



MAG 30 46



DISPUTATIONES
AD MORBORUM
HISTORIAM ET CURATIONEM
FACIENTES.

QUAS COLLEGIT, EDIDIT ET RECENSUIT

ALBERTUS HALLERUS.

TOMI SEPTIMI PARS II.

PRIORUM VOLUMINUM SUPPLEMENTUM.



LAUSANNE,

Sumptibus SIGISMUNDI D'ARNAY.



MDCCCLX.

CCXLVIII.

J. HENR. SCHULZE

ET

FRID. WILHELM. BRUNE

CASUS ALIQUOT

MENTE ALIENATORUM AUT PERVERSORUM

HALL. 1737.

P R O O E M I U M.

QUanta sit hominum felicitas, quibus mentem sanam in corpore sano Deum indulget, tunc demum cognoscimus, quando miserrimos illos intuemur, qui vel penitus mente alienati sunt, vel perversa bona mentis parte quadam velut cum ratione insanunt. Quo autem magis venerari divinum beneficium discimus, & ne quisquam elatus de se sentiat, credo fieri ut Deus, qui omnia hominum negotia dirigit, inter nos haud raro permittat aliquos recte rationis usum vel omnino amittere, vel per intervalla eo privari, vel denique aliqua ex parte delirare & a vero impertinaciter aberrare, ut omnes, qui cum ipsis vivunt, agnoscant quantum sibi ipsis dissimiles facti fuerint, & calamitatem eorum non sine doloribus commiseratione intueantur. Quo autem nobilior est animi, quam corporis integritas, quoque plus damni sepe infertur hominum societati ab ejusmodi aegrotis, qui mente corrupti, quam corpore affecti sunt; quam si fere tantum non juvando, quantum praesent, noceant; illi vero sepe magnarum calamitatum auctores inviti sunt: apparet sane quam digna sit medico hac cura, qua impenditur sollicite notantis ac perpendendi casibus istiusmodi, ubi homines antea bene sani in huiusmodi calamitatem inciderunt. Quiaquam enim sunt aliqui, ubi vix licet aliquid invenire, de quo certo perhibere quantum hoc consequuti evenim sufficientem rationem fuisse: per aliquibus tamen aliquid cum summa veri similitudine elucet, quod si

Disput. Medico-Pract. Tom. VII. Hhh tamquam

tamquam indicem in curando sequimur, aliquando ad salutem recuperandum valere potest. Res sane digna videtur, quam non permittamus empiricis, inter quorum manus aliquos periisse non sine dolore recordor, quemadmodum neque defunt, quorum ad recta rationis ductum, per methodicam & satâ blandam curationem, restitutorum non sine gaudio & gratie divina celebratione meminisse possum. Putavi igitur non committendum ut casus mihi bene noti, & a D. D. PRÆSIDIS mecum communicati, privatim mihi serviant. Referam bona fide acceptas facti circumstantias, & quas meditatione crebra elicere hinc licuit veri similitudines, candide impertiar, pro lucro habiturus si quis loco vero similium certa & demonstrata hinc deducere, & ad communem fructum conferre valuerit & voluerit.

C A S U S I.

JUvenis vigesimum annum egressus, jamque academiam ingressus, non lauto quidem stipendio, sed integra mente, bonis litteris operam daturus, honorato cuidam viro suam operam addixerat, ut ipsi aliquibus negotiis inserviret. Corripiebatur autem scabie humida, quæ tantopere manus obsidebat, ut ministerio ineptus redderetur. Anxius ille quærebat non a quo securissima ratione, sed ut citissime curaretur. Incidit in hominem qui sulphur oleo subactum jubet injungere. Paret, & mox consequitur manus nitidas. Enimvero sat cito emicabant valetudinis magnopere labefactæ conspicua signa, & hæc inter perniciem, corruptæ mentis indicia. Cantillabat, ubi minime decebat, cachinnabatur, alia omnia agebat, quam locus, tempus & demandatum ministerium requirebant. Aliquando subito & tanta cum pernicitate, ut nemo eum assequi posset, per medium forum & plateas decurrebat, donec omnino fessus & viribus destitutus in agro procidebat. Non opus est plura dare specimina. Quum in singulos dies, tam corpore, quam mente, deterior omninoque cachecticus, mox etiam hemiplegicus factus, diem tandem obiisset, cultroque via pararetur ad extispicium, mire omnia corrupta offerebat abdomen sua viscera. Cum peritonæo omentum cohærebat: hoc inferius cum intestinis, hæc inter se & cum ventriculo, hepate & liene valde crasso & duro ira coaluerant, ut unam quasi passam hæc omnia sisterent, lividis ulcusculis & passim vero pure turgentibus pustulis, quales sunt scabiosorum, in hoc magno glorio hinc & inde conspicuis. Pulmones ad quamvis bronchiorum divisionem obsessi erant crebris tuberculis, quorum maxima nucem juglandem æquabant, cetera proportionem eadem, ut ipsi bronchiorum rami angustiores

tiores diametros habebant, minora observabantur. Incisa hæc materiam in quibusdam molliorem, instar gypsi modo aqua subacti, in aliis aliquantum spissiore, instar gypsi magis jam consistentis, offerebant. Caput ne secaretur, efficiebat dirus futor cadaveris, cujus sat multum se devorasse præsentem omnes existimabant & his visis acquiescendum rebantur.

EPICRISIS MEDICA.

§. I.

Sistit hic casus complura, quæ medicum allicere ad considerationem maturiorem possunt. Sed nos unicum hoc, quod promissimus, venabimur, scilicet ut inveniamus, cui in mente pervertenda aliquid iuste tribuere possimus. Fuisse autem mentem deliram ex casu satis patet: potuissentque plura, quæ id comprobarent, documenta similia adferri. Quin omnino post hemiplexiam & sermonis & omnis rationis usum aliquanto ante obitum tempore amiserat.

§. II.

Præcipue hic nobis in abdomine occurrit magna illa omnium partium, naturalibus actionibus destinatarum, a recto & laudabili statu discrepantia: quam ut quidem orta fuerit, & ad producendos effectus in mentis officinam prave valuerit, ex mea sententia præferam. Scabiosa materia, ad interiorem superficiem compulsa, ibi efflavit & exulcerationes fecit. Hæ exulcerationes effacerunt illum a natura omnino ablutentem coalitum. Hæc facta motus ventriculi & intestinorum peristalticus & undulatorius necessario pervertebatur. Hinc vitium redundabat ad chylicationem: qua depravata sanguinem non potuisse bonum elaborari per se patet. Cognoscitur autem qualitas vitii chylo afflicti ex glandularum bronchialium magno infarctu, & in illis deprehensa collectione materie instar casei aut gypsi magis vel minus mollis. Quum vero ad illas glandulas nihil venire possit, nisi mediate per lympham a sanguine digressam: non potest sane dubitari ipsum sanguinem crassioribus etiam ejus generis partibus plenum fuisse: quum ad lympham non nisi id, quod in humorum massa est tenuissimum, perveniat.

§. III.

Quum hic talis humor, ad trajiciendum tenuissima colatoria & canaliculos transeundos ineptissimus, in vasis ferretur, quid mirum si

H h h 2

animæ

animæ ratiocinantis officinam, cerebrum, ubi sunt omnium tenuissimæ ductus, minus recte trajecit, adeoque perverso & depravato organo actiones depravatæ fuerunt. Quantam autem sanguinis qualitas, & ad motum vel aptitudinem vel ineptitudinem, potestatem in animæ actiones habeat, solide ostendit Illustris noster FRID. HOFFMANNUS, cum aliis multis locis, tum maxime nervosæ *Medic. Systemat. Tom. I. Sect. III. cap. VII. §. 6. & seqq.* Nihil itaque mirum si in hoc homine, antea vitæ sedentariæ dedito, deinde tantopere corruptis visceribus prædito, actiones animæ fuerunt perturbatæ, quæ non solum ratiocinationem, sed motus ipsos animales per eminentiam dictos depravavit & ex magna parte, consequuta hemiplegia, absulit.

§. IV.

Nec omittendus est lienis depravatus omnino status, five is ab eodem prius corruptæ sanguificationis vitio enatus est, five antiquiora initia habuit. Qui hominum melancholia hypochondriaca afflictorum corpora secuerunt, sapissime notaverunt magnos, crassos, induratos lienes. Enimvero nexus inter hujus visceris vitia & animi perturbationes tanto abstrusioris cognitionis est, quanto major est de lienis usu & officio in œconomia corporis nostri disceptatio; quam hic vel refutere vel judicare ab instituto meo alienum videtur. Consultatur BONETUS in *sepulchret. lib. I. sect. IX.*

§. V.

Utrum vero in causâ perversarum mentis actionum solis fluidorum depravatorum vitiis inhærendum sit, an suas etiam partes solida sustinuerint, & forte non postremas, cogitandum nunc fuerit. Age igitur consideremus, quantum nexus ille præternaturalis tot partium, quæ ab instituto naturæ debebant liberæ esse, nocere possit. Omentum peritonæo erat adnatum superiori latere, inferiori cum intestinis, ipsis inter se coalitis concreverat. Jam ea est natura omenti, ut ventriculo expanso ab assuetis sursum trahatur, eodem vacuo descendat & libere longiusque dependeat. Ita autem est comparatum cum partibus omnibus, ut tensio diuturnior in eodem statu manens, nobis molestiam afferat, quamvis talis sit, ut sine dolore & incommodo eandem facile per breve tempus feras. Quis est, qui non id sentiat quando e. g. brachium diutius extendendum est? quin commodo sedili impositus, si eodem situ per complures horas permanere debeas, id tibi molestum sane experieris, mutandique positum illum desiderio afficeris, cujus rationes

rationes ipse vix alias, quam sensum quendam innominatum, quem intra te ipsum percipis, allegare poteris.

§. VI.

Memorabilis est observatio ex WARTHONO apud BONETUM allata c. l. *obs.* XX. de viro melancholico, in quo dissecto omentum nigricans, fere putridum, & pluribus locis infra umbilicum peritonæo adhærens, inventum fuit. Ceterum tensionis etiam transitorie effectum subinde videmus in quibusdam hypochondriaco-melancholicis, qui semper gravius degunt quoties alvus pertinaciter clausa est, aut status intestina & ventriculorum valde tendunt; unde his submotis causis manifestum fit, quantum levati fuerint.

§. VII.

Rara est apud observationum auctores mentio pustularum viscera abdominis obsidentium: quare non possum quin hoc loco commemorarem, fuisse non ita pridem quoque simile quid visum in theatro hujus academie anatomico, quod dissecaretur femina, quæ a multis annis læpius delira, sed aliquando ab errore mentis satis visa fuit libera.

CASUS II.

Femina XXX. annos egressa, in matrimonio vivens, rebus pro sua conditione satis lautis, nihil, de quo conquereretur aut angî posset, experta, aliquot liberorum mater, ab omnibus, qui eam noverant, moderationis & prudentiæ laude ornata, cum puerperio satis bene defuncta esset, jamque in publicum prodire cœpisset, in miram aliquam mentis aberrationem, finiente hieme, incidebat. Nam quum de aliis omnibus rebus satis recte judicaret & sermocinaretur, in hoc uno, sed gravissimo sane, pertinacissime delirabat, quod verum Deum apertissimo odio se prosequi, d.ctis horrendum in modum blasphemis, misera testabatur: de diabolo vero jucundissime cogitabat & loquebatur, eum deperire se & unice desiderare præse ferebat, neque se ab illo detestabili errore liberari aut dimoveri cupiebat. Quum intra hæc aliquanto tempore desipuisset, magis jam taciturna fiebat, alienatum a marito & liberis animum prodebat: ut jam non sine ratione graviora metuerentur, & custodes adhiberi deberent. Truces erant oculi, & quod in illis album esse debet, plane fuscum videbatur. Edebat inter hæc

dubitabat hepar cum systemate cholepoco male constitutum, atque huic succurrendum esse.

§. II.

Incepit igitur a remedio externo, quod non solum spasmos seu stricuras fibrarum omnis generis resolvit, verum etiam in humoribus fluiditati suæ restituendis utile sæpius invenerat.

§. III.

Subjunxit tandem flosculi, non suo pretio habiti & plane polychrestii, usum; qui spem de bile emendanda & mensibus promovendis minime destituit. Plura addere non opus puto.

C A S U S III.

Feminae rusticæ sexagenariæ vetulus maritus requirebat opem medicam pro sua matre familias, quæ non solum toto corpore emarcuerat intra breve tempus, ut vix pedibus incedere posset: sed prius fatua & mente destituta, aliquibus certe horis, videbatur. Nuper, cum cœnam apparatus butyrum in fartagine liquaret, conciderat ad focum, effluenteque & flammis incensa materia incendium grave consequutum esset, nisi bona totius pagi fortuna illo momento rediisset ex agro familia & opem tulisset. Hæc audiens medicus de prægressa valetudine percunctabatur. Audiebat semper robustam & sanam fuisse, usque ad ver prægressum, quo, febre intermittente correpta, remediis domesticis mox convalesceret a febre quidem, sed alacritatem non recuperaverat. Ignorare se profitebatur, quo remedio usâ sit, sed hoc se scire putabat, quod sit rusticæ plebi admodum familiare. Medicus non dubitabat febrem quidem suppressam, sed causam ejus superesse; dabat igitur aliqua, quæ sæpius bona fuerat expertus. Rusticus post aliquot dies interfectos referebat, nihil esse istis medicinis effectum; rogabat opem sibi ferri. Proxime ab urbe distabat pagus & amœna tempestas ad illuc deambulandum invitabat. Exquirebat accuratius quid factum esset ad febrem illam abigendam: simulque considerabat ægrotam, quæ omnino marcida, instar vivi sceleti cute corrugata inducti, nec pedibus consistere, nec audire bene, nec videre, nec verba proferre valebat. Conficia remedia filia, quid factum esset probebat. Scilicet urinam febricitantis farina subegerant. hancque pastam vesicæ suillæ inditam in camino suspendebant. Jubebat medicus afferri vesicam, eamque in profluentem proximæ rivum illico evacuare & eluere, præcipiebat ægrotam autem balneo

neo

neo aquæ dulcis tepido, cui furfures & obviæ quædam plantæ incoctæ essent, aliquoties foveri iussit. Uno vel altero mense transacto tantum confirmata erat, ut cum vetulo marito ad medicum, satis pro illa ætate alacris, veniret, gratumque animum profiteretur.

EPICRISIS MEDICA.

§. I.

Sistit hic casus imminutionem & paulatinam ablationem facultatis tam ratiocinantis cum sensitiva, quam simul actionum naturalium & vitalium. Id vero quam manifestum est, omnique dubio carere videtur, tam abstrusa est connexio inter effectum & causam, quæ deprehensa fuit.

§. II.

Scio quam controversa sit doctrina de sympatheticis illis; quæ etiam maleficia audiunt, ubi ad lædendam hominis valetudinem fuerunt adhibita. Alexandri nostri, quoniam notum hunc Gordium non facile solvunt, ne imperio Afiz excidant, malunt eum secare, & omnia fabulis adscribere. Mihi illud quidem non placet; sed cautius videtur profiteri quod nesciamus id, quod & doctissimi expedire desperant.

§. III.

Homines fame diuturna vexatos animi & corporis vigorem amittere res est notissima: consignaveruntque iterum ac historiarum scriptores multa exempla miserorum, qui ad delirium, quin rabiem ac furrorem, tandem, ubi ad extrema prope pervenerant, ad omnimodum mentis stuporem adacti & adducti fuerunt, quoniam alimento caruerunt. Non autem mirandum si id accadat hominibus vigentibus & appetitu bono præditis vehementius: in nostra vero, utpote sene & febre exhausta, magis paulatino incremento invaluit & progressum fuit.

§. IV.

Scio multis ita videri posse hoc negotium, quod remedium sympatheticum nullam culpam sustinuerit, cum id non fuisset inter rusticolas illius tractus tam familiare, si tales noxas afferre antea observatum esset. His autem repono prudens CORNELII CELSI effatum: *non sequitur, ut quod alium non afficit, aut eundem alias, id ne alteri quidem, aut eidem tempore alio, noceat. Possunt enim quædam subesse corpori, vel ex infirmitate ejus, vel ex aliquo afflicto, quæ vel in alio non sunt,*
vel

vel in hoc alias non fuerunt. Succurrit casus, qui multos honestos viros, quos superstites spero, testes habet, quemque referam ut moneat eos, qui vel omnino elewant sympatheticas curationes, vel nimium iis fidunt. Juvenis XXX. annorum, artifex & artificis præclari filius, hernia laborabat, pudoreque detinebatur, ne opem quæreretur. Legerat is in chirurgorum scriptis omnium tumorum incrementa sisti, quin eos sensim evanescere, post contactum manus mortuæ, præcipue si sit hominis phthisico morbo extincti. Quamque pater ejus hoc morbo decederet, manum mortui admovet suo scroto & inguini. Post aliquot dies partes illæ coeperunt absque dolore aut inflammatione emori, prorsusque in putrilaginem, nulla arte compescibilem, abire, quæ ad intestinum simul prolapsum, indeque ad reliqua eundo moriendi necessitatem attulit. Certo scio mille homines scrophulas, aliasque excrescentias, tali manu attigisse, si non cum optato fructu, tamen sine tam funesto eventu.

CASUS IV.

Femina plebeia XXV. annorum, robusta, iracunda, & nulla disciplina ad mansuetudinem deducta, quum nuper puerperio satis bene esset defuncta, audiebat quædam accidisse, quæ fortunas ejus eversura videbantur. Tantopere indulgebat iracundiæ, ut par erat ab hujus generis femina expectare. Ita autem exagitata, totaque in fermento existens, mammas exfugendas tenero scroto porrigebat, qui inde epilepsia correptus moriebatur. Nescio quantus hic moeror post iram fuerit consequutus: sed illud scio mox fuisse febrem subsequutam, & mammas ab affluxu lactis valde tumefactas. Adhibebatur in consilium barbitonfor: sed mox emicabat plena mania. Quum aliquo tempore non adesset qui eam custodirent, frigidissima hyeme lecto exsiliabat, & ad fluvium, non procul a suis redibus decurrentem, tunc glacie penitus constratum, properabat, seseque multitudini juvenum ibi se exercentium tota nuda ingerebat. Non poterat ipsi persuaderi, ut quicquam medicinæ assumeret, vel exterius imponi pateretur. Fallenda igitur erat. Nam quum non abhorrere illam spirituosa intellexisset medicus, concinnabat satis efficax vomitorium antimonialia, quod gratissimæ aquæ, ut vocant, vitæ comparari posset. Succedebat fraus licita, ut omnem avidè exhauriret potionem. Mediocriter vomebat, sed cum euphoria optatissima: ad mentem enim bonam hæctenus redibat, ut se usui medicinarum, quibus percurata est, deinceps idoneam & obsequentem præberet.

EPICRISIS MEDICA.

§. I.

HIPPOCRATES Sect. V. aph. 40. scribit: *mulieribus, quibus ad mammas sanguis in tumorem colligitur, furor significatur.* GALENUS ad h. z. notat rarius hoc contingere, nec sibi obvenisse casum. Medicus non incelebris HIEREM. THRIVERIUS BRACHELIUS in comment. ad h. l. ita, haud scio an satis ad rem, scribit: *Id contigit nobis videre, quod mulier quadam, quotiescunque aliquo tempore puerum lactasset, propemodum desperet.* Sed propemodum desipere multum distat a furore, ^{mania}. FRANG. VALLESIUS Comment. ad hunc locum, restringit sensum eo, ut furor extimesci debeat, si pro lacte sanguis mulgeatur; neque tamen significat quibus id rationibus motus asserat. Propius ad rem facit historia, quam recenset HENRIC. ad HEER Observat. cap. XIV. quam apud ipsum commendo legendam. Noster hic casus quantum illustret Hippocrateum aphorismum, spero abunde patere. Forte in Heeriano casu, & illo, qui Hippocrati contigit, præcesserunt similes causæ procatasticæ, ad animum vehementer commovendum efficaces. Sed quum illi de his sileant, in nostro sane merentur in primis attendi. Nam quum re vera multæ quotannis occurrant feminæ, quibus mammae in magnum tumorem attolluntur; utique ab affluente & detento sanguine, quod eventus suppuratorius luce meridiana clarius comprobat; haud tamen adeo frequenter notatur concurrens aut succedens mania. Evolvi studiose magnam gynæciorum commentationum collectionem Basileæ quatuor voluminibus editam, sed nihil, quod me doceret, invenire potui.

§. II.

Ut huic miseræ daretur vomitorium antimoniale, potissimum efficiebat tunc recens lecta observatio D. D. ALBRECHTI in ephemer. N. C. dec. II. ann. VI. pag. 46. cui candidus calculus adjicitur ab auctore penultimæ editionis Dispensatorii Braudenburgici ad tit. *sæpe vomitoria* D. Sylvi.

§. III.

Nec erat poenitendus effectus. Quamquam enim viri, quibus multum, ut debent omnes recta monentibus, attendo, vitare jubent vomitorias medicinas post exandescentiam; hic tamen casus non videbatur illo præcepto comprehensus, quum vomitorii irriti conatus, qui merito suspecti sunt, non adessent, jamque plures dies ab exandescencia illa

illa effluxissent, absque eo ut se proderet signum inflammati stomachi

§. IV.

Verosimile est profectum, qui a medicina consequeretur, tribuendum esse effectui universaliter resolventi & dispoico, quem antimonialia emetica blandius operata post se relinquunt; quem si anodinum dicere velis & antispasmodicum, facies, credo equidem, eodem jure, quo incredibili consensu cinnabaris hodie inter talia principem fere locum consequuta est. Et nec alia erant, quæ post vomitorium dabantur, medicamenta, præter antimonialia fixa cum cinnabari, & sacculum discutientem mammis exterius imponendum.

CASUS V.

Vir honestus, doctus & magnis dignitatibus ornatus, temperamenti sanguineo - melancholici, quinquagesimum annum jam supergressus, quum maximi momenti negotiis coram principum legatus occupatus esset discipulis, hicque labor in multos dies protraheretur; quo toto tempore occupatissimus erat, suæque causæ tuendæ intentissimus; parum inierat poterat corpori & animo per justa quietis & recreationis intervalla sustentandis & refocillandis indulgere. Quum negotium ex voto plane confectum esset, omnes, qui ipsum antea noverant, mirabantur animi infoliam submissionem & prostrationem. Cesserat pristina alacritas, vultus tristitiam præ se ferebat, lacrymabatur subinde, metus sibi fingeat, aut a longissimo accersebat. Mox augebatur malum, ut male coherencia loqueretur, & quæ nunquam facta erant, tanquam facta referret. Parum inter hæc appetebat, & alvo reddebat dura, grisea, fere canum scybalis similia. Quum is esset valetudinis status, necio cujus consilio, & sanguis semel ac iterum detrahebatur, & vomitorium offerebatur. In deterius hinc omnia vergebant, & cachexia ichterica emicabat, animo etiam magis, quam antea, irrequieto & vagis imaginibus turbato. Toto hoc tempore parum fuerat somno recreatus, multasque noctes prorsus insomnes transegerat: noctu semper niagis, quam per diem, afflictus. Hoc rerum statu ad consilium vocabatur medicus, qui, quum calorem aliquem siccum depascenem animadverteret, ante omnia huic statuebat obviam ire, & simul somni beneficium reducere. Rem gerebat, quum junius mensis esset, & situs affligeret ægotantem, emulsione ex seminibus frigidis & papaveris, cum aqua ceraforum nigrorum & florum nymphaeæ. Hanc ipsi versus vesperam copiose indulgebat, fructu optato, ut illa nocte per aliquot

aliquot horas blando somno reficeretur. Quum die insequuta multo melius se habentem ægrotum deprehenderet medicus, hypochondriacæ regioni imponebat emplastrum resolvens & anodinum, ex saponato, splenetico, & de ammoniaco: in prandii cœnæque sine ovum mollissime coctum, cum pauxillo pulveris florum cheiri, jubebat sumere, versus noctem vero emulsionem prædictam repetere. Reddebatur hæc inter alvus magis magisque liquida & exturbabat tandem copiose flavas biliosas fæces; quo facto ad naturalem statum redibat, ut ab omni pristina labe nunc immunis jam per decem annos degat, suoque principi, & amicorum ac clientum negotiis, absque impedimento possit satisfacere.

EPICRISIS MEDICA.

§. I.

In hoc viro manifestum est, quod labes valetudini illata a nimia virium animi agitatione, & continuata sollicitudine cum vigiliis, orta fuerit. Irrequieta enim cogitatio nocturnæque vigilie, præsertim per multos dies protractæ, corporum robor valde minuunt & per hoc ipsas animi vires atterunt.

§. II.

Quo pacto id fiat, quibusque gradibus invalescat, egregie, & ad practicum usum commodissime, docuit illustris quondam archiater Palatinus JOAN. CONR. a BRUNN in aureo libello de *glandulis duodeni*; cujus ductum in percurando hoc ægroto sequutus posterior medicus, nihil hic evacuantibus, sed plurimum sedantibus atque chylicationis negotium emendantibus, tribuit. Haud enim poterat ipsum fallere origo morbi, intuentem quæ prægressa fuerant, & ad defectum bilis, de quo fæces testabantur, animum rite advertentem.

§. III.

De fructu emulsionum ex refrigerantibus & papaveraceis, qui adeo quoque in acutis deliriis manifestus est, nihil hic attinet dicere, quum ab omni ævo commendatius nihil apud practicos occurrat. Quod vero etiam in chronicis melancholicorum affectibus apprime conducatur, si quis somnum omni secuta ratione, per externa & interna præsidia, adducere & in justum ordinem redigere allaborat, plurimis exemplis posset doceri. Non heic suadeo ad opium illico recurrere; quod

quod minime damno, sed suo loco honorifice positum relinquo : sed scio haud saepe hoc indigere medicum, qui praxin antiquam suo pretio habere & tempestive imitari didicit.

§. IV.

Quibus indicationibus cetera, quae in hoc viro salutariter adhibita sunt, directa & superstructa fuerint, jam satis puto ex superioribus clarum esse posse. Et haec nunc sufficiant.



CCXLIX.
 JOH. BOHN,
 ET
 DAVID VIPACHER
 CASUS
 ÆGRI NOCTAMBULATIONIS MORBO
 LABORANTIS RESOLUTUS.

Lps. 1717.

P R Æ F A M E N.

QUicquid innotum diu manet, id extra controversiam vel teredinibus excedi, vel sine corrodi, vel argine affici, vel alio quocunque modo tempus invidum corrumpere, præter Ovid. Metamorphos. L. XV. ipsa quotidiana testatur experientia. Hinc etiam est, quod in præsentem vires ingenii mei periclitor, ne forsitan (veluti sapius evenire solet) eodem fere modo torpore tandem consumantur, vel, ad minimum, odorem tantum ignavia redoleant, ac inficiantur. Non autem hic de singulari venenum inter atque cornu monocerotum antipathia: non, de cantilena cygni suavitate: nec etiam de lapidum ita dicti Philosophorum existentia; multo minus de partu, frustra dudum adeo desiderati, Perpetui mobilis, aliisque hujuscemodi, sollicitor esse libet, quippe, cum uno intuitu plures considerare velle res, ineptum videatur admodum. Sed potius ÆGRUM, SOMNAMBULATIONIS MALO (cujus existentiam permulti hodiernum acriter in dubium vocant, ne dicam penitus negant) LABORANTEM, utpote quod, nostri præcipue rationem habentes fori, paulo plus, nisi solior, in recessu fovere videtur, quam quidem in limine pronittit, sub incudem revocare, mihi nunc est animus. Revera stupendum esse hunc affectum, dignumque, circa quem sollicitum aliquanto medici occurrunt, vel me tacente, quilibet

quilibet levi perspicit negotio. Quod ego animo volvens, nuper cum, ex auctoritate atque decreto gratissimum, Incluta hujus academica, collegii medici, SPECIMEN INAUGURALE ACADEMICUM meditarer, non dubitavi, licet impar tanti operis, ad amissum delineandi, argumentum illum constituere casum, non ita pridem in juvene singulari cura notatum. Quem, cum resolutum paucis hisce pagellâ luci publicae jam exhibeo, non blandiri quidem mihi, persuasione materia ratiore tractande (superbia quodam incitatus stimulo, sustineo: sustineor autem spe bona apud bonos benevolosque Lectores, facili me tam negligenter omisforum, quam improvisi commissorum, impetraturum veniam, aqua cumprimis si lance perpenderit, me, in re adeo ardua, omnibus quidem satisfacere voluisse, Et, quod in magnâ, juxta vulgatum illud, etiam voluisse tantum, satissit. Quod superest, faveas, oro, adspiceque disceptationi huic meae supremum munus, atque impofterum non hujusmodi solum in casibus recte mederi, sed Et alii perniciossimâ morborum generibus felicem ac fructuosam ad-movere licet manum. Benedicas ex alto benignissimus archiatrorum archia-ter conatibus meis, eosque in sanctissimi nominis sui gloriam, Et nostri plurimorumque languentium salutem cedere felicissime faciat. Hoc itaque duce, hoc auspice, jam fiat initium ab

HISTORIA CASUS.

Noti hic Læpse juvenem perbonestum extorrem, vigesimum quartum jam, nisi fallor, aetatis agentem annum, gracilem corpore, facie pallidum, ventre subtumido ac duro, potu fere nullo, ciboque succiore uti adjectum: appetitu solito vehementiore, dolore circa praecordia tenso, artuum immo-dica lassitudine, nec non obstructionibus alvi pertinacioribus, accedente frequentiore phlogosi, continua cum dyspnœa, laborantem; ad hæc vitæ sedentariam, quam res angusta domi tum temporis ita distabat, ob lucri desiderium, acriter prosequentem, caris ac marore non levis agitatum, inde, somno pauco, eoque turbulento, fruentem, Et valde semper medita-bundum. Hic, ad studia non minus quam alios labores pronus, ne horas perderet successivâ, collegia medica celeberrimorum in arte virorum, alii cum cura describenda suscipit. Cum cura, inquam, siquidem pro more suo ne verbulum difficilis (quibus tamen integrum medicina scaset forum) nisi primâ abunde consideratum, questum, intellectumque, pretermisit. Unde factum etiam est, ut spatium bimestri sic transacto, Et quidam circa medi-um anni MDCCCXII. præter omnem spem atque opinionem in somnum adeo depravatam incidere, ut, per integrum fere Junii mensem, sive noctu, sive interdiu etiam somno correptus, clausis vereque dormientibus oculis e lecto vel sedili surgeret, e illegia scriptula pervolveret, vocabula difficiliora terminoque medicos, alia silentio, lexico castelli, quod, repositurum ac-cedens

cedens, ex eo tam provide petiit, ut vigilem esse iuraveris, arrepto, singulari cum attentione quereretur, non inventa verbis exciperet durioribus, reperta vero hilari vultu, exilamo, (ridiculum est, sed mirum admodum dictum) rudi licet charactere, distincte tamen, super chartam notaret, donec his ita peractum denique lectum intraret, nihil ante gestorum futuro mane sibi conscium. Vidit autem, narravitque mihi hæc omnia candidè conterraneum ejus, idem hypocaustum idemque lectum ad tempus una cum eodem capiens, qui etiam, antequam restitueretur, (restitutum vero est felicissime, adhucque, quamdiu Deo ita visum fueris, inter vivos hospitatur) cum aliquando per jocum, postquam noctu, brevi post obdormitionem, hora videlicet inter primam ac duodecimam media, sic dormiens, lectum egressus, ad mensulam straret, scriptaque more solito volveret, plaga, in fidem rei, (negabas enim omnia neque ultero passus erat, sibi hæc de re illud) ut sentiret, excepit, qua accepta, in terram concidis, sicque narratum hæcenus fabulam revera confirmatam esse; ambabus concedit atque faretur. Petis itaque consilium.

Resolutionis.

S. I.

Quis, qualis & quantus sit affectus, quem profigare hic est animus? quis item & qualis, quantusve homo, cui medicinam parare, jam allaboro? percontari sollicitè prius, quam vel determinare velle agendum quid, vel tentare quicquam, jubent saluberrimæ artis medendi magistri. Quorum dicto audiens & ego, disquirere cumprimis, de eo; quid mali sit, quod historia præsens innuit? totus occupatus ero. Et esse quidem somnambulationem, partim ex descriptione hujus ipsius morbi, partim etiam ex historiis eorum, quos vel unquam ejusmodi affectu laborasse constat, paulo infra recensendis, patefiet. Oportet autem, si iusto singula tractare velimus ordine modoque, ante omnia vocis ipsius usum (teste subtilissimo Philosophorum arbitro, J. C. Scaligero, L. de subtil. ad Hieron. Cardan. Exerc. I. Sect. I.) cognoscere, partim quod ab eo sæpenumero ad rei perceptionem ultro provehamur; partim etiam, quod ad rei progressus haud pateat nisi prius rei sit conspicuum: partim denique, quod surdo narrarem fabulam, quamdiu rudiores quosdam nomen ac res omnis adhuc lateat, ejus in rationes inquiratur anxie. Nam & ipse Galenus, de quo infra paulo dicetur, antea id credere nolens, tandem experientia rem ipsam edoctus, coactus est credere. Et Horstius ipsissimis hæc verbis librum suum de natura disferentis & causis eorum qui dormientes ambulant, sequentem in modum orditur:

orditur : Multi sunt , qui cum vel causas , cur dormientes in somno ambulent , omniaque opera peragant , ignorent , vel ipsi tales nunquam viderint , nihil eorum qua dormientes perficiunt , utus a fide dignis vel doctioribus referri audiunt , credant .

§. II.

Vocabulum somnambulationis , *νυσθηρία* Græcis , ἀνὰ τὴν νύκτα , a somno , καὶ τὸ βῆαι , & ambulare vadere vel incedere , natales suos ducit , Germ. *das Ungehen im Schlafe* : improprie vero , *die Mondsucht* , atque hoc malo detentos , *die Mondsuchtigen* , appellare communiter solent . Aliis , uti v. g. *Jacobo Horstio* , Traß. modo laudato *passim* integro : *Semerto* , *Medic. Pract. L. 1. P. II. c. 19. p. m. 484.* & *Libavio* , *singular. P. II. Dissertat. 8.* dicitur *νυσθηρία* s. noctambulatio , itemque noctisurgium : *Bonetus vero in Sepulchret. anatom. L. 1. S. 5. p. 152.* noctivagationem nominat , sed minus accurate cum & sanos noctu surgere (præcipue si necessitas excretionis alicujus , urinæ puta vel ficum alvinarum &c. urgeat ,) quotidiana , in subiectis bibulis ut plurimum , doceat experientia : præterea noctambulones rectius dici quosvis , qui vigilantes seu ex officio seu etiam intentione pessima , furum , raptorumque imitari indolem , noctu iter faciunt , quo fallere securius , & sub umbone tenebrarum , opera sua tenebrarum , fidentius tegere queant , quos *Horatius L. 1. Epist. 2. v. 32.* ita , *distinguit* :

Ut jugulent homines , surgunt de nocte latrones.

Vel ex alia quacunque tandem consuetudine prava noctu discunt , quive Germanis comm. *Nacht-Räben* , *Nachroder Dassen-Schwärmer* , &c. &c. audiunt , nemo facile in dubium vocabit . Ejusmodi noctambulis accenferi quoque merito possunt studiosi illi Lovanienses (ut vicinos atque proximos silentii populo hic involvamus) quorum prot. riviam Jesuita *Bellarminus Tom. VI. oper. Conc. 6.* perstringit seqq. „ *Quis* , inquit , *ignorat* , multos esse , qui Lovanium veniunt , ut doctores „ *fiant in jure* , & *sunt doctores in choreis* & *in gladio* ? Quorum multi „ *sunt* , qui , cum ad parentes suos redeunt , si queratur ab eò : quid „ *Lovanii didicisti* ? responsuri sunt , si verum dicere velint ; didicimus „ *vagari totam noctem per plateas* : didicimus *districto gladio bellum gerere* „ *cum lapidibus* : didicimus multa novaque genera *chorearum* : didicimus uno „ *hausu libere medium poculum* : didicimus denique *pecunias nostras* , quæ „ *unum mensem duratura erant* , una hora consumere . Quadrat huc apposite , quæ *B. Franzius* movet *Part. 1. Hystor. animal. c. 25.* *Quæri solet ab eruditis joci gratia* , utrum in una urbe possint esse *Antipodes* ; *Dissut. Medico-Pract. Tom. VII.* K k k (mallem

(mallem ego dicere noctambulones) & respondetur, affirmando. Nimirum *Antipodes nostri, sunt nostri Helluones, qui habent diem seu lucem*, (i. e. laboriosi atque occupati sunt, sed NB. circa pocula &c. acriter cum iis dimicando) quando nos dormimus, & vicissim ipsi dormiunt, cum nos in die seu luce operamur. De quibus tamen agere, cum nec operarum nunc, neque partium nostrarum sit, merito hic nobis conscientiae ducimus, Ciceronis illud in Lælio cogitantes: satis superque esse sibi suarumque cuique rerum curam, alienis nimis implicari, molestum. Porro *Foresto L. X. Observ. 50. p. 377. & Schenk. observ. Medic. L. I. p. 142. Nocturna nominatur infania: Etmullero, op. Theor. Pract. P. II. c. 6. p. 252. (Edit. Lugd.) Somnus vigilans & vigilia somnians; Paracelso, L. de insomni. & eunt. in somno p. 494. Mania somni, aliis denique aliter. Et utut nonnulli vocabulis huius promiscue utantur, putantes, nominum possessionem neminem, adeoque nec ipsos facere divites, nihilominus tamen accuratissimum atque convenientissimum illud esse, quod Tituli loco posuimus; utpote, ad naturam morbi, sub prælo jam sudantis, quam proxime accedens præter *Sennertum Medic. Pract. L. I. P. II. c. 19 p. m. 454. Capellus in suo Lexico Med. Græc. Lat. sub voce noctambulo, Martini Centur. VI. quæst. illustr. Diss. 3. Qu. 4. & Sperlingium Traët. de anima sensitiva cap. 15. qu. 5. satis superque comprobare videntur. Quamvis neque denominationem illam doctissimi Etmulleri, nisi forsitan ob pronunciationem paulo prolixiorē, hic plane rejiciendam putemus.**

§. III.

An vero somnambulatio termino *Helmontiano Traët. demens idea* §. 37. p. m. 269. Lunaticismus a nobis hic dici commode queat, ideo, quod eo tempore, quo Luna, ad *apogæum*, perventa, splendere amat, obrerrare fodalem suum *Helmontium* forte deprehenderit, vid. *Traët. Form. art. §. 54. p. m. 136. vel etiam ex eo, quod Somnambuli a Galeno Comment. I. ad L. III. Epidem. Hippocr. p. 252. vocantur, & a Jacobo Horstio, Libr. præmemor. c. 3. p. 189. Lunatici vocentur, maxime, cum ex clarissimi Sennerti sententia constet, sub incrementum Lunæ hunc affectum esse valde familiarem, qua de re videri poterit loco superius allegato p. 457. valde, non sine ratione, dubito, & primo quidem, quoniam Lunaticismi nomen proprie competat Maniæ vel etiam Epilepsiæ certis Lunæ intervallis repetenti ac redeunti, prout ex sacris literis, vides. Matth. cap. 4. v. 24. & cap. 17. v. 15. videre est: Secundo, quod decrefcente etiam Luna, & absente, h. e. interdiu, nihilominus observari sine ullo discrimine somnambulatio solet; cujus rei testimonium præter ipsam a nobis prolatam historiam præbet *Coscellus**

tellus in alleg. *Lexico Gr. Lat.* p. 674. sub voce *somnambulo*. *Propria* inquit, *experientia* *sumus* *edocti*, *theologum* *quendam* *celebrem* *olim*, *somno* *meridiano* *indulgentem*, *inter* *dormiendum* *surrexisse*, *prodeambulasse*, *cum* *conjugis* *locutum* *esse*, *a* *qua* *etiam* *rursus* *ad* *sellam* *in* *qua* *dormiverat*, *relictam*, *paululum* *adhuc* *dormiuit*, *evigilans* *deinde*, *omnium* *plane* *sus* *ignare*.

§. IV.

Præterea nomen *somnambulorum* late nonnunquam sumitur, diciturque de illis, qui per plana iter facientes, eundem iter, vel etiam domi hærentes, quiescendi gratia, parerga tractantes, somno capti, paulatim obdormiscunt domientesque vel loquendo vel ambulando, vel aliud denique agendo aliquousque progrediuntur, donec, ad minimum quoddam obitaculum allidentes, iterum expergiscantur, id quod *Galenus* de se ipso scribit *L. I. de motu musculorum c. 4.* *Sæpius* *sepe* *quidam* *dormierunt*, *&* *nonnulli* *deambulantes*: *&* *hoc* *equidem* *audienti*, *antea* *non* *credebam*. *Non* *autem* *fuit* *opus*, *aliquando* *per* *totam* *noctem* *iter* *facere*, *experientia* *rem* *ipsam* *edoctum*, *coactum* *sibi* *credere*. *Ferme* *namque* *studium* *integrum* *dormiendo* *peregi* *&* *somnia* *videns* *nec* *primus* *excitatus* *sum*, *quam* *in* *lapidem* *inpegerim*, *&* *id* *est* *profecto* *quod* *non* *permittit* *dormienti* *iter* *facere* *longum*, *quia* *non* *potest* *exacte* *levem* *viam* *nancisci*. *Ec.* Simile quid *Joanni Oporino* præstantissimo quondam *Typographo*, & sibi aliquoties contigisse, narrat *felix Platerus L. I. observ. p. 11.* hisce verbis: *Johannes Oporinus*, *insignis Typographus*, *nocte* *ingruente*, *urbe* *inclusus*, *cum* *parente* *meo*, *Thoma Platero*, *tunc temporis Typographo*, *ut* *in* *hospitio* *minus* *commodo* *noctem* *fallerent*, *gracius* *exemplar* *corrigenes* *cum* *textum* *legeret* *Oporinus*, *obdormitus*, *a* *lectione* *tamen* *minime* *cessavit*, *postmodum* *excitatus*, *nihil* *eorum*, *que* *legerat*, *penitus* *meminerat*, *cum* *tamen* *integram* *legisset* *paginam*. *Sic* *&* *mibi* *idem* *sepe* *contigit*, *&c.* Deinde (*pergit p. 12.*) aliquoties *mibi* *etiam* *accidit*, *testudinem* *a* *cena* *pulsanti*, *ut* *obdormiscens*, *in* *lusu* *nihilominus* *aliquantulum* *pergerem*, *quod* *&* *adjantes* *fieri* *assererant*, *egoque* *observare* *potui*, *præsertim* *cum* *mibi* *aliquando*, *somno* *correpto*, *testudo* *e* *manibus* *elaberetur*. *Hæc* *ille*. De me ipso vero certissime fateri cogor, præter voluntatem correptum, ulterius pervenisse; quam quidem custos, evigilanti postea, dictitaverat; immemor interea omnium sui: hinc factum etiam est, ut eandem rem sæpe bis describerem, vel aliunde petita animoque tum obversantia, immiscerem. Sed neque tales proprie ad nostram spectant andromachem; non enim e lecto surgunt, (quippe jam ante ad quietem consulto compositi) uti nosstrates: nec a phantasia ad ambulandum, aut movendum se, impelluntur, sed jam ante ambulabant.

labant, jam ante movebantur & nunc semisopiti ac levi-somni, quam vigilantes orsi fuerant telam, dormientes aliquandiu pertextunt.

§. V.

Nobis autem *striſo* hic *ſenſu* accipitur pro illis hominibus, qui ſomno ſepulti, e lecto inſcii ſurgunt, dormientes ambulant, vigilantium (imo quæ vigilantes abſque periculi metu nedum tentare ſemper audent, v. g. muros teſtaque concendere, puteos intrare, &c.) opera ſæpe ſat mira, quandoque apertis plus minus, aliquando etiam clauſis exequentur oculis, ad lectum iterum ſe conferentes, dum evigilant, vel proſuſ, quid egerint, ignorant, vel paululum ſaltem recordantur. Qua occaſione, ſi animus ſimul eſſet, in abſtraſſo definire ſomnambulationem, ad quamnam morborum claſſem potius referri debeat, non immerito quis in limine ſtatim objicere poſſet? *Sennertus* equidem, *Inſtit. Medic. L. II. P. 3. Sect. 1. c. 7. it. Medic. Pract. L. I. P. II. c. 19. & cum eo B'aucardus Inſtit. c. 21. p. 434.* conatur eam ad coma vigil referre; verum minus mihi videtur vero ſimile cum ſomnambuli revera ſint expediti ad munia vigilantium obeunda, comatoſi vero non æque. Præterea, neque melancholiæ ſpecies appellari commodè poteſt; quamvis negari nequeat, melancholicam quandam diſpoſitionem, ſi non ſemper, ſæpius certe (veluti noſtra oſtendit Hiſtoria) concurrere, ac plerumque eos hoc mali genere laborare, qui ad eandem ſunt proclives: quia tamen melancholici, eſſi pertinaciter ideas ſemel impreſſas conſervant, atque circa eas fortiter occupantur, plerique nihilominus, ne dicam omnes, ad res exequendas tardiores, meticuloſi & cunctatores ſunt, contrarium vero in ſomnambulis accidit, utpote, qui expediti & audaciores exiſtunt, igitur peculiarem plane ſomni *p. n.* ſpeciem videlicet ſomnum depravatum, conſtituere, vel ex eo liquet, quod tales dormiant omnino, ſecus namque remiſcerentur omnium eorum, quæ dormientes peregere. At vero non recordantur, niſi forſitan per modum inſomniæ, quod tamen itidem raro accidit; E.

§. VI.

Deterius adhuc omni etiam Somnambulone mihi errare videntur; qui affectum, de quo jam loquimur *vere naturalem* eſſe dicunt, ceu clariffimorum quondam medicorum ſententiam fuiſſe teſtis eſt doctiſſ. *Ettmull. T. I. op. p. 425.* Cum revera ſit *ſtatim præter naturam* contingens, phantafia vel maxime tum vicio laborante, quippe a cujus imperio motus partium voluntarios, alioqui ſoli animæ arbitrio ſubjectos, hic confici, clarum ſit atque perfectum. Dicendum potius eſſe *in* ou-

novus

nium quasi *vigilans*, probatur partim ex rationibus ipsius insomnii, quod fit, quando ligata per somnum facultate discernendi, consopito sensorio communi, ob spirituum in sensoria externa influxum interceptum, sola fictrix libera existit faculas, nullisque veluti vinculis irretita, (sunt verba Joh. Langii Epist. Medic. L. II. p. 770. nisi fallor ex Marcelli L. 4. de anima c. 11. desumpta) ex rebus, quas vel vigilans gesserit, vel cogitatione diurna traxerit, varias demum ideas & phantasmat. confuse agitat, quæ tanquam res veras dormiens inuenerit ac cernit: partim etiam ex eo quod affectu ejusmodi detenti, in statum quasi somni atque vigiliarum intermedio hæreant, dum scilicet evigilati, vel plane ignari eorum sunt, quæ fecerunt, vel vero per somnium apparuisse sibi talia firmiter persuadent. Quinimo dari talem statum, præter exemplum Petri, e carcere liberati, Aët. c. 12. v. 7. seqq. ipsa quoque testatur experientia. Quem enim latet, quospiam, in specie aniculas, medias inter confabulationes cum aliis in levem delabi somnum h. e. in statum paulisper a vigilia recedentem, poris videl. cerebri atque nervorum non arcte riteque satis subsidentibus, veluti perfectio & naturali fit in somno, sed conniventibus ita quidem ut spiritus ex parte illos ingredi queant, hinc etiam est, quod aliis citius evigilent, sæpeque & audiant & intelligant, quæ ab adstantibus prolata fiere: somnum autem adesse vel hinc apparet, quod scilicet oculi concidant, ipsis etiam invitis, caput nutet atque antrosum prolabatur, ob defectum spirituum, musculos capitis inhabitantium. Simile quid in somnambulibus adesse, ob inæqualem spirituum in cerebro constitutionem & motum, quis non videt, dum in paribus & nervis, ad motus corporis voluntarios peragendos a natura benignissima matre destinatis, abundantes, vigentes, atque in motu constituti: in aliis vero cerebri locis, ubi sensuum externorum ministerio operantur, & ubi idearum a mente fit discretio, languidi, quiescentes, ac non influentes, deprehenduntur, quid quæso inde aliud, quam status quidam vigiliarum somnique intermedius, oriri poterit.

§. VII.

Rem uno vel altero, ex autoribus fide dignis depromto, illustrare liceat exemplo, quo scil. melius affectus hujus ingenium eniteat, atque iudicium post modum quoque medicum eo feliciter imponere queamus. *Henricum ab Heers in observ. suis medic. oppido rarū sonni spasmus annexis observ. 2. p. 32. se novisse, refert, senem quem 'aon somnambulism, sibi a primis canis societatem fidum. Hic (inquit) mira in somno & scis observatione digna, & passus est. Cum admodum juvenis in celebri academia præsen proficeretur, atque interdum mentem in omnia versasset, ut versus ad incudem sapiens revocatus, melius tornaret, quod vigili nequire-*

.Kkk 3

722

cras, noctū surgens pluteum aperuit, scripsit, sedim alta voce, quod scripserat, relegit; demum cum risu & cachino sibi ipsi adplausit, atque contubernalem, ut secum planderet, hortatus est, postūque sandaliū, & veste, clauso pluteo chartāque, ut vesperi fecerat, repositū, lectum repetiit, somnumque dum excitaretur, protraxit. Omnium, quae noctū gesta essent, ignavissimū. Mane pridiana sollicitudine adhuc laborans, quomodo hiatum versuum replet. Cum vero chartas ad libitum suum inapietas, idque sua manu, videret, attonitus quasi sollicitusque demum fuit, bonine an mali genii opus esset. &c. Idem (pergit) cum multo post relictis scholā uxorem duxisset, eam tamen, ut fert conjugii conditio, quadam celaret, quoties noctū, infantem cum ereptum gestans, domum perambulabat, comitanti per omnia uxori, quaecumque rogatus patefaciebat, & ad singula ejus quaesita verissime respondebat, ita ut ab ambulante & quasi dormiente, quae a vigili mulier nullū inquam extorsisset illecebrū & vitium, quaeque rogare erubisset, simplici nunc interrogatinnula, quicquid vellet, scire ac sine fūco intelligeret, mirante postea sapius somnambulo, quomodo quae secretissima habebat, in uxoris cor linguamque venissent.

§. VIII.

Clarissimus Jacobus Ho sius Cap. I. p. 173. memorat: tres nobiles in arce Bernstein, juvenes, & sat bellicosi fratres in eodem cubiculo dormiunt, quorum unus, nudus e somno surgens, indusium manibus secum aufert, e lecto sese subducit, silens pergit ad fenestram, corripit funem e trochlea pendentem, & in domus fastigium prorepens, incidit in nidum picarum, quem diripit atque dissipat, pullosque induso involvens iterum descendit, ambulat, & ad lectum se confert, pullos cum induso ibidem abscondit, & bene dormit. Mane expergescit cum fratribus loquitur, nihil scit, nisi quod quasi per somnium recordatur, fratribus suis hac verba refert: narrabo vobis mirabile somnium, visum sum mihi lecto surgere, ambulare, penetrare ad domus usque fastigium, nidum picarum disturbare, pullos auferre mecum: alii ipsum rident. Nihilominus post hac & alia colloquia surrecturus, querit in lecto indusium, sed illud pullis circumdatum, pullosque vivos invenit, omnes ad turrim accedunt, & nidum fractum expugnationeque deprehendunt, sic etiam, ut par pari addam: in recenti adhuc memoria hæret exemplum. Filii civis cujusdam Novissolensis, annorum circiter 16. qui, postquam per borrenum aliquando, prope domum paternam situm, animi gratia spaciaretur, astutiamque passerum, copiose intra lectum s. stramineum s. arundinaceum nidulantium forte fortiora conspiceret valdeque miraretur, extemplo eorundem locula proxima data occasione se debellatum, se nim serio constituit, quod ipsum non verbū tantum, sed fido postmodum ipso confirmat, dum sol. tertia vel quarta abhinc

abbinc nocte dormiens lectum egreditur, per inferioris hypocausti fenestram, a basi ad diametrum usque cancellum munitam, in lectum horrei se confert, ibique rem antea firmiter sibi propositam, nunc non solum feliciter exequitur, sed præterea etiam spoliatus nidus pullorum prædavi, quam mitra continebat, secum in lectum remeando, deportat, omnium a se susceptorum & patratum non nisi per somnium quadrantem adhuc memor. Mne siquidem expergefactus, antequam surgeret, de mitra sollicitus, eam quasi perditam, ubivis anxie quaris, sed frustra, imo querendum inter in hac verba erumpis: Der Geyer wird doch nicht sein Spiel mit meiner Nacht-Mütze haben, es träumete mir, ich hätte junge Sperlinge ausgenommen, die setzte ich alle in die Mütze, und siehe, es ist keines von beyden da: Unde risu etiam nimio exceptum, donec tandem stragulum extensis, in conspectum ipsa una cum pullis, prodiret.

Idem Horfium, l. c. pag. 176. aliud notabile profert exemplum his verbis: Noctū, in hac vicinia quendam, cujus pro concione mentio facta est, d. 24. Martii somnambulonem fuisse qui cum e lecto surrexisset, de scala descendisset, iter magnum per arcam aditum fecisset, in culinam venit palpitando, puteum ingressus est, & parieti digiti manuum pedumque firmiter adhaesit nudus, indusio tantum indutus, nec aquam in puteo, nisi sinitria indusii palme quantitate tetigit, sponte demum expergefactus, forte gelida & contactu, clamat: o mein Bein, heisse mir! Domestici audita & agnita voce, illum querunt, putei parieti affixion manibus pedibusque inveniunt, sciam cum lucerna illi porrigunt, sed cum hac ratione redire non possent, urnam illi demittunt, monentes, ut illam dextro pede ingrediat, dextra vero manu catenam apprehendat, sese extrahum iri, quod etiam feliciter factum est, sed valde refrigeratus in puteo, & in lectulum deportatus, obmutescit, & vix palpebras, easque rarius, nec nisi valde excitatus, aperit.

§. IX.

Petrus Salim Diverfus, medicus quondam ac philosophus Faventinus libro de affectibus particularibus, cap. 18. ita scribit: Juvenem novi, qui somnians se propter negotia sua equitatem esse, e lecto surgens, indutus vestimenta propria, cothurnique & calcaribus appositis, super fenestram (nam in tabulato degebat) descendit, & hinc indeque divaricatis curiis parietem, perinde, ac si equus esset, & voce & calcaribus ad cursum incitabat: hic ex somno expergefactus, tanto horrore correptus est, cogitans se per somnium mortem fere sibi ex præcipuo conscivisse, ut me die sequenti consuluerit ad prohibenda hæc insomnia, quæ ipsum ad obeunda vigilantium munia deducebant. Alterum (pergit) curari, qui cum na-

tura

tura iurgiosus & contentiosus cum aliis foret, ut plurimum somniabat, se cum aliquo manum conferre, indeque surgens e lecto arma capiebat, gladiumque evaginatim furiose vibrabat, perinde ac cum inimico pugnant, undique parietes & circumstantia loca percutiebat, &c. Præter hos artificem etiam se cognovisse asserit, qui dormiens e lecto surgebat, e thalamoque exiens, domum fere totam peragrabat, scalasque nullo discrimine adscendebat ac descendebat. Hic aliquando nullis indumentis amictus exiens apothecam propriam adruit, eamque clavibus aperuit, postmodum vero expergestus ab amicis, qui ei forte obviam facti fuerunt, maxima cum verecundia & timore, dubitans, ne inde stultus existimaretur, non amplius dormiens, sed vigilans rediit. Denique ab Andr. Libavio singular. P. II. p. 266. sequens narratur historia: novi sartorem, ait, qui ebrum de nocte surgebat ad naturæ postulatū satisfaciendum, neque tamen id satū vigilantem. Cum ergo redire ad thalamum vellet, præteriens fenestram in cavadium spectantem, nec clausam, manūque quasi sponte latus adesse sentiens, errore deceptus, cum se injicere lecto vellet, in vacuum decidit & tunc demum a lithistrato arca inferioris sublatu, vix longo tempore a conqussatione membrorum convalescit. Huic non ab simile, sed stupendius paulo, superioribus annis observare licuit somnambulationis exemplum; ubi vir quidam honestus ac eruditus, consuetu ætatis, noctū e somno surgens, in reditu vero ejus infelici fenestram pro lecto petens, in plateam se præcipitavit, sicque cruribus cranioque fractis, mane summo a vigilibus mortuus repertus est.

§. X.

Verum ad bonam causam cum vel tria verba sufficiant, adhæc brevitas lex, quam sedulo in materiæ hujus translatione observare animus est, jubeat, ut a fusiori historiarum compilatione abstinere, satis superque, nisi fallor, e tot tantisque testibus, utpote omni exceptione majoribus, veritas jam elucescet. Interea, quem plura legere atque evolvere hæc de re non piget, adeat quæso Andr. Libavium, Singular. P. II. p. 250. seqq. *Sibenkinum observ.* L. I. p. 71. *Hildannm*, C. 2. *Oper. Medico-Chirurg. Observ.* 84. & 85. *Jonston. Taumatorg. natural. Class.* 10. c. 6. art. 6. p. 482. *Jac. & Gregor. Horsius*, illum, loco supra dato; hunc, *Tom. I. oper. Med. concis.* 1. *Diss.* 3. p. 144. *Marcell. Donat. Histor. Med. mirabil.* L. II c. 1. p. 93. Aliosque, quorum numerus videri poterit præter alleg. *Libav. in Waltheri Sylva Medica* sub voce somnambuli.

§. XI.

§. XI.

Ordine autem ut progrediamur, sine quo natura constare non potest, quoque nihil vel in animo vel in opere sapientis admirabilius est, *Scilicet primum Exerc. II. de differentia* quoque somnambulationis, priusquam ad reliqua descendamus, pauca quædam proferre licebit. Ubi si clarissimi hic *sic. Horstii* c. 5 p. 198. Tract. alleg. vestigiis inhæ-
 rere velimus, somnambulones in genere alii erunt ^{diversimodis} mere naturales, alii naturales & ^{diversimodis} simul. Naturales a variis eorum operationibus, quas edunt, varias quoque sortiuntur denominationes, ita ut alii dicantur *filutes*, alii *emittentes*; alii *facile*, alii vero *difficile evigilantes*: alii *clausis oculis ambulantes*, alii *plum minus aperti*, &c. Somnambulos partim naturales, partim hyperphysicos esse dicit, qui alias actiones plane naturales, & secundum ordinem naturæ gerunt, alias miraculosas, quæ plane præter ordinem naturæ sunt. Varii tales, ipse sacer codex testatur, dum nimirum hujus rei habetur testimonium in *Actu Apostoli* c. 12. v. 7. seqq. ubi *Angelus Petrum incarcerationem excitavit*, ipse vero *Petrum, jubente sic Angelo, subligavit solem*, & *circumledit se vestimentis*, & *ambulavit*, quod ille non prius agnoscebat, quum processisset per *sat longum vicum*, & *Angelus descendisset*. Tum enim ad se *reversus*, dixit: *nunc scio, quod verum sit* &c. Divinum esse, quod illæsi conserventur ambulones isti, & præter ordinem naturæ divinitus in iis aliquid nonnunciam contingere, tradit allegatus laudatissimus *Autor* Cap. 2. p. 183. Anima hominis tum multo præstantiorem mentem assumente, multaque majora suis potentiis vel viribus, ac fere divina agente, quod enim expergefacti stantes adhærentesque periculosissimis locis non cadant, sed salvi multoties firmique servantur, id sane omnem humanæ rationis non minus, quam etiam physicæ doctrinæ captum excedit. Adhæc in apprehensione adeo vehementi tandiu vires naturales perdurare, neque defatigatione remittere, revera aliquid divini miraculosique esse, vel Eihnicus concesserit. Vere namque (juxta locum *S. S. Actor. XVII. v. 28* in Omnipotentissimo Creatore nostro vivimus, movemur, & sumus; cum nos in omnibus actionibus & cogitationibus, in singulis minutis ac motibus nostris extra controversiam præsupponimus, quid igitur temere sublimius hic ascendere velis, nisi forsitan hoc sine, ut lapsu graviore ruas. Sed de his satis. Hic enim naturales tantummodo moramur Quos, pare præmemorati doctissimi auctoris, aliorumque, mihi rectius forsitan sequentem in modum distinguere licebit.

§. XII.

Scilicet primo somnambulationem aliam ego dico veram, aliam
Dupus. Metaph. Praef. Tom VII. LII *simu-*

simulatam. De vera, non est, cur vel aliquid hic dicamus, utpote tot exemplis jam ante ad nauseam fere comprobata: de simulata vero memorabile sequens exhibere possum exemplum: nimirum, *videre mihi* (& quidem, quantum scio, haecenus soli) *quondam Praga Lipsium repenti, contigit, in oppido quodam Bobeniz si recte jam memini, Auspiz dicto, juvenum rusticum astutus non minus quam libidinosum, somnambulationis morbum brevi adhuc ante adventum meum mentientem, ita, ut qui libet sancte juraverit, nebulonem hunc revera ex eo laborare malo. Surgebat enim e lecto, oberrabat, scalas sursum deorsumque absolvendo, postmodum in lectum vel sponte regressum, vel a domesticis suis, quibus in aditu clausis & quasi dormientibus oculis sese conspiciendum offert, aliquoties, non sine admiratione summa exasperatum, ad cubiculum reducebatur. At hoc sub prae-textu sedulo semper ancillam visitavit, donec tandem pariter ab eadem in lucem edito, propria oris confessione ambo de morbo affectato domesticis, & mihi quoque testarentur fidem. Et ne forsitan, quod hic recensui, fabulam alicui magis quam verum sapere videatur, attendat, quæso, eos tantum, qui epilepticos, phriscos, vel alio etiam morbo affectos, tam egregie imitari audent, ut pro vere talibus a quolibet etiam eruditissimo maxime cum commiseratione habeantur. Ejusmodi epilepticum se vidisse, aliquoties ex ore prænobilissimi excellentissimique domini A. Q. Rivini, patroni, præceptoris & procancellarii mei cum cura colendi, relatum accepi: imo ipse ante biennium, & quod excurrit, excursionem aliqualem cum commilitone amico instituens botanicam, a nebulone quodam claudicationem cecitatemque ad amissum mentiente, me decipere passus sum, quod tamen non rescivissem, nisi furcifer ille, accepto paulo post grosso, de fuga sibi consulisset. Sed neque de hac nobis hic sermo est.*

§. XIII.

Vera somnambulatio, (de qua hoc loco solliciti sumus) esse poterit vel vulgaris s. simplex, alias *ordinaria* l. *consueta* dicta; vel rara l. *conjuncta* aliis *inconsueta* l. *extraordinaria*. Illam (quam *Hofst* etiam *frequentiore* dicit) voco, quando taliter affecti munia omnis admirationis expertia subeunt, h. e. (ut clarius me expediam) tacite in cubiculis l. *hypocausto* deambulant, iterumque post moram ad lectum redeunt &c. Hanc, si talia ab ægris suscipiuntur, qualia vel demirari satis a nobis nequeunt, v. g. libros evolvere, scripta supplere; vel etiam quæ vigilantes absque periculi metu nedum tentare audent, uti: lecta conscendere, puteos aliaque loca periculosa adire, sicque perro. Talis quoque fuit illa somnambulatio, quam Tyrnaviz annotasse vir omni alias fide dignus mihi domi quondam narraverat; *Fuit ibi studiosum quidam*

dam arvi balneatoria. Hic solenni aliquando die balneatorio circa horam noctis undecimam, strepitu laboribusque paulatim cessantibus, in presentia reliquorum sodalium pone fores locum occupans, placide quidem obdormit, sed ecce, brevi post, sedem antea occupatam segnitè deserit, ad fenestram clausis oculis & manibus, cruciatim complicatis, tacite se confert: adstantes, desiderio pleni, quid sibi hic velit actum, expectantes, vizque a risu sibi temperare possunt; ibi somnibulo manus explicat, cuneos parieti infixos leniter apprehendit, provideque per eosdem ad repositoryum usque instrumentorum pertingit, quocum, dum ei insidere conatur, repente, est sine noxa, delabitur. Interrogantibus postea, sibi somniasse de componendis atque in ordinem redigendis utensilibus, respondet. Huc etiam facit observatio doctissimi Clauderi in *Miscell. N. C. Decur. II. Ann. V. Ordine* 189 descripta, itemque illa, quam ex Henr. ab Heers supra §. 6. recensuimus. Utramque præterea, & raram & frequentiorè, ad eundem fere modum quo subres communiter in continentes, continuas ac intermittentes distingui solent, esse etiam dicique commode posse aliam continentem: quæ unico absolvitur cursu, nec amplius, nisi finito forsitan bene longo temporis intervallo, redit, v. g. si aliquem certo quadam die sollicitudo gravis premat, vel laborum lex acriter urgeat, vel etiam si quis forte inebrietur, sic enim fieri potest, ut eadem nocte surgat & ambulet. Aliam continentem, quæ post quamlibet obdormitionem, & talis fuit nostro; aliam intermittentem seu periodicam, quæ certo tantum septimanæ vel etiam mensis cujuslibet tempore, hominem invadit, qualemque Josephus Lynzonius in *Miscell. N. C. Dec. III. Ann. V. & VI. observ.* 119. exhibet, nullus dubito; ita quidem, ut hæc ipsa intermittens, vel sit statuta, h. e. certum in plurimum servans ordinem, vel erratica, i. e. talis, quæ non horis tantum incertis, sed & diebus dubiis, ægrum prehendat. Tandem vera quoque somnambulationio alia erit connata seu hæreditaria, & alia acquisita: illius, egregium doctissimus nobis testimonium reliquit *Willisus L. de anima brutor.* c. 16. f. ult. p. 538 in quadam familia, ubi & pater & nati singuli huic affectui fuere obnoxii; ad hanc, omnes reliquæ referri merentur.

§. XIV.

Antequam vero hæc somnambulationis differentiam penitus deseramus, non immerito quæstio suboritur, quam ejus speciem laboraverit noster? Forsitan connata; cum cepto mihi constet eum, antequam dulcissimo valediceret patriæ solo, subinde jam hypochondriacum perpetuasse malum? Non sane. Posito enim atque concessio, quod fuerit hypochondriacus, tamen non statim sequitur, propterea fuisse quoque somnambulonem. Præterea vero nodum hujus dubii solvit constitutio parentum

ejusdem fortis & sana, vivida, neque ad malum ejusmodi, quantum quidem hæcenus scio, vel unquam inclinans, animadversa. Ergo acquisita. Non intermittente, alias namque unius vel alterius noctis percipisset intervallum: neque continente sic enim unico absoluta cursu & post primam statim invasionem finita penitus cessare in posterum debuisset: Imo nedum erratica, statum siquidem ut plurimum servabat tempus, statim etiam præter præter horam. Anne igitur continua? quidni! & quidem vera; post quamlibet enim obdormitionem, adhuc, spatio sesqui horulæ circiter soluto, vere dormiens, e lecto se subtrahi & ad propositos labores humeros accingere, videbatur.

§. XV.

Tempus est, ut sedem morbi, ea, qua fieri poterit diligentia, jam etiam scrutemur. Hæc primario quidem quaerenda erit in cerebro, speciatim vero in illa parte ubi commune idearum receptaculum atque perceptionum centrum, nec non eminens in reliquum corpus imperium degit, quamvis neque is a vero forsitan penitus aberraverit, qui centrum sic dictum ovale, ut pote quod abs nonnullis recentiorum anatomicorum pro dispensatorio spirituum sic dictorum animalium, medianthibus nervis ad partes, pro voluntario motu perficiendo ferendorum habetur, quodque fundum ventriculorum constituit, ac ubi medullares fibrillæ desinunt, & nervorum principium existere videtur, situm est, partem pariter affectam dixerit. *Subiectum* autem, ut *quoniam*, ipsi, extra controversiam sunt spiritus, h. e. particulæ sanguinis subtilissimæ, s. æthereæ, vivida & elastica virtute pollentes, sensus omnis ac motus parentes & præsides. Hi sunt, qui ab objectis de die cerebro fortiter impressis vellicati atque ad contrarium motum intra nervos concitati, totam corporis compagem per quam semel expansi sunt, sive propria sua mobili indole, sive stimulatitia phantasia, commovent, ita, ut actiones suas alioqui naturales & cæteræ postmodum subire cogantur partes. Nullum hic vitium erit in anima rationali, quia in se nonnisi mere intellectus s. lumen substantiale ac intellectuale est; sed omnes id sufficient partes corporis impetum, stylo Hippocratico, facientes, utpote quæ verus animæ vicarius, necessariumque motus instrumentum sunt. Dantur tamen plures adhuc loci affecti, respectu scil. causarum, in §§. subsequētibz commemorandarum e. gr. diaphragma, ventriculus, una cum eorum; aliisque hypochondriacis nervis, qui cerebrum, & per consequens spiritus etiam adeo nonnunquam inquietos reddere possunt, ut dulci atque composito sui nequeat somno.

§. XVI.

§. XVI.

Sed ad causas properemus, utpote e quibus unis vera hauritur scientia. Hæc ut eo felicius erui possit, in genere considerandum in somnambulis ante omnia venit somnium ipsum. Dormire tales, licet in somno surgant, oberrent, vigilantium opera expediant &c. vel ex eo patet, quod ante actorum vel plane sint inscii, vel eorum per somnium quasi tantum recordentur. *old. historia* §. 8. *addita*. Deinde a contrario, i. e. vigiliis, hoc ipsum probari etiam potest. Sicut enim vigilie sunt actio facultatis animalis i. e. spirituum a primo sensorio ad sensus externos; ita somnus est vinculum s. copula eorundem in sensorio primo, unde olim jam ab Aristotele vigilias in se sentire, seu (quod idem est) operari, consistere, credebatur. Verum hoc non ita simpliciter est accipiendum, sed secundum quid: siquidem per experientiam certo constat potentiam animalium motivam non omnino sopiri in somno, quia dormientes persepe agitant brachia seque versant, imo suat, qui (*sunt* verba *Job. Contr. Wechleri* L. 1. de hom. orient. difficult. 16.) domorum siltigia conscendunt, ratio est, quoniam etiam inter dormiendum spiritibus animalibus libera divagatio per nervos ac influxio virtutis motivæ, quæ tamen non aliter, nisi accedente phantasia fortique imaginativa stimulantè operatur, denegata non est. Tale quid forsitan etiam intelligit *Ovidius*, L. 11. *Metamorph.* Quin ita canit:

Ingenit Ayone, lacrymas movet atque lacertos
Per somnium, corpusque petens, amplectitur auras,
Exclamatque, mane, quo te vixisti libinus una.
Vocæ sua, specieque viri turbata, soporem
Excutit.

Quæ ratione hinc *Gunter*, *Andernacum*, *Hieron. Dandinus*, *Amul. Parisianus*, *Franc. Hilderheim*, aliiq. complures, suam hic defendere valeant sententiam, somno sensus omnes feriari asserentes, ipsi viderint. Præterea vero quoniam operatio talis, quæ fit in vera & legitima vigilia, non consistit in sola spirituum expansione ad peripheriam a centro, quin potius in receptione specierum sensibilium, quæ ad cerebrum a sensibus externis deferuntur, atque in recta earum disjudicatione, hæc autem omnia in somnambulis frustra quis quærat, idcirco non vigilare, sed dormire hos ipsos, nemo est, qui inficias ire velit. Præterea eos eodem tempore quoque somniare, partim actiones, quas veluti cum intentione quadam fulcipiunt, partim vero recordationes eorum leves, confirmare videntur. Somniant autem & ea fingunt & imaginantur sibi, quorum antea notitiam habuere, utnt consue. Sicuti ergo somnia quæ-

vis principaliter efficit phantasia, ut pro ratione objectorum, quæ sibi ipsi proponit, delira sæpius & inconcinna, homo dormiens loquatur, rideat, ploret, clamitet, terreatur, aliaque similia præstet; ita, cum hæc majori solummodo gradu differant, causa eadem querenda erit in phantasia. Hæc, (ut clariss. Wedellii verba mea faciam) suavis exhalationibus, quæ somnum inducunt, demulcetur equidem etiam sub primum, id est, altiore somnum, omnium tamen prima se excedit, & perpetui vigilis ad instar se gerit, qui sub primum somnum vigilat quidem, ast in statione sua quietus perseverat, & ut ita loquar, patitur magis, tandem, donec sese hinc extricet, ac simul agat, seu medietur, species olim prius ad se allatas recolat, examinet, novasque inde fabricet.

§. XVII.

Si itaque fortior sit phantasia, si fortius sibi hoc vel illud imprimat objectum, rectore anima vel ratione quasi quiescente, fit, ut ob ferias organis concessas, ipsa demum sibi in Cœlo microcosmico circa mentis voluntatem sumat imperium, duobus stipata, scilicet, quorum ministerio ad actiones ejusmodi expediendas, constanter utitur, nimirum uno, *facultate appetente*, seu *appetitu tum sensitivo, tum voluntario*, quo *æ affectus spectant*: requiritur scilicet, in hoc affectu impulsus ad agendum quoque, sub specie boni, & quidem in somno; altero, *Locomotiva*, ita quidem ut appetitus, antea tantum ad ea latus, quæ ratio æstimaverat, fortiori jam agatur impetu, adeoque locomotiva citetur, & ad munia sæpe sat nuda exequenda incitetur. Ubi tamen probe tenendum est, appetitum voluntarium non secundum rationis arbitrium, sed potius secundum ipsius phantasie impetum hic perfici, alias namque loca ejusmodi periculosa non adirent. Deinde vero & hoc notari meretur, facultatem spirituum animalium motricem non simpliciter & absolute dependere a mente, sic enim vel pure dormirent, vel vigilarent, sed saltem hanc illorum determinare vim, quod vel exinde constat, quando paralysis artus occupat, nulla etiam efficacissima voluntas motum efficere potest, ratio, quia tum temporis nervi spiritu, & consequenter etiam vi motrice destituti sunt. Hinc mirum non est, si, (ut Poëtarum solummodo huc applicemus) solis equis & curru alteri conceditis, hi, insueti habenarum & imperii, extra orbem ferantur, atque se precipites in mare dent. Siquidem iudicio plane suspensio, neque timidi sunt, neque conscii eorum quæ perficiunt: & ab infantibus non differunt, qui igni & aquæ illudunt, quoniam eorum mens nec dum iudicat, quid malum sit aut bonum. Non male itaque Syvius *Prax. Med. c. 33. p. 474.* scribit: *somnambulationem fieri per phantasiam, circa unum objectum attentius & cum grandi affectu animi occupatam, ac proinde*

ab

ab aliorum objectorum consideratione abstractam. Cui assentitur Blancardus, *Instit. Med.* cap. 21. p. 434. dum putat, causum esse fortem atque continuam impressionem rerum, quæ quotiæ peraguntur, & simul illos curam eorum habere, quæ sequenti adhuc die erant peragenda. Certo enim ex rerum præcedentibus diebus attentius paulo agitatarum, vel cum diligentia gestarum, firmiter impressis ac asservatis ideis, phantasie per somnium oblati, hæc vivacissimam utplurimum vim nanciscitur operaticem, tales postmodum actionum ideas inter dormiendum in actum deducendi. De viribus autem phantasie in corpus nostrum, cum hic plura disserere prolixum nimis, ne dicam, tædiosum foret, ideoque lectorem benevolum potius ad lectionem autorum ea de re, ex professo agentium, lubenter hac vice remittimus.

§. XVIII.

Cum autem præter fortem rerum imaginationem & spiritus & humores ad actiones quasunque animales obeundas, tanquam necessarium instrumentum concurrant, nihil obstat, quo minus & horum, quacumque tandem ratione peccantium, labes eodem modo etiam redundet in phantasiam. Et quidem quod 1) spiritus concernit, horum sufficiens activitas & promptitudo ad tubulos partium conniventes, in somno referendas, omnino utrumque hic faciunt paginam. Notum enim est, dissipatos laboribus, curis, aliisque innumeris animi corporisque motibus spiritus, per somnum iterum e sanguinis massa quotidie necessario restitui, nisi nobis metuendum sit de imminente vitæ periculo: unde, si 2) ea itum sit sanguinis crasis, ut copiosiores, quam quidem ordinarie fieri solet, & partibus movendis sufficientes, separentur spiritus, clausi licet adhuc certis quibusdam cerebri loculis, ad sensus externos spectantibus, actiones ejusmodi somnambulatoriæ facili negotio emergere possunt. Ubi tamen probe notandum, pro ratione sanguinis temperaturæ s. constitutionis, a vitis primarum viarum dependentis majorem vel minorem elaborari atque separari spirituum copiam. Sic v. g. *Hypochondriaci*, quibus acidum nimium dominatur, teste Salo L. de affect. particul. c. 18. familiare præ aliis est hocce mali genus, propterea quod sanguis a vitio tali ad perpetuum quasi organum stimulus, copiosos separet spiritus pertinaces, neque torpidos; hinc etiam est, quod adeo fortissima vi abundant imaginativa, sic quidem, ut in nonnullis imaginationes tam vehementer imprimantur & hæreant, ut nullis argumentis, nullisque persuasionibus ab iis amoveri aut distrahi se patiantur. *vid. Keckerman. Syst. Phys.* L. III. c. 2y. *Col. Rhodigin. Lect. antiqu.* L. 16. c. 37. His itaque dormientibus somnia ita evidenter fortiterque imaginata præsentantur, ut ea pro veris magis multo, habeant, quam quæ ipsis vigilan-

vigilantibus offeruntur, unde in hisce somniis tota mente ac totis viribus agentes, eas functiones, concurrente sin ul spirituum tenuitate, perinde ac si vigilarent, operantur, hincque dormientes corpus erigunt, e lecto surgunt, ambulant, digladiantur, & iisdem propriis operationibus, quæ somniantes imaginantur se addicunt atque operam navant, *sunt verba Schenkii loco superius dato* p. 116. qui hac de re legi meretur. Et utut non nesciam, hic mihi dicam scribi objicique a doctioribus ex *Jac. Huxlii*, l. c. c. 6. posse actiones somnambulatorias in subiectis hypochondriacis esse impossibiles, ideo, quod certum sit, ejusmodi complexionis homines paucos eosque ad motum tardos, per consequens etiam ad munia, qualia nonnunquam a somnambulis suscipi videmus, expedienda plane ineptos progenerari spiritus? quibus tamen breviter hic respondemus: extra omnem controversiæ aleam positum esse, talem, veluti est melancholicorum s. hypochondriacorum, sanguinis dispositionem s. temperamentum, ut vocant, ad eudendas ideas, pro phantasiæ morbis producendis, aptissimam esse atque convenientissimam; si igitur in his force concurrat vel acrimonia quædam notabilis; (quale subiectum demum rectissime dicitur hypochondriaco-scorbuticum) vel major bilis quantitas, (inde talis hypochondriaco-biliofus optime appellabitur) verbo: dispositio M. S. sive nativa s. forinsecus introducta, talis, ut particulæ mobiles, subtiles, atque sulphureæ simul abundant, facilis omnino ad hunc affectum dispositio erit.

§. XIX.

Sed audiamus, quæso, *Jacob. Horslium*, qui *Tract. sup. alleg.* c. 4 p. 195 & c. 7 p. 206. dicit: *Non tam bene, inæquali sse complexionis nimir. aut frigidioris aut humidioris aut utriusque simul in cerebro, & calidioris sicciorisque in corde atque hepate, ita, ut calore sanguinis æstuant, & agilitate spirituum organa motus ad movendum sese sponte, nec non ad varia opera loco motus peragenda, quam promptissima evadant.* Cui proxime assentitur *Tob. Tanstetter Dissert. Physico-Medic. V. p. 171. §. 30* seqq ubi eodem tempore demonstrare conatur tum caliditatem & siccitatem viscerum præmotorum nimiam ex sanguinis spirituumque effervescencia, quæ corpus agile & ad motum proclive animum vero audacem & aliquando temerarium reddere potis est non secus ac pila ventosa statu turgida, quæ facile quæquo versum impellitur, tum etiam humiditatem cerebri, exinde quod somno tales, ætate paulo deinceps, propter vaporis nimirum, qui tenacis cerebrum occupat, abundantiam atque dissolutionem tardiores. Verum, etsi negari non possit, esse inæqualem quandam in nostro affectu cerebri dispositionem, quæ tamen non statim humida & frigida nuncupari potest aut debet;

debet; quid enim sibi vult frigiditas cerebri? cum omnis, vel minima etiam, corporis nostri pars, quanto magis illa, quæ mentis habitaculum est & primaria sedes, calore sit perfusa: quid humiditas? nisi eam ab ipsius cerebri poris & fibrarum robore ac tono nimis languido laxoque derivare velimus. Potius itaque dicendum erit, motum adesse, spirituum inæqualem s. improporcionatum, uti vult clariss. Hoffmannus, ita quidem, ut certa cerebri loca, speciatim vero, quæ ad sensus externos & idearum a mente dijudicationem faciunt, humido clausa & spirituum vigore destituta sunt, unde somni ratio petenda est: partes autem cerebri magis interiores, ubi scil. phantasia viget, & spiritus ad partes emittuntur, satis calidæ, adhuc spirituum tenuitate copique refertæ videantur, dum ipsi foras a superficie cerebri introrsum subeant, & ubi ad centrum ejus pervenerint, ibidem unita vi facta fortiori operantur.

§. XX.

Neque tamen hic aliquam prærogativam habere dicimus Biliolos, quasi vero ab omni excepti essent somnambulatione. Non sane: propterea namque, quod corpore sint agiles, & ad obeundas actiones quascunque prompti, animo vero audaces atque temerarii, sæpe ejusmodi *nitens* facilius incurrere, consentaneum esse, præter alleg. Tandler. l. c. p. 183. §. 17. experientia quoque pro me loquitur. Soli itaque jam restabunt ii, quorum corpora pituitoso nimioque humore vel etiam pinguedine repleta, graviter afficiuntur, examinandi. Ubi, si eruditissimas hac de re scriptorum sententias paulo penitus perpendamus atque sequi velimus, quibus ad affectum ejusmodi producendum, multum facere habitum corporis macilentum, nec pinguedine aut humorum copia gravem & recte quidem, docent, pene immunes ab hocce malo tales pronuntiandi essent; cum pituitosi sua natura ad motum sint segnes, & ob gravitatem corporis iusto torpidiores: e contra qui rarioris sunt texture, non solum humores habeant, sed & solidas partes ad motum faciliores & accommodatiores. Verum & his non videmus omnibus numeris absolutam datam esse tesseram, qua liberi permanere possint ab invasione ad minimum vulgaris seu (quod idem esse antea jam diximus) *imbecilis*, non obstante corporis eorum pondere atque mole, qua veluti ad omnes alios labores, sic quoque ad ambulationis &c. negotium ignavi atque inhabiles existunt, hac tantum intercedente differentia, quod quæ illi, h. e. macilenti, tecta, parietesque conscendentes, muros perrepantes, similique exequuntur, hi, obesi scil. assequi non nisi difficulter & cum præsentī certissimoque vitæ periculo valeant. *Tumidis nimium* (verba sunt Libanii p. 269.) & pigritia corporis torpidis, & molliculis *ingens* cum nervis eneratis habentibus res ultra fidem humanam videtur:

Disput. Medico-Pract. Tom. VII.

M m m

at

at non perinde agilibus & audacibus impigribus est. Uno verbo: ratione causæ & effectuum non vero ratione morbi peculiare quid eos præ aliis habere, certum est.

§. XXI.

Porro ex R. N. multum hic quoque facit ætas : sic namque videmus adolescentes , juvenes & viros crebrius affectu hocce corripri , quam quidem infantes , pueros , vel in senili jam ætate constitutos ; ratio quoniam in junioribus habitus corporis est levior , agiliorque , spirituum atque caloris naturalis major apparet ubertas , consequenter etiam humorum agitatio s. motus intensior , quæ e contra in primis pueritiæ annis & senibus deficiunt. vid. Levin. Lemm. de occult. natura mirac. L. 2. c. 5. p. 154. it. Sennert. Prax. Med. p. 120. add. Horst. p. 128. Quamvis neque viris ob vastitatem corporis ac inconstantiam animi adeo familiarem esse somnambulationis morbum , experientia testetur. Præterea observamus quoque , viros eundem affectum facilius experiri ipsis foeminis. Cujus rei ratio partim videtur hæc , quod sanguis earum propter humidi dissipationem atque penuriam , materiam spiritibus pauciorum suppeditet : partim , quod feminae præ viris semper membra habeant ignaviora , nec non minori agilitate imbuta ; partim etiam , quod officis , si quæ habent , suis non ea , qua viri ut plurimum solent , attentione satisficiant , nec facile variis aut alienis , aut abstrusioribus rebus cogitationes censeant. Tandem ex R. P. N. ad productionem affectus nostri symbolum suum nonnunquam addunt dispositiones quædam morbosæ , quales sunt : febres , melancholia hypochondriaca , epilepsis , phrenesis & si quæ sunt alia , de quibus latius videri poterit Sennert. loco præmemorato.

§. XXII.

Abolutis sic causis internis , jam externas pari aggrediamur sedulitate. Mittimus autem statim causas divinas & supernaturales sive a bonis sive malis etiam provenientes Angelis , utpote ad altiorem spectantes philosophiam. Potius eas tantum consideraturi , quas non-naturales stylo dæterico vocitare medici solent. Ex earum itaque numero primo loco se nobis offert aër , qui , si pluviosus , nividus , vel turbidus existat , humiditate sua præternaturali corpora inebriando , facilius teste dicitur. Sennerto Medic. Pract. L. I. P. II. cap. 10. p. 457. ad hocce malum prædispositos (intelligit autem hypochondriacos) corripit , ac quidem serenius , præsertim cum somno ejusmodi depravato vexati multum interdum peregrinati fuerint , vel noctu aërem liberius majorique noxa ad cubiculum

cubiculum & lectum usque admiserint. Cujus rei exemplum Jac. Horstii noctambulo circa plenilunium & valde intempesta nocte, praebruit, cap. 7. p. 228. A tali enim aëre, ob ætheris motum, ab humidi eo tempore prædominantis copia interceptum, minus transpirabile redditur corpus: unde humiditatibus in corpore plus justo cumulatis, postea poris cerebri laxitatem induci, necesse est. Sed quid statuendum hic sit de luna, cum tantos in arte medica viros, qui eam non solum humorum dominam atque directricem unicam colunt, verum etiam pro causa hujus morbi somnambulatorii (ut alios cerebri ac nervosi generis affectus v. g. maniam, epilepsiam &c. silentii peple involvam) efficiente habent, e regione stantes & contradicentes, videam, non immerito jam quaeritur. Solum hic nobis allegasse sufficiat *Sennertum*, cujus verba loco antea citato p. 457. hæc sunt: *imprimis hoc (i. e. Somnambulationem) facit Luna, cujus motu uti epilepsia, ita etiam hoc malum commoveri experientia docet. Et præcipue radii lunares, si dormientium capiti incident, hoc malum excitare solent.* Sicuti & idem ipse in diæta postmodum p. 459. præcipit, ut noctu radii lunares vitentur, & ne in ad caput dormientis pertingant, caveatur. Vid. præterea *Macrobius* L. 7. *Saturnal. c. 16. Horstius c. 3. p. 23. Alii.*

§. XXIII.

Ubi, licet equidem extra omne dubium positum esse concedamus, Lunam, speciatim vero plenam, ætherem non minus quam aërem nostrum atmosphæricum circumfusum, particularum copiosa facta exhalatione, valde comprimere, unde atmosphæra densior, magisque concentrata quasi emergit, sicque fieri demum potest, ut humiditates ex corpore diffusi solutæ, beneficio intrinseci caloris retineantur, ob aëris videlicet externi resistentiam: ex quo haud difficile jam patet, humidi intra corpus redundantia laxitatem fibrillis atque meatibus cerebri levi perquam negotio induci, & stagnationem feri circa corticem ejus causari, quæ postmodum humiditates circa regionem hanc collectæ, gravem ac profundam inferunt somnum. Alit, quicquid hujus sit, (dicam enim, quid mihi videatur) nisi *universales* illæ cause, *spiritus* puta & *phantasia* cum *appetitiva* & *locomotiva* junctæ, simul adfuerint, frustra certe est eritque omnis Luna, cum omni sua ope, ut possit membrum, multo minus totam corporis compagem, suo unquam movere loco. Vulgatum itaque illud:

Astra regunt homines, sed regit astra Deus,

quoad posterius, non vero quoad prius, verum esse, ultro fateamur.

M m m 2

§. XXIV.

§. XXIV.

Secundo, *alimenta* ordinis ratio jam considerare jubet. Ex quibus damno hic sunt *cibi* omnis generis *potusque* somnum profundiorum adjuvantes, vel calorem atque fervorem sanguini solito majorem foverantes. Priorum generum erunt: semen papaveris, pisa, faba, aliaque legumina, lac & lacticia, fructus borrai, rapa, &c. lactuca (testante id ipsum Horstio) circa vesperam in cana largius assumta: cerevisia item fortiores, crasse, lupulate, cuiusque anodynam vel narcoticam vim possidentia; hæc enim & similia mentem facile turbant, phantasiam contra roborant, & fluidum nerveum fixius atque spissius, hinc ad somnum ineundum proclivius, reddunt. Posteriorum generum, nimirum quæ sanguinis massam ad orgasmum seu citatiorem motum disponere valent, dici possunt omnia spirituosæ, acida & aromatica v. g. vina recentia, dulcia vel alia generosiora ad ebrietatem usque assumta, pronuntiantibus ita clarissime verbis Salomonis, ebrios cum dormientibus componentis, Prov. XXIII. v. 31. dum sic paterne quemlibet monet: *Ne intuearæ vinum, quando flaveris; dum splenderis color ejus; ingredietur blande & in novissimo mordebit ut coluber, & sicuti regulus venena diffundet. Oculi tui videbunt extranea, & cor tuum loquetur perversa, & eris sicuti dormiens in medio mari & quasi sopitus gubernator amisso clavo &c.* Itemque sublimata, vulgo aquæ vite dicta &c. Porro cibi sive nimis aromatizati, sive saliti, quibus etiam fumo indurata quæcunque jure annumeramus, utpote magnam ad productionem mali hujus partem conferentia. Si enim aliquid est, quod mentem obfuscat & spirituum ordinem turbat, erit certe immodicus spirituosorum usus; in his enim reconditæ sunt quamplures particule igneæ, quæ transientes ad massam sanguineam spiritus ubicunque tandem obvios turbant & circumagunt vehementer: imo ita inflammant, ut incallescere videantur plus satis: notatu dignum extat exemplum apud Henr. ab Heer loco toties allegato de juvene illo Poëseos Professore, scil. postquam sub annum ætatis 45. somnambulationi repulsam dedisset, nunquam enim, nisi prius vino se nimium replevisset sopitum lecto se novisse. Simile quid annotasse Libavi. l. a. p. 266. legimus, Est, (inquit) oppidum non incelebre, in qua quidam bene potus demum periturus absque lucerna & comite ad puteum accessit, atque in eum exutis vestibus & calceis descendit, delapsusque suffocatus est. Nimirum (pergit) hic solus cum esset vitæ ebrietate, semisopitus ambulavit, atque errante phantasia, deceptoque judicio, illud vite periculum incurrit. Plura adhuc ibi habentur testimonia, quæ tamen h. l. brevitate, gratia lubenter omitimus.

§. XXV.

Tertio ad absolvendam ~~ambulationem~~ suum quoque calculum addunt, *vigilantiam* excessus, *somnus* statim a cibo invadens: *motus* corporis iusto intensior, iustoque parcior, qualis est v. g. Tabellarii itemque scriptoribus, netricibus, aliisque vitam sedentariam sancte colentibus: unde *alvi* atque *viscerum obstructio*, quæ, qualium quantorumque sit malorum fons & origo, res ipsa loquatur. Quid itaque mirum, si somnambuloni nostro malum hoc tam pertinaciter adhaerit, cum alvum (ut impetrata prius venia id proferam) ultimis diebus intra mensem bis deposuerit, cujus rei vivus ego adhuc sum testis. Imo ad perficiendum, & perfectum jam, exacerbandum affectum, præterea vehementia etiam necesse est concurrant *animi pathemata*, qualia sunt, *cura*, *metor*, *ira*, *libido* &c. uno verbo, *cogitationes* & *actiones diurnæ continuæ*; quarum ideæ spiritibus firmiter impressæ, tempore somni ex facili renovantur, phantasiæ operatione vivida: qua de re potissimum eorum de nocte recordamur, quorum de die mentio fuit vel actio, confirmante hoc ipsum piscatore illo apud Theocritum:

Somnia sunt canibus panes, mihi somnia pisces;

Et Claudiano, in *Prefat. L. III. de raptu Proserpinae*, perelegantibus hisce versiculis:

*Omnia qua sensu votuuntur vota diurno,
Tempore nocturno reddit amica quies.
Venator defessa tono cum membra reponit,
Mens tamen ad sylvas & sua iustia redit:
Judicibus lites, auriga somnia curus.
Vanaque nocturnis meta cavetur equis;*

Nec tamen etiam nobis exempla desint eorum, qui ea, quæ vigilantes egerunt, vel feria & continua cogitatione versarunt, inter somnambulandum reddiderint. Levin, Lemnius de occult. natur. miracula L. II. c. 5. dicit, ardeliones illos, h. e. homines inquietos & jactabundos, qui omnibus se negotiis ingerunt, atque ultro citroque discursant, mirique utuntur gestibus, in somno exsiliare, ac plausum strepitumque excitare, ob simulacra quæ sensui occurrunt, quæque voluntati atque actionibus diurnis correspondent. Similis quoque apud Liv. l. c. p. 259. legitur historia famula, quæ cum somno occupata in balneo totam peregisset noctem, subiretque phantasia, bubulcum cantu exposcere pecora, repente ex labro pedibus jam tumefactis & vix officium facientibus, nuda profleret, caputque

per fenestram obviam, effractus impetuose vitru, exerens, tunc primum penitus evigilares. vid. præterea p. 267. add. Schenck l. c. observ. 127. ex Adr. Alemanno. Sul. Divers. de Aff. part. cap. 18. & unam alteramque historiarum, quas supra exhibuimus.

§. XXXVI.

Restat, antequam curam ipsam aggrediamur, ne illotis, uti ajunt, manibus id fiat, in *SIGNA*, tum diagnostica, tum anamnistica, tum etiam prognostica tribus tantum modo verbis, adhuc inquiramus. Illorum seriem præ more suo distinctissimo exhibet Jac. Horstius l. c. cap. 7. pag. 230. dicique desumenda ea esse *PARTIM* ab actionibus læsi, quando scil. hominem talem non rite ambulantiem, nec prout debeat, agentem varia notamus: *PARTIM* ab effectibus se sui perceptibilibus, ut, si vel vocem alicujus in tenebris audiamus, hujus memores simus, vel in lecto solitum non videamus, addo: si clausis vereque dormientibus oculis trabes & lacunaria perreptent, ædium fastigia superent, in puteos descendant, aliaque opera, temporis, officio, &c. minus respondentia, suscipiant & exequantur, vid. Tandlerus l. c. p. 194. *PARTIM* denique ab excrementis, si faciem magis bilem petere deprehendamus, circa caput omnia tumida & rubicunda aut flava, uno verbo, cachectico perfusa colore, existant. Plura ex historiis recensitis erui possunt. Ex signis Anamnisticis unicum apud Levin. Lemmum reperitur, sequens: homines ultro citroque discursantes mirique uti gestibus solitos, quos ex oculis, ex vultu, incessu, vestitu, totoque corporis habitu, conicere licet, quarum singula varii motus componunt, atque immutant, aliamque personam subinde adfiscunt, & ad hosce effectus magis dispositos esse, atque hujusmodi fore.

§. XXVII.

Licet hic pedem parumper figere, siquidem phenomena quedam & accidentia concurrentia lupertunt, quæ aurem continuo vellicant, quorumque rationem reddere, neque frustraneum erit neque inutile. Ante omnia quaestio moveri solet: quæ sit causa, ut dormientes & ambulantes, nonnunquam adeo periculosa & suspenda, imo tanta invrepi de suscipiant & exequantur, quæ vigilantibus alias impossibilia fere reputantur, v. g. in locorum ædificiorum præruptiorum at præcipitium consensione, nec tamen decidunt? Mihi videatur hæc: quod scilicet dormientes rectæ rationis usu, adeoque cillatione atque comparatione rerum, destitui, sola regantur phantasia, a qua omne, quicquid occurrit in somno tanquam verum & possibile existimatur, quare cum metus absit, sentiente

tiente sic *Langio Epistol. Medicinal. L. 2. Epist. 45. p. 771.*) qui vigilantium corporis animique robur maximopere prostermit, spiritus unice vacantes eidem rei susceptæ, neque distracti, robustius sic agere possunt. Huic sententiæ quoque adstriplatur *Lemnius*, cum ita dicit: quod vero inoffense multoque corporis incommodo ista peragant nec labi contingat aut in præceptis agi, eo fit, quod sensum ac nullo metu nullaque trepidatione aut discriminis respecta ista aggrediantur, quæ plerumque vigilæ a rebus arduis & periculis vel avocare solent vel deterrevit, quid quod ipsimet vigilantes in eadem etiam declivitate ambulare optime possunt, v. g. in parietibus fossarum &c. &c. modo nobis non adsuerit periculum vite præsens, si delabimur. Ut multa paucis eloquar, rationis & metus cessatio, punctum hic omne fert, phantasia interim & appetitu fortioribus, quemadmodum videre est in ebriis ac delirantibus (ut *funambulones*, *peiauristas*, aliosque taceamus) inconsculte temerarioque ausu pericula quæque aggredientibus. Ex dictis vel sponte jam apparet, (ut doctissimi *Hæseri Herculi Medic. l. 1. c. 4. de affect. capit. p. 50. verbis utar*) in nulla re alia distingui somnambulorum & sanorum vigilantium opera & moriones, nisi quod illi fiant in somno, hi autem citra somnum, adeoque cum adjuncta ratione, quæ illos vel omnino deficit, vel certe obscurissime comitatur, alias namque loca tam periculosa non adirent.

§. XXVIII.

Deinde quæritur etiam, qui sint, quod somnambulantibus (testantibus id historiis, a *Lewnio*, *Salio*, *Horstio* &c. annotatis) ad vocationem nominis proprii excitentur, evigilent atque concidant, concidentes tamen minus ledantur? Sic enim scribit *Lemnius l. c.* Cum ista obeunt, si illos nota agnitaque voce, aut eo nomine, quo christianismo sunt insigniti, ac Baptismo initiati, compellere pergat (rationem addit) ex consternatione incussoque terrore ac perturbatione decidunt, dissipati videlicet spiritibus, discussaque vi ac facultate naturali, qua illa perfecerunt. Ubi tamen verum notetur, perpetuæ non esse veritatis, eos per acclamationem nominis quidem proprii, sed potius ad illud nomen nominatum, quod communiter appellari consueverunt, evigilare, propterea, quod nominis tali proprio compellari ad vocationes audiendas soleant, quas alias neutiquam attenderent; addo & alia adhuc dari vocabula specifica, ut ita dicam, quorum ope profundius etiam dormientes excitare possumus, v. g. *Es ist Feuer!* ad hunc modum milites in castris, recubantes ac stertentes aliquando sub tegmine fagi nihil citius nihilque facilius evigilare facit, quam si dicatur: *Der Feind ist da!* Quadrat huc apposite historia de *Samfone Judic. cap. XVI. vers. 10.* Terror enim tunc incutitur, unde spiritus illi, qui antea copiosi collectique hærebant in exterioribus membris,

bris, manuum eumprimis ac pedum, ad cerebrum & cor, tanquam officinam suam & asyllum ultimum, retrogrediuntur, ac partes ante obseſſas deſtituunt. Admittimus quidem acclamationem fortem in cauſa eſſe poſſe, non autem, quod nonnulli exiſtintant, ſi proprio nomine ſonnambulo inclametur, in præſens diſcrimen incidere, propter eam ipſam nominis proprii appellationem, uti *vult inter alios obſervatus Lemnius*; id namque ſuperſtitionem aliquam ſapere videtur, & ratione caret. Neque enim ſyllabarum iſta eſt efficacia, ſed ſoni & clamoris, quo clamore excitantur ſpiritus, ut a membris exterioribus, veluti jam diximus, reſugiant interiora verſus, atque ita nervi, muſculi & lacerti ſui, quod ante habebant, robore priventur. Et licet ab alto cadant, ſicuti & ebrii, de quibus Germani proverbium habent: *die Truncken ſallen nur auf dein Ween*; plerumque tamen minus offendantur, quam vigilēs & ſobrii. Cujus rei rationem aſſert Guil. Fabr. Hildanus *oper. Med. Chr. Centur. II. obſerv. 84. p. 161. & ex eo Horſtius oper. Tom. III. p. 112. 114.* Nimirum tales recta ratione deſtituti, non prævident periculi tela, neque timore conſternuntur noxio, hinc neque articulos tendunt, ut caſui reſiſtant, ſic enim certo certius violentius impingerent. Navis ubi major eſt reſiſtentia, ibi etiam fortior actio.

§. XXIX.

Porro quæritur: *An ſonnambuli clauſis ſemper oculis incedant, reſque ſuas peragant?* Affirmativam tenent, Bodinus atque Lemnius, negat contra Salius & alii, Ariſtotelem ſecuti, qui *VIDERE* illos aſſerit, his verbis: *Accidit, (inquit) dormientibus nunquam ut reſurgant & ambulent, videntes eo modo, quo qui vigilant.* Ait medium hic tenere, cum Doctiſſ. *Sennerto Inſtit. Medic. p. 410.* conſultiſſimum eſſe, omnino arbitramur; nimirum eos, qui per loca præſertim cognita, nec adeo remota vel periculofa ſpatiantur, poſſe id facere ſenſu apertis vel plane compreſſis non ſecus ac cæci, quibus omnes anguli domus noti ſunt, alios, v. g. ſublimia petentes, ſcalas gradufque ſcandentes, fores aperientes, ſeras recludentes, &c. oculis vel apertis, hocque rarius, vel brevibus admodum intervallis modo clauſis, modo apertis. Si vero tum ambulent, cum Luna apud nos ſplendere ariet, utpote quo tempore noctes illuminatæ ſunt, quid obſtat, quominus poſtmodum objecta viſu feliciter deprehendere queant.

§. XXX.

Ultimo tandem quæritur: *cur ſonnambulatores tam variat & a ſe invicem differentes edunt operationes?* Videtur id dependere partim a diverſa

diversa sanguinis atque spirituum constitutione; nec non a cerebri ideis ipsis propriis & familiaribus. Perpetua namque physicorum ac medicorum regula est: *Qualis temperies motusque sanguinis & humorum, talis etiam erit temperies & motus spirituum*: qualis hic tales quoque sunt idæ, cogitationes, actiones, & inclinationes. Unicum hic allegasse sufficiat exemplum hypochondriacorum, qui propter spissitudinem sanguinis spirituum languidiorem motum timidi sunt, meticulosi & cunctatores, quare hi in actu somnambulationis non tam periculosas & furiosas suscipiunt actiones, quam quidem biliosi vel etiam scorbutici. *PARTIM* ab operarum d'urnorum diversa strenuaque functione. Exemplo hic esse poterit, præter nostram historiam, *juvencula illa castitatis studiosa, quæ, cum marito prima fortassis vice dormiens, circa noctis gallicinium subito e lecto exiit, & ad januam cubiculi properavit; verum ab eodem evigilante, atque sistentis voce eam inclamante excitata, flens ac tremens ad lectum rediit, narrans postmodum, se e lecto fugere voluisse, ad evitandam vim, quam virum quendam sibi inferre velle somniabat, vid. Petrus Salum diversum l. a. c. 18. & post eum Theod. Craanen in observ. super. Henr. Regii Prax. Med. L. I. medicat. 10. p. 95.*

§. XXXI.

Prognosis hujus affectus quod concernit, videmus eam ab antoribus pro diverso objectorum respectu tradi variam. Si neque crebrior, nec adeo periculosa fuerit invadens, decursu etatû eam ordinariè mutari, senesque sponte desistere, asserunt Tob. Tandlerus, Jac. Horstius, Sennerius & alii, quos vid. B. cc. Deinde malum istud facilius perhibetur esse curationis in sexu sequiori, quam quidem potiori: *Comata* vero seu hereditaria somnambulationi, vel plane non; vel certe difficillime medetur. Alias morbus hic periculo caret, neque letalis est, nisi forte per accidens, quatenus ii saltem de vita periclitantur, qui (teste Zacut. Lusitan. de Medicor. Princip. Hist. L. I. p. 106. histor. 15.) in loco declivi & alto, item aquam, ignem &c. versus ambulationes ejusmodi nocturnas suscipiunt. Eos tamen, qui diutius hoc ipso divexantur, in coma, apoplexiam, epilepsiam, vel etiam melancholiam hypochondriacam incidere, Sennerius l. c. R. J. Fortius consulti. & Resp. Medic. Tom. II. Cent. I. conf. II. p. 30. item Horstius p. 250. & Sylv. in Prax. p. 477. testantur.

§. XXXII.

Probe sic ac satis, nisi fallor, perspicue consideratis omnibus & singulis, quæ ad partem spectare videbantur theoreticam, jam ad curandam omnem ipsam tum generalem tum specialem progredi me posse sine
Diffr. Medico-Pract. Tom. VII. N n n ulteriori

ulteriori ambage, arbitror. Hanc autem aliter paulo instituendam esse in paroxysmo, & aliter extra eum, nemo erit, qui negare audeat. Durante scilicet paroxysmo in genere suadent auctores v. c. Jac. Horstius p. 251. Blancardus in Prax. cap. 12. p. 213. Craanen l. c. Tandlerus p. 200. & alii excitandi potissimum sensus gratia, omnis generis acclamationes, oburgationes & verbera, utpote, quæ curam non secus ac in pueris, singulis noctibus lecturi commingentibus, planissime absolvere, idem Blancardus scribit. Ratio est, ut notis istis oburgationis atque castigationis cerebro profundius impressis, a somnambulatione tales postmodum deterreantur. Quodsi tamen natura subiecti peculiariter ad epilepsiam, ob debilem fortassis cerebri constitutionem, est disposita, cautio adhibenda est, monente J. Horstio l. c. cap. 9. Præter vero minas & castigationes optimum etiam erit, si medium corpus, crus, vel brachium &c. fascia lecto leniter alligetur, vel tenia ita vinciatur, ut iterum cubili firmiter sit connexa. Hinc enim surgentes, se ligatos esse animadvertentes, evigilabunt, atque hoc modo fieri tandem poterit, formata nova idea ut prior supprimatur, sicque nocturnas in somno deambulationes desuescant. Accedit consilium illud medicorum physico-politicum, quo vas, aqua frigida repletum, ante lectum ponendum esse communiter jubetur, vel ideo, ut nimirum exeuntes pedibus immeris erroris admoncantur, & exsuscitati postmodum lectum repetant. Nec plane hic rejiciendos atque contemnendos esse puto pulveres sternutatorios, ex foliis Nicotianæ, Majoranæ, Flor. Ptarmicæ, Lil. convallium, helleboro albo, euphorbio & similibus paratos, & ope tubuli naribus inflatos. Quali modo filium, ex ignobili stirpe natum aliquando curatum fuisse memini, absque ullo alio remedio. Ast, hoc solum succedit, ubi æger ambulaverit in tuto: si enim in periculoso constitutus sit loco, cavendum omnino serio, ne excitetur, siquidem talis excitatio facile mortem inferre posset. Extra paroxysmum ad dno respiciendum erit, 1.) ut orgasmus sanguinis compescatur, 2.) cerebrum cum reliquo genere nervoso, roboretur.

§. XXXIII.

Prius obtineri potest, partim per vitiorum primarum viarum corrigentia. Supponamus ambulatorem ejusmodi furti abundare acido, conveniet illi exhibere medicamenta præcipitantia & absorbentia, v. g. corallia, matrem perlarum, Lap. 69. fabas seu uniblicos marin. Oleum tartari p. d. &c. in specie vero martialia. Copiosæ bili collectæ proderunt salsa sic dicta essentialia & salsa v. g. Absinthii, centaurii (vulgo dicti) minor. Cardui bened. arcanum dupl. cremor tartari, & si quæ sunt alia. Acrimoniam corrigent omnis generis temperantia, telia sunt

ex R. M. terræ pingues; ex R. V. præcipue radices, herbæ, cortices & ligna, pro infusis atque decoctis parandis usitata, e. g. rad. chinæ, farsaparill. polypod. bardan. korzoner. herb. matrifylv. pilosell. cortex lign. guajac. tiliæ, lign. guajacum s. sanctum &c. Ex R. A. dentes apri, unic. marin. dent. hypopot. ebur, ungu. alcis, gelatina C. C. &c. Sicque porro: *partim* per materię peccantis evacuantiã, ^{a)} *per superiora*, tartaro videl. emet. ^{ß)} *per inferiora*, rad. jalapp. rhabarb. fol. sen. aliisque innumeris. *Partim* denique per V. S. quam laudat *Regius in Prax. Cas. X. p. 97. præcipue si corpus sit plethoricum*. Posteriori scopo inserviunt remedia specifica, analepticonum s. nervinorum titulo venientia, ex quorum classe eminent sequentia, nimirum ex *simplicibus*: rosamarinus, mentha, lavendula, marum, majorana, serpillum, satureja, fl. lilior. convall. cardamomum. eudebæ, cinamomum, ambra, moschus, castoreum; ex *compositis* spiritus lilior. convall. salis ammoniac. C. C. succinat. Essentia ambre, ligni aloes, castorei volatilis, Δ æ item communiter sic dictæ antapoplecticæ, balsama, & sexcenta alia, quibus si malum non cedat, ad opiatorum usum confugere, autor est *Fortis l. c. p. 30.* item, ad vesicatoria, quibus curatos ipse scio. Hac tamen cum admonitione, ut æger simul dietam observet accuratam, h. e. Aëre utatur temperato modice ad frigidum vergente, vitet nebulosum & pluviosum: cibi sint *levissimi*, flatulenti proscribantur, potus sit tenuis ac defæcatus: somnum non statim a cœna, eumque parciolem, capiat; motus corporis & animi sit moderatus, mens tranquilla &c.

§. XXXIV.

Ne autem quid prætermisisse videamur, illum cujus gratia hæc quantacunque adornata est disputatio, qua ratione quibusve remediis restitutus fuerit, jam dicendum. Scilicet extra paroxysmum post repetitam aliquoties de oleo tartari, p. d. parati, præscriptionem, ad destruentium acidum acre, laxans accipit sequens:

Rec. Rad. Altheæ Drachm. β .

Polypod. Scrup. j.

Sem. Anif. vel Fœnicul. Scrup. ji .

Incis. Contus. coqv. in \varnothing æ font. lb. j.

Adde.

Fl. Papav. errat. Mp. β .

Fol. Sennæ Unc. β .

Fac ebulliant; tunc ab Δ remotum atque refrigeratum coletur,

N n n 2

tur, Colaturæ altera pars dimidia sub ingressum lecti ,
altera vero mane sumenda.

Referatis ita obstructionibus , atque subductis bonam partem humo-
ribus pravis , sequenti præscripto continuabat pulvere :

Rec. Limat. Stis puriss. Unc. β.
Corall. rubr.
Oss. Sepiæ.
Lap. cancror.
Manat.
Stli diaphor.
Rad. Galapp. aa Drachm. ji.
Fl. Sulph. Drachm. j.
33. Stii. Scrup. j.
Subtiliss. pulverisat M. S.

Resolvir. Pulver , Messerspitzen Weise des Tages 3mal zu nehmen.

Reiteratis tam decocto laxante , quam pulvere absorbente atque
aperiente , ad confortandum cerebrum externe naribus admovendum
erat istud :

Rec. Spirit. vini camphor. Drachm. ji.
Sal. Ammon. c. Calc. viv. Drachm. β.
Ol. Lavendul. gtt. vi.

M. S. *Stärkender Spiritus zum riechen.*

Interim a studiis toto curationis tempore animum abstrahere co-
gebatur : acidis , aromaticis acrioribus , atque fumo induratis penitus
hic exulantibus , potu præter decoctum lignorum , nullo alio per men-
sem utente : pro vita sedentaria motum blandum , & quidem bihorio
post assumtum cibum , feligente , feliciter divino adstante convaluit
auxilio.

Sed cessandum mihi jam est. Quodsi quædam minus accurate
posuerim , aut acu , juxta vulgarem loquendi formulam , omnia non te-
tigerim , benevolam a lectoribus eruditissimis castigationem , ea , qua
par est , humanitate peto ; cum perquam familiare mentibus humanis
sit errare.

S. D. G.

CCL

C C L.

THOMÆ SCHWENKE,

R A R I C A S U S

EXPLICATIO ANATOMICO - MEDICA.

Hag. Comit. 1733.

Illustrissimus militum dux de Keppel, annor: 61. vir fortis animo & corpore, cui eximia sanitatis dona dedit suprenus conditor, namque illi corpus firmum, mediocris longitudinis & staturæ, valens, membra athletice musculosa, neutiquam gracilia, nec tamen pondere molesta, a juventute in bello exercitata, venaticis exercitiis firmata, denique perfecta (si ullibi inveniat) valetudine fruebatur Heros.

Animo tranquillus, hilaris, summe in omnes officiosus, nec ulli nobilitate, aut generis splendore, aut honorum (quibus fungebatur) multitudine molestus aut imperans, non minus tamen gravis, in ætate virili mascule se gessit, vixit, & viri fortis partes explevit omnes, neque ullis morbis (exceptis in bello vulneribus) quod sciam correptus, usque ad annum 1725., incidit tum in peripneumoniam satis fortem, per plures dies acriter decurrentem & corpus divexantem.

Anno 1726., prope Mechliniam in venatu, distantia a Trajecto ad mosam duorum milliarium, occiput percussione equi allisit arbori tam fortiter, ut humi projectum per horam fere expiraturum eum crederent amici atque adstantes, refocillatus satis bene se habuit; post ali-quod tempus sæpius humi prosternatus, a levissima causa externa ut credebant amici familiares, seu fortasse ex vertigine, subinde enim & spasmo aut cujusdam membri convulsione vexatus, contrario motu & contorsione malum id profigare & vincere conabatur, sed ne quidem id multum curavit.

Interim vitæ sedentariæ sese totum dederat, nam aut librorum lectione continuata, au alio animi exercitio cum familiaribus falleba

N n n 3

suavit

suaviter tempus amicis, hinc factum, ut fere nullis corporis exercitiis resecutus vitam ageret corporis constructioni plane adversam, eamque debilitantem.

His si addas, quod laute comederet, & alimenta succi-plena ingereret, cœnamque in seram noctem (ut apud magnates obtinet) protraheret, postea noctem degens placidam in longam diem protrahens somnum, anno 1728. gravissimo morbo præsertim cerebrum affligente correptus, ubi unum latus semii paralyticum scilicet dextrum, febris acuta continua, & alia symptomata, &c. a quibus morbis doctissimi De By ope, qui curam illustrissimi viri habuit, restitutus per V. S. evacuationes, & ut morbi genius ferebat medicamina, solita valetudine frui videbatur.

Aliquamdiu post, lenis vertigo subinde aut gravitas cerebrum occupavit, ut membri alicujus, ut brachii, manus, aut pedis torpor, quem frictione profligabat, jam visus imbecillitas, aut linguæ impedita volubilitas, accidit quoque, quod pronus in faciem deciderit, (credebant familiares nimia animi intensione occupatum de subito spirituum influxu debito destitutum sic procidisse) atqui cum de eo facto ne quidem medicum consuluerit, anno 1732. paulatim corporis vigorem recessisse credebatur charissima & nobilissima uxor, noctesque sæpe inquietos degisse maritum.

In castro mense octobri ejusdem anni quod respublica prope Bredam jussu haberi, animo commotus atque incitatus in paralyfin linguæ spuriam incidit, V. Sectione quidem liberatus, graviores tamen linguam loquela difficilis denotabat, oris aut faciei spasmodicus motus sæpe vexabat.

Redux Hagam comitis in peripneumoniam illam notham epidemiam (qua tertia hominum pare conflictata fuit) circa finem Decembris incidebat, acute laborabat, tussis, dolor pectoris & capitis, febris, cæteraque symptomata vehementer commovebant corpus, venæ sectionibus, pectoralibus, antiphlogisticis, emollientibus, alvum laxantibus in integrum restituitur; ex venæ sectione in pede facta, cum calceamentum vulnusculum confringeret fortius, abscessus ortus, qui satis diu illusterrimum virum ab omni corporis exercitio lecto assixum detinuit, liberatus, & sanus videbatur, sed brevi alia rerum vicissitudo.

Mense Aprili 1733. conquerebatur de vertigine & capitis gravitate, ilico metuebam vel hemiplegiam, vel apoplexiam, vel partis cuiusdam paralyfin, a collectione serosa, timorem incutebant præcedentia, igitur ut a cerebro serum averterem, purgans sequens præscriptum fuit decimo quinto die Aprilis.

℞ Fol : Senn : Mundat :
 rhei Elect : ꝯi ʒij
 tamarindor : ꝯvj
 digerantur, dein.
 Ebulliant in aq : f : q :
 in colat : ꝯiij dissolve
 manu : calabr : ʒiv.

Purgatus largiter, defuit vertigo & gravitas usque ad 27. Aprilis diem, tum denuo de capitis gravitate & stomachi inflatione conquesto neuroticum & flatus discutiens medicamentum profere credidi.

℞ Spir : matric ; ꝯβ
 Tinct : succin : ꝯij
 Aq : Salviae
 — Cort : Citrei :
 — Rorismar :
 — Majoran : ꝯi ꝯij β
 Syr : Stachados ʒvij

Omni quadrihorio fumeret unciam iussi, sed neque id sumpsit accurate iusto tempore, neque idcirco etiam praestitit quod debebat; interim appetitus prostratus, circa vespere levis febricula, subinde corporis torpor & gravitas, ad motum difficilis, oculorum languor, vires prostratae, in somnum proclivis, cum tamen totam noctem degisset placidam vix de lectulo in die continere se potuit, urina pauca, rubra, febrilis, vel turbida cum sedimento lateritio, alvi dejectio naturalis, pulsus debilis, aequalis tamen.

Præscripti medicamentum malo conveniens, sed cum id non assumpserit, non opus ut hic inferatur, nam altero insequenti die celeberrimum nostrum Boerhaavium adiit, consilium ejus experturus, redux usus est vino medicato martiali cum pilulis balsamicis per aliquot dies, sed ob incrementem febrem & alia symptomata graviora desistere coactus, ut v : gr : sitim, dolores praesertim tibiarum pedumque inquietantes noctu, maculas rubras dolore digitos hinc & inde afficientes, a tero sanguinis acriori membranas vellicante, ut credidi.

Talia attento quantum potui animo pensitans praescripti mixturam antifebrilem cum spir : sulphuris & syrupo violarum, non appetenti ventriculo applicavi eniplastrum stomachicum Galeni, &c.

Huius usum usque ad 12. Maji febricula fere reliquit, & plurima symptomata mitiora, sed dolor fornicatioque pedum summe molesta, cum maxima tamen in somnum propensione, horis matutinis in lenem incepit

incepti vergere sudorem, inde æger solamen sibi promisit, non sine vana spe, nam & ego credidi sic posse expelli materiem vellicantem & febriculam hucusque excitantem, præsertim si simul curetur, ne internæ in putredinem vergant partes, quod consilium & annuente celeberrimo Buerhaavio conducere existimavi, itaque tempore matutino iussi in lecto calidam assumere, ut & iuscula tenuia cum succo auran-
tiorum aut citri fervida fere, hinc promotus sudor per totum corpus ægrum levavit, ut vero & interni humores magis præpararentur, & ad peripheriam expellerentur, hoc medicamen partitis vicibus assumpsit
48. horarum spatio.

℞ Rad: Contraj: ʒiij.
Infund: in
Aq: samb: ʒss phiala
Alta per aliquot horas
Calidissime, Colatur: adde
Rob: sambuc: ʒij.
Succi citri rec: ʒß
Tart: vitr: gr. xx.
Sal: polychr: ʒij.

m

In usu hujus, adjecto pulvere zedoariæ radicis ad grana pauca continuavit usque ad 24. istius mensis cum euphoria.

Sed querelæ de fornicatione & tibiæ dolore eadem redibant, cum tamen reliqua omnia symptomata mitiora.

Ut corpus irrorarem, materiem acrem fluxilem redderem, & aut per renes aut sudores expellerem, emollienti antiphlogistico & antiseptico decocto ex radicibus graministarax: bardanæ recentis cum ꝑ sulphuris, syr: violar: aqua cinamoui opus aggressus sum, ex hoc decocto de die bibebat largiter, & hinc æger reficiebatur, quippe febricula tota desit, vires meliores, calor bonus, pulsus fortior, lingua naturalis, urinæ copia major & sanorum similis, appetitus utcumque melior, in corporis motu magis sufficiebat, nam & equitatio & deambulatio continuo commendata fuere.

Sed 27. urina turbida, fusca fuit, sine sensibili lumborum dolore, sanguinis quidquam adesse coniciebam, quem sanguinem in urina recenter excreta clare videbam, erat enim tum subrubri coloris, postea magis turbida & fusca. ut solet fieri a sanguine cum urina mixto, & post aliquot horas subsidente; color vero & odor recentis urinæ ferofus nullo modo foetens probabant & confirmabant id, atque id per diapedesin in renibus fieri prædixi consanguineis, forte ex nimia con-

sione

sione thedæ, vel equi, huc usque enim exercitiis continuatis his utebatur, nec aderat renum, aut illius partis internæ dolor sensibilis, inflatio, aut tensio.

Ideoquæ id facile cessaturum me credere si decoctum suum ingurgitaret largiter, hucusque initium morbi a cerebro pressò ortum judicavi, & nihil vitii notabilis in abdominis visceribus latere professus lethale, hypochondria enim non tensa, neque elevata, abdomen tactu molle, nec timens aut dolens, respiratio bona sed tarda, utroque in latere decubitus eodem modo facilis, nec ullo pondere preniens, uti strictum eorum partium examen docuit.

Adfuit hoc tempore amplissimus Consul de By medicus in praxi felicissimus, qui mecum communem ægri curam suscepit postea, sic erat ægri status ut dixi præcedenti pagina usque ad primum junii diem, cum denique Boerhaavium adiret nostrum medicinæ parentem, qui ut vires restaurarentur, appetitus redderetur, & simul putredini resisteretur, proposuit per litteras, ut pilulas ex bulb: ari, gumm: opopan: mastiche bals: peruv: devoraret aliquot cum vehiculo aromatico confortante, adjecto sulphuris spiritu.

Dein ceratum Galeni cum mastiche &c. stomacho applicandum censuit, quod & ante mensẽ, ut notavi, jam factum erat, vinum Rhenanum vetus cum pane tosto sæpius de die assumendum & formati stomacho fovendum esse: sed primo adventante calore aquas spadanæ exhibendas fore, non omiſsa deambulatione, dein equitatione, aut rhedæ motu a meridie, si forte vires priorem motum non permitterent.

His attento quantum potuimus animo perpensis judicavimus quid hæc prædicta medicamina valerent, tentandum esse: mecum metuebat tamen prudentissimus De By ne corpus nimium siccarent jam satis siccum, ideoque decoctum suum ordinarius fuit potus, assumpsit itaque iusto ordine & tempore præscripta, sed in dies vires magis prosternebantur, appetitus nullus, pulsus parvus, ad motum difficillimus, facies pallida, oculi tristes & sinister leni inflammatione vexatus per aliquot dies totum defigurabat vultum, ob palpebræ prolapsum: curum dolor, & fornicatio cum expergisceretur maxima, hinc inquietus & somnolentus noctu, in somnum maxima propensio, sed interrompebatur quovis momento, matutino tempore extra lectum in lætica cum paulo plus frigesceret tibix pedesque, placide dormiebat, excitatus præbebat pulsum debilem.

In genu & tibia subinde macula rubra mox disparens apparebat, a fero sanguinis acriori, ut etiam in oculo irritante musculorum membranas, periosteum & cutim.

Præscripsimus ut dolores & vellicationes istas percremamus, sequen-

Disput. Medico-Pract. Tom. VII.

O o o

tem

tem herbarum collectionem ex floribus chamæm : sambuci : lavend : foliis melissæ : menthæ , salviæ , rorifinar : semine anisi , hæc infundebatur in aquæ fervidæ. f. q: pro balneo pedum & tibiærum , cogitabamus his partes sub introitum lecti ad sudorem disponere emolliendo , & leniter stimulando materiem vellicantem excutere.

Per semihoram pedes fovebat, dein fricare pannis jussimus , idque per aliquot dies continuos fecit , cum hinc solatium sentiret , idem matutino tempore præparari jussit suo proprio Marte illustrissimus patiens , & cum euphoria usus est.

Sed tali rerum statu manente , ulteriusque nihil proficiente ægro , iusto nos metuebamus totalem virium prostrationem , nam in dies magis adhuc languescebat appetitus , pulvis parvus , respiratio bona paulo tardior , actiones naturales tardius paulo , sed bene procedebant , namque uti urinæ excretio naturalis , sic & alvi.

Convenimus clarissimus De By atque ego nervos corroborandos , vim vitæ paulo augendam , in genere , corroborans & cardiacum esse exhibendum , ut omni quadrihorio unciam mixturæ sumeret hujus diximus.

R Aq: stillat: salviæ

———— Cort: Citrei:

———— Rorifinar:

———— Melissæ aa ʒij.

Confect. alkermes sine moscho cum ambra ʒss.

Spir: matricalis ʒij.

Aq: cinamom: ʒvj.

Syrup: veron: ʒss.

ms

Pro potu superbibebat decoctum sæpius præscriptum : ut verum fateamur , neque boni neque mali multum attulit , immobile stabat malum , neque proficiebamur quidquam , antequam vires prolaberentur omnes , 7^{mo} junio adventante calore majori paulo , de aquis Ipadanis a celeberrimo Boerhaavio commendatis hoc in morbo facta mentio , ponderatis omnibus quæ ad rem , cum morbus nullis auscultaret remediis , præstabat experiri .

Ad ʒXXX. partitis vicibus deglutiit cum deambulatione , quæ magnam ægro molestiam dedit , vix enim movere se poterat , aut humeris sustentatus passus paucos ire , horis duabus elapsis post epotas aquas , panem tostum cum nuce myrsifica , cinamomo , ac vino veteri rubro assumebat , ut forma conditi contineret , stomachumque roboraret , in prandio

prandio fere nihil, a meridie, vinum Rhenanum vetus, aliquando cum aqua, simili fere modo datum & in eundem finem.

Sic octavo, nono, & decimo junii egimus, sed in dies incredebant symptomata, sola urina excepta, quæ melioris & tota naturalis fuit coloris, & consistentiæ, ut & febre, quæ nulla: vix a meridie rhedæ motum sustinere poterat, mecum eruditissimus De By judicavit pejori esse loco ægrum, igitur omni attentione adhibita, perpensis omnibus symptomatibus, morbo, viribus, dubitavimus, an ulterius aquæ spadanæ quidquam possent.

Per epistolam consilium denuo cum celeberr. Boheravio habuimus.

Qui nobiscum periculum crescere credidit, sed quid aquæ spadanæ largiori dosi assumptæ per aliquot dies successivos absque intermissione (ad minimum per quinque dies) efficerent, periculum faciendum esse; fateor, metuebamus ne sufficeret æger ob motus defectum, qui in aquarum usu desideratur, quo enim musculi magis agunt, respiratio fortior, calor major (absque sudore tamen) eo facilius circumaguntur aquæ & per renes fluunt, & contra; reliqua medicamina cum nihil hucusque effecissent & summo vitæ discrimine flaret æger, concessimus, hæc cum prognosi, vix boni quidquam nos sperare, at in casu hoc difficili præstare anceps experiri remedium.

12. Junii pint. *iss* assumere incepit, cum ea & tam longæ deambulatione quantam animalium motuum machinæ permiscere.

Fecit tamen vir animi cum constantia, & præsentia, ita quidem, ut 13. & 14^{to} ad 5 XL. potaret quovis die matutino tempore: interim a somno pomeridiano abstinere se non potuit, & verissimum fuit illud, somnum nisi requiem corporibus & medicinam quandam laboris afferret contra naturam putaremus datum, aufert enim sensus, actionemque tollit omnem, hic vero nulla medicina laborum, sed circa noctem febricula invasit, matutina hora nona recedens.

Aquarum per renes dejectio sat copiosa fuit omni hoc triduo, & urinae naturales instar sanorum tam nocturnæ quam diurnæ, ut solet, alvum ad minimum ter viginti quatuor horarum spatio deponebat naturalis consistentiæ & coloris.

His non obstantibus appetitus nullus, nullus corporis vigor, hinc 15. non ausi fuimus quantitatem adeo largam exhibere, nam summo cum tædio, & difficili deglutatione vix assumebat uncias sedecim, a meridie vomuit, & hora vespertina septima dejectiones fuere multæ, liquidæ, numero & copia antæ, nam sexta matutina 16. Junii ultra tringinta fuere, materia instar lactis, foetens, diceret fero materiem fuisse, hæc cum farina mixtum, præscriptum est decoctum album cum aqua cinnamonæ pro potu ordinario.

Epithema ex vino rubro in quo infundebantur cortices cinamomi, granatorum, aurantiorum, rosarum rubrarum, stomacho & ventri applicuimus, mixturam omni hora cochleatim assumendam ex corroborantibus, & absorbentibus scilicet, confect. hiacint 3j-coral: rubr. 3^{ss} terr. Catech 3j aq. still. meliss. 3v. aq. cinam. 3j syr. cydoniorum 3^{ss} m.

Eventum sane morbi tristem toti familiæ prædiximus, vixque quidquam spei superesse: & certe his licet iusto ordine assumptis, dejectiones sine dolore fere frequentiores, ita ut decies horæ spatio deiceret, hinc vires sublata, sitis, animi dejectio, facies tristis & emaciata, oculi squallidi, pulverulenti, febricula, omnia sumebat quæ offerebantur, sed difficulter & cum singultu.

Gelatinam cornu cervi cum succo aurantiorum & vino Rhenano, aut similia quæ vires corpusque fractum refocillarent deglutiebat continuo, firmatus etiam, circa noctem 17^{mi} clystima injectum ex theriacæ 3ij vitell. ov. levis chalybeati 3vij, de cætero medicamina interna eadem quæ præcedenti die.

Illico subleuit alvus, ingravescenti febre, retinuit enema usque ad sextam vespertinam 18. junii.

Febræm hanc auctam cum metuermus, nec minus putredinem a retenta tam subito materia ad intestina mota, credebamus melius fore, si & illato excerneret, ne hinc putrescerent abdominis viscera, sed tamen ne nimis, ut sufficeret, ob vires fractas debilesque omni trihorio pulvisculum devoravit ex his sex.

℞ Rhei levis. pulveris. 3ij
Lap. cancr. Corall. rubr. ppt.
ss 3^{ss} fiant pulv. vj.

Hinc ter 24. horarum spatio deposuit excrementa naturalia magis & pultacea, nec adeo siccantia, unde febris diminutio, atque melior videbatur ægri status.

19^{no} roborantibus & antisepticis continuatum.

At 20. denuo febricula ingravescenti (quasi alternis diebus ut in comate pervigili ab aliis observatum) sine dejectionibus, coëgit nos ut claretum ex 4. sic dictis conservis cordialibus cum spiritu sulphuris per campanam pro potu exhiberemus.

Avenaceum cum vino Rhenano & succo aurantiorum alimentum fuit, iusculis vitulinis interpolatis; ut alvus responderet, clystima emolliens, & leniter abstergens injectum non retinuit, hinc nihil excrevit.

Jam vero oculi splendor ablati, lingua sicca, sed colore naturali prædita, urina optima, pulsus æqualis instar sanorum sed parvus, interim

interim motus animales fere ablati omnes, aspiciens non videbat, in objectum figens oculos, imaginem objecti non percipiebat, nisi commotus & revocatus quasi e somno, e longinquo quencquam loquentem audiebat, tarde respondens cum difficultate, bis terve rogabat, antequam quidquam proferebat, ad rem tamen, vox rauca & debilis, diceret coma vigil, sæpius dormitabat, expergefactus pauca inordinate loquebatur, momento post, errore comperto, animo constabat, in genere id quod anima ope organorum intendebat, eorum debilitate impeditum; hunc conjeci amicisq̃ denunciavi, depositæ esse salutis, hære e etenim materiem prementem in capite, cerebrumque destruentem, ut initio hujus morbi credidi, hanc esse solam causam morbi, & fore ut videbatur, mortis causam per eandem rationem.

21. circa vesperam lapidis porcini infusionem propositam bibe-
bat, mane 22. eandem, repetitum dosin tertiam vespertina hora octa-
va, sine ullo vel sudoris expulsiōne notabili, aut alio quovis effectū.

Ingravescente morbo, vi vitæ fracta, 23^{to} hora matutina nona
cum frigore extremorum, motu membrorum omnium sublato, Deum
invocavit tanta animi cum constantia, ut spiritus animales quasi a peri-
pheria ad centrum revocati animæ satellites nullis machinis corporeis
amplius inservientes pro sola anima flarent, quasi ea pars animi quæ
rationis atque intelligentiæ sit particeps, tum maxime vigeret cum plu-
rimum abesset a corpore, donec brevi post sine ulla convulsione, aut
corporis, aut membrorum motu, eam redderet.

Mirum est, virum illustrissimum (exceptis sub vitæ terminum
paucis momentis a somno) semper animo præsentem per totum morbi
decursum fuisse.

En mi lector, hic verus ægri status, hæc vera morbi historia,
judica jam quid cadaver lustrandum exhibebit, vix omnia quæ inve-
ni, suspicaberis.

Longior ideo fui in morbi descriptione, non ut Apologiam pro
medicina aut medicis facerem, hæc enim ars longa similibus n̄titur
fundamentis ac multæ aliz nobiles artes, scientiæque, sed ut hinc vide-
atur, quo modo post inspectum cadaver ex necessitate ea omnia sequi
debuere, turpius enim nihil est physico quam fieri quidquam sine cau-
sa dicere.

Impetrata inspicendi corpus venia ab illustrissima familia, 23.
Junii ad aperturam circa nonam vespertinam advenimus, cum eadem
fere hora matutina expirasset.

Sectioni interfuere eruditissimus Jacobus de By medicinz doctor.
Wilhelmus Schwencke medicinz doctor, frater meus, Rochet
Principis Auriaci Chirurgus, Shoonderhage Chirurgus, pharmacopæus

Voege, Chirurgiæ & pharmaciæ studiosi plures, alique multi, quorum numerus & nomina non occurrunt.

Corpus fortissimi viri mensæ impositum lustravimus exterius nihil mali repræsentans, quippe erat naturalis coloris, graciliora quidem membra, ut manus, brachia, & pedes, sed ventrem tactu mollem, pinguem, e regione stomachi paulo inflatum habebat, hypochondria nec tensa nec tumida.

Thoracem amplum, prominentem & fortem illi natura dederat, facies emaciata, oculi concavi, exsucci, tempora collapsa, genæ prominentes apparuere, cum itaque exterius nihil aliud quod notatu dignum, ad corporis inspectionem ivimus.

Facta cruciali abdominis incisione per cuticulam, cutim, & panniculum adiposum crassissimum, multum adipem continentem, cum tamen reliqua membra ut & facies emaciata viderentur, usque ad abdominis musculos ne mali ulla indices.

Aperitis musculis, resecto peritonæo, omnia naturaliter sese habebant, namque omentum primo sanum, a ventriculo & colo ad inguina extensum totum abdominis cavum supra intestina positum replens, satis crassum, venis naturalis coloris sed parvis interspersum, usque ad pelvis marginem nullibi accretum cernebatur, in superiori abdomine ventriculorum sanissimum sed statibus tumentem (quod exterius jam conspiciebatur) invenimus. Elevato omento visui offerebantur intestina, duodenum, jejunum, ileum, cæcum, colon, & rectum, nihil præternaturalis fœventia, excepto ileo quod paulo rubicundius naturali, mesenterium pingue & mesocolon sanissimum, in istius centro macula pallide rubra nullius momenti videbatur, a dextris, & supra stomachum hærens hepatis sanissimum paululum solidioris substantiæ diceret.

Vesicula fellea bile referta bona, cum ductibus hepaticis & cisticis apertis.

Lien in hypochondrio sinistro diaphragmatis parti posteriori & laterali incumbens, naturalis & coloris & magnitudinis, non majoris, aperto liene, lymphæ sanguine tinctæ uncia semis circiter prorupit, porro tenerrimæ texturæ erat, ut assolet.

Pancreas sub ventriculo parvum, durioris exsiccæque substantiæ, cæteroquin color & situs debitus: glandulæ omnes in quinquagesimum ætatis annum transgressis exsiccantur, vel durioris aut granulæ substantiæ inveniuntur, ut observata docent.

Amotis intestinis, præsertim colo, renem sinistram primo, dein dextrum lustravimus, ubi quid culpares præter maculas duas rubellas in rene dextro, vividas, parvas, papillas occupantes, & sanguine repletas, nihil habebatur, non vero tumore renem molestantes, erant enim naturalis magnitudinis.

Ureteres:

Uteres boni reperti, vesica nihil noxii continens cernebatur, in ea aperta circa orificium exigui puris quidquam hæreꝛe in duriusculo magis corpore inveni.

Itaque cum nihil hic, in toto peritonæi sacco, neque in visceribus contentis, renibus, ureteribus, vesica inveniretur, cui morbi, multo minus mortis causam tribuere possemus, pectus aperire decreveram: resectis integumentis, ecce thoracem invenio osseum totum, nam cartilagine costis junctas osseas, imo ossibus duriores & latiores vidimus, dices totum scutum osseum, quod vi maxima frangere, nullis vero machinis discindere aut comprimere licuit.

Cum nec sic referare neque oculis exponere possem, inferius diaphragmate a costis & sterno resecto, utrinque in dextra & sinistra parte pulmones vidimus consistentia & colore valentes, inferior utriusque lobi margo in utroque pectoris cavo diaphragmatis parti posteriori juxta vertebra fortissimis fibris annexus.

In sinistro latere inter annexam cum pulmone pleuram diaphragma investientem feri sanguinolenti inodori quantitatem invenimus unciarum quatuor, quasi illic loci sacco hærentem, sed nec diaphragma dissolutum, inflammatum, aut ullo modo puris speciem præ se ferens: cor firmum ac forte, mediastinum recte valens, præter hæc in pectore nihil.

Nec hic mortis causa hærebat, e contra & circuli sanguinis, & respirationis organa perfecte cæteroquin sana monstrabant accurata inspectio & examen.

Ad tertium sic dictum corporis cavum transivimus caput.

Apertis integumentis, inciso cranio, in parte posteriori statim ut cranium perforatum, feri magna quantitas sanguinolenta erupit, quantum potui lente ac caute præcidi a parte anteriori dnam matrem a cranio supra pro:essum falciformem, sed hæc membrana tam firmiter ubique cranio nexa impedivit separationem, igitur circum circa forcipe divisa, erupit serum limpidum in quantitate.

Examinata dura matre in abscisso cranio, præternaturalis ne quidem quidquam aderat, sed pia mater admodum tensa supra cerebrum vesiculas multas limpidas hydatides fingentes continebat externe ubique clausas, & nullum laticem in parte superiori emittentes, parte posteriori excepta, ex qua, aqua defluxerat, paucas sed venas varicosas conspiciebas in pia matre: elevata pia matre & aperta cultelli acie, feri quantitas insignis prorupit, quod cum in pluribus locis vel forcice vel unguibus vel cultro factum esset, patebat piam matrem non amplius tensam sed flaccidam esse, inde inter hanc membranam & cerebrum liquidum id contineri.

Tum pia mater non amplius tensa, sed flaccida, ubique fere in lobi utriusque cerebri parte superiori a cerebro subiecto separata, præsertim

præsertim tamen sinistra in parte, paucis solum modo in locis vasculis inter cerebri gyros annexa, est alias innumeris canalibus affixa corticali substantiæ & continua plurimis in locis, sed hic dissoluta & instar cortinæ libere fluctuans inveniebatur: spatia & anfractus cavi omnes sero repleti, ita quidem ut spatia invenirentur inter cerebri gyros ubique semipollicis latitudine, colore magis ad flavum vergente ipso cerebro, vel potius corticali substantia.

Ipsam denique cerebrum durissimum instar tendinis, exsuccum, tractabile totum, compressum, parvum, calvariam nentiquam replens, licuit palam hic jucundo sat spectaculo videre, quousque anfractus cerebri, quousque pia mater quæ hos investit, subintrent, mirandum quod ubique fere ab his anfractibus & gyris soluta paucissimis in locis annexa, supra cerebrum fluctuaret hæc membrana, erat vero quoad videre potuimus, humoris effluxi quantitas unciarum decem, vel ad libram pharmaceuticam accedens.

Sublata falce, intra cerebri lebos vel hæmispheria nullus nisi naturalis partium status, in cerebri ventriculis nulla præternaturalis feri collectio, sed pia mater & in ventriculis plexus Choroides iusto modo dispositus.

Neque cerebellum supra tensis processibus duræ matris lateralibus testum quidquam extraordinarii ferebat, e contra.

Sub cerebro vasa & nervi adeo conspicui, duriores paululum, ut sese nunquam melius examinauda & videnda præbuerint, alias enim teneritas impedit sæpe accuratum examen.

Cerebellum ipsam (duræ matris processibus cultro solutis) sanum, valens, nullo corpore nec humido nec solido compressum, neque infra processus neque supra quidquam inveniebatur, quod cerebellum afficeret.

Hic est aperti cadaveris status præternaturalis, his si jungas dissectionem totam fuisse siccam, habes omnia quæ notau digna inventa fuisse, neque ex vasis abdominalibus neque aliis quæ in dissolutione & apertura separata guttula sanguinis erupit, omnia vasa flaccida, exsucca, collapsaque fuisse, exceptis paucis guttulis sanguinis, quæ cum sero mixtæ ruborem dedere in abscissione cranii, hæc ex diploe destillata.

Benevole lector, quæso, quamnam causam atrocis istius affectus designabis aliam, quam initio hujus tractatuli monstravi, scilicet casum istum, cerebrum concussum, hinc piam matrem passam fuisse, a cerebro quibuscumque in locis aut a coacervato humore postea avulsam, qui humor nec copia nimia premeret, effectumque subito notabilem produceret, nec mora sua acedinem haberet, sicque cerebrum membranasque

nasque vellicaret, nam id in feri collectione vix fieri videmus, quando enim ascies, pectoris hydrops non geritur! laticem si gulle, fibrali, subdulcique saporis sit, si putrescat, quæ non symptomata sequuntur!

Vides igitur a pressione paulatim aucta jam prolapsum, membri spasmum, convulsionem productam membri alicujus, jam vertiginem ab impedito spirituum fluxu, aut inæquali liquidi nervosi motu per canaliculos, unde tandem species apoplexiæ, paralyseos, cur per evacuantia quæ locum dant, & faciunt ne partes cerebri adeo premantur, solamen, qua occasione minima vasa humiores absorbent circuloque sanguinis reddunt, nam strictis nimium cancellis si retineant nostri corporis liquidam, vix dissipant, laxa paululum solida continentia vel ambientia, majus spatium occupabit, resorbetur.

Si autem hic notetur vitam sedentariam cum mentis exercitio junctam quidquam posse tribuere, vel morbi causam augere, ut per experimenta innumera constat, capitis gravedines & serosas collectiones a cerebri mentisque indefessa operatione augeri, cerebrumque ut ita loquar exhauriri, potest, quod manente eadem causa supra cerebrum, de novo sæpius serum coagmentatum presserit jam hos jam alios canaliculos corticalis substantiæ, a qua medullaris producta varios nervos efficit, unde vel spirituum influxus pro tempore cessavit, vel inæqualiter motus per nervos inæqualem musculorum actionem produxit, ut lingux paralytin, oculorum hebetudinem, affectum soporosum si paululum pressio augeatur, cujusdam membri, aut oris spasmodicum motum, languorem, aut motum difficilem: & quod summum, si pia meninx a cerebro dissoluta, non amplius prospiciat corticali substantiæ, hæc collapsa, & exsiccata fere nihil reddat medullari substantiæ, unde nam sufficiens nervosi laticis copia?

Verum est si fricentur & moveantur partes affectæ, juvatur perfluxus, & allicitur quasi influens liquidum nervosum; sicuti a compressionem autem pedetentim hæc symptomata aucta tandem etiam diminvere aut abstinere appetitum, motum, aut sensum; humani enim animi ea pars, quæ sensum, quæ motum, quæ appetitum habet, non est ab actione corporis sejugata ut habet Cicero, id est hæc a cerebro per nervos sunt, quorum functio si impediatur, diminuantur aut cessant prædicta, hinc & somnolentia, idem tandem de deglutitione sentiendum, quæ fit ope & actione nervorum musculos perreptantium gulæ stomachi &c.

Species ista singulus in morbi fine potius a deglutitione difficili, & resistentia orificii sinistri ventriculi, quam ab alia causa, postquam enim assumendum stomacho contineret, nullus singulus, Unde

Disput. Medico-Pract. Tom. VII.

Ppp

potius

potius denotabat vim vitæ fractam, actionem deprimentium musculorum diminutam, aut pro tempore ablatam.

Febricula videtur dependere a duplici causa, primo quidem a collapsu musculorum, qui semiparalitici flaccecebant ubique, & transitum sanguinis multis in locis, præsertim extremis impediabant (vix enim venæ conspicuæ), sanguis minus ampla circulus vasa pulsuum frequentior præsertim circa vespæram excitabat, dein præsertim a sero acri stimulantе cerebri meninges, aut & sanguini mixto irritante periosteum, membranas, nervos, venas, arteriasque, hinc crurum dolor & maculæ rubræ, ut jam proposui.

Hinc & excretio urinæ sanguinolenta, sanguis enim dissolutus paululum tubulos renum intraverat, & cum urina excretus, in duabus papillis maculæ istæ rubræ inventæ patenter id demonstrant, dein ex rhæda succussione.

Diarrhæa sub finem partim ex laxitate fibrarum, partim forte ex pondere ingestorum, partim etiam ex seri irritantis, & per glandulas intestinales ventriculi, pancreatis fluentis conditione, & intestina ipsa afficiente.

Liquet satis itaque unde totale virium dispendium, si enim corporis infirmitas multos subeat casus per se & denique ipsum corpus tenuissima sæpe de causa conficiatur, quanto magis si causa magna vel multæ concurrere videantur.

Dextrum lotus fuit semiparaliticum anno 1728, cum tamen plurimæ aquæ & maxima abruptio piæ meningis sinistro in cerebri hæmisperio: probat id quod antea per experimenta alii jam demonstraveres, & memini me in corticali substantia cerebri sinistri, tumorem satis magnum in nobili matrona latus paraliticum dextrum creasse, sic & confirmant vulnera & compressiones.

Animales motus diminuti, tandem sublati, quia solum cerebrum a quo nervi voluntariis vel animalibus motibus inservientes pressum, intacto cerebello, a quo vel ejus medulla elongata aut cruribus nervi cordi, pulmonibus, actionibus vitalibus prospicientes, ut experimenta in vivis animalibus & morbi probant.

Sic & de actionibus naturalibus, quæ sunt in abdomine, judicandum, hi enim non compressi nervi & aliunde orti fungebantur officio.

Animus præsens & constans denotavit internum cerebri integrum & valens, neque etiam illic quidquam præternaturalis inventum est.

Verosimile est illic nulle & ultra tubulos memoriæ aut potius animæ inservientes nervos a summo numine creatos esse, cum miliones alii actionibus musculorum præsent: medullarem quoque substantiam in medio liberam, corticalem comprimi, nisi liquorum copia &

& totali compressione interna cerebri ac ejus medulla oblongata comprimantur, tum est vera apoplexia, sine motu & sensu, confirmant id observata, & experimenta.

Sic constitutum est, ut dum motu diminuto vel sublato membrorum extenuantur extrema, impinguescant fere semper abdominis membranæ adiposæ & cellulares, motus enim sanguinis aut corporis tardior oleum & axungiam auget, nimius dissolvit.

Cur tandem sicca sectio hujus corporis? id primo a collapsu & vasorum tenuitate deducendum videtur, sed quod mirum ipsa sanguificatio fere cessat in morbis multis capitis a colluvie serosa, probant id similes observationes: Palam est igitur quid V. S. possit, quando & in quibus capitis morbis, adde, quod illa evacuatio per alvum brevi ante mortem sic exoneraverit debile & exhaustum corpus, ut nihil fere restaret.

Reliqua quæ in pectore & liene inventa fuere, parvi momenti, & quæ gestantur diu absque noxa aut mortis causa.

Vel fortasse hæ collectiones ultimis morbi diebus factæ sunt, nunquam enim quidquam conquestum esse descriptio morbi & symptomatum demonstrat, ex quo vel somniando divinari possit, aliquid mortiferi aut morbosi hic latuisse, evolve præcedentia, convictus ejusdem eris sententiz.

Sic habes mi lector quæ disputationis brevis desiderabat, descriptionem vitæ, morbi & mortis, quam dolent omnes boni.

C C L I.

CAROLI FRID. KALTSCHMIED,

D E

HYDROCEPHALO INTERNO

RARÆ MAGNITUDINIS.

Jenæ 1752.

ANte aliquod tempus ex pago vicino ad me deferitur infans demortuus hydrocephalo, quem eo lubentius cultello anatomico subijciebam, quo majori mole capitis magnitudo rarum exhibebat casum, & hinc operæ pretium esse duxi, ea, quæ dissectio nobis exhibuit, in hoc programme explicare. In vulgus notum est, quod in praxi obveniat vel hydrocephalus internus, vel externus, vel uterque in eodem subiecto simul. Externus aquas super cranio sub integumentis recondit. Internus easdem sub cranio vel intra cranium & duram matrem, quod rarius occurrit, sæpius vero sub menyngibus & in ipsis quandoque ventriculis cerebri, continet. Cadaver nostrum maxime emaciatum, longitudine vitulinam superabat, cum tamen annum unum cum dimidio superasset. Cranii vero peripheria ulnam unam cum quadrante excedebat. Remotis integumentis capitis, nulla humorum extravasatio obvenit. Apertura vero in cranium, cultello facta, per menynges simul novem libratum aquas eduximus satis fluidas. Remota superiori cranii parte, sinus sagittalis sanguine admodum turgidus, & vasa ex dura matre in eum hiantia, sanguine distensa comparuere. Cæterum dura mater firmissime cranio adhæsit. Pia mater, sub qua aquarum moles maxime latuit, ex omnibus corticalis substantiæ cerebri fulcis elevata, in multis locis arachnoidæ separationem admittit, ita tamen ut hæc in dextro inprimis latere vacie rupta, intra duram & piam matrem filamenta hinc inde hærentia, demonstraret. Curiosissimo vero spectaculo cerebrum ipsum se exposuit, ubi totum compressum atque compactum libæ vulgaris dimidiæ ponderi æquabat & ad tactum duriusculum se exhibebat. Corticalis cerebri maior

æ q'q'


quanti-








Fig. I.



Disput. Medico-Pract. Tom. VIII. Aeschlester de spina bifida





quantitas aderat, cum medullaris substantia vix tenuibus striis distinguui posset, & corpus callosum membranam carthæ vulgaris crassitie referret. Quod vero maxime memorabile & jucundum visui se obtulit, in cerebri denudata figura externa, in eo fuit. Notum enim est, quod cerebrum per processum duræ matris divisum, duo exhibeat hæmiphæria, quorum utrumque iterum ab anatomicis vulgo dividitur in tres lobos. Verum hi tres lobus, in cerebro, alias sanq, vix oculis sese subjiciunt, & difficiliter possunt demonstrari. In nostro vero subiecto, utrinque tres lobus, ita distincte ante oculos positi, ut exactissime divisio eorum visui se objiceret, rarissimumque exhiberet spectaculum. Dissecto utrinque corpore calloso, admodum tenui, in utroque ventriculo cerebri anteriori, aquæ latebat uncia fere dimidia, qualis portio etiam tertium replebat ventriculum. Fornix ejusque crura, tenuis instar membranz fluctuabant, & corpora striata vix pili magnitudinem referebant. Plexus choroideus sanguine admodum turgidus, & septum pellucidum tenuissimum comparuere. Glandula pinealis vesiculæ aqua repletæ speciem exhibuit, & lentis dimidiæ magnitudinem, non superabat. Nates ad pisorum, testiculi vero lentis, magnitudinem vix accedebant. Valvula magna cerebri, diffuse in aquis fluctuabat, & pedunculi cerebelli, calami scriptorii crassitiem non superabant. Infundibulum duplo amplius dilatatum, aquarum sub cerebro ad unciam unam delitescentium communicationem permittebat. Thalami nervorum opticorum fere disparuerant, & ad nervos opticos tendentes, in eos fere tanquam filamenta, quæ nervos opticos exhibebant, terminabantur. Nec reliqua ex cerebro, seu medulla oblongata, derivata nervorum paria, in vulgus nota, majus monstrabant robur, cerebelli vero magnitudo vix avellanæ majori similis. Et id vero notari meretur, quod cranii ossa circumcirca fuerint clausa, & firmiter coheserint, tota superior pars vero, ossibus frontis, bregmatis & occipitis per aquarum molem distentis, saltem membrana fuerit reclusa, prout alias in sic dicto fonticulo videmus. Inde vero satis luculenter patere existimo, quod sejusmodi hydrocephalus nullam admittere possit medellam. Quacunque enim ratione, sive per interna sive per externa remedia, aquarum molem vel resorberi vel evacuari feceris, cum tamen ossa cranii non possint ita coarctari, ut decentem & proportionatam cerebro naturalis magnitudinis resumant cavitatem, & sic coherente archus dura matre cum cranio, longissime a cerebro remota maneret, æque ac reliquæ meninges, hinc vel novæ inundationi spatium liberum concederetur, vel cerebro decens involucrum desisset, vel opus secretionis spirituum turbaretur, alia ut taceamus.

C C L V I I.

CAROLI FRID. HOCHSTETTER,

D E

S P I N A B I F I D A.

Altdorff 1703.

Inier rariora forsan phaenomena Medico - Chirurgiae referendus videri posset tumor, quem dicimus, lumbaris cum spina bifida, eo quod de hoc affectu plurimi Scriptorum Medico practicorum celeberrimorum & Chirurgorum alte gluerunt, & paucissimi ii, qui scripti quicquam nobis de eo communicarunt, eidem inter observationes rariores & curiosiores locum tantummodo concesserunt, prout eundem in Ephem. N. C. paucissimo numero insertum reperies. Unde celeberr. Frid. Ruyschius observationibus suis Anatomico Chirurgicis rarioribus admisit eundem, Excell. B. Nic. Tulpius observationibus suis curiosioribus pariter nonnisi duo inseruit exempla. Doctissimus vero Justus Schraderus una saltem observationum curiosissimarum Medico-anatomicarum ejusd. mentionem fecit, & si qui forsan alii supersunt, quamvis ego horum numerum ne uno quidem adaugere sciam.

II. Penitus vero trutinando, Excell. D. D. Apinum hunc affectum aequè in adultis ac in embryonibus jam aliquoties observasse, & Celeberr. Frid. Ruyschium in observ. superius allegatis observ. XXXIV. p. m. 45 decies, idem D. D. Joh. Burgium in Ephem. N. C. Dec. II. A. VI. obs. LVIII. p. 141 & seq. quater eund. vidisse, ut reliquos taceam, quibus rarius saltem affectum hunc intueri contigit haud difficulter conjecturare quis posset, saepius forte an ac frequentius, quam sibi quis somniasset eund. spectari posse, dum modo frequentius etiam, ac accuratius tumores ejusmodi rimarentur Medici, & causas respiciendo, fertassis aequè ni magis adhuc quam hydrocephalum familiarem fore, cum in utrisque morbis eadem pene militare cernatur causa, prout evidentissimo edocet exemplo observatio CLVIII.

Ephem.

Ephem. N. C. Dec. II. A. II. ubi utrique affectus in uno subiecto simul occurrerunt. Quid? quod obstetrices & balneatores, quibus plebs sincondita plus fidei in tumoribus curandis quam ipsis Medicis cruditionibus habet, enuntient, sibi haud infrequenter tumores istiusmodi observatum obtingere, de eventu vero interrogati, id responsi dant, infantes tales debilioris & maioris semper esse naturæ, hinc plerumque mox in puerperio fata sua obiisse.

III. Quamvis vero hic affectus quo rarior putatur, eo etiam intricatior existat, non tamen deterruerunt me tricke illæ, quin eundem thematis loco pro disputatione inaugurali eligere ac pro viribus disquirere auderem, magis honorandi lectoris æquitati & benevolentie fidens, quam syrtes hujus affectus timens: Sis itaque talis B. L. prout fides in te habeo, & judicando hæc pagellas id cogites, in re magis ardua & rara facilius aliquid condonare æquum esse: Deus. T. O. M. conatus nostris divina sua clementia ac benedictione adlset, eosque ita dirigat, quo cedant unice in sui gloriam & proximi salutem.

IV. Res vero tota quo clarior ante oculos ponatur præmittamus observationem quandam, prout eandem ante annum circiter Vie prænobilissimus atque Experientissimus Dn. *Joh. Ludovic. APINUS* Med. Doct. ejusdemque Prof. publ. longe celeberrimus, serenissimi Principis Salisbaco Palatini Archiater & Physicus Norimbergensis felicissimus, naturæ curiosorum Collega Nonus dictus, gratiosæ facultatis Medicæ h. t. Decanus spectatissimus, Patronus atque promotor studiorum meorum, quorum non minimam partem ejus fidelissimæ pariter ac solertissimæ informationi debeo, per omnes vitæ mææ dies sanctissime devenerandus, hic loci in puerulo quodam habuit, eamque mihi non tantum propriis oculis tum intueri, sed & nunc ob summum in me favorem disputationi huic æri incisum progere benignissime concessit; estque seq. ipsius Autoris verbis recensita. Fœmina 36. annorum, aliquot jam liberorum mater, civis Altdorffina, postquam gravida, duobus mensibus ante partum alterutro pede in foveam incidisset, & ex illo tempore notabilem in fœtu alterationem percepisset, peperit anno abhinc filiolum tumore aquoso in regione vertebrarum lumbarium instructum, magnitudine pomi curtispenduli, in medio sui cute & cuticula privato, ac serosa humiditate perpetuo scatente. Vocatus illico post partum, pronunciavi vitium hæere in spinali medulla, inque eo confirmabar, quod pulsio artus inferiores nihil omnino agitalet, & elatis ab obstetrice cruribus ejulatu suo abunde proderet, subesse læsam spinæ dorsii conformationem. Id vero singulare, nec alibi facile visum, defuisse in summitate tumoris communia corporis integumenta. De cætero universus corporis habitus intemperie laboraverat serosa, frequenti sternutatione, tussi, coryza

coryza & alvi fluxu, quibus a prima natiuitate invadebatur, satis testantibus. Curationem vero, & si frustraneam prædixerim, incipientem duxi a siccantibus, ut si possibile cicatrice ducta; reliquum deinde fotibus discuterem, iuxta methodum alias in hydrocephali curatione proficuum deprehensam, quem in finem varia præscripta, sed non fuit in cicatrice progredi ultra limites circelli fig. I. BB. media area C. propter exsudantem ichorem aciem omnem epuloticorum efficaciam eludente, ruffi etiam, atrophia, & alvi fluxu ultra remedium spem invalescentibus, puerulus post octavam hebdomadam tabe periit, paucis ante obitum diebus tumore penitus subsidente. Illo autem post mortem aperto insignis cavitas fig. II. bb. se ostendit in regione vertebrarum lumbiarum, apparuitque tres posteriores processus acutos, transversos, oblique ascendentes & descendentes omnino defuisse, sola basi illarum superstitie. Integumenta medullæ spinalis insigniter erant expansa, cum vasculis sanguiferis in magnitudine sua notabiliter auctis fig. III. BB. ipsa autem medulla spinalis ex cavitate secundæ adhuc integræ lumbaris prodiens inserta conspiciebatur mediæ tumoris supra dicti areæ prout videre est fig. II. c. fig. III. lit. A. & adhuc clarius fig. IV. A. ubi stylo inserto magis in altum elevata conspicietur medulla.

EXPLICATIO FIGURARUM.

FIG. I.

- AA. basis totius tumoris.
 BB. circulus exulceratus antea, nunc per adhibita medicamenta consolidatus.
 C. Area media, quæ nullam cicatrificationem admisit.

FIG. II.

- N. 1. 2. prima & secunda vertebra lumbares illæ.
 aa. tumor in duas partes cultro divisus;
 bb. Cavitas tumoris.
 c. Medulla spinalis medio tumori implantata.

FIG. III.

- A. Medulla spinalis in ipsam superficiem tumoris æquasi implantata.

BB.

BB. vascula sanguifera insigniter aucta.

FIG. IV.

A. Medullam spinalem stylo inserto elevatam repræsentat.

V. Affectum hunc quo denominemus; omisiss etymologia, homonymia & synonymia, quippe cum ex præmissa observatione notum, quid vocabulo spinæ intellectum velimus; non scil. rosarum aut cynosbati spinas; sed vel ipsam spinam dorsi, Græcis Acantha & Râchis dictam, ex triginta circiter ossibus, quæ vertebrae dicuntur, compositam; vel vertebrarum corporis humani processus acutos, spinarum nomine ab Anatomicis salutato; retinuimus appellationes auctorum, qui de eo scriptis nobis aliquid reliquerunt, tum quia non est animus, dicam alicui scribere, tum quia convenientissime etiam illi impostitæ videantur; nominamus ergo eum vel spinam bifidam solitarie, eo quod revera spina dorsi semper maxime sub eo pati atque divulsa esse debeat, imo quod quandoque relictis vestigiis processuum inter se invicem hiantium accuratissime bifida cernatur, prout eandem depinxit Nic. Tulpus observ. medic. lib. III. c. 30. p. 221. & D. D. Joh. Lechellius in Ephem. N. C. Dec. II. A. II. obs. CLVIII. descripsit, ita ut digitis spina revera bipartita tangi poterit; quamvis sæpius etiam acciderit, ut processus spinosi penitus oblitterati visi fuerint, corpore vertebrarum solo atque illæso superflite, prout in nostra & aliorum observationibus videre est: vel consideratis simul aliquibus circumstantiis locoque affecto, eum plenius dicimus tumorem lombarem cum spina bifida, & lombarem quidem, non quod semper in vertebra lumbaribus accidat, sed plerumque tantum, eum & in reliquo spinæ tractu obtingere queat, prout inferius videbimus, sicque prius denominatio pro generali, hæc pro speciali assumi possit.

VI. Quoad definitionem realem ea sit seq: spina bifida, est morbus conformationis & unitatis læsæ, consistens in hiatu vertebrarum spinæ dorsi alicujus, vel etiam plurium, ac exinde subsequente tumore aquoso elatiori, modo cum modo sine partium inferiorum atrophia & imbecillitate, obveniens vel ex prava prægnantis matris imaginatione fortiori, & inde dependente vertebrarum fetus in utero prava conformatione, vel earundem ob fortuitum corporis lapsum, concussionem, incurvationem, nism validiorem & tandem ipsam feri lymphatici spinalis medullæ copiam excedentem, tum in embryonibus, tum in adultis, licet hoc rarius, fissione, diffractione, divisione &c. cum insequente membranarum spinalem medullam investientium intumescatione, distensionem atque ipsius medullæ spinalis diversimoda affectione.

VII. Morbum diximus esse læsæ conformationis; eo quod certe

Disput. Medico-Præf. Tom. VII.

Qqq

super-

superficies dorsi in magnitudine aucta peccet, cavius quæ spinæ dorsi, pro secure deducenda medulla spinali non nisi digito mediocri continendo apta, hic multum ampliata conspiciatur, ut non ex debito complecti medullam valeat, sed hanc cum integumentis suis licentius evagari permittat. Quid? quod spinalis medulla naturalem suam mutet pariter situm, neque ad partes vel artus inferiores ex naturæ instituto disseminetur; ubicunque vero hæc talia in corpore sese offerunt, ad classem morborum malæ conformationis referenda esse, eruditissime edocui vir magnificus, prænob. ampliss. atque experientiss. *Jac. Pancrat. BRUNO* inclytæ universitatis hujus h. t. Rector gravissimus, phil. & Med. Doctor ac ejusd. prof. p. atque senior longe celeberrimus, Archiater Norimbergensis meritissimus, patronus, atque præceptor meus alie suspiciendus, in propyleo suo medico pag. 59. unitatem vero læsam manifeste arguunt termini hiatus fissionis, diffractionis &c. in definitione usurpati.

VIII. Hæc intimius paulo considerando, adnexis simul reliquis, quæ ad essentiam hujus morbi retulimus, facili negotio ad signa diagnostica medico sagaciori via pandentur, præcipue si causas procatarchicas magis solícite investigaverit, tumorem enim circa spinam plane specialem & aquosum propriis tanget manibus & ipso tactu insimul facile vertebrarum spinas sede sua dimotas & diffractas esse, atque easdem hiare percipiet, imo defectum spinarum digiti numerabit, atrophiam ac imbecillitatem partium ægri inferiorum suis contemplabitur oculis, & si de causis callidius quærens autiverit lapsum præcessisse, terrorem item, imaginationem fortiolem, & embryonem exinde inquietiorem factum, pressionem molis alicujus in dorso gestatæ diffregisse aliquid, confirmatum se credat de præsentia hujus affectus.

IX. Sedem hujus morbi inquisituri subjectum ejus nominamus & quidem primarium, quod nullum est aliud, quam una vel plures vertebræ quoad partem sui exteriorem magis angustam, processibus variis ornatam, ab invicem divulsæ, cum vel sine processuum illorum obliteratione, una cum spinali medulla varie circa locum affectum intumescens, distorta, expansa & quandoque penitus in humorosam quandam substantiam resoluta, prout exemplo testatur observ. CLVII. Ephem. N. C. D. II. A. II. 363. & ipsa hæc noitra, quoad partes inferiores, spina enim integra & medulla ejus illæsa manente, vix talis oboriatur affectus. Nec tamen ulla univèrsa spinæ dorsi excipienda hic venit vertebræ, sed qualibus pro ratione causarum affectus hujus capax esse potest. Sic observat eundem celeb. Ruyschius in vertebrarum colli spinis observ. LII. observationum suarum anatomico chirurgicarum; excellentissimus

D. D.

D. D. Apinus eund. vidit in virgine quadam hæctica 20 annorum medias infra scapulas enatum, pariter idem vir ut doctissimus ita curiosissimus quoque similem pugni magnitudine in fine ossis sacri in femina 50 annorum ex conatu fortiori, cum levatura esset falcem graminis majoram *eine birde Grass*. abortum notavit, cum doloribus fævissimis ob lympham acrem ichorelcentem effusam; frequentius vero unam vel plures & plerumque quidem ex ultimis vertebrarum lumbiarum affectus hic occupat, prout reliquæ hætenus allegatæ observationes testantur; secundario vero totum corpus compatitur, quatenus tota etiam spirituum animalium compages in circulo suo disturbata existit, ita ut corpus vivide satis haud invigorare ac reficere valeant; specialius vero hoc modo compatiuntur quoque partes inferiores, quippe nervis plerumque cruralibus maximam partem destitutæ.

X. Differentias hujus affectus, quod concernit, præter eam, quæ a loco affecto desumi possit, quamque in antecedenti thesi claram jam dedimus, supersunt aliæ. Nimirum quoad originem, dum oboritur alius vel sponte, sine prægressa externa violentia corporali, vel a causa externa violenta, lapsu, jactu, ictu, conatu fortiore, tam in adultis quam præcipue in embryonibus, utero materno adhuc conclusus; quos sæpe noxam pati illæsa matre constat: vel symptomaticè plane ex humoribus copiosioribus; prout sub erratione causarum proximarum videbimus: sic quoad tumorem, quandoque eum exulceratum, prout talem in nostra descripsimus observatione, quandoque vero non exulceratum, item alium latiori exurgere cernimus basi, angustiori alium, eundem porro nunc rotundum, nunc oblongum, pro diversa amplitudine huius, qui ratione causarum rursus diversissimus pariter existit, nunc enim ubi spina violenter diffracta, distat eadem quousque fracturæ impetus se extendit; ubi morbus ex prava conformatione enatus, hiat nunc amplius nunc angustius, prout nimirum plures vel pauciores vertebrarum spinæ defunt, eæque nunc latius a se invicem dehiscunt nunc speciale solummodo foraminulum rotundum loco hiatus relinquunt, uti talem descripsit Ruyschius in observ. XXXVI. suarum obl. Anatomico-Chirurgicarum. Denique intimius spectando hunc affectum, alias rursus inveniemus differentias ratione affectionis ipsius spinæ nullæ, prout ista vel quoad duplicem suum caudicem, vel quoad alterutram saltem medietatem affecta est; modo adnata, modo non, modo ultra tumorem exporrecta, modo intra ipsum tumorem humorose resoluta & quæ sunt plures aliæ. Quæ vero a symptomatibus desumi queant differentiarum, cum diversitati subjectorum, temperamentorum, ætatis, sexus, vitæ generis &c. sese accommodent, & innumerabiles fere haberi queant, ideo brevitati studentes recensendis iis super sedebimus.

XI. De causis ut sollicitos nunc nos geramus ordo jubet, quarum campus quo plenior iis, eo etiam intricatior exiit & quidem eo magis spinis difficultatum horridus cernitur, quo certius vertebræ iis in hoc affectu destitutæ notantur, tentabimus vero hariolari aliquid, si dicere haud valeamus: causa immediata atque formalis, ubi malum ex prava matris imaginatione, ipsum erit principium fetus vitale, seu anima prout enim tota corpusculi embryonis formatio ab ejus directione dependet, ita vix deformatio ejusdem ex aliq capite deducenda erit, cum quævis corpora naturalia organice structa sive conformia sive deformatia existant, principium aliquod struens pro causa immediata atque sui fabro agnoscant. Ne vero obscuritas hic subeat B. lectorem, circa vocabulum principium vitale, paucis explicamus, id nos per illud intellectum velle, quod alii per archeum, flammulam vel luculam vitalem, byolychnum, naturam, vel ipsum animam exprimere intendunt. Quid vero sit hoc nostrum principium vitale, & quomodo res suas peragat, vix nobis brevitati studiosis hic inferere licebit, hinc quibus durum est nostras per illud ductas rationes intelligere, adeant rogo Excell. D. D. Apini eruditissimas de eo habitas disputationes, seque in eo informatos videbunt. Ad nostra redimus, & miramur quantum sibi potestatis imaginatio matris prægnantis fortior informandis ac deformandis fetibus vindicet, quod enim ad nutum illius certi quid, insoliti alias, corpori embryonis super induci vel etiam naturaliter alias configurandæ partes absumi soleant & annihilari, certe clarum est, dummodo nervorum species innumerabiles consideremus. Ex mille aliis, quos ipse vidi, aliquos dicam, ipse ego in latere dextro maculam teneo, quæ in teneriori corpore ante annos aliquot araneam cum pedibus suis & oculo exactissime referebat, robustior vero nunc factus, obscuriorem quoque eam noto, sigillabar autem hoc stigmate, quod B. mater utero incarceratum me tenens araneam in pectoralis sui dextro latere prorepentem cerneret & dira inde sibi imaginaretur; sororem, nunc dudum quoque beatam habui quæ nævum humero sinistro insidentem alebat, fundulum tam exactissimæ representantem ut demere ipsum voluisses, si vidisses, quo nævo notabatur pnella, quod charissimæ B. matri fundulos decocturæ unus eorum ex cacabo in humerum prosiliret, eamque insigni terrore percelleret: Vidi binos viros manibus ac pedibus penitus destitutos, nisi quod alter pedem habebat anserino similem, quo multa curiosa præstabat, defectuosi vero sic nati fuerant miseri illi, quod matribus eorum anser denegabatur, quem in veru assatum ex pica appetebant; annumerari his convenientissima quoque potest observatio Tulpiana, de timore rapi fornii cum spina bifida obs. Med. lib. III. cap. XXX. p. 230. & quæ sunt sexcenta alia ejusmodi exempla, Num lapsus & casus gravidarum, ob inde sequentem terrorem fortiores.

an vero ob ipsam allisionem, concussionem & spinarum sub his motionibus diffractionem potius acculandi in hoc nostro affectu veniant, suo loco relinquemus. Certi itaque tantam intercedere matris cum erubryone conspirationem, ut & sola imaginatio fortior istius hunc & formosorem & deformiorem reddere possit, de eo paucis circumspectamus, de quo & Plato quandoque silere cogitur, qui nimirum fiat, ut tale quid imaginatio præstet? Effectus certe docet, conceptus ex imaginatione ortos plus esse quam entia rationis, prout vulgo creduntur, nempe entia quædam vera, realia, spiritualia tamen, prototypo suo similia, non solum ratione figuræ sed & activitatis intrinsecæ, quo ipso simul patet, vocabulum imaginatio ipsam ejus formalitatem insigniter exhaurire, revera enim sub ipso imaginationis actu imagines quædam ponuntur, clarius idææ formantur, quæ deinceps in fetum transeunt, suamque activitatem incerta corporis parte cum sigilli veluti sui impressione exerunt; qua ratione vero istæ fiant quid sint ubi existant & quomodo operentur humana mens huc usque definire haud valuit, ideo & hic nos taceamus, maximum vero pondus collectioni spirituum animalium tribuere, forsitan non est de nihilo. Relinquimus igitur ea, & solliciti potius sumus explicare, qua ratione fiat, ut ob imaginationem in cerebro factam, principium vitale embryonis in utero inclusi in formationis opere præpediatur, aut irregularius agere cogatur. Hoc ut explicemus, præsupposuimus jam conspirationem matris cum infante firmissimam, eamque consensionem in spiritibus magis quam humoribus consistere probabile videri autumamus; supposuimus item imaginationem fortiores terrores & animi affectus graviores perfici quasi collectione quadam fortiori ac revocatione & recursum spirituum animalium ad cerebrum phantasiæ sedem ac tribunal. At cum spirituosæ corporis partes potissimi existant operarii, per quos principium vitale suum gubernat officium, sic impediri in eo oportet, ubi contraria impressa idea advocatis & disturbatis ipsis illis spiritibus, prioribusque connatis ideis, quarum ad normam partium elaboratio perfici debebat, misere corruptus vel penitus deletis, aut omnino abruptis formationis negotium, aut saltem hac illa parte negligentius tractat, sique accuratius suo fingi officio haud potius est, quoquo modo interim se adjuvat, & ut alacrius rem agere valeat, ipsi spirituum motui impresso sese accommodat, & simile quid efformat, ad quod spirituum motus inclinat, ponit rudimenta alba, alia seponit, quid dicam? si est aliquid dixisse, ideo aliter agit, & hoc cursum de nævis dixisse sufficiat, quod licet argumenti gravitatem non exhauriat, non tamen penitus de nihilo futurum confidimus. Redimus hinc in viam, unde digressi fuimus, & de causa immediata anxii porro, rursus adducimus aliam, ubi affectus ex lapsu, pressione violenta, co-

natu quovis fortiori &c. quæ est ipsa dehiscencia, positus inordinatus & omnimoda resolutio spinarum cum intumescencia membranarum spinalis medullæ.

XII. Ad causas proximas mediatas ordine nunc delati, in affectu hoc varias eandem deprehendimus, prout nimirum ortum hinc morbus hausit suum. Dicere vero eas ac definire, ubi ex imaginatione affectus, vix fuerit opus, cum fetus etiam sanctissimus & robustissimus imaginationis naturæ vim vix possit eludere. Credibile tamen interdum portiones illas naturales, ex quibus spina, vertebra, medulla spinalis & reliquæ partes adjacentes formandæ erant, culpandas esse, sicuti fluxiliores magis & molliores existant, quemadmodum & ipsum principium vitale fetus, debilius in uno quam altero, facilius ab imaginatione materna subigi huiusque impetuoso torrente abripi possit: verisimile videtur. Ubi affectus ex concussione, congnatione, tensione &c. ipsa corpora allicita & sub nisu fortiori, ipsi tendimus musculorum spinis affixi & fortius attracti, easdem divellendo proxime malum hoc causabuntur, non inculpatis tamen simul manentibus ipsa lymphæ extravasata cum spiritibus animalibus turbato ordine spinalem medullam percurrentibus & tunicas instantibus atque intumefacientibus. Quæ etiam causa est, cur in thesi secunda huncce morbum hydrocephalo comparaverimus & æque ac illum frequenter ob causas fere communes obvenire posse affirmaverimus, atque in §. 10. eundem symptomaticæ magis quoque exoriri posse dixerimus, ut id quidem facile est conceptu, si dicamus, malum hocce ortum suum debere lymphæ ac humoribus circa locum affectum cumulatius collectis, fibras spinarum in embryonibus cartilagineas, imo membranaceas distendentibus & tandem perfrumpentibus. Adesse vero talem lympham, quæ excedere propriis suis canalibus præ inferre valeat, probamus, partim quia mediantibus digitis ex ipsa spinali medulla exprimi potest lymphæ pellucida, terebinthinam consistentia æmulans, teste experimento Malpighii in opere posthumo Bibl. Anz. tom. I. præfixo p. 60. a ipsaque interior ejusdem substantiæ cinerina glandulosa eandem necessario stillare debet, partim quia in membranis cerebro & medullam spinalem involventibus, lymphæ ductus observati fuerunt, nec in membranis solum, sed & per ipsam cerebri substantiam percurrentes, prout accuratissime & solidissime id evicit vir prænob. Amplissim. atque Excellent. Dn. *Job. Mauric. HOFFMANNUS* Phil. & Med. Doctor, ejusdemque in hac alma universitate prof. p. famigeratissimus, sereniss. Marchionis Onoldo Brandenburgici consiliarius atque Archiater gravissimus, physicus Norinbergensis ac collegii naturæ curiosorum adjunctus Heliodorus dictus meritisimus patronus atque præceptor meus omni honoris cultu venerandus in disp. publica aliqua de hydrocephalo cap. I. §. II. quod idem, de medulla spinali affirmari

firmari posse nullum est dubium, cum ejusd. membranæ ac tota quoque substantia nihil sint nisi continuationes tum membranarum cerebrum investientium, tum ipsius cerebri. Nec obstat, quominus evincere quis conetur, humiditates in cerebro contentas per ipsam quoque spinalem medullam depluere posse. Quoad cætera vasa humorifera spinalem medullam circumvallantia, arterias puta & venas, numerosa eadem descripsit idem vir excellentissimus in Disp. XIV. idæz machinæ humanæ §. II. ista pariter tum per *duram materem* tum glandulis spinalis medullæ subministrando materiam pro secernenda lymphæ laticem hunc humorosum adaugere valent.

XIII. Causæ antecedentes, si malum ob prægressam imaginationem ex prava conformatione obortum fuerit, eadem sunt, quæ jam recensitæ in principio thesæos proxime præcedentis, a proxima non diversæ nisi loco & tempore, mollities nempe & teneritas staminum spinarum & vertebrarum primordialium, cum certum sit naturam partes solidiores & minus tractabiles minus quoque aggredi ac deformare, sed tales solum, quos nexu suo dissolvere facile possit, hinc si spinas deformaverit, eas fuisse oportet mollissimas & minus resistentiæ habuisse quam spiritus impetus. Eadem vero mollities & fracturæ facilitas accusanda hic etiam venit, si morbus ex alia causa ortus fuerit. Notamus enim in adutorum vertebri spinas laxiori & minus veræ apophysi vertebrarum corpori adnexas esse, ut facile a se invicem divelli queant, quid ergo fiet quæso in embryonibus? Ubi in tertio ætatis mense vix vestigium processus alicujus spinosi animadvertas, & ubi septimum jam mentem transgressus fuerit, vix præter cartilagineas mollissimas punctula ossea in iis cernes, prout Bibliotheca Anatomica part. IV. cap. XII. p. 411. nos informat. Quævis certe mollissima alissio spinas diffringere & e loco suo dimovere potis est, & maximopere demiror, embryonem sub illa corpusculi sui curvatura & duriore ad corpora vertebrarum matris accubitu, in hujus præcipue motu paulo vehementiori, non frequentius affectum talem incurrere. Ubi affectus ex prægressa aliqua violentia, causæ *permatricis* sive antecedentis rationem habebunt hæc ipsa modo memorata. Si collectioni copiosioris feri lymphatici & inde subsequenti spinarum emotioni sui originem debet, pro causa antecedente alleganda erit obstructio cujuscunque generis vasorum quæ subsecuturis humoribus transitum præpediendo eosdem stagnare faciet, & hoc modo *duram materem* auctiorem una cum copiosiore feri lymphatici in glandulis ad medullam spinalem pertinentibus secretionem, & vasorum lymphoducorum crepatura inducet, & ita tumori dicto anfractum dabit. Non plane insens quandoque etiam habenda ipsa lymphæ, mucilaginosior in spinali medulla alias contenta, nunc vero resoluta magis & aquosior reddita humiditates præternaturales adaugens. Esti serum

ratione

ratione qualitatis peccaverit, acrimoniam ejus sub hanc classem referre oportet, quippe ea vasa lymphatica eroduntur, quæ deinde causam proximam materialem lympham sc. copiosorem fundunt.

XIV. Excipiunt causas antecedentes remotæ ac prostaticæ & quidem ubi imaginatio in hoc affectu tragædiam excitaverit, accusandæ ipsæ illæ idæ extrinsecus ab objectis his illis appellemes, per violentiam ubi malum obortum, causas remote constituent quævis corpora dura cum inipetu adacta, item onerum sublationes, lapsus, conatus fortiores, vehementiores dorso incurvationes, & quæcunque rupturam in vertebrarum una vel pluribus inferre valent. Communissima vero quæ hic militare queat, causa remota est temperatura infantum serosior, excedentem alens humiditatem, qua ossa non tantum tenuiora servantur, sed & ab ossificationis consueto termino magis elongantur, vel quod idem, tardius sibi competentem soliditatem adipiscuntur. Insuper vero ubi copiosius illud serum segnius movetur facillime parit stagnationes, stagnando rupturas vasculorum teneriorum & effusiones lymphæ, perque effusiones tumores aquosus. Et eatenus quoque male audiet ipsius matris temperamentum phlegmaticum magis & humidius, prout in embryonem per maternam enutritionem in utero transfunditur.

XV. Commune est proverbium: nulla calamitas sola idque verissimum cernimus quotidie in corpore nostro, cujus partes tam amabili nexu ac delicatissima conspiratione inter se invicem cohærent, ut nulla fibra sola affici queat, quin centum aliæ compatiuntur, & vel ratione functionis suæ desistant vel aliarum partium officia naturalia impediant & quovis modo ubique condoleant, & quæ sexcentæ aliæ ejusmodi sunt compassionēs. Nil mirum igitur, si affectus hic spinalis medullæ plura post se trahat symptomata, nos potissima saltem rimabimur, ne limites brevitatē præfixæ transgrediamur. Notamus vero, forissecus affectum hunc contemplando, illico tumorem spinis vertebrarum insidentem ut plurimum figuræ hemisphæricæ. Eum si oculis intuearis, quandoque exulceratum carnes quandoque vero integra cute tectum, si digitis cum palpabis, molliorem istum deprehendes, & magis aquosum. Prout item nullam inflammationem notabis, ita pus subesse haud æque concludes, nisi forsitan excipere arrideat, ubi malum in subiecto magis adulto ex causa quadam violenta obortum. Tumoris vero hujus natales sub enarratione causarum explicavimus, dicendo illam non aliam esse nisi lympham extra circulum & sphaeram suam dilapsam stagnantem & integumenta medullæ spinalis distendendo tumorem parientem: ipsius autem illius lymphæ scaturigines patefacimus in §. 12. sed prout humores contenti corrumpuntur ac nunc acriores & corrosivi redduntur, nunc vero mites & insipidi permanent, eatenus etiam tumorem erodunt &

& exulcerant vel intactum relinquunt. In nostra observatione area C. fig. 1. exulcerata notabatur, quod eo in loco spinæ medulla adnata fuerat humidam quandam substantiam ichoreſcentem continuo exillens. Adnata autem fuit in caſu præſenti medulla ſpinalis medio tumori vertici, quod ſubdior jam exiſtens penitus annihilari non potuerit. Accidit enim lapſus matris gravidæ ſeptimo geſtationis menſe, partibus ſectis notabiliter jam confirmatis. Viſo vero ita tumore in ſuo ambitu, totum etiam corporis habitum exteriorẽ accuratius examinabimus, quem diverſum deprehendimus, modo languidum, imbecilem, atrophia conſumtum, pedibus quaſi paralyticis, & quæ ſunt alia; modo validiorem, agiliorem & pleniorẽ, prout tale ſiſtit exemplum celeb. Ruſchius in obſerv. ſuperius ſæpius allegatis obſ. XXXVI. totius vero hujus differentię cauſa erit in ipſa ſpinali medulla prout hæc ſcil. affecta. Ubi rariora quædam prænotanda veniunt, nimirum, quod quandoque non ultra locum affectum exporrigatur, ſed mox in humoroſam quandam ſubſtantiam penitus reſoluta diſpareat; nunc illico in loco affecto ſicuti nos in obſervatione notavimus; adnaſcatur, quæ ubi obveniunt, non poſſunt non partes inferiores contabefieri & motu ſuo privatæ jacere, quippe nervis cruralibus penitus deſtitutæ, per quos tamen neceſſarium vitale, ſpirituum nempe influxum, recipere deberent. Accidit etiam quandoque ulterius exporrigi medullam ſpinalem, & circa locum affectum, vel aliquas tantum fibras medullares, vel alterutrum ſaltem ejus caudicem offici altero illaſo adhuc, utcumque partibus inferioribus proſpiciente, hoc ſi contigerit, adelle quidem ad tempus poteſt & nutritio & motus partium aliquis, non vero conſtans: cum ſenſim ſpinalis medulla magis magiſque deperdi ſoleat idem dicendum quoque erit, ubi affectus in decliviori fuerit loco, ita ut ſupra enndem plerique nervi illaſi jam excurrent v. g. in offis ſacri ſine. Quoad reliqua ſymptomata in noſtro ægro puerulo obſervata temperamento ſeroſiori ſpeciatim illa attribuenda erunt, cum enim ſerum illud acrius exitiſſet, fibrillas nerveas varie lancinando nunc tuſſire eum fecit, nunc ſternutare frequentius, ipſaque quantitate ſua excedente coryzam & alvi fluxum continuum producebat.

XVI. Conſideratis nunc quid ſit ſpina bifida, quomodo oboriatur, & quæ ſymptomata eam comitentur, prognofin, ut adjiciamus ordine jubemur. Spectando vero cauſas, æque adultis aique embryonibus affectum huncce familiarem eſſe poſſe facile affirmamus, æque vero facile inſinuſi indicamus, eundem niſi ex fractura hiatus ſit minimus & in ſine offis ſacri obveniat, ſtatimque a principio remediis tractetur convenientibus, undis ſpinalis medulla mox obruatur, vitium capiat & ſpirituum animalium motus circularis inde diſturbetur ac ſufflaminetur,

Diſput. Medico-Pract. Tom. VII.

R. r v

ut

ut avolantes ii & inordinatus pervolantes corpus demortuum jacere sinant.

XVII. Ultimum nunc est, ut de curatione pauca adjiciamus, sed quid dicam de ea? Optarim certe veram certamque eam promitti posse, aut vestigia me terrent, cum celeb. Ruyschius obs. XXXIV. hæc circa curationem adjiciat: vix ac ne vix quidem affectus hic profligari potest, nemo enim inter eos, quos tractavi hætenus, infantes, evasit, nec unquam ab aliis curatum percepi. Turpe vero esset medico in desperatissimis etiam morbis ægrum derelinquere, tentet hinc quævis, quæ prodesse sibi videri queant, curet palliative, & naturæ operationem expectet, ni methodice atque certe curare liceat, caveat saltem, ne noceat. Hinc & nos moniti loco hoc tenentes, quid de ejus curatione sentiamus, aperiemus. Duplicem autem eam merito constituimus; aliam quippe, ubi exulceratus cernitur tumor, & ubi non exulceratus aliam, sic in exulcerato tumore exulceratum resiccetur & cicatrifetur pulveribus siccantibus inspersis v. g. mag. sacch. Saturni, cerussa, creta, talia præparata &c. sic folia semper vivi maj. in pollinem tenuissimum redacta pro eodem scopo valde proficua censeo; super imponatur porro empl. diapomphol. vel saturnium Mynsvel album coctum, vel aliud simile, id tantum præcaveatur, ne talia emplastra nimis glutinent, fortiusque adhæreant, & ita sub difficiliore remotione sui aperturæ ansam præbeant. Consolidato vero ulcere cutique nunc integra conspecta, quovis modo præcaveatur, ne rursus exulceretur locus: Tumorem interim disjicere annitaris cutemque leviter adstringentibus ad naturalem firmitatem reducas. Hoc si præstabis, curationem præstabis, sed hic opus hic laborem invenies. Non abs re autem fore arbitror, si in hunc finem ad præceptum excellentissimi D. D. Apini, patroni mei æstumatissimi, in collegio publico super Ruyschianas observationes datum, fortibus tractaretur discutientibus locus affectus, & in huncce scopum sacculi conficerentur ex H. fragar. burf. pastor. mille fol. origanplantag. salv. betonic. fem. carvi &c. vino incoquendi & calide atque diligenter imponendi, cujusmodi quippe sacculos in puero hydrocephalico profuisse, communicavit in colleg. chirurgico privato scēt. I. obs. 26. vel adhabeatur linimentum in hydrocephali curatione alias laudatissimum, quod paratur ex herb. fragar. burf. pastor. pulverifatis & cum s. q. axung. porci junioris, picisque abietis purissimæ, in linimenti formam redactis: Tumorem si hoc modo dissipaveris, de bono eventu latari poteris, tum enim natura ipsa foramen cartilagine aut membranis occludere, ac intra sphaeram suam munire sciet. Dum vero hæc aguntur, prospiciat medicus insuper circa symptomata. Hinc ægros languentes semper reficiat, v. gr. potionibus cordialibus, confortantibus, pulveribus antiepilepticis, & quicquid subiecto commodum viderit, suadeat; si

insuper

insuper observaverit, serositates acrimonia sua in corpore peccare vari-
aque inde scaturire mala, corrigat eandem absorbentibus, dulcificantibus
&c. prout natura morbi, & subjecti postulaverit. Hæc si voto non res-
pondeant, naturæ rem relinquant, cave sis vero ne ab indicationibus
superioribus recedas & apertionem suscipere intendas, trucidabis enim
hoc modo ægrum, & cum aquis ipsam quoque emittes vitam, per
experientiam enim probata hæc est cautela, nec ulli eam tentanti unquam
feliciter cessit; per rationes medicas insuper stabilita medullam enim,
si denudabis, & aërem incautius admittes, substantiam eorum deper-
des; convulsiones excitabis, & infelicitè totum ægrum jugulabis, cautius
ergo aliorum exemplo mercari discas. Quæ circa dietam admonenda
veniunt, sunt seqq. dieta sit qualis hæticorum, & omne vitetur, quod
acrimoniam in corpore producere valeat; corpus fasciis bene fulciatur
& portando tales infantes, nolito eos vehementius concutere. Alvus
semper apertior servetur, quo serositates superflue commodius evacu-
ari queant, caveas tamen, ne limites etiam transgrediatur, quo in casu,
ubi durior scilicet clysteres & suppositoria proficua erunt. Et hæc de hoc
affectu dixisse sufficiat, DEO sit laus honor & gloria in æternum.



G C L I I I
J. I G N A T I I G I L D.
D E
S P I N A B I F I D A.

Vienn. 1754.


P R Æ F A T I O.

EX immenso morborum, corpus humanum infestantium acervo spinam bifidam pro specimine comparatæ in medicina doctrinæ exhibere, siue utilitatem, siue dignitatem materiæ spectes, operæ pretium censui. Ad eam autem conscribendam non novus morbus, quasi a nullo foret notatus, non repetita occasio eum videndi, neque curatio, cujus hic vana spes atque desiderium: sed fissuræ apophysium vix hætenus notatæ magnitudo me impulit, ut languido ac imbecilli animo in notandis rarioribus medico dignissimis laborare viderer, si tacendo illam palam proponere neglexissem; quæ, ut nullus dubito doctioribus non minus admirationi quam erudientis cautelæ ac normæ inserviet. Nam quotquot ejusmodi casus spectare mihi licuit, fere semper incisionem a Chirurgo factam cum subitaneo corporis interitui observavi.

Ne vero effigies ejus ornatu careret, conscripsi generaliter quæ in tribus tumoribus lumbaribus cum divisione spinæ dorsi notare potui; his causas adjeci, meamque in illis opinionem expressi, atque ut evidentia a probabilibus distinguerem, in duo capita totam morbi historiam partiti sum. Quorum 1^{um} constitutionem morbi, 2^{dum} causas & reliquas morbi divisiones continet.


Cuncta hæc voto meo respondebunt, si tibi L. B. satisfecisse visus fuero; si vero in quibusdam a recto tramite declinavero, veniam dabis; dantur enim hæc in disceptationem publicam, ut confirmer, si bene sensi; si minus, bene devinus redeam. Ea igitur benevole legenda accipe, fave, & vale.

C A-



Disput. Medico-Pract. Tom. VII.

Gily de spina bifida



CAPUT I

DE

SPINA BIFIDA.

§. I.

Nomen ipsum, significans spinæ unionem separatam, morbi definitionem fere abolvit; ut controversias de illo hic adducere minime animus sit, sed in recte describenda morbi historia procedere eo ordine, quo ablatis exterioribus, spinæ dorsi videlicet incumbentibus partibus affectis læsæ vertebræ, tanquam primum morbi subiectum examini subjiçientur. Quarum præmissa contemplatione tanto leviori opera effectuum, ac morbi causæ, atque curæ ratio eruetur. Quod facturus sapientissimum monitum Illustrissimi L. B. van Swieten sequor in Commentar. in Herman. Boerhaave aphor. de cogn. & curand. morbis Tom. 1. §. 3. pag. 6. expositum: *Medico morbum curaturus necesse est morbum nosse -- qui ergo ignorat requisita ad functionem; quomodo cognoscat quid deficiat. Quam veritatem jam ipse observaverat Celsus in præfat. lib. 1. pag. 7. neque curari id, quod ægrum est, posse ab eo, qui, quid sit, ignoret.*

2. Priusquam ad specialia descendam, quæpiam generatim præmittenda occurrunt, & quidem primario determinanda morbi sedes; hæc semper est spina dorsi, ejus vero partes varix, locaque diversa testante Frederico Ruyschio in operibus suis anatom. med. Chirurgicis observat. 34. de spina bifida: *sepe in dorso aut lumbis, rarius in nucha, rarissime in inferiore & exteriori parte ossis sacri, simile quid occurrit.* Possunt itaque, ut clare ex celeberrimo isthoc authore patet, vertebræ omnes findi; quod autem illæ lumborum præ aliis frequentius separantur, in capite de causis spinæ bifidæ dicitur. Talis vero fissura in postica parte seu facie spinæ dorsi cum divisione apophysium spinosarum, & ad extus prominente tumore oedematoso, ac renitente contingit, non tamen ut quidam voluerit una cum corporis vertebræ longitudinali separatione, sed nonnunquam cum ossæ substantiæ corruptione, nonnunquam sine ullo partium vertebrae constituentium defectu observatur. Magna hinc morbi diversitas in variis subiectis deprehenditur, ut in quibusdam non tantum vertebrarum & vicinarum partium deformatio, sed & distantium ut capitis longe alia, quam par est constitutio spectanda obveniat. Quæ cuncta quantum ex eruditissimorum in arte viro-

rum, mea vero qualicumque experientia colligere quivi, singillatim recensere.

3. Vertebra ergo fissam intuenti primum se offerunt apophyses spinosæ, quæ per medium longitudinally sectione divisæ, & a se invicem remotæ sunt, ut sua distantia latitudinem ut plurimum corporis vertebrarum superent.

Singulæ apophyses ita separatæ videntur particulares apophyses formare in semi circulum reflexas, adnotasque apophysisibus transversis. Illæ porro apophyses spinosæ solutæ facieculis cartilagineis ut naturaliter vestitæ sunt, obductæ plerumque deprehenduntur.

Epiphyses vero, per quas apophyses terminantur, vel nullas, vel ad modum exiguas notare potui.

Circa apophyses laterales id solum animadverti, quod figura & magnitudine conservata una cum spinosis, quibus affixæ sunt, ad latus remotæ sunt.

4. Apophyses obliquæ seu articulares nec numero, nec magnitudine deficient, articulatio vero earum seu conjunctio, quousque morbus durat, multum a cohesione naturali recedit. Fit quidem per arthrodiam, mediante nempe applicatione, seu cohesione harum parvarum apophysium cujuslibet vertebrae, cum apophysisibus vicinæ vertebrae, quarum facies cartilagine incrustatæ sunt, albescente, polita, illisque perfecte proportionata. Verum cum apophysis spinosæ medietas ab alia avulsa, cum toto latere vertebrae retroflexa sit sine ulteriori divisione, non potuit fieri. quin ipse motus existerit in hac articulatione, solutione ergo apophysium articularium, & earum dislocatione. Exinde autem nullatenus concludere licet, vertebrae in corpore spina bifida occupato in tria frusta, ex quibus constant, corpore videlicet & duobus lateribus, absolute divitas reperiri. Dum enim apophyses spinosæ jam semel ad latera divisæ sunt etiam cum turbata serie apophysium articularium, cessat motus undique in solidis, & divisæ a solo attactu mediante supradicta cartilagine denuo uniuntur.

5. Incisure seu foramina lateralia vertebrarum fissarum pro transitu nervorum constructa vix mutata in sceletio inveniuntur, nisi quod una cum apophysisibus elevata de loco solito & naturali mota sint, atque nervos una secum trahant, iisque æqualem transitum denegent.

Corpus vero cujuslibet vertebrae fissæ prorsus convenit cum incolumnis vertebrae corpore; non enim in sua figura, aut magnitudine, aut subtilitate, a morbi causa injuriam pati videtur.

6. Verum cartilagine symphysis inter corpora vertebrarum locatæ multum a statu naturali recedunt. Hæ enim sana indole præditæ ad nectendum vertebrae necessariæ, & aptissimæ sunt, dum structura sua ab omnibus reliquis corporis humani cartilaginibus distinctissima vertebrarum

tebrarum corpora uniunt, se annectendo uno margine faciei unius vertebræ, & altero margine faciei vicinæ venebræ, atque altitudine, & latitudine distantiam vertebrarum, quibus annectuntur adæquando. Ait in hoc morbo contraria patent, quousque enim apophyses spinosæ vertebrarum separatæ sunt, non tantum hi circuli cartilagineosi aliam adipiscuntur structuram, sed etiam omnis inter nonnullas vertebrae cartilago abest, ut solæ tantum membranæ externe corpus vertebrarum cingentes appareant, cum horum corporum imminuta distantia, adeoque fere nuda applicatione, & facile separabili cohesione.

Cum jam in quibusdam locis hæc cartilago totaliter in sua generatione impediatur, non abs re præsens, quousque plaga durat, pervenire poterit ad rectam sui constitutionem. Hinc eandem examinando reperi non ex circulis ut refert Winslow exposuit, anatom. tom. 1. pag. 335. constructam, sed compressam valde, ac vix distinctam ab alia cartilagine. Quod autem corpora vertebrarum nunc denominata cartilagine orba a se invicem non declinent, ac dehiscant, impedimentum ponit copia parvorum ligamentorum robustissimorum, se invicem oblique decussantium, quæ uno extremo circa unius vertebræ marginem, & altero extremo circa vicinæ vertebræ marginem annectuntur, atque sibi invicem intricata tanta quantitate decurrunt, ut totam cartilaginum intervertebraliū circumferentiam tegant.

Quæ cuncta ligamenta, quanquam in infante recens nato exigua, præsentem etiam vertebrarum fissuram illæsa, & eo, quo solent fungi officio animadvertuntur.

7. Hactenus dicta de vertebis, contra earundem integritatem ad vitam necessariam inventa, morbum unice constituunt, spinam bifidam merito dicendum. Quibus jam, quantum attento animo lustrando solidas partes vertebrarum læsas colligere quivi, expositis; progrediendum erit ad molliora sive enim a morbi causa, sive a morbo dictarum vertebrarum constitutione, læsa, enumerando, tam contentarum a specu vertebrarum, quam vertebis fissis annexarum, aut proxime adjacentium partium præternaturalem constitutionem, & quarundam substantialem corruptionem.

8. Ut vero coeptum ordinem retineam, recensenda sunt proxima vertebis: præ omnibus itaque congruum erit meminisse semivaginæ ligamentosæ, quæ corporum vertebrarum convexitatem tegit, atque ibidem juxta longitudinem totius columnæ vertebralis annectitur. Hæc quidem per totum tractum vertebrarum fissuram in loco suo hærens primo intuitu integra conspicitur, penitus tamen consideranti tota exsucca, & cohesionis fibrarum fere experta, facile ergo separabilis, & vix robore respectu fibrarum prædita apparet, ut inquirens in morbi indolem manifesto structuram ejus distinguere valeat, compositam ut
probat

probat Winslow exposuit. anat. tom. 1. pag. 338. ex pluribus filamentis, atque fasciculis ligamentosis ex parte oblique, maxima vero ex parte longitudinaliter varie invicem intricatis.

9. Quid de tubo ligamentoso sentiendum sit præsentè fissuravertebrarum, incertum est. Hic, ut ex anatomicis constat, totam superficiem internam canalis ossei spinæ dorsi a magno foramine occipitali usque ad os sacrum investit, & infundibuli speciem longi & flexilis representat. Eandem jam dupliciter lædi posse existimo, vel enim per depressionem versus spinalem medullam, vel per dilatationem. Dubiæ hujus morbosæ constitutionis causam ponit ipsa elasticitas cuique tendinoso corpori propria ut dicit celeberr. Boerhaave in aphoris. de cogn. & curand. morbis de vulnere in genere §. 162. *nervi toti diffecti reprofiliunt, se recondunt*, & idem §. 164. & §. 165. de tendinibus & membranis affirmat. Secto namque tumore lumbari undatim effluit contentum liquidum cum tubi hujus contractione, adeoque imminuta amplitudine, ut quærens affectuum partium constitutionem vix affirmare queat, utrum materia morbi extra hunc tubum hæserit, vel ab illo reclusa fuerit. Cum quoque rerum curiosarum indagatoribus, authoribusque hujus affectus placuerit silentio, vel oblivione ex etiam singularem partium læsarum constitutionem exponendam præterire, neque mihi semper occasio fuerit tumorem, qui non prius expertus fuisset manuum Chirurgi, lustrandi; neq. eo tam autoritate Authorum, quam raro usu præditus concludere: tubum ligamentosum eodem semper modo deprehensum fuisse, sed potius rationi consonum vi letur affirmare, utrumque posse fieri, tubi nempe dilatationem a fero subitus remorante, & ejusdem a vertebra soluti spinalem medullam versus deprehensionem ex causa contraria modo posita. Posterius spectandum mihi nunquam occurrat, priori tamen modo summopere tensum tubum per magnam vertebrarum fissuram protuberantem observabam in infante paucis diebus post natiuitatem mortalitatem implente.

10. Ablato hoc tubo ligamentoso in conspectum prodit dura mater, quæ cum eodem modo, postquam totam superficiem internam cranii vestivit, ceu tubus ille, in specu vertebrarum descendendo, atque infundibuli speciem formando, decurrat, illicque ad marginem magni foraminis occipitalis agglutinata sit, similia pati videtur. Id præterea notare mihi licuit: duram matrem dissentim quidem prominuisse per fissuram vertebrarum, non tamen ipsi tubo immediate applicatam fuisse, sed intercessisse liquidum tenue serosum.

11. Nec aliud quid concipiendum est de laminis piæ matris, seu membrana arachnoidea, & pia matre. Pari enim modo, quotisque spina bifurcata, protenduntur, medullam spinalem deserunt, nec illi ex ulla parte adherent, sed circacircum, præprimis ubi fissura, in tumorem

tumorem attolluntur comparandum facile cum amplitudine prominentis duræ matris. Taliter constituta pia mater, & in alienam indolem ratione substantiæ degenerata commode perspicui potest: dum illa duabus constat laminis distinctissimis, vix visibilibus fibris sibi invicem hinc inde unitis.

Harum manifesta separatio a causa distendente absque dubio producta est; cum in aliis locis piæ matris id minime deprehendatur, semper enim hæ membranæ teste Winslow Exposit. anat. tom. 4. pag. 19. *mediante texto celluloso sibi invicem adherent*, ut exiguæ saltem portiones per tubulum adacto statu secedant, quod nitide exprimit Ruyfch. Tab. 10. in responsione vero ad epistolam y. Ait. Subtiliorem ipsa arachnoidea non reperiri in toto corpore. Unde eruitur membranas has tenerrimas a violentia causæ morbi frequenter lacerandas esse, hinc minus formare saccum superius expositum. Hoc patet in magnis vertebrarum fissuris, ubi communiter, aliis prius separatis, exiguæ portiones piæ matris superstites apparent, leviter frustillatim medullæ spinali incumbentes, meraque, sed tenerrima filamenta representantes.

12. Postquam ordine exposita sunt involucra medullæ spinalis, sequitur ut de ipsa medulla nobilissima partim læsarum agatur. Variam hujus corruptionem intelligendam volo, cum diversis in locis fissuræ spinæ dorsi contingant, corpusque medullæ spinalis in suo processu ratione structuræ variet. Hæc enim usque ad ultimas thoracis vertebrae fere conveniens cum medullæ oblongatæ substantia multo citius, periculosisque læditur, quam ubi caudam equinam format, & robustioribus fibris prædita violentiæ causæ firmius resistit. Utrumque luce clarius apparuit in infante num. 9. adducto, cujus sceleton ad finem thesium prostat, ex sola enim longitudine spinæ bifidæ consideranti patebit facile, quanta diversitas læsæ substantiæ medullæ spinalis deprehensa fuerit. Et revera illa sub vertebra dorsi adhuc hærens in liquamen ex toto dissoluta cernebatur, ut tenuissimæ admodum ac paucae solummodo fibrillæ superfuissent. Quo profundius versus os sacrum inquirebatur, eo tenaciores fibræ, absente tamen parte medullari ac corticali, existebant, atque ob earum copiam major portio medullæ spinalis superstes representabatur.

13. Nervi autem egredientes ex medulla spinali osseo tegmine privata in origine sua degenerant a naturali constitutione, dum ipsa filamenta, quæ naturaliter conglobata fasciculum, consequenter nervum componunt, soluta penitus existunt, & corrupta. In progressu vero non tam depravati quo ad substantiam quam inæquali exitu per incisuras vertebrarum laterales aliter, quam par est, dispositas vid. num. 5. tortuose procedentes, suis tamen involucris cincti, inveniuntur.

Disput. Medico-Pract. Tom. VII.

Sss

14. In

14. In specu porro vertebrarum remote a fissis vertebis an-
madvertuntur similia, quæ tam ex historia morbi a serosa colluvie orti,
probari, quam ex supradictis intelligi possunt.

Totus namque medullæ spinalis processus, cuncta ejus involucria
humore scatent aquoso, & inter cellulas effuso, & a vasculis lymphati-
cis contento, ut eorum plenitudo ad crepaturam usque, aliarum vero
partium nimia flacciditas reperiatur.

15. Pertractatis demum partibus internis morbum constituentibus,
ordo jubet progredi ad extus apparentia tanquam morbi pro-
ducta. Externe ergo longitudinem fissarum vertebrarum emetitur, si
non excedat, tumor persæpe pallidus, mollis, cum proportionata lati-
tudine, existens sine signis inflammationis, digito pressus cedit quidem,
at prementis vestigia non retinet, quo excepto totus convenit cum
oedemate. Amplitudine differt pro ratione morbi vel durationis, ut
nonnunquam nucem juglandem æquet, nonnunquam magnitudinem duo-
rum pugnorum superet. Tumoris effigiem proponit Ruyschius in ope-
ribus suis fig. 36. qui pariter cujusdam in gangrænam versi meminit ibi-
dem observat. 37. dicens. *vidi in filiola cujusdam procuratoris amstelæda-
mensis (spinam nempe bifidam) in qua tumor lumbaris pugni magnitu-
dinem æquans, rugisque refertus brevi gangrænam conceperat.* Hoc mihi
videndum nunquam occurrit, semper enim tales prius expirasse novi,
quam humores aciores redditi gangræna partes tumidas contumplissent.

16. Quanquam mei instituti non sit disserere de partibus remotio-
ribus non immediate vertebis dorso adherentibus, nihilominus tamen
cum crebro hic morbus caput affectum sequatur, vel illo præsentente caput
vim patiat, minime perfectam spinæ bifidæ descriptionem existima-
rem, si negligerem illa, quæ in capite digna notatu se exhibuerunt.

Idcirco breviter recensendo ejus morbosam constitutionem, devenio
primario ad auctam illius magnitudinem, quam aliquando naturalem ex-
cedentem, cum tumore integumentorum capitis externorum, ossium
cranii vero majori quam par est mollitie, spectabam. In eodem ca-
davere cerebri substantia videbatur nullatenus, ut num. 12. de medulla
spinali dictum est, dissoluta. Verum gyri, alias in sano cerebro ap-
parentes, hic disparuerunt. Ventriculi cerebri sero limpidi pleni con-
spiciebantur una cum eorum cavitate aucta. In plexu tandem choroideo
vasa tumebant admodum ac si is undique hydatidibus refertus fuisset.
Cuncta denique phænomena hydrocephali præsentiam significarunt.

CAPUT II.

De causis spinæ bifidæ & reliquis morbi divisionibus.

§. XVII.

Quam evidentia sunt illa in præcedenti capite exposita, quæ a natura morbi in corpore expressa, oculis subjecta, diligenti animo conscribi poterant; tam arduum est de morbi causa hærente in abdito loco, & in ipso fœtu jam originem ducente, agere. Non enim copiam habui spinam bifidam videndi in adultis, nec eandem ortam fuisse in jam natis mihi constat. Quapropter, ut hæc Thesis veritari consona videatur, oportebit primo probare: quanta fœtus proclivitas sit ad hunc morbum, & quam e contra difficulter is possit produci in jam natis.

18. Morbos secundum ætatem nobis Hippocrates sect. 3. aphor. 24. &c. indicat, non alia vero ratione illos partitus est in morbos ætatis, præterquam ut exhiberet simul variam corporis constitutionem, adeoque respectu ætatis certam dispositionem ad certum morbum, neminem ignur latebit, qui perscrutatus fuerit fœtus corpusculum tenerimum, ejusque constitutionem, quare illius fluida tam facile a sana indole degenerare, solidæ partes vero ab exigua fere causa solvi, flecti, aut penitus destrui possint. In embryone enim nihil, nisi quod vascula refert, spectandum restat, de quo dubitare non sinit accuratissimæ Malpighii, quas incubato in ovo sagax instituit, observationes; imo vero totam embryonis massam in primo ortu esse tenerrimam, flexilem valde. Solida ejus a liquidis, unde originem sumpserunt, sola quiete, coactione, & figura tantum differre, nihil proin esse, quod resisteret fortiter, nihil quod flecti non posset, accurato evicit Leeuwenhoekius experimento. Quod pariter magnus Boerhaave agens de nutritione §. 441. confirmat ubi dicit: *Et profecto omnis illa massa, solida nempe corporis, concretis ex iis, quæ antea erant subtilissimum liquidum.*

19. Hinc eruitur embrionis deformationem, destructionemque a levissima quapiam causa posse fieri, sui vero interitum effugere eo securius, quo magis increvit, & corpus robustius evasit. Id patet ex Hippocrat. lib. de natura pueri ubi ait: *posteaquam in membra distinctus puer fuerit, tum eorum forma increfcit, tum etiam ossa duriora evadunt.* Dum enim fœtus incipit sanguine materno per funem umbilicalem nutriri, jam habetur notabilis solidarum partium durities, sic: ut

quæ paulo ante continebantur sub forma gelatinæ nunc jam ossæam indolem recipiant. Quæ cuncta semper duriora evadunt , quo fœtus proximior fit partui.

Verum enim vero quousque infans in utero hæret , nunquam ejus ossa tam solida ac rigida fiunt , ut facile flecti non possint ; imo adhuc recens nati ossa non tantum flexibilia , sed etiam ossium articulatorum extremitates cartilagineæ , & eorum quædam , uti ossa carpi mollissima deprehenduntur. De quibus vid. Clopton Havers in sua Osteologia pag. 185.

20. Omnia ista spinæ dorsii attribuantur , cujus vertebræ æque ceu omnia ossa in primordio tenerrimæ substantiæ sunt , ut sua mollitiæ nervis , atque vasibus transitum denegare non possint ; verum potius undequaque medullæ spinali se accommodant , parantque illi aptum domicilium ; cedunt ergo cuicunque corpori prementis consequenter materiæ morbi tanquam causæ separando agentis resistere nequeunt.

21. Ex his jam omnimoda fœtus dispositio ad spinam nostram bifidam liquet , magis tamen adhuc ea detegitur ex contemplatione singularis separationis quorundam ossium in fœtu , ut ossis frontis , sic maxillæ inferioris , quæ successu temporis in unum os coalent , ita quoque vertebrarum ; singulas enim tribus ex partibus constructas esse , corpore nempe , & duobus lateribus , docet osteologia. Separationem interim nolo intelligendam esse absolutam , sed quæ intercedente cartilagine vel membrana quospiam fit ; Quæ vero quam levi opera in fœtu solvi possint , non latet anatomiz perarum.

22. Nihil proin obstat , quin quis dubius hæreat ex intuitu antedictorum , quare morbi solidorum , ut plurimum vero spina bifida crebrius non producat in infantibus utero adhuc quiescentibus ? Ast rem in conjectura positam solvit , qui naturam sapientissimam geometram omnia numero , pondere , mole , figura disponentem , unice intentam operibus machinæ humanæ apte construendæ , penitus perpendit ; atque omnia pervenire , sepositis injuriis , ad illum statum , quo humana natura indiget ad functiones quasunque respectu corporis peragendas , jure merito consentit. Licet hinc in fœtu summa omnium partium laxitas adsit , nullatenus tamen , impediende sula natura , is morbum contrahit , nisi accedat causa materialis potens agere in fœtum primario naturam impediendo in opere suo , solvendo dein jamjam unita.

23. Causa igitur in fœtu spinam dorsii findens , non valeret eundem effectum producere in jam natis , quibus majus robur adest corporis ad resistendum cunctis noxiis , quorum inquam constructio , atque solidarum partium firmiter cohesio , non , ut in fœtu , tam facile cedit. Quod patet ex celeberr. Boerhaave institut. med. §. 465.

clarum

clarum est, vasa illa quo teneriora, recentiora, propiora causæ moventi, eo facilius elongari, distendi, destrui, refici posse. Adeoque corpora quo remotiora ab origine sua, eo magis repugnant causæ destruenti.

24. Quapropter illorum sententiæ favere non valeo, qui spinam bifidam in ætate consistente positam ortam fuisse perhibent. Ossa enim tunc jam pervenire ad illum perfectionis gradum, quo cunctis aliis in corpore existentibus resistunt, contentis alylum, externe applicatis punctum fixum præbent, totumque corpus firmum servant, solida sunt, & dicente Clopton Havers osteolog. nov. pag. 36. *Partes, ex quibus consistant, unitæ existentes in eo conspirant, ut omni pressioni, & omni conatu eas turbare, & unionem solvere conanti resistant.* Soliditatem porro exprimit dicendo ibidem: *adeo, ut nec ab intra a particulis subtilibus, & volatilibus possint agitari, nec etiam ab extra, nisi ab infigni causa, & extraordinaria plane violentia dimoveri & confindi.* Quanta jam soliditas adulti hominis vertebri tribuenda sit, patet ex pondere illis incumbente, dum unitæ plus quam medium vasti corporis ad omnem partem moti sustinent. Hinc Winslow exposit. anat. tom. 1. §. 518. dicit: *Spina dorsii est fulcrum generale omnium reliquorum ossium, & gubernaculum universale situm, ad eorum motus differentes necessarium.*

Præter solidam earum substantiam firmissima simul partium vertebra constituentium cohesio hic consideranda venit, quæ laxa & solubilis in foetu, in adultis commissuræ obliteratæ, & in unum os abeuntes, spectantur. Quæ dicunt in adultis nullam dispositionem esse ad spinam bifidam, & solam ossium soliditatem causæ illius morbi qualicumque sat repugnare.

25. Præmissis jam illis, quæ spinæ bifidæ corpus obnoxium determinant, sequitur: ut de ipsa causa morbum hunc immediate producente agatur; Hæc est: serosa colluvies in specu vertebrarum exorta, seu serum extra vasa fufum, & cavitatibus receptum; quo fit: ut cavitas, quam occupat, distentis fibris circumpositis, vel ex toto ruptis, dilatetur cum apophysium spinosarum solutione.

26. Cum jam hanc causam proximam morbi aliz præcedant, atque istam componant, ut pulchre notavit Celsus in præfat. lib. 1. pag. 16. *nihil omnino sit ob unam causam, sed id pro causa apprehenditur, quod contulisse plurimum videtur, oportebit ulteriora prosequi expendendo rationes seri, aliorumque corporum respective ad vasa continentia, quorum necessariæ proportionibus destructæ varios proferunt morbos, sive enim ex vitio seri, sive inepta vasorum structura id fiat, hinc dicit Plato in timæo: quod autem oberrat sive accedendo, sive decedendo mutationes varias, morbos, corruptiones infinitas inducit.* Quæ vero speciatim huc referuntur, est impræmixtis sanguis ob seri copiam dilutus,

dilutus, ad circulandum iners, in vasis torpet, eadem distendit, frangit, liquidum inde manans cavitatem sua vi producit solida laxando, atque extendendo.

Huc dein perinet serum tenue undique transudans, oscula vasorum pertransiens, collectum in cavitare vertebrarum.

Simila licet diverso modo efficiunt humores spissi, tenaces, quorum meminit Illustriss. L. B. van Swieten in Comment. tom. 1. §. 115. ubi ergo a quacunque causa molecularum fluida nostra constituentium figura spherica mutatur, tunc possibilitas aequabilis transmissionis per vasa tollitur, non obstat, quin inde nascatur obstructio vasorum a motu reliqui humoris moti in locum obstructum, solutio atque liquidi in cavo immoti congestio.

27. Sicut jam sanitas consistit in partium solidarum debita configuratione & appositione, fluidorum vero iusta temperie quoad molecularum numerum, figuram, situm atque motum; ita morbus non solum ex depravata indole fluidorum, sed etiam vitio solidarum componitur. Non enim, vix quidem exceptis externe corpori illatis, unum horum laeditur altero manente sano: Quare solidorum ratio hic quoque habenda est, quorum a naturali statu recessus illa, quae de fluidis di a, efficit. Vitia autem vasorum quatenus concurrunt ad proximam causam nostri morbi reducta ad quampiam classes, existunt 1^{mo}: in eorum laxitate nimia, 2^{do}. in obstructione vasorum rebotientium, reducentiumque, 3^{tio}. in nimia osculorum exhalantium vasorum dilatatione.

28. Horum praesentia docet liquidum vasis improporionatum posse in iisdem harrere, accumulari, vasa tandem distendere, atque tumorem efficere; idem liquidum posse congregari extra vasa positum, iners reddi ad circulandum, oscula vasorum sua tenacitate obstruere, vel saltem eorundem vim elasticam destruere. Liquidum vero debere mutari a morbosa vasorum constitutione quocumque modo destructa patet ex Comment. Illustriss. L. B. van Swieten tom. 1. §. 116. Si causa illa, quae aequabili pressione figuram illam sphericam fluidorum fecerant, & factam conservant, cessant agere, elastica molecula resilient, & ab hac figura recedunt. Adeoque imminuta vasorum elasticitate sanguis a debita soliditate recedens, aquosus, tenuis fit, vel & iners, lentusque, glutinosa tenacitate immeabilis. Quae si corpus universum foetus occupant, universales producant morbos, quorum meminisse videtur Hippocrates in libro de octimestri partu, ubi haec habet: *quare multi jam, quervi morbi initium intum, in utero nempe, obtinentes, in lucem prodire ex quo alii quidem perierunt, alii vero morbum trahentes superfuerunt. Et paulo post: quod cum iis non ex incremento, sed ex corporis laxumore contingat, ex his sane multi perierunt.* Si vero causae illae in specu

Specu vertebrarum concurrant, non licet dubitare morbum particularem, sic spinam bifidam cum tumore lumb.ri, debere fieri.

Quod si vero dictæ causæ convenient in capite sub cranio, hydrocephalus oritur frequenter cum spina bifida, hic tanquam causa morbi considerandus. Si namque ventriculi cerebri latice abundante, vel morbofo scatent, via huic liquido patet in specum vertebrarum, quod descendendo inter vertebrarum processus in foetu facile dehiscen-tes, accedente obstaculo colligitur, ut constat ex comment. Illustriss. L. B. van. Swieten tom. 1. §. 273. pag. 447. *dum effusi in ventriculū cerebri humores ad quartum ventriculum perveniunt, qui initium est rimæ decurrentis per totam longitudinem spinalis medullæ, poterunt hac via delabi, & varias paralyses &c. producere*: idque ex compressione nervorum. Quanquam vero naturaliter omne commercium liquidi existentis in anterioribus ventriculis cerebri cum eo quod renouatur in quarto ventriculo inhibeat, potest tamen illud abundans in statu præternaturali ex ventriculis anterioribus in cavum vertebrarum pervenire; inde enim fertur per aquæ ductum Silvii in tertium ventriculum, & inde impedito exitu per infundibulum pertranscundo valvulam majorem cerebri, occupat ventriculum quartum, ex quo descendens in specum vertebrarum causam nostri morbi unice sustinet. Neque in talibus viam quærere necesse est, cum operante vel natura ad excernendum id quod corpori nocivum est, vel urgente causa morbi, sæpe varie partes solidæ mutantur; id diversæ probant observationes, quarum unam adducit peritissimus Chirurgus Belloste in suo tractatu chirurgico cap. 15. pag. 367. ubi dicit se novisse ægrum cum abscessu insigni cubitum occupante, cujus faciendam a Chirurgis aperturam repentina præcessit diarrhoea purulenta, ad quam penitus evanuit tumor cum subsequo symptomatum levamine; paucis diebus tumor denuo increvit, atque nova tali evacuatione puris per alvum absque ulla incisione cubitus sanitati restitutus fuit. Quanta jam vasorum resorbentium dilatatione hic opus fuerit, quantaque naturæ conamina hic requirebantur, patet ex qualitate puris densa atque ejus motu scientiam anatomicam, physiologicamque circulationis humorum explicationem vix non superante. Hinc celeberrimus Sydenhamus pag. 39. dicit, *morbum quantumlibet ejus causæ humano corpori adversentur, nihil esse aliud quam naturæ conamen materię morbificæ exterminationem in ægri salutem omni ope molientis*. Solo itaque naturæ conamine fieri potest, ut materia morbi ex capite in thecam vertebrarum saltem ideo deferatur, ut relicta nobiliori parte corporis vita diutius protrahatur.

30. Cum autem foetus ex natura sua omne quod in interitum
fui

fui corporis tendit, tentet avertere, ut Hippoc. 6. epidem. dicit. *Natura omnia omnibus sufficit*; probabile videtur, causas morbi hæc-
tenus dictas non generari in foetu immediate ex nativa corpusculi con-
structione, sed potius morbosam tam fluidorum quam solidorum indole-
m in corpore tenero existentem, cum ab externe applicatis, tum a
matre receptis, primordia ducere, de quibus pauca disserere ordo rei
jubet.

31. Foetum constare ex iis, quæ antea extiterant in matre, docet
illius incrementum, æque circulus humorum ex matre in foetum per
vasa umbilicalia; id confirmat Fredericus Hofman. med. rat. systemat.
Tom. 1. pag. 248. dicens: *succum nutritum matris factum in utero nu-
trit; qualis itaque indolis u est, talis quoque est nutritio fetus in utero.*
Vir celeberrimus hoc textu significat: matrem sanam ex assumptis elab-
orare humorem aptum pro nutriendo foetu, non excludens illum
humorem adhuc indigere vi & efficacia viscerum ac vasorum proprio-
rum fœtus, cujus veritatem exprimit Boerhaave institut. med. de nutrit.
& increment. §. 442. *sed & tum adhuc datum embryonem ille liquor
crassissimus est, & in longo subtiliores tranmutandus, in ejus vasis, vis-
ceribusque.* Laudabilis tamen, purissimus & uberrime subactus est san-
guis a matre fœtui datus, quia adhuc efficacissimo ad chylum subi-
gendum adminiculo desinituit, non tamen sufficiens ex integro ad
absolvendum nutritionis negotium, nisi visceribus propriis adaptetur adeo
efficaciter, ut spirituum subtilitatem fere imitetur. Hinc licet naturam
fœtus nutritione augmentativa tota occupata esse videatur, nihilominus
tamen mater graviditatis tempore morbo affecta minus præstare valet,
ut fœtus omnibus requisitis gaudeat, nihilque mutaretur a sanitatis
maternæ declinatione. Pro exemplo sit Hippocrat. aph. 60. sect. 5. *si
mulieri utero gerenti purgationes erant, factum ut bene valeat, fieri non po-
test.* Si itaque sanguis in matre morbo oppressa a sana indole dege-
neret, fieri non potest, quin ipse fœtus exinde vim patiatur, in acti-
onibus propriorum viscerum deficiat, tenerissimi corporis tam solida,
quam fluida mutantur, atque disponantur ad multos morbos graviori
fœtus detrimento.

32. Matris jam morbos loco causarum procatasticarum foetui
infectos hic adducere exigua filia non sustinerent; unicum in specie
adnotare sufficiet: quid matris imaginatio ad nostrum affectum, spinam
nempe bifidam, contribuat, num id efficere valeat, quod Tulpius in
suis observat. med. lib. 3. cap. 30. profert, dicens: *ob rapam præ-
gnanti matri inprovidè delegatam factum lumbi rapiformem tumorem enatum
fuisse.* Aut ut Bonetus in sepulchret. anat. præct. pag. 390. adducit
infantem cum tumore lumbi & fissura spinæ dorsi natum fuisse ex
matre, cui prægnanti maritus joci causa ex improviso sacculum herbarum
plenum

plenum in occiput jecit, inde perterrita mox fricuit locum a sacculo affectum, putans murem ex alto in occiput ejus delapsum fuisse, hinc tumoris muriformis origo. Spinæ dorsii vero fissura censabatur provenisse ex intuitu vertebrarum cervi in longum fissuram.

33. Mirabilis quidem inter matrem & foetum intercedere videtur conspiratio minus perfecte secundum machinæ leges declaranda, qua fieri dicitur: quod mater subitanea idea terroris percussa foeturam mox mirabili signo offendat, maculam illi imprimat, quam nævum appellant, mox omnium artuum figuram immutet, eosque corrumpat, sique longe alia stupenda producat, ut talium fixum animæ si viverent, ab humanitate abluentium, propter organorum ad animalium actionum exercitia destinatorum ineptitudinem, erudiri, & conceptus homine dignos de sensibilibus sibi fingere non possent, quales colligit Joan. Georg. Schenkius in historia Monstrorum. Et sane accurate attendenti adparebit spissas hic dari tenebras nec facile intricatum hoc negotium experiri posse. Suo interim quemvis sino abundare genio; statuo tamen hæc & similia minime fieri in imaginatione, impressione, vel phantasia.

34. Sunt matres non paucae, quæ ob visam miseri hominis deformem faciem se parituras esse monstrum toto graviditatis tempore verentur, ex qua tamen concepta idea & firmissima impressione foetus nullatenus movetur, neque mater aliquid eorum experitur, quæ profunda meditatione timuerat. Porro dum ob pessimos succos a matre foetui traditos superioris maxillæ compages solvitur, nec tandem unitur, nascitur labium leporinum, oportetne tunc leporem a matre visum fuisse? Non alia ratione spinam bifidam ex phantasia matris productam fuisse superstitiose concluderem, ratio est: quia morbi hujus causas detegere occasio superest, ut ex superius dictis abunde constat.

35. Licet autem nonnullorum morborum in foetu existentium, & sic dictorum monstrorum rationem exactam quandoque reddere non valeamus; non tamen expedit descendere ad ea, quæ seposita structuræ corporis humani cognitione physiologica, neglecta a pari argumentatione ad solam credulitatem ducunt. Neque hæc ignorantia locum haberet, si possibile foret inquirere in morbi originem, & progressum; quod vetat morbi raritas, corporis exilitas, atque clausus aditus.

36. Quanta vero sanguinis mutatio affectum animi sequatur, non me latet; sic namque mœstitia pressus præter alia symptomata notante Galeno de pulsibus ad Tyrones cap. 12. pulsus habet parvum, languidum, tardum, & rarum. Quid hypochondriacis sola mentis turbatio contribuat, exponit Boerhaave in aph. de cogn. & curand. morbis §. 1090. ubi atram bilem a sola mente fieri probat; iia gravida terrore percussa, languet, cuncta ejus membra tremunt cum insolita

Disput. Medico-Pract. Tom. VII.

T t t

ac

ac moleſta corporis laſſitudine; humores ejus turbantur, a ſana indole degenerant, non cedentes in commodum tenerrimi fœtus, ruſſime tamen exprimendo ſpeciem objecti in mente concepti. Id enim ſi foret poſſibile, fieri deberet per ſpiritus, quia ſola mens matris in cogitatione tunc mutatur; cum autem nervi matris nullo hæcenus deſectio modo ad fœtum perveniant, multo minus efficacia ſpirituum in fœtu aliquid immediate pervertere poterit. Hac opinione ductus cenſeo ſpinam noſtram bifidam fieri a cauſis ſupra expoſitis, imaginationem vero matris ad eam producendam nihil conferre, niſi quatenus ſuo ſanguine a ſana indole recedente afficit fœtum vid. num. 30. deſtruat ergo illius fluida & ſolida, ut illa, quæ num. 28. dicta ſunt, ſequi poſſint.

37. Quæ præterea fœtui occasionaliter accidunt ad apophyſes ſpinofas ſolventas, continentur primo ſub inæquali fœtus diſpoſitione, vel nimia ab utero compreſſione. Dicit enim Hippocrat. in lib. de genitura: *quin & alio modo mutilantur pueri, ubi uteri loca, in quo mutilati fuerint, anguſta fuerit.* Nam duo membra molliſſima fœtus premuntur, hæc nunquam poſſunt pervenire ad debitam ſoliditatem; ſic dum puerorum corpora præmature loricis conſtringuntur, accedit inæqualis partium ſolidarum nutritio, ut quædam earum exhaustæ contabefcant, quædam in gibbum attollantur; quod pariter fieri videtur: ſi uterus inæqualiter vel ob ſitum fœtus ineptum, vel ob proprium vitium fortiter ſpinæ dorſi incumbat; tunc enim in loco nimium preſſo prohibetur æqualis circulus humorum per vaſa, venæ, præprimis vaſa lymphatica cauſæ prementis ſicut arteriæ reſiſtere, & in contenta agere nequeunt, ſed liquidum per arterias allatum urget in vaſa compreſſa atque obſtructa, eadem rumpit cum effectu num. 25. & 26. diſto.

38. Huc dein refertur corpus durum, quodcunque violenter abdomini matris verſus ſpinam dorſi fœtus adactum, ſive dum matris abdomen percutitur duro obtuſoque inſtrumento, ſive dum impingit in corpus ſolidum, vel eundo, vel per lapſum. Laxa enim compages oſſium his cito ſolvitur, aut ex ſolo impetu violento vaſa franguntur.

39. Quid ſpina bifida ſit, quæ ejus cauſæ, quiſque effectus, expoſui. Ac proinde ſupervacaneum fore exiſtimo ulteriores morbi diſviſiones longis deducere, cum plurima huꝝ pertinentia ex antedictis commodè deſumi poſſint. Varietas enim hujus morbi intelligitur ex vario loco ſpinæ dorſi, quem occupat, ut dictum eſt num. 2. ex varietate dein materiæ morbi. Poſſeſt namque liquidum acrimoniz expers longo tempore extra vaſa poſitum tenerrimis partibus corporis incumbere abſque earum corruptione, quod ex illis morbo Chronico deſunctis patet, quorum cerebri cavitates omnino liquidi aquoſi plenæ reperiuntur ſine ulla tamen ſubſtantiæ cerebri corruptione, aut inde enato morbo mortem

mortem inferente. A tali itaque materia tumor in lumbis erit oedemati similis, si vero in hoc morbo effusum, & in vasis stagnans liquidum acre evadat, cuncta in tabum putridum convertit, & apparet tumor flaccidus, rugosus cum gangræna brevi secutura vid. num. 15.

40. Spinam bifidam præterea differre ab omni alio morbo, eruitur ex cognita constitutione morbi, dum videlicet tumor adest mollis, profundus sine signis subjacentium spinosarum apophysium cum paralyfi crurum, aut aliarum partium, quarum nervi a materia morbi destructi sunt; eam vero debere adesse patet ex Comment. Illustriss. L. B. van Swieten. tom. 3. §. 1063. *Idem contingit, motus nempe muscularis deletus, si nervi ex medulla oblongata, vel spinali egressi quoddam impedimentum nascatur in toto decursu ad musculos usque, quibus hi nervi prospectunt.* Nervos autem, quousque apophyses spinosæ divitæ sunt, non tantum obstructus, sed corruptos in origine sua esse, probatum fuit num. 13. Ex his quoque desumitur diagnosi.

41. In prognosi præter exitialem, & brevi funestum morbi eventum, aliud nihil statui potest. Quemadmodum enim medullæ oblongatæ læsio lethalis habetur, quia tollitur mutuum commercium inter mentem & corpus, ita interior corporis sequitur ex simili causa nullam spinalem læsam. Hippocrat. dicit. lib. 1. de morbis: *moritur etiam si quis vulneratum habet cerebrum aut spinalem medullam.* In hoc autem textu vulnera cerebri intelligenda sunt prout Boerhaave in aph. de cogn. & curand. morbis §. 170. exponit: *profunda adeo, ut medullam oblongatam lædant multum.* Simplex enim læsio cerebri frequenter curatur, imo ægros evasisse, quibus notabilis pars de substantia cerebri ablata fuit quocunque instrumento, docent copiosæ observationes. Idem intelligendum esse de medulla spinali probat Illustriss. L. B. van Swieten in Comment. tom. 1. §. 1061. *Si vertebra lumborum parum tantum ex situ mota fuerit, spes cura superest, verum si multum recesserit ex loco suo versus interiora corporis, medulla spinalis sæpe integre destructa est, & nullum habetur remedium.*

42. Cum itaque in spina bifurcata integre destruat medulla spinalis solis fibris nervosis manentibus, constat vitam totius corporis debere perire: ratio est: quia nervi ex medulla spinali egressi officio suo destituuntur, ut perinde cerebri, cerebellique actio in subiectas capiti partes evanescat, istarum vero functiones pereant. Hinc recte sensit Ruyschius in suis operibus anatom. med. chirurg. observat. 34. pag. 34. *nemo enim inter eos, quos hæcæm tractavi infantes, cum spina bifida evasisse, nec unquam ab aliis percepti curatum.* Licet autem læsio medullæ spinalis cum læsa medulla oblongata conveniat quoad inevitabilem corporis interitum, differunt tamen quoad tempus durationis. Corpus enim diutius ferre potest læsionem medullæ spinalis, quia partes

T t t 2.

quibus

quibus nervi spinales prospiciunt, sustententur aliquandiu a nervis paris oſtavi vagi dicti, quam laſa medulla oblongata, unde omnium nervorum actio ſubito ceſſat.

43. Ex his ſequitur ſanitatē in hoc caſu non poſſe promitti a medico, quare illi ſufficiat vera prædicere. Quod pulchre exprimit Hippocrat. in lib. prænotion. *Neque enim fieri poteſt, ut omnes ægræ ſanitatē aſſequantur; hoc nempe longe præſtantius foret, quam futurorum conſecutionem prænoſcere.* Expedit igitur ex diverſitate morbi diverſas formare prognofes ſaltem quoad durationem morbi. Hæc habentur ex diverſa conſtitutione medullæ ſpinalis, quam mutat decurrendo in theca vertebrarum, atque ex variis ſignis tumoris num. 39. expoſiti. Si namque medullæ ſpinalis cum vertebrarum colli, vel dorſi fiſſura lædatur, longe deteriora ſymptomata metuenda ſunt, multoque citius vitæ terminus finiētur, quam ſi morbus in ultimis lumborum vertebris contingat, ratio hujus habetur ex Comment. Illuſtriſſ. L. B. van Swieten tom. 3. §. 1062. *Quo paralyſis altiori in loco corporis hæret, eo periculoſior eſt, quoniam cauſa mali encephalo tunc propinquior eſt.* Et ex ſola hac ratione inſans cum fiſſa infima parte oſſis ſacri videtur aliis diutius vitam traxiſſe deſcriptus in operibus Ruyſchii obſervat. 35. pag. 35. ubi celeberrimus ille Author dicit: *Inter omnes dicto affectu correptos nullum vidi infantem tam diu ſuperſiſtem, quam hunc, vivit enim in hunc uſque diem, nunquam jam fere agens.*

44. In curatione hujus morbi breviffimis me expedire cogor, cum nihil aſſequi poſſim, quod indicationi reſponderet. Non enim diſcutientibus, non exſiccantibus, non aliis quæſcunque remediis reſolves tumorem lumbarem, non conjungabis aniplius apophyſes diductas cum reſtitutione ſubſtantię medullæ ſpinalis per materiam morbi perditæ, neque ſcindendo, aut causticis urendo derivabis liquidum ex theca vertebrarum remanente ægri vita. Dicit quidem Celfus lib. 2. cap. 10. pag. 79. *ſatius eſt anceps remedium experiri quam nullum.* Verum licet dexteritas Chirurgi bona quæque etiam in hoc caſu promittat, hæc tamen illico a contra indicante ſupprimuntur, ut ſolummodo reſſet ea concludere de ſpina biſſida, quæ alleruit Boerhaave vir immortalis memorię in aphoris. de cogn. & curand. morbis de Hydrocephalo a ſero cavitates cerebri internas occupante exorto. ubi dicit §. 1218. *facile cognoscitur hæc ſpecies incurabilis.*

Unicum hic adhuc notare fas eſto, ne, ſi quis ægro prodeſſe non poſſit, noceat, & mortem ex hoc morbo certo venturam acceleret; Unum ex utriſque facienti Hippocrat. determinat præmium in lib. 2. prædiction: *Qui prædictionis ſucceſſum conſecutus fuerit, apud prudentem ægrum admirationi erit; qui vero decerraverit, præterquam quod odio gravabitur, ſi ne inſania quidem ſuſpicionem eſſugere poterit.*

T A.

TABULÆ EXPLICATIO.

AA. Longitudinem apophysium spinosarum a sexta vertebra dorſi
usque ad os Coccygis indigitat.

BB. Apophyses spinosas reflexas.

Notatur præterea in hoc sceleto solida concretio septimæ costæ veræ
cum quatuor spuris, ut patet sub CC.



C C L I V.

WILH. HULD. WALDSCHMIED,

E T

CHRIST. STEPH. SCHEFFEL,

De morbo epidemico convulsivo per Holsatiam grassante oppido raro.

K I L I N . 1717.

Q. B. F.

Maximam esse inter Theologiam & Medicinam convenientiam, non usque adeo mirandum esse arbitror, præsertim cum homines sive animam, sive corpora eorum spectes, præstantissimos ex utraque percipiant fructus. Theologus enim salutem animarum invigilat, & viam ad vitam æternam præmonstrat; Medicus sanando corpori curam impendit, unde *Owenus*, Poeta venustissimus:

*Theologus animam subieci lapsus Adami,
Et corpus Medicus, & bona iudicium.*

Nemo igitur vitio nobis vertere poterit, si in publica & sæculari solemnitate, celebrandaque B. LUTHERI, factæque ab eo reformationis memoria, thema medicum ventilandum proponamus, atque de morbo populariter in hisce regionibus grassante, & rarissime obvio, agamus, cujus latissime nunc divagantis vestigia in observationibus medicorum, circa initia sæculi superioris viventium nobis relicta esse, ex sequentibus patebit. Ea quippe morborum epidemiorum est indoles, ut, vel ex temporum tempestatumque mutationibus, & communi cibi potusve vitio suborti latius serpent, & quasi contagio plures, uno eodemque tempore invadant, diversissimæque stipati symptomatibus primum emergant, aut oblivione jam jam deliti, nepotibus denuo sub

piisino

pristino schemate molesti, & sæpe fatales existant. Quod ipsum de morbo præsentē etiam possumus dicere, cujus prima signa circa finem mensis Augusti, currentis anni, & si calculum accurate ponb, diem ejus vicesimum sextum, apud incolās pagi Wester-Ronfeld, haud procul Rendsburgo apparuerunt, latius deinde per vicina prædia, & sylvam Danicam, in ipsum Ducatum Slesvicensem divagante malo.

Morbus ex inopinato oritur, & maxime sanos, robustos, vegetos, citra ulla signa antecedentia, inter ipsos labores, domi, ruri, jejunos, pastos, quacunque hora, ut plurimum vigilantes, cujuscunque ætatis & sexus adoritur: ira tamen, ut pueri & puellæ paucæ, paucissimi senes, & vix una ex matribus familias hæcenus quidem eo laborarint. Agrotantes statim sub morbi initia sentiunt nausæam, cum capitis quadam gravitate, & molesta tractione, aut fornicationis sensu per totum corpus, præcipue autem in artubus, quorum extrema modo citius, modo ardius spasmo summe dolorifero contrahuntur: convelluntur aliquibus digiti, & non, nisi magno conatu, & cum dolore ab adstantibus extendi, & e manibus dimoveri possunt. Alii simul contrahuntur manus ad cubitum, hicque ad ipsum humerum; alii similes convulsiones simul patiuntur in pedibus, cum artuum contractorum dolore & tumore plus minus constante. Malum eam per vices sua ludit dramata, ut dispari gravitate, ita incertis ac irregularibus intervallis; nonnunquam bis, ter, imo sæpius dietim redit, atque unam, duas, tresve horas durat, donec cessantibus cum spasmo doloribus, ægri paulatim ad se redeunt, cibum petant, & avidius solito ingerant, maximaque eorum pars obambulare & negotia domestica satis promte expedire possit, quamvis interea dolores tensivos, per artus divagantes, sed tolerabiles sentiant, donec, revertente paroxysmo vehementiore, spasmos & dolores summos iterum patiantur.

In ipso hoc paroxysmo & mente constant, & apposite ad interrogata respondent; plurimi extra lectum degunt, obambulant, magnitudine dolorum ejulantes, propter contractionem artuum dolorificam: alii ad focum sedent, aut humi jacent, prono capite, genibus & cubitis innixi, contractis cum cubito manibus ad usque humerum; plorant, vociferantur, auxilium implorant: lecto incumbentes alii, similia patiuntur, & ut membra spasmodice contracta extendantur, enixe petunt; inde enim dolorum levamen, quamvis ad extensionem talem viri robusti unus vel alter vix sæpe sufficiant. Sub hac extensione dolores primum augentur, postmodum remittunt, & artus facile servantur extensi, remota vero manu extendentis, successive iterum convelluntur.

Symptomata & numero & gravitate variant, pro diversitate subjectorum; plerique ægrotantium conqueruntur de stupore artuum, *als ob die Glieder schliefen*; omnibus membra convulsa leviter tument, aliqui-

aliquibus autem tumor est in manibus pedibusque magnus, & ad tactum renitens. Plerique extra paroxysmum, aut dum convalescunt, conqueruntur de sensu frigoris in artubus, quamvis foris calor naturalis observetur. Alvi fluxus aliquibus molestus est; aliis, sed paucioribus, mentis quædam alienatio aut leve delirium accidit. Omnibus communis est spasmus extremorum, in manibus semper, rarius in pedibus, cubitis & cruribus, cum præcedentibus tensionibus circa præcordia, & angustis, *Hervrens-Angst, Bängigkeit*, cessantibus demum quando membra externe convelluntur. Dolores autem comitantur membrorum contractiones, cum rubore faciei, & sudoribus, quibus vix non differunt. Pulsus magnus usplorimum est & tardus, qualis plerumque est rusticorum, & qui victu utuntur crasso, & melancholicorum; in paucissimis debilis, ita ut in ipsis moribunbis satis magnus, sed cum celeritate & inæqualitate mihi fuerit observatus.

Notatu maxime dignus est sensus iste fornicationis, cujus antea facta est nentio; hunc omnes per totum corpus sentiunt, molestissimum, *et laßt ihn in den Gliedern und über den gantzen Leib, als obs le bete, oder Aneissen da ließen*; & quod maxime singulare est, motus, iste in facie, artubus, & præsertim manuum dorso, etiam extra paroxysmi vehementiam oculis cerni potest, nihilque est aliud, quam motus fibrarum carnearum & tendinum reciprocus, velocissimus, tremulus, sub cute conspicuus. Conqueruntur simul de siti, quamvis nullus adsit calor p. n. nulla febris: adsunt vigilie fere perpetuæ, & nonnunquam, licet rarissime, insultus epileptici, facile remedio cedentes, nisi in his qui moriuntur, quorum vix quinque aut sex fuerunt, quique aut epilepsia, aut apoplexia, intereunt.

Illi, qui convalescunt, lento gradu, & post aliquot demum septimanas cum sanitate in gratiam redeunt, & dum labores consuetos manibus exercent, aut corpus movent validius, bene sese habent, nihilque amplius incommodi sentiunt; quiescentes vero a laboribus & corporis exercitio, tensiones quasdam in artubus, cum stupore, etiam diu a superato morbo percipiunt: quin & si subito nimis frigori sese exponant facile recidivas patiuntur; id quod bis aut ter aliquibus accidisse meminimus.

Morbi hujus hæc est indoles, hæc comitantis symptomata, quæ sedula & accurata observatione, & frequentiore vilitatione ægrotantium aliquot centenorum, in diversis prædiis decumbentium mihi innotuerunt. Videndum igitur nunc est, quis aut qualis sit affectus iste, apud nos hæcenus plane ignotus? Cum autem a symptomate præcipuo, uno aut altero, quodque inviduus morbi est comes, & quo posito, morbus ponitur, quo sublato idem tollitur, denominatio ejus desumi debeat, ni tot nobis fingere velimus morbos, quot adsunt symptomata; spaf-

spasmus, vel morbum convulsivum epidemium & populariter inter rusticos grassantem, eundem vocandum esse arbitror, hæcenus enim ne unicus quidem in urbe, aut lautioris conditionis homo eodem malo quantum quidem mihi innotuit, laboravit.

Novum plane esse morbum, cujusque nulla apud autores prostant vestigia, multis primum persuasum erat; siquidem omnes affectus epidemii, & febrium diversa genera, variis & insolitis stipata symptomatibus, novi morbi nostratibus audiunt. Ita febris illa erraticæ, parti Ducatus Slesvicensis occidentali, ab Eidora fluvio *Gidderst* dictæ, circa mensem, vel autumnii principium familiaris, *das Stoppell-Fieber*, per ipsam hiemem quandoque se extendens, variisque stipata symptomatibus, typum servans nunc intermittens, nunc continuæ periodicæ, cum, vel sine malignitate, si latius divagetur, & ad orientalem Chersonesin hujus Cimbricæ partem & Balthici maris oras serpat, ut fieri nonnunquam aßolet, novus nostratibus dicitur morbus, quamvis vicinis nostris singulis fere annis fatalis existat. Idem de morbis aliis, regiones epidemice pervagantibus esto judicium, quorum paucissimi inter novos referri poterunt, modo observationes medicorum, ante nostra tempora conscriptæ, diligentius evolvantur. Certe, cum anno hujus seculi duodecimo, circæ æstatis medium febris quædam catarrhalis non solum apud nos, sed per totam sorte Europam grassaretur, & a principio Julii ad medium Augusti vix non omnes adoriretur, simul vero Glückstadii & Rendesburgi lues contagiosa plurimos interficeret, haud levem sane metum cunctis incutiebat morbus iste, totam hanc regionem brevissimo tempore populariter infestans, ita ut paucissimi ab eo evaserint immunes. Insultus morbi fiebat cum dolore capitis & dorsi, succedebant horripilationes frequentes, calor levis, cum faucium & colli dolore, prostratione virium summa, sudore continuo; quibus demum tussis gravissima succedebat, & quandoque coryza. Morbus non nisi ad triduum vel quadriduum vigeat, quo tempore pauci decumbere opus habebant, & remanente demum tussi, facile ad se redibant, nullis etiam adhibitis remediis, quamvis hanc una cum virium imbecillitate, etiam robustiores post quatuordecim dies vix superare poterant. Venæsectio in principio administrata, egregie profuit; iis vero, qui longiores inducias morbo dederant, ut plerumque fieri solet, dabatur bezoardica, absorbentia, nitrosa. Illustris Vir, Dn. *Krugius de Nide*, Consiliarius intimus & Archiater primarius Borussia in literis illo tempore ad me datis, laudat spiritum bezoardicum in morbi principio datum, & pulverem pectoralem Ludovici, denique essentiam asthmaicam sine opio. Cæterum vitæ periculum omnes evadebant, nisi malum in principio neglectum habitum, degeneraret in febrem quotidianam vel tertianam continuas, ubi accedebant lipothymiz, & haud

Disput. Medico-Pract. Tom. VII.

V v v

obscura



obscura malignitatis signa alia, quali tamen neminem præter studiosum quendam, post gravissimam narum hæmorrhagiam, devotum fuisse meminini. Licet autem mihi evidentissima hujus morbi vestigia reperire in dialogis mensuris, idiomate Germanico anno 1653. sub titulo *Novellen aus der Gelehrten und curiösen Welt*, editis, ubi auctor p. 1559. inquit; es solte wohl diese eine national - Krankheit Teutschlands genennet werden können, da im vorigen seculo 1580. eine Seuche, der Bemer Papp, in Teutschland regierte, welche auch gantz Europam durch gelassen, und allen zu Rom 40000. damals davon nieder gelegen sind: und ist eben die Krankheit gewesen, die Joh. Bange in seiner Thuringischen Chronick beschrieben, daß sie 1579. sich in Teutschland hervor gethan, da er sie eine seltsame, geschwinde, und unerhörte Krankheit nennet, die ersliche den Leuten mit Frost, und etliche mit Hitze angekommen, davon wäre der Husten und Heiserkeit entstanden, und wären se in denen Häfen wund worden, hätte aber nur etwan drey oder vier Tage mit einem gewähret.

Sed redeo iterum ad primarium dissertationis hujus argumentum, morbum scilicet convulsivum, & quemadmodum ostendi epidemios sapissime citra omnem rationem novos appellari, ita præsens morbus idem etiam satis demonstrat. Dum enim de natura ejus sollicitus, auctores evolvo, commode incido in *Willisi de morbi convulsivi tractatum*, hujusque c. 8. p. m. 45. ubi graphicam ejus descriptionem reperio. Apud Gregorium Horstium, inquit, mentio fit morbi convulsivi, & maligni, qui olim Hassie, Westphalie, & in locis vicinis epidemius fuerat: illo correpti sine febrili æstu, aut immodica sanguinis effervescentia, dum circa negotia familiaria versarentur, sese vix modo egrotare percipientes, circa manus aut pedes, & interdum in utrisque fornicationis sensum, cum stupore, huc illuc transcurrentem, habere solebant: dein mox digiti, simulque brachia & erura modo arcte contraherentur, mox valde diffuse, ac si obriguissent, extendebantur. Et paucis interjectis: sui morbus, pergit, uti non raro contingit, cerebrum una totum invaderet, convulsione: universales & sæpe insulsum epileptici egrotos infestabant. Adii igitur ipsum Horstium, & operum Tom. 2. l. 8. obs. 22. morbi hujus convulsivi maligni, epidemii, quem miserabilem & omnino terribilem, imo pestilentialem vocat, anaphorem reperio descriptionem, fuisse scilicet eum anno 1617. Hassie, Westphalie. Episcopatu Colonienſi epidemium, vernacula die krubell Krankheit, Krampfucht oder ziehende Seuche appellatum, ejusdemque recidivas aliquot subsequenter lustris idem observavit Horstius & in gratiam proximi, tractatum de eodem malo, per professores Medicinæ Facultatis in Illustri Marburgensium Academia editum, latinitati donatum, appendicis instar operibus suis addidit

addidit. Symptomata, morbo isti propria, quamvis apud omnes quidem eadem & similia non sint, ut plurimum tamen sequenti modo sese habere legimus c. 2. Primo omnium agrotantes, modo in manibus saltem, modo in pedibus duntaxat, interdum in manibus & pedibus simul, aliquando in uno tantum latere, nonnunquam in utroque, sensum quendam formicantem, ac si pars plena formicarum transirentium, aut alias conspicienda esset, percipiunt. Hinc digiti manuum ac pedum ex improvviso arte contrahuntur, aut validissime, ac si obriguissent, extenduntur, tensisque hac, a manibus ac pedibus inque ad cubitum, humerum, crura, coxaeque progreditur, ac simili ratione horum unumquolibet membrum usque ad corpus contrahit: &c. Frequenter etiam hac convulsio in manibus aut brachiis, aut in utroque (ut in nostro agris) crebro quoque in ore, labiis, oculis & toto corpore perseverat. Problematum deinde decade decima, quæst. 7. p. 109. de eodem morbo agens, familiarem eum fuisse anno 1596. & 97. Westphaliæque, Coloniam Agrippinensem, Witteussteiniensem & Waldeckensem Ducatum, (comitatum), & Hassiæ populariter invasisse scribit. Quin & evidentissima hujus affectus vestigia reperiuntur apud Schenkium, l. 6. obs. 2. qui tamen auctor dubius hæret, num inter pestilentialium epidemiorum, num vero endemiorum censum referendus sit? Unde factum esse existimo quod Clarissimus Reusnerus, Eph. Germ. cent. 5. & 6. p. 21. morbum hunc convulsivum Westphalorum quondam endemium aut vernaculum appellavit, quamvis non semper, sed potius rarissime Westphaliæ affixerit, quare huic quoque epidemium eundem esse censemus, quod certo saltem tempore has aut alias regiones infestare soleat. Vid. Gal. c. I. in i. epid. in proemi. & in defin.

Præterquam vero quod mali hujus ante nostra tempora hincinde grassantis mentionem faciat Horstius & alii, inter recentissimos nominare liceat D. Budden, Lusatiæ superioris Physicum celeberrimum, cujus consilium medicum von der Krampf-Such oder Kriebe-Krankheit, hoc ipso anno publicæ luci datum, mihi dum hæc scribo, ab Amico communicatur: meminit hic ejusdem morbi, annis superioris seculi 48. 49. prima vice in Vogtlandia, 1675. in urbe Plauen & locis vicinis: & præsentis seculi anno secundo circa Freibergam Misniæ, & anno proxime præcedente decimo sexto, mensibus Augusto, septembri & sequentibus in diversis Saxoniz & Lusatiæ superioris locis, gravissime sævientis.

Si causam proximam mali hujus investigare velimus, eadem hæc erit, quæ cæterarum convulsionum omnium, cui tamen spirituum expulso, aut rarefactio, quando pulveris pyrii ritu, veluti ignis ex-

V v v 2

plodun-

ploduntur, ut placuit *Willisio* de morb. convuls. c. 1. p. 2. non sufficere videtur. utpote quæ nec naturæ spiritum convenit, nec explicandis membrorum contractionibus convulsivis ullo modo inservire potest. Neque etiam repletio aut inanitas, ab *Hippocrate* 6. aph. 39. adductæ, in censu caularum locum habere poterunt, ut ut corium madidum, aut fidum nervi, madido aere repleti, aut nimis siccò inani, laxati aut contracti in exemplum afferantur: texturæ enim nervorum non convenit utraque, nec ipsi etiam partibus solidis quæ convelli solent, ut *Willisius* l. c. c. 3. exemplo anasaræ & tabis eleganter ostendit: Quamvis si sano sensu hæc explicentur, non profus rejicienda esse, in sequentibus patebit. Intricatissima enim est res ista, unde diversissimas apud authores de causâ convulsionum proxima reperire licet opiniones: ut enim in rebus a sensibus remotis, & tantum intelligibilibus facile decipimur, nisi omnes earundem circumstantias exactissimi judicii lance ponderemus; ita & hic fieri facile posse, videbit quivis, cui causas ab effectibus & a posteriori ut loquuntur deducere libuerit. Vir Clarissimus *Bartholomæus de Moor* pathologiam cerebri peculiari tractatu elegantissime tradidit, & convulsionum spasimorumque ætiologia p. 342. 537. ab eo allata, lucem quandam affundit, & cum rei veritate conciliari facile potest: quæ vero ab aliis de timoris & pathematum animi, imprimis summe anxii, indeque ortis mortuum vitalium perturbationibus, in hoc negotio afferri solent, illa non tam causam proximam, quam remotas & protatarcticas tangunt, de quibus nobis nondum sermo est. Quin obscura quoque illa esse, quæ de naturæ, in conservando suo corpore energia, & paratissimis eum in finem subsidiis, augmento motus sanguinis progressivi, ut in febribus; coarctatione fibrarum muscularium, auctoque motu tonico, ut in convulsionibus, afferri solent, quam incertissima, vixque probabilia esse, satis ostendit nondum demonstratum animæ rationalis, in actiones istas mere vitales imperium; ut cætera omnia silentio præteream; tantum abest ut administriculis ejusmodi, a naturæ ordine prorsus alienis, ad illud quod economiæ animali noxium est, aut periculum quodvis imminens, sive evitandum, sive arcendum aut expellendum, cestinato consilio uti possit.

Ante vero quam in re adeo obscura certi quid determinare possimus, videndum prius est, quomodo motus tum voluntarii, tum illi, qui mere sunt automatici, secundum naturam in corpore nostro contingant, & per quæ instrumenta fiant? Ita enim depravationis eorundem causa facilius nobis innotescet. Motus animalis organum immediatum est fibra motrix, quarum plurimum in certos fasciculos collectio musculum constituit: fibra hæc est cylindracea, porosa, in medio

carnea,

carnea, in extremis sui partibus tendinosa, quibus ab una extremitate parti quiescenti, ab altera mobili seu movendæ inferitur, atque dum fibra carnea contrahitur corrugatur & constringitur, hæc verus illam trahitur, finis ad suum principium, vel ut loquuntur cauda musculi versus ejus caput, & ita membrum movetur. Tendinea quippe fibræ pars incepta est contractioni, & basis aut fulcimenti vices gerit, vimque motricis fibræ tantum sequitur; hæc autem vis motrix, qua membra moventur, est contractio, orta, non tam a succorum contentorum turgescencia & rarefactione, aut ab illarum repletione sola, & inde orta distensione & abbreviatione; sed a tensione potissimum fibrillarum membranaceo - nervearum transversalium, prædictas fibras carneas decussatim, angulis obliquis intersecantibus, stringentibus & crispantibus.

Fibra quippe carnea tubulata est, seu vasculosa, siquidem *Comperi* experimento mercurium injectum admittit, testante hoc *Mungeto* theatri Anat. p. 16. Et musculi contractio contingit, quando fibrillæ nervæ transversales a spirituum animalium, seu liquoris nervi, totum nervi tractum replentis, influxu & undulatione turgent, & fibras carneas, quæ iis convolutæ sunt, constringendo, motum sanguinis per hæc fluentis sistunt, unde fieri aliter nequit, quam ut musculus infletur, dñior fiat, & brevior, & finis tendinis ad suum principium accedat, & os vel membrum cui inferitur, secum attrahat, & adeo membrum moveatur. Concurrent igitur ad motum ætio fibræ nervæ, scilicet contractio ejus, & inde orta crispatura fibræ carnosæ, contentique in ea liquoris stagnatio, a quibus causis omnibus simul concurrentibus musculus abbreviatur: nec obstat fibrillarum nervearum teneritudo, propter quam robur earundem ad crispationem fibræ carnosæ minus sufficere nonnulli existimant: requiruntur enim ad hanc actionem fibrillæ plurimæ, quarum una alterius vim adjuvat, & cuicunque machinatum, per trochleas corpora moventium robur perspectum est, quibus rite & ex mechanices regulis dispositis trochleis, mediante filo tenuissimo ingens pondus elevari potest, huic inquam ætio, fibrillarum istarum maxime tenuium non videbitur impossibilis.

Videmus ex his, quæ modo dicta sunt, membra moveri contractione fibrarum in statu naturali, idemque in statu p. n. etiam contingere statuimus, sed ab alia causa, eademque præternaturali, seu morbosa: adeoque causa proxima & formalis ut convulsionum omnium, ita etiam spasmi hujus epidemii esse impetuosum, violentum & inordinatum liquoris nervi in partes fibrosas, motui inservientes influxum, eundemque interruptum & alternativum in motibus convulsivis, continuum

vero & magis ordinatum in convulsionibus & spasmodis, aut ut vocantur, conductionibus. Uti enim spiritus, per nervos brachii influens, movet in statu naturali digitos & brachium ex meo arbitrio; ita, si fiat punctura nervi, & inde convulsio brachii, motusque ejus præternaturalis, sequitur necessario, eundem spiritum, qui ex arbitrio brachium movet in statu naturali, etiam in convulsio brachio, ex motu ejus vitiat, propter irritationem, & inde dependentem continuum motum tremulum, convulsionis istius & motus p. n. esse autorem. Ex quibus omnibus evidentiissimum esse arbitror, quid demum inanitionis & repletionis nomine in hoc negotio intelligi debeat; præsertim si simul consideremus, quod fibrillarum contractionibus istis sanguini arterioso, per fibras carnes transeunt obex ponatur, ejusdemque ingressus in venas impediatur.

Inter causas remotiores primum locum obtinet omne illud, quicquid crispationes tales fibrillarum producere valet: & quemadmodum a causa externa sæpe id contingere videmus, punctura scilicet aut læsione nervi; ita, si a causa interna, humore acri, aut spirituum impetu nimio, irritetur nervorum principium aut nervus, ex celerissima hac in parte admodum sensili fibrillarum agitatione & vellelitatione, spiritus per nervum antea blande fluentes, simul impetuosè commoventur, & ab his tota liquoris nervei massa, adeo, ut iidem spiritus per nervum istum violenter & cum impetu ferantur, istiusque membri, ad quod nervus fertur, convulsio exoritur. Vix enim induci possum, ut credam, causam materialem ipsis spiritibus hæere implicitam, sive hanc in acido volatili cum *Sylvio*, sive in nitro-sulphureo cum *Willisio*, quærere placeat: siquidem spiritus animæ, liquidum hoc subtilissimum, moleculas tales plane heterogeneas, propter sui subtilitatem, & tubulorum cerebri, per quos separatur, viarumque, per quas it & redit, exilitatem, non admittit, adeo ut non tam qualitate, quam quantitate & motu illud peccare videatur.

Causæ antecedentes præsentis mali, quærendæ sunt in ipsa humorum constitutione acido-viscida, & temperamento, ut vocant, melancholico, cui producendo vitæ genus maxime favet: unde non usque adeo est mirandum, si, accedente levi aliqua causa externa internave, humorum acrimonia augeatur, & irritationes ejusmodi producant; aut propter lentorem hinc inde stagnantes partium distensiones augeant, fibras irritent, temporisque successu acorem contrahant, præsertim, si hæc omnia a causis procatactæis in actum introducantur aut foveantur. Quanta enim sit vis harum causarum in producendis morbis, quotidie experimur, quando ex perversa sex rerum nonnaturalium, ut medicis audiunt,

audiunt, administratione, corpus nostrum variis modis læditur. Aer noster atmosphæricus, commune vitæ pabulum, corpora vario modo alterat, & teste Hippocrate, aut cuicumque demum adscribere placeat, *L. de flatibus, mortalibus vitæ, & morborum agrosi solus in est auctor*: Epidemiorum sane malorum causa generalis ut plurimum est aer, tempestatunque anni mutationes potissimum tales morbos pariunt, & in hiis ipsi anni tempestatibus magnæ mutationes frigoris & caloris, ut liquitur Hippocrates l. 3. aph. 1. Et huic quidem partes præcipuas in producendo hoc morbo tribuendas esse puto, siquidem aer vitæ cibis longe nocentior est, utpote qui statim intimos corporis recessus occupat, spiritusque ipsos inficit ac continuo afficit, teste B. vivens in se & æt. diætet. p. 1. Quod si igitur aeris nostri & tempestatum huius anni constitutiones accuratius paulo examinemus, videbimus post hiemem utcumque frigidam & diuturnam, veris initia fuisse temperata, & pro temporis ratione calidiora atque serena, succedente denum frigore insolito, & pluviis perpetuis, ad æstatis medium durantibus, quas tandem excepit tempestas calidissima, serena, per plures septimanas constans, & non nisi unius forte hebdomadis spatio pluviis interrupta; cæterum ut interdiu summum æstem, ita noctu fere temper, paucissimis solummodo exceptis, frigus singulare experiebamur. Sub hisce inæqualibus sæpiusque mutatis tempestatibus, corpora vario modo alterabantur, eorum præsertim, qui propter vitam & labores rusticanos sub dio semper aut ut plurimum commorari necessum habebant; unde facile patet ratio, cur patres familias, servi & ancillæ potissimum, pueri item & puellæ, quæ ruri quoque operas pro ætate præstare poterant, morbo hoc obnoxii potius fuerint, quam uxores & matres familias, ipsique infantes, quorum vix unum vel alterum ægrotantem, aut morbo hoc correptum vidi, sicut nec ullum hominem in civitatibus viventem, aut qui aeri rusticano sese continuo exponere, ex vitæ ratione non habebat opus, eodem morbo correptum fuisse memini. In his vero qui in aere aprico continuo vivebant, rusticis, messoribus & similibus postquam a præcedente aeris constitutione frigida & humida transpiratio fuerat impeditior, humoresque movebantur lentius ac hinc inde facile stagnarent, acoremque contraherent summum, fieri facillime poterat, ut succedente aestu magno, & laboribus gravioribus messis tempore propter constantem serenitatem vix interruptis & continuis, moverentur humores isti viscosi, acres, atque fluidior feri portio sudore expelleretur, illudque quod reliquum erat, majorem contraheret visciditatem & acrimoniam: unde tam in cerebro, quam circa viscera alia, ipsiusque nervorum principium facile fiebant stagnationes, & succedentia cum spasmodis symptomata alia plurima. Fovebantur causæ modo recensitæ a nocturno frigore, æstus diurnos excipiente, quodque poros interdiu apertos subito claud-

bat,

bat, & humores æstu agitados & attenuatos in motu sistebat, & quasi coagulabat; non sine succedentibus hinc inde stagnationibus & obstruccionibus. Quantum autem se excipientes invicem caloris & frigoris vicissitudines subitanæ sanitati noceant, testatur experientia, quando ex subitanea refrigeratione post æstum varia mala & interea haud raro convulsiones produci videmus; ipsaque etiam ratio satis evincit, non posse non ex cohibita transpiratione, & a frigore post æstum suscepto varia mala oriri.

At facile obicere aliquis posset, rusticam gentem singulis annis, & potissimum circa messis tempora, eadem pati, eosdem subire labores, nec tamen semper, imo rarissime morbo tali convulsivo affici, atque adeo aliam plane hic subesse causam, & quidem huic constitutioni epidemicæ singularem. Verum quamvis rusticolæ ad labores nati videantur, annisque singulis, præsertim circa messis tempora, in his præsertim terris, tanta segetum & pratorum copia abundantibus, gravissimos labores subeant, extraordinarios tamen hosce hac ipsa æstate fuisse statim apparebit, si considerare velimus serenitatem, tempore messis continuum, post pluvias frequentiores circa initium ejus decedentes, unde labore partim cito nimis se invicem exceperunt, partim vero metus mutationis tempestatum, festinationem summam imperavit, factumque est, ut hoc autumno messis, per tres minimum septimanas citius apud nos absoluta fuerit, quam alias fieri consuevit. Accedit nocturnum frigus satis insolitum, quo corporum pori æstu diurno aperti, non citra summam alterationem clausi iterum sunt: Nec prætermittendæ sunt e causarum classe frequentes nebulæ, & rubigines, quibus crasis corporum non parum læditur: recte enim *Ovidium*.

Cum modo frigoribus, calido modo stringimur æstu,

Tempore non certo, corpora languor habet.

Et ex longa mora aut decubitu sub dio convulsiones oriri, ex *Jacchin. comm* ad c. 13. l. 9. Rhafis, observat *Schenckius*, l. 1. obs. 4. q. 125. Verbo: frigus, præsertim post æstum susceptum, convulsiones producit, teste *Sennerto*, & de *Moor* l. c. p. 535. ipseque *Cowp*, morbus, inquit, qui sacer appellatur, ex iisdem causis, ex quibus etiam reliqui, originem trahit, ex his nempe que accedunt & decedunt, velut frigore, sole, ventis, & mutationibus nunquam conquiescentibus. Lib. de morbo sacro; Sect. operum 3. p. 94. edit. *Foef*. Num vero inter causarum remittarum censum vocare etiam debeam, quod rusticorum plurimi graminis desecatum ex pratis, aquis inundatis ad altiora loca deportare

deportare opus habuerint, ubi quotidie ad coxas usque aquis sese immergere necesse habuerunt; incertus hæreo, præsertim cum multos eodem morbo laborantes viderim, qui loca editiora inhabitantes, prata aquis inundata non possideant. Illud tamen negari non posse arbitror, refrigerationem istam in aquis factam, haud leve in iis, quibus hæc contigit, momentum & promovendo & augendo morbo contulisse.

Neque tamen e classe causarum procacciarum cibum potumve, uno verbo, alimenta prorsus excludi velim; quamvis enim quæ in aere existit morborum causa, sit maxime universalis; non omnes tamen eadem affici, aut dominante constitutione aliqua epidemica, cunctos egrotare videmus, ut etiam in præsentī lue convulsiva observavimus: illa enim inter rusticos tantum, eosdemque potissimum, qui & laboribus gravioribus exerciti, & diutius & in aprico eos continuare necesse habuerunt. Sin vero in aere vitium, si in corporis excitatione infmia querendum, cur non omnes promiscue, aut cur non plures eodem morbo correpti fuere? Certum enim est partem rusticorum maximam immunem fuisse ab hoc contagio, unde necessario sequitur, requiri in corporibus certam dispositionem, certam humorum crasin, quæ a causis ejusmodi universalibus alterari possit, quæque absente nihil a constitutione epidemica individuum huic est meruendum. Cum autem multi rusticorum, nulli vero alii homines hoc morbo affecti fuerint, causa hujus diversitatis querenda est, meo quidem judicio, in ipso temperamento, & naturali dispositione istorum hominum, ab ipsa victus, quo utuntur, ratione derivanda. Viliori alimento vescuntur omnes, pane secalino confusaneo, furfuraceo, atro, acidiori, sæpius non bene cocto, unde chylus admodum crassus, viscidus, lentus, acidus, sanguini ejusdem qualitatis generando, producendæque cachexiæ & scorbuto peropportunos. Vid. Ephem. Germ. Dec. 2. ann. 6. obs. 87. Et Dec. ejusdem ann. 10. obs. 171. Pulte quoque e frumento Saracenico decorticato, & mola crasse comminuto (*Buchweizen Grütze*) in aqua aut lacte ad crassiorem consistentiam cocto, quotidie fere & ad satietatem usque replentur, quod difficulter digeritur, flatulentum est, & crassum atque viscosum nutrimentum præbet, teste *Sennerto* Instit. l. 4. part. I. c. 3. Quin & ex hordeo decorticato puliculas sibi parant, alimenti sicioris, crassi, pauci. Nec silentio prætereundæ sunt lautitiæ eorum, quas ex farina secalina, aut quacunque alia sibi parant, aqua aut lacte in massam coacta, ex qua globulos efformant, quibus ad duritiem fere coctis, ventriculum gravant, & ad crepaturam usque replent. Carnibus vescuntur rarius, & non nisi in nuptiis, aut messis tempore, ubi lardo potissimum de-

X x x

Disput. Medico-Pract. Tom. VII. lectantur.

lectantur. Potus ipsorum est aqua, vel lac, dulce, frequentius acidum, ebutyratum, aut ejus serum, rarius cerevisia, & ex frumento per fermentationem destilans spiritus. Diata talis, & alimenta crassiora viscidiora, chylum crassum, viscidum, acrem, aut acidum suppetant, similemque sanguinem; qualis enim chylus, talis sanguis; qualis sanguis, tales ceteri humores a sanguine dependentes: adeo ut mirum plane sit, quod commoda fruantur valetudine, nisi dixeret hujus vitia laborum duritie & frequentia corrigerent. Cum igitur sanguis eorum crassus, lentus, ad motum minus aptus exultat, a quacunque causa facile magis coagulatur, stases ejus promoveantur, & fomes morbi aeri inhærens eundem facillime alterare potest.

In specie vero morbo huic ansam præbuisse credebatur panis, ex fecali recenti, & qualitate virofa infecto paratus: cui quidem sententia favere videbantur aliorum observationes, & frequens experientia. Nec ipsi *Marpurgenses* ab hac opinione alieni videntur, quando apud *Horstium* l. c. scribunt: *ex ægrotantium relatione scire licet, quod externa causa communiter in alimento, ad nutriendum nimis idoneo & improporcionado consistat, dum pauperes, rebus ad vitam necessariis destituti, panem impurum & male coctum, longo tempore in summa fami urgentia devorant. &c.* Multo vero evidentius id ipsum probare videtur elegans Illustris *Brunneri* L. B. in *Brunn*, Fautoris mei honoratissimi, de granis fecalis degeneribus venenatis observatio, *Ephemericibus* Nat. Curioforum Dec. 3, ann. 2. p. 348. inserta. *Degeneravit* scilicet, *secale*, & loco granorum alimentariorum protrusa coriucula nigra, grana secalis degenerantia: quæ experti in sylva *Hercynia Martini Kori* vocarunt, & noxam, quam alias intulit, generi humano præstiterunt. Pergit deinde & dicit: *degener illud frumenti genus esse causam, quod incolæ sylvæ non tantum convulsionibus tententur miris, sed & extrema sphacelo emoriantur.* Et quem supra citavi *Buddæ*, in consilio medico p. 9. ita inquit: *es wird uach gnugsamer Untersuchung und gemachten experimenten, wie auch deßwegen erlangten Nachrichten, von denen meisten dafür gehalten, daß unter andern Ursachen, als der lang anhaltenden Kälte, und Nätze, denen offi gefallenen Meelthauen und giftigen Nebeln die Schuld hauptsächlich bezzumessen sey dem in diesem Jahr gewachsenen Korn, als in welchem an vielen Orten, vornehmlich wo der giftige Aelshau und Schloffen gefallen, wegen der anhaltenden grossen Nässe vieles Unkraut, Tobkraut, Treffe, insonderheit die langen schwarzen Körner an denen meisten Korn-Aehren, nebst denen anderen guten Körner gewachsen, welche Körner bey trocknen Jahren ein gutes und fruchtbares Zeichen, bey nasßen Jahren aber vor ein Mißgewachse gehalten werden.* Addit porro quatuor aut quinque observationes, de virulentia granorum

granorum istorum testantes. Confirmare autem videtur hanc de vitio fecalis sententiam, quod in prædio S. mense Septembri hujus anni, rusticus quidam, cum uxore, fratre, ancilla, puella annorum 13. & puero annorum 8. graviter hoc malo decubuerit, ex quibus primo puella, postea rusticus ipse morti in prædam cesserunt, & molitor istius loci Domino fundi fassus est, rusticum hunc antequam ægrota- ret, frumentum novum, summe impurum, & corniculis nigris refer- tissimum, nec satis exsiccatum molendino intulisse, quod terna vice molæ injici oportuit, quare rusticum monuit, ne panem ex ista farina comederet.

Nec nova est hæc de noxa granorum fecalis degenerum, aut corniculorum nigrorum, nostrates *Brand-Körn* vocant, qualitate vene- nata, quibus miras convulsiones, quin imo sphacelum extremitatum producta fuisse referunt *Ephemerides Nat. Curios. cent. 5. & 6. obs. 82.* & malum hoc pauperum, temporibus caræ annonæ imputatur nutrimento vitioso, & præcipue certo frumento nigro, fecali, & qui- dem soli: degeneranti in clavos, *bled cornu*, ergo Gallis dicto; ad- dicitur, easdem causas, quæ producunt sterilitatem annorum, produxisse quoque copiam clavorum, quos non fecercentes pauperes, soli æ- grotarunt.

Neque etiam de vitio hocce segetum, & inde productis malis desunt plures aliorum observationes: ita varios morbos epidemios a fecali vitioso, & uredine corrupto, in Thuringiæ tractu circa Erfordiam ortos fuisse anno 1700, recenset celeberr. *Hoystrum*, medicus Molhusinus, *Eph. nat. Cur. Dec. 3. ann. 9. & 10. p. 173.* Imo stu- penda plane sunt, quæ de gangrænæ quadam specie, in Aurelianensi Galliæ Ducatu epidemia leguntur dans *l'histoire de l'Academie Royale des sciences*, anno 1710. p. 80. de gangræna sicca, nigra, livida, plures affligente: & in specie de rustico quodam, cui deciderunt su- bito pedum digiti omnes, una deinde cum pedum residuo, & carne binorum crurum, & natium, relictis tantum ossibus nudis. Adscribitur malum hocce nutrimento vitioso, pauperibus sub annonæ caritate usitato, & præsertim corniculis istis nigris in fecali reperiundis, me- returque res ipsa intimiorem considerationem, cum ipsa quoque ani- malia bruta, grana ista recusent, ut de gallinis affirmatur l. c. p. 83. quamvis dum incautiores illa assumpserint, nullam inde noxam patiantur. Sic canes quoque panem ex fecali recente hujus anni factum, in quibusdam locis noluerunt comedere, unde argumentum qualitatæ vitiosæ utcumque desumere possumus. Quin & mihi met ipsi, talem panem in prædio W. degultanti, sapor quidam crudus, gra-

minis instar in eo deprehensus est, qualem tamen semper in pane, ex fecali novo facto reperiiri affirmabant plurimi, dicentes: *das Brod von neuen Rocken schmecke anfangs allezeit so grün*, evanescente postmodum, quando fecalis grana, diuturnitate temporis aridiora fiunt.

Oriuntur autem cornicula ista nigra ab uredine seu rore melleo, *van Honig oder Meelthau*, de cujus qualitatibus vitiis videri potest *Theophrast. Eresim*, Hist. plant. c. notis *Bodel a Stapel*, p. 498. & *Plin.* Hist. natur. l. 18. p. m. 462. Glucinosam enim roris istius substantiam, adhærescendo fecalis spiciæ, quarum pleræque barbulis suis se defendunt, nisi pluvia succedente abluatur, aut ventis protinus dissipetur, exsicceturve, exteriorem granorum pelliculam putrefacit, ita ut nutritius istorum succus, luxurians, intra terminos suos contineri nescius, ordine a naturali plane alieno accumuletur, limitesque suos excedens, in granorum ista monstra abeat, noxiis qualitatibus propter mixturam succi alibilis superflui, cum unctuositate roris vitiis infecta. Vid. *Hist. de l'Acad. Royale des sciences*, l. c. p. 82. Rationem hujus rei paulo aliter reddit *Helwichius*, in *derer auffgefangenen Briefen fünfftem* paquet. 73. correspondenz, p. 581. sq. ubi negat materiam esse a rore melleo, quoniam guttulæ istæ dulces, e granis mollioribus immaturis proveniunt, & ab aere vel rore coagulantur, quale quid in aliis frugibus non observatur, neque in spiciis granivæ omnibus; & cum odorem exhibeant mucidum, instar granorum putredine incipiente corruptorum, nullum plane dubium relinqui scribit, cornicula ista nigra ex arstis excrescentia, pro re corrupta, insalubri nutritioni præstandæ minus apta, habenda esse. Cunctarum deinde rerum originem & finem esse mucilaginem dulcem, plus minus crassam, ex mercurio & vitriolo constantem, quarum illa virtute dissipante & attenuante, hæc vero adstringente polleat, ita ut ex justa earundem proportionem & harmonia omnia consent; quod si hæc proportio casu destruatut aut immutetur, alterari rei essentiam, atque ex nimia mercurii copia oriri turgescientiam, solutionem, fermentationem, imo putredinem & corruptionem; sin vero abundet vitriolum, coacervari tenuem, fluidam, raram materiam, & crassiorem, densiorem, imo duriorem fieri. A præcedente igitur humiditate, quam terra cum multo mercurio absorpsit, plantisque communicavit, orta est primo turgescencia, & succedente calore fermentatio unde, lactea & nutritia granuli materia, pelliculam perrumpendo extillavit, atque ab aere, roreve frigidiusculo coagulata & putrescens, monstrum istud fecalis produxit. Plura videri possunt l. c. non prorsus a scopo nostro aliena; scilicet cur fecale vitio huic tantum subiectum sit, rariusque in hordeo aut frugibus aliis reperiatur; & cur non singulis annis tale quid accidat?

dat? Prius fieri dicit, quoniam fecale per totam hiemem tempestatum iniuriis expositum, plus humiditatis unā cum mercurio aereo haurit, quam fruges ætivæ, atque granum ejus pellicula tenuiore, succoque alibi magis abundante conitat. Posteriùs adscribit calori excessivo, tum demum superveniente, quando natura in coagulanda materia viscosa lactea erat occupata, atque suborta fermentatione forti, & turgescencia præternaturali, perrupta pellicula succus iste exsiliat.

Satis hæcenus de vitio panis, cui morbus noster convulsivus a multis adscribitur, actum est, diffiteor mala plurima, & in specie affectus convulsivos, aliasve capitis tati a pane vitioso, quam ab aliis alimentis produci posse: ita frumentum malum morbos chronicos, & imprimis scorbutum producit Eph. Nat. Cur. Dec. 2. ann. 10. Obs. 171. Efus coturnicini spasmus pedum produxit, notatumque est quendam, quoties coturnicibus vesceretur, semper altero die spasmus pedum, haud parum molesto correptum, cui alias nunquam obnoxius existerat: *Riedlin*. lin. ann. I. p. 30. & alaudæ manus contractas induxerunt, teste eodem *Itiner.* p. 17. lin. ann. 4. p. 913. Anguillæ nervis imprimis adversantur & convulsionum causa sunt, quales aliquando virgines duæ ab esu earundem adeo horrendas patiebantur, ut rigidæ starent, corporibus nonnihil in anteriora incurvais, ut in emprosthotono fieri solet; testante *Bierlingio* thes. præf. p. 738. Quin & lac ipsam, primum istud omnium animantium pabulum, oris torturam aliquando induxit gravissimam, cum tensione dolorifica totius colli, & pene corporis, teste *Baglivo* prax. l. 2. p. 243. Et ex leguminum esu crurum impotentiam observavit *Hippocrates* de morb. vulgar. 2. edit. *Coef.* Sect. 7. p. 119.

Quicquid autem horum est, & quavis ab alimentis tum spasmus & convulsiones, tum morbi alii produci queant, sæpiusque a solo pane ortos fuisse non diffiteamur; neque ignoremus, quid lolium aut triticum temulentum malignitate sua efficiat; quamvis etiam negare non possimus, constitutionem frigidam pluviosam, productioni fecalis vitiosi admodum favisse, utrique enim, & corniculis nigris & lolio producendo, favet, teste *Ramazzone* de morbis artificum c. 27. atque lychnidis segetum semina, nostratibus *redde* vocata, fecali permixta, farinam hoc anno suppeditarint rubram, quæ alba ordinario esse solet, indeque malum hoc ortum fuisse nonnulli existimaverint: his tamen omnibus nihil obstantibus, vix induci possum, ut credam, mali hujus causam apud nos extitisse panem ex vitioso fecalis farina excoctum, sequentibus potissimum rationibus inductus. Quod scilicet plures spasmus epidemio laborantes

X x x 3

vide-

viderim, antequam panem recentem comederint; multos autem qui talem in magna copia assumpserunt, non ægrotasse: quemadmodum hodie adhuc talis panis, sine omni noxa a rusticorum plerisque usurpatur: præsertim cum certa mihi constet experientia, collecta ante plures annos in annonæ charitate a pauperibus secalis recrementa, multis granis degeneribus referta, in panes coacta & comesta, nihil plane mali post esum reliquisse. Ex quibus omnibus concludo, morbum hunc apud nos non tam a secalis & panis vitio quam ex peculiari aeris constitutione epidemia, ut & nebulis & vaporibus ortum suum habuisse, a quibus scilicet morbi epidemii ut plurimum oriuntur, ut de aere & tempestatibus p. 18. dictum est; de nebulis vero, febrem malignam producentibus, historiam notatu dignam refert Celeb. Hoyerus Eph. Nat. Cur. Dec. 3. ann. 9. & 10. p. 174. simulque subjungit, haud facile esse naturam & causas nebularum rimari, utpote quæ pro mineralium & aquarum, in terræ cryptis & antris contentarum diversitate maxime variant: Placet Hippocrati effatum scēt. 3. edit. Coef. p. 7. de natura hominis, ubi complures, inquit, uno morbo eadem tempestate vexantur, in id quod maxime commune est, quoque omnes utinur potissimum rejicienda causa est: id autem est, quod inspirando trahimus.

Cæterum, unde aeris ista corruptio & vitium oriatur, res est altioris indaginis. Præterquam enim quod ab exhalationibus & vaporibus corrumpi & infici possit, non penitus e causarum numero proscribendum esse astrorum influxum, existimo. De sole & luna res extra controversiam posita est; de planetis reliquis & superioribus dubia forte nonnullis videri potest, propter nimiam eorum a nobis distantiam, & corporum istorum opacitatem. Verum enim vero, aliud est influxus solis & stellarum fixarum, aliud planetarum: illa agunt luminis emissionem, & vario modo tam aerem, quam corpora nostra alterant: hi non immediate, sed mediantibus exhalationibus primo atmosphæram sibi propriam, deinde ætherem & aerem contiguum & vicinum, denique longius distantem diversimode alterant, ita ut mutationes inde provenientes, ad aerem nostrum atmosphæricum usque se extendant, & mutationes tempestatum in eo producant. Certum enim est, quod pro ratione situs planetarum tum inter se, tum imprimis ratione solis alia effluvia ex iis emittantur, quibus alteratio ista merito tribuenda est, præsertim, cum recentiorum industria certas regulas meteorologicas detexerit, quibus observatis, ex positu stellarum, constellationes vocant, certissimum de futuris tempestatibus judicium, formari potest, id quod post Wilhelmum Coccium, Anglum, sedula plurium annorum observatione ostendit Sluterus, Hamburgensium senator spectatissimus, & ex utroque Stablius introductione ad meteoroscopiam novam. Nostrum non est,

est, in speciales syderum positus, & ordines, quæque eorundem ad producendum hunc morbum vis sit & efficacia sigillatim inquirere, habebunt igitur hic, in quo se exercent, astrologi.

Quicquid autem horum est, & sive ab astrorum influxu, sive ab exhalationibus aut vaporibus aer vitietur, res eodem recidit, illeque semper pro primaria morborum epidemicorum causa habendus est, quorum certe originem aliunde derivare vix licet. Quis enim febrem catarrhalem seu catarrhum epidemicum, cujus mentio facta est p. 8. toti fere Europæ communem, aliunde, quam ex aeris vitio, derivabit? Et cum *Reusnerus*, Nordlingensium poliater, tractatu de scorbuto p. 72. ejusdem morbi meminerit, anno 1580. ab austro principium sumentis, sub Sirii ortum, tempestate aquilonia, maxime autem circa interlunium æquinoctii autumnalis, municipatim pervagantis Europam, & in omnes fere mundi regiones debacchantis, commode hic de eodem adhuc monendum esse censui, quod *Fernelio* l. 1. de abdit. rerum caus. c. 12. gravedo anhelosa, Gallis *la coqueluche*, Germanis *der Bremer, oder Bohmer Pipp*, *das Hünerweh*, quoniam laborantes instar gallinarum coryza vexabantur, dictus, atque *Hippocrati* l. 3. epid. sect. 3. cognitus, aerisque constitutioni austrinæ tum aquilonari adscriptus fuerit. Et quis dubitabit unquam, affectus epidemios alios, aeri potissimum & frequentius, rarius cibo aut potui adscribendos esse? Id quod in abortu epidemio, anno seculi superioris 96. passim observato, docet *Hippocrates* sect. 3. aph. 12. & l. de aere: aquis & locis c. 6. Idem docet *Aristot.* sect. 1. probl. 9. Et mihi met ipsi anno 1637. die 29. Martii partus difficilis in tribus puerperis hic observatus est, quo tempore ipsi syderum positus idem innuere videbantur; & Vates iste Anglicus, ut se ipsum vocat, in suis prognosticis ad diem 28. Martii notanter ait: *das zarte schwache Frauen - Zimmer hat schwheergefahr, auch missliche Geburten zubefahren.*

Sed his missis, nos potius ad alia pergimus, & considerabimus, quomodo causæ istæ generales, de quibus in præcedentibus actum est, & morbum ipsum, & potissimum, symptomata eum concomitantia producere possint? Cunctaque ad malum præsens applicando, ætiologiam ejus, quantum quidem in re adeo obscura licebit, tradituri sumus.

Ut ordine hic procedamus, symptomata dividere placet in antecedentia, concomitantia, & consequentia. Inter antecedentia plerumque observantur nulla, nisi capitis quandam gravitatem, nauseam, & molestim quam nonnulli in aribus sentiunt, tractionem huc referre lubeat. Oriuntur illa a miasmate morbo, ipsum caput, & ventriculum infestante, leviterque vellicante, usque adeo, ut

ut contractis meningibus aut fibris quibusdam cerebri medullaribus, levique earum compressione capitis gravitas, in ventriculo vero, ex rursione tunicae nervae nausea oriatur, quæ in subiectis istis robustioribus sua sponte nunquam in vomitum terminatur. *Traçtio* ista *molesta*, cum aliquali dolore, quem in principio paroxysmi plerique sentiunt, spasmodicæ musculorum & tendinum contractionis principium esse solet, quam demum ipse morbus, seu spasmus sequitur: & observatione maxime dignum esse arbitror, quod ejusmodi *tensiones circa respirationis organa*, & *diaphragma*, una cum *angustiis circa præcordia* in quamplurimis observari soleant, antequam membrorum contractiones subsequantur, quibus tamen succedentibus, cessant molestiæ istæ circa pectus: evidenti testimonio, malum per respirationem cum aere haustum, aut ex superflua transpiratione ad viscera propulsum, afficere organa & viscera thoracis, & convulsivas contractiones iisdem inferre, donec malo ad artuum nervos, ipsius naturæ, & circulationis humorum ope delato, extrema convellantur.

Spasmus ille extremorum, cujus ampliorem descriptionem p. 6. tradidi, individuum est morbi comes, imo morbus ipse, oriturque ab humore aut miasmate acido-acri, plus minus activo, nervos irritante, rodente, vellicante, & organorum motus contractiones involuntarias, morbosas & præternaturales causante: quo tandem discusso, morbus dat inducias, donec, collecto denuo circa nervorum principium, aut in ipsis motus instrumentis novo fomite, pristina ludatur fabula, & spasmus revertatur. Concomitantur convulsiones istas *dolor*, a violenta membrorum contractione ortus; *tumor* a sanguinis, cæterorumque humorum stagnatione, & *rubor* tam faciei, quam membrorum convulsorum, ab eadem causa producti: quin ipse quoque, qui in paroxysmo observatur, *sudor copiosus*, ab eadem humorum stagnatione oritur. Dum enim sanguis intra sua vasa in musculis cogitur, & premitur, serum ejus facile exprimitur, & per poros sub odoris forma dilabitur, ut in moribundis observamus. Interea, & dum ista fiunt, *mente constant* ægri, quoniam causa mali non tam rationis officinam, ipsum cerebrum & cerebellum, quam potius medullam ejus oblongatam & spinalem, principiumque nervorum artus moventium in vadit & aggreditur. Quod si contingat ut simul ad caput intimius feratur, oritur *delirium*, *epilepsia*, aut *apoplexia*, rarissima in nostris ægris symptomata, quorum ultima etiam sæpe funesta sunt. Causam *formationis* istius *motusque tremuli*, quem tam in, quam extra paroxysmum sub cute sentiunt, & qui oculis cerni potest, a motu tremulo & reciproco fibrarum carnearum & tendinum, supra p. 6. deduxi. *Alii fluxum*, non tam in principio morbi, quam ejus progressu, quamvis rarius succedens, symp-

symptomaticus erat, non carens periculo, & collectione materiæ morbificæ acris, intestinis & visceribus abdominis mollescæ oriundus. *Sitis* non tam a defectu humidi in sanguine, aut obstructione vasorum salivalium, vel calore p. n. qui nullus aderat, originem habebat, sed doloribus potius, & tristi spiritui exsiccanti, aut spirituum ataxiæ tribuenda erat: hæc enim vel materialiter salivam alterant, vel secretionem ejus impediunt, id quod in magnis doloribus, aut animi pathematibus vehementioribus quotidie observamus. Nec possum silentio præterire observationem, quam proprio meo damno expertus sum: cum enim circa initia veris anni proxime elapsi, Schlesviga domum reverfurus, curru prostrato, os humeri dextrum in sui medio mihi diffringeretur, eo ipso momento, & dum humi adhuc jacerem, sitim ineffabilem, qualemque nunquam in vita mea habui, experiebar, non aliter ac si per plures dies nihil liquidi assumpsissem, cum tamen vix ante horam hausitus thee potus, nullam plane sitim reliquerat, & ante lapsum os saliva maderet. Quin & celeberrimus noster *Pechlinus* profligatissimam sitim, in iis qui crurifragium propter delicta passi sunt, ipse annotavit, & pro suo more verbis elegantissimis describit, observ. med. l. 3. obs. 39. p. 518. *Pulsus* magnus & tardus non tam a morbo, cujus causa proxima non in sanguine, sed in nervis, horumque principio hæret, originem ducit, sed temperamento rusticorum melancholico, aut melancholico-sanguineo naturalis esse videtur; celeritas vero & inæqualitas ejus, qualem in moribundis observavi, ab inæquali & tumultuario spirituum motu originem traxit. Nec *urina* multum a statu naturali mutata erat, nisi quod in aliquibus justo pallidior ex vitio digestionis, & a feri in renibus copiosiore secretionem, apparuerit.

Post paroxysmum consequebatur *frigoris sensus* in artubus, species quædam horripilationis, a fibrillarum motu tremulo, sanguinisve circulatione tardiore per vasorum capillarium extrema. *Fames*, in aliquibus *canina* ab acido excessivo, stomachum vellicante ortum ducit, & dum vellicatio hæc in ipso paroxysmo propter dolores & spirituum distractiones sentiri nequit, his demum sedatis animadvertitur & ægri fiunt famelici. Denique *tensiones artuum cum stupore* quodam membrorum diu remanent, partim propter relictam materiæ morbificæ, nondum penitus discussæ aut correctæ aliquam portionem, partim propter debilitata motus arbitrarii instrumenta: & dum antecedens mali causa, & humorum constitutio acido viscida, propter dietam hominum nostrorum, & deficientem remedium continuationem diuturnam, a qua natura eorum plane abhorret, non facile penitus tollitur, quid inquam, mirum est, si ex levi causa procataclica, & accessu aeris frigidiori *recidivam* pariantur? Quamvis hoc ipso, dum hæc scribo tempore,

Disput. Medico-Praz. Tom. VII. Y y omnes,

omnes, qui curæ meæ subiecti erant, per Dei gratiam plenarie sanitati restitutos esse, affirmare possim. Nec reticenda, aut silentio prætereunda, sed publicæ potius laudanda est Illustrium & Generosissimorum Toparcharum plurium generosa in subditos misericordia, qua de medela pauperrimis illis hominibus gratiose prospexerunt, cui ex alto benedixit Iehovah, ut exceptis paucissimis, mortuorum catalogo adscriptis, reliqui optima nunc fruantur valetudine.

Talia erant symptomata, in nostris ægrotantibus obvia, quorum tamen plura in aliis, eodem morbo laborantibus alibi observavit medicorum, qui de eodem antea scripserunt triga Reusnerus, Drawisus & Buddew: horum primus diædodicarum exercitationum libro de scorbuto, anno superioris seculi 1600. Francofurti impresso, de spasmo hocce, plures provincias populariter & digladiatorie invadente p. 72. dicit: eum agitationem esse convellentem, atque desinere in morbum Herculeum, resolutionem nervorum, veterum, maniam, lumbaginem, paralyisin, quorum tamen omnium, præter morbum Herculeum, & apoplexiam, nullum plane aliud accidens notavimus. Drawisus, in Bericht und Unterricht vom schmerzsmachenden Scharbock, tit. 2. de affectu scorbutico - spasmodico p. 88. inter signa morbi, præter illa quæ a nobis observata sunt, recenset tetanum, opisthotonum & emprosthotonum, convulsionis diversas species, vomitus, manuum & pedum vesiculas ichore plenas, aut alibi in artubus erumpentes; iis autem recentior Buddew, l. c. p. 4. & sq. maniar, caloris p. n. & exurentis, affectus comatosi, melancholiar, vertiginis, tinnitus aurium, vesicularum tam artus quam ipsa viscera occupantium, erosionum & extravasationum sanguinis meminit, de quibus tamen omnibus nihil prorsus a nobis observatum est. De internis vero morbi hujus productis legi potest relatio factæ inspectionis cadaveris, adolescentis annorum 19. eodem morbo demortui, l. c. p. 8.

Morbi diagnosi ex iis quæ in antecedentibus sunt allata facilis est, & ex symptomatibus petenda, quorum præcipuum & pathognomonicum, præter ipsum spasnum & contractiones membrorum, meo quidem judicio est sensus ille fornicationis in artubus toroque corpore sensibilis & conspicuus, a quo morbus nomen suum germanicum obtinuit. Simul vero malum hocce quamvis alibi periculosum, fœnstum, & quasi pestilens & malignum fuisse perhibeatur, apud nos tamen nec cum pari malignitate, nec tanto cum periculo conjunctum fuisse, docet prognosis. In specie quantum ad hanc attinet, Drawisus observavit, malum non nimis radicatam, & ubi peccans materia discuti potest & evacuari, simulque nova hujus præcaveri, & curabile esse, & licet per

per annos aliquot duraverit, mitigari posse: si vero delirium aut mentis alienatio continua adsit, visceraque a tono naturali, dejecta, nervique debilitati penitus fuerint, nec mitigari nec curari posse affectum, & quamvis inducias concedat, redire tamen illum quotannis, ut plurimum hiberno & frigidissimo tempore. Ex quibus videmus, non extremo gradu in nostris ægris sævire morbi violentiam, id quod eventus docuit, quando paucissimis demortuis, reliqui omnes pristinae sanitati sunt restituti. idque intra paucarum septimanarum spatium, quamvis Hippocrates, l. de locis in homine, de nervorum morbis sequens prognosticum ferat: *Quicumque autem morbus, inquit, ad nervos accesserit, eodem loco firmatur & consiliet, nec nisi agre expellitur.* sect. 4 p. 80. edit. Foesl.

Quibus ita sese habentibus, certa spes quoque est, morbum, qui in ægris nostris longe mitior quam olim & alibi locorum observatus est, tantumque in iis virulentiam non ostendit, postquam convenientibus remediis plene devictus est, manus penitus daturum, nec novas restitutus molestias paraturum esse, quale quid alias observant *Murpurgenses* l. c. p. 424. Omnes, inquit, ii, quibus morbus comitialis supervenit, recidivantes epilepsie insultum per reliquos vite des experti sunt. Pari modo & illi, qui mente exiverunt, aut in furorem, rabiemque conversi fuerunt, plerumque ad ultimum vite terminum, non redintegrata pristina discretionis & iudicio, stupidi permanserunt. Exemplis enim notis constare dicunt, quod aliqui post invasionem huius mali quindecim annis supervixerint, qui aspera & prægélida hyeme, circa mensem Decembriū & Januarii, annuatim in eandem cladem reciderint, & peractis quindecim annis, ex improvviso recidiva quadam correpti, in campos excurrentes, & in flumina profusientes aqua submersi fuerint.

Unicum hic dicendum restat, scilicet an morbus contagiosus sit, nec ne? Quod quidem primo intuitu absolute affirmandum esse videtur: invadit enī plures, uno eodemque tempore, & omnes fere, in una domo degentes, ita ut temporis progressu paucissimi immunes evadant. Quin & illi, qui licet in eadem domo cum ægris non versentur, iis tamen frequentius adsunt, aut opem ferunt, haud semper ab eo immunes sunt. Verum istud contagium non est absolutum: neque enim pleraque domos unius pagi ingreditur, sed paucissimas, unam, binas, tres, quatuor, in quibus omnes fere adoritur, reliquis domibus intactis relictis: sed restrictum potius ad certa individua, æst complexionum, sanguinis, vitæque similitudo, eadem omnes calamitate involveret, dum cæteri, aut aliter temperati, aut alia dicta vitæque genere fruētes immunes

agunt. Idem in aliis quoque morbis epidemiis, inter vilioris conditionis homines grassantibus sæpius mihi observare licuit, & imprimis ante annos 20. cum in prædio K. in tribus casis plusquam viginti homines febre quadam epidemia mali moris, graviter decumberent, & ne unus quidem inhabitantium immunis maneret; reliqui in pago proximo habitantes, & ægrotos frequentius visitantes, nullam labem contrahebant. Simile contigisse memini in prædiis P. F. & M. Et cum ante quinquennium in pago B. prædii S. subditi magno numero dysenteria maligna gravissime decumberent, contagium tantum certis quasi ædibus alligatum esse videbatur, easdemque non facile egrediebatur, aut hospites accedentes inficiebat.

Præmissis igitur iis quæ ad naturam morbi pernoscentiam, causasque ejus detegendas inferviebant, ad curationem progrediendum est: ubi statim in limine monendum esse censeo, me non tam aliorum, qui ante nos de simili malo scripserunt, curandi methodum, sed eam potissimum, qua ipsemet cum fructu usus sum, sincere & sine furo traditurum esse. Cum autem indicationes ad tres potissimum classes commode referantur, præservatoriam, curatoriam & symptomaticam, lubet nunc totam rem iisdem includere. Et quantum ad præservationem attinet, optime quidem hæc fieri posset convenienti diætâ, abstinendo scilicet ab omnibus tam alimentis quam potulentis, quibus chylus crassus, viscidus, acidus generari potest, & vitando aerem nebulosum, frigidum, aut alia qualitate vitiosa contraminatum: cum autem id ipsum a rusticis impetrari non possit, nec vitæ eorundem conditio id patiaur, sanis prospexi venæ sectione, cujus in præservando morbo insignem efficaciam, multiplex experientia edoctus sum, ita ut paucissimi quibus illa tempestive, & antequam quicquam mali sentirent, administrata esset, aliquid mali passi sint, atque ex 120. quibus in prædio B. vena est secta, vix quatuor spasmo correpti, cæteri omnes ab eo immunes existerint: idem in aliis locis a me observatum est. Vomitoria quoque ad præservationem usus sunt non contemnendi, ut & leniora purgantia, quibus causa antecedens tollitur aut imminuitur, maximo cum ægri levamine. Nec negligendæ prorsus sunt aeris correctiones per suffumigia, ex baccis & ligno juniperi, radice enulæ, absinthii herba: & res aromaticas, angelicæ radicem, aut acori veri, masticando; aut odoratas, rutam, mentham, melissam, naribus admovendo. Rusticis nostris optimum præservativum est tabaci fumus, quem summa cum delectatione per fistulam attrahunt.

Ubi vero morbus aliquem invasit, tunc considerare oportet, quid in principio, quid in progressu, quid denique circa finem ejus facienda

dum sit ? Siquidem in his circumstantiis magnum curationis momentum situm esse, necum omnes medici dogmatici affirmant. Neque enim illud quod in principio juvat, in progressu ullius est momenti & vice versa: in principio igitur & si materia turget, danda sunt evacuantia; primus, enim curandi scopus in hoc stadio est evacuatio materiæ peccantis, partim primis viis, partim ipsi sanguini inhærentis. Si nausæ, cordis anxietates & præcordiorum angustia urgeant, dari potest vomitorium, quod egregie profuisse certa mihi constat experientia. Communissimum mihi esse solet tartarus emeticus, secundum *Ludovicum* paratus; hunc enim *Mynsichtiano* præferre placet, cum certioris longe sit operationis: præscribitur pro ætatis ratione a gr. f. ad gr. iij. nihilque aliud addere soleo, præter sacchari aut lapidum cancrorum exiguum portionem, ad molem potius pulvisculi augendam, quam ad alios usus: observavi enim stomachica vim ejus infringere aut retardare. Quod si humores viscidii simul incidendi sunt, addi potest arcanum duplicatum, aut tartari cremor, & similia. Nec laude sua destituit *Americana Ipecacuanhæ* radix, cui sane, præcipuus inter tutiora emetica locus debetur; blande enim operationes edit, & cum euphoria, roborando postea ventriculum: pulvis ejus datur a ℥j ad ℥ss. Et sane præter propriam experientiam, laudatus supra *Buddam* l. c. p. 45. effectus ejus laudat, simulque vim bezoardicam eidem tribuit. Sin vero ægri conditio, aut alie circumstantiæ usum vomitorii dissuaderint, simulque tormina, alvi adstrictio, flatus, abdominis inflatio, de præsentia humorum crudorum, viscidiorum in intestinis & mesenterio testentur, purgantia potius danda esse exilimo: quem in finem *Marpurges* laudant electuarium quoddam laxativum, quod secundum genium Seculi istius satis concinne præscriptum est, vid. *Horsii* operum part. 2. p. 429. Mihi inter purgantia paucissima, tutiora & magis selecta semper placuerunt, quare ægrotis meæ curæ commissis dedi radicis *Jalappæ* pulverem ad ℥j aut 3℥. vel solum, vel cum salibus digestivis aut mercurio dulci mixtum, quo modo dimidia jalappii dosis sufficit. Notandum autem est circa usum purgantium, ea non nisi in principio, ubi nullus adhuc observatur spasmus, adhibenda esse; hoc enim præsentem, minus tuto illa esse arbitror, nisi laxantium usum suaserint morbi circumstantiæ.

Nec ipsa quoque venæ sectio præsentem jam morbo tuto est, multiplicique experientia edoctus, sæpissime vidi, post administratam venæsectionem, horrendas convulsiones immediate subsecutas fuisse; quare postmodum, etiam in plethoricis, ab ejus administratione abhorruí. Adolescens annorum 18. habitus plethorici, conquiebat de membrorum lætitudine, & dolore artuum quasi rheumatico, ego suadeo venæsectionem, securus de malo epidemio, cum nulla ejus vestigia in præ-

dio, ubi vivebat, hæcenus apparuerint; simul ac vero sanguis, non ultra, quam vires ægri ferre poterant detractus erat, gravissimo manuum & pedum spismo corripitur, una cum vehementissimis doloribus, quibus per remedia infra dicenda postmodum liberatus est.

Cum vero morbus nullis præviis signis aliis, ut plurimum cum ipso spismo incipiat, huic equidem convenientibus remediis statim obviam eundem esse existimavi; quem in finem, cum malum per paroxysmos agat, duplex curandi tempus, unum in paroxysmo, alterum extra eum, observandum est. Et quantum quidem ad prius attinet, dum morbus primum mihi ignotus videbatur, maxime consultum esse duxi, sequi Hippocrati consilium, quando de locis in homine dicit: *morbi quos quis minime cognoscit, medicamentum minime vehemens potui exhibendum. Quod si inde levior ager evadat, & extenuando curatio instituenda est. Sin vero minime levius, sed ægrum habeat, contraria facienda.* Sequentes igitur mihi proposui scopos: omnibus viribus eo animendum esse, ut 1. irritatio in nervis facta tollatur, 2. materia peccans dissipetur aut corrigatur. Utrumque fit remediis nervinis & vulgo dictis antispasmodicis, & quæ virtute anodyna blanda præpollent: Eum in finem in ipso paroxysmo dedi liquorem cornu cervi succinatum, spiritum fuliginis, & spiritum cephalicum cum castoreo, meæ compositionis, in capitis & nervorum vitiis egregiæ operationis, simul vero de fin singularum pro ætatis ratione determinando, a gt. X. ad gt. XL. cum vehiculo domestico, cerevisia aut vini spiritu; quibus tamen substitui potest aqua quædam cephalica fl. tilis, liliorum convallium. Quin etiam pulveres antispasmodicos ex succino albo, cinnabari Ænii, nitro, castoreo, sale succini volatili, theriaca cœlesti, opio depurato usus fuerunt non contemnendi; sicut anodyna in forma liquidâ volatilibus mixta, præsentissimæ operationis a me deprehensa sunt; ut fuliginis spiritus cum essentia anodyna Zwelfferi, aut liquor C. C. succinatus, cum laudano liquido. Una enim fidelia, ut dicunt, duos dealbamus parietes, tollendo scilicet irritationem in nervis factam, & dissipando corrigendove materiam peccantem. Simul vero externa in auxilium vocari debent, membrorum extensiones, quibus solis paroxysmi curationem peragi scribit doctissimus de Moor patholog; cerebri p. 533. si enim musculorum frateriorum (uti ex Hippocrate loquitur Fallopius p. m. 586.) alter contrahatur, utriusque æqualis extensio, contractionem violentam alterius corrigit. Imo nullum ægris nostris levamen præsentius fieri poterat, quam convulsi membri extensio, ut supra p. 5. monui. Deinde ligaturæ membrorum. ut & frictions cum linteis asperis calidis haud parum juvant, præsertim si accedant inunctiones cum nervinis, calidis, spiritu articulari externo, aut maritico camphorato, addito tantillo

tillo olei philosophorum aut petræ albo: nec inutiliter adhibebantur
fuffimigia ex abſynthio, ruſticorum remedio univerſali, ſabina, ſuccino.

Deinde cum obſervarem, ſuſpendi quidem a remediis modo diſtis
paroxyſmum, atque inducias dare, conſultum duxi iis, quibus
breviora intervalla, ab inſultu morbi vacua erant, remedia *Maryagen-
ſium* antiſpaſtica. apud *Horſium* l. c. toties laudata exhibere, antidotum
ſcilicet convulſivum & pulverem convulſivum, quorum deſcriptiones
videri poſſunt operum T. 2. p. 429. de quibus authores ipſi teſtantur,
ſibi quotidiana experientia compertum eſſe, remedia hæc uſurpata, natura
tam luculentum auxilium præſtiſſe, ut morbo devicto, ſymptomata om-
nia quoque mitigata & evanida fuerint. Et fateor equidem me non
ſine fructu, ſed sæpe cum præſenti effectu ea in plurimis adhibuiſſe;
conſtant enim ex nervinis antiſpaſmodicis, anodynis & theriacalibus,
quorum vis maxima eſſe ſolet in ejuſmodi morbis, quamvis cæterum
formulæ iſtæ, & præſertim pulveris, artis regulis non omni ex parte
reſpondeant, propter inſufficientem ingredientium, reſpectu & intuitu
ſingularum doſium proportionem: quando enim doſis hujus pulveris eſt
ʒj. totaque compoſitio eſt ʒix quantum quæſo ſpecierum iſtarum offici-
narium diamoſchi dulc. &c. quarum ʒj, totam compoſitionem ingre-
ditur, & vix ſexageſimam ejus partem conſtituit, quantum, inquam,
a grano uno, quod ſingulas ingreditur doſes ſperandum ſit efficaciz,
ego certe non video. Mutavi igitur pulverem ratione ſequenti: Rep.
Rad. Vincetoxic.

Valerian.

poconiz maris:

Cariophyllat: ſſ. ʒj.

Calam. aromat:

baccar: lauri.

ſ. ſulphuris. ſſ. ʒij

Cinnab. ʒnii. ʒiſ.

Caſſorei ʒſ.

Mfc. ſ. pulv: divid. in cælo part. æq. pro tot doſibus præſtatis
diverſitate minuendis. De hoc pulvere ſanctè poſſum affirmare, quod
ab ejus uſu, ſi ſcilicet poſt ſingulos paroxyſmos, aut in horum decli-
natione, juſſa ejus doſis exhibita fuerit, ſpaſmodicæ artuum contraçti-
ones aut emanſerint penitus, aut longiores inducias dederint, aut vis
earundem ſenſibiliter imminuta fuerit.

Porro extra paroxyſmum eo potiſſimum dirigenda eſt cura, ut
cauſa

causa antecedens interna, prava humorum dispositio corrigatur; scorbuticam illam vocant auctorum, plerique, nos cacochymiam acido-viscido-acrem. Non enim placet eorum sententia, qui cum *Bontecchi* ejusdemque sequacibus, omnes morbos scorbutum esse volunt, quamvis concedamus hujus causam in diathesi humorum plus minus acida, viscida aut acri consistere. Quippe scorbutus, quamvis communem causam cum multis morbis aliis habeat, affectus tamen est particularis, peculiaris & propria sibi habens symptomata, & propterea cum aliis non confundendus. Interim, ut in verbis faciles sumus, modo conveniamus in re, cacochymia ista sanguinis peculiarem sui postulat medelam, (ut *Horslius* problem. Dec. 10. p. 109. eleganter ostendit) quam per sequentes scopos obtinemus: 1. Visciditas sanguinis & humorum est corrigenda 2. aciditas aut acrimonia temperanda 3. serum acre evacuandum 4. Digestio ventriculi promovenda 5. Cum genus nervosum multum in hoc morbo patiatur, roborandum id est, remediis convenientibus. His enim scopis omne illud continetur, quicquid indicatio curatoria hoc loco postulat.

Primus scopus obtinetur incidentibus, attenuantibus, diluentibus; id quod insigniter præstant amara, & sale incidente attenuante prædita, antiscorbutica vulgo dicta, ut & alexipharmaca: nec non salia fixa & volatilia, quæ tamen refracta dosi & aliis temperata exhibeantur. Eum in finem dedi ter in die essentiam trifolii aquatici, cochleariæ, fumaricæ, fuliginis cum vel sine spiritu cornu cervi; sal volatile oleosum Sylvii, cum essentia alexipharmaca aut theriacali & tinctura tartari: lumbricorum spiritum & essentiam, liquorem cornu cervi succinatum; quibus singulis rite & conveniente dosi usurpatis, multum præstiti. Nec decocta etiam ex antiscorbuticis non nimis calidis frustra fuere adhibita, largiore dosi ab iis, quibus ventriculi digestio læsa non erat, hausta; scilicet ex radice ennlæ, & in causa magis acri acetosæ, bardanæ, rasura guaiaci, foliis trifolii aquatici, herba fumaricæ aliisque parata, saporis quidem ingrati, sed effectus non contemnendi. Alterum scopum, temperandi scilicet aut corrigendi humorum aciditatem aut acrimoniam, quarum utraque cause antecedentis vices gerit, obtinui absorbentibus, diluentibus, quin & volatilibus, ratione aciditatis, eumque in finem ordinavi pulveres, ex pannonico rubro, lapillis 69. Cornu cervi sine igne calcinato, succino, quibus nunc salia volatilia, succini, cornu cervi, nunc cinnabarium & castoreum pro symptomatum diversitate addidi. Ubi vero sal acre potissimum peccare videbatur, dedi præter pulveres absorbentes, cum nitro aut arcano duplicato, acida blandiora, tincturam bezoardicam, sed sine camphora, elixir proprietatis Paracelsi, essentiam celeberrimi Wedelii carminativam. Tertiæ intentioni satisfeci evacuantibus,

tibus, rarius purgantibus, sæpius sudoriferis, quorum virtutem in progressu morbi non solum, sed in ipsa quoque declinatione sæpius expertus fui salutare. Præscripti plerumque potiunculae ex spiritu cordii, essentia fuliginis lignorum, & spiritu cornu cervi, una vice hauriendam; aut tincturam bezoardicam largiore dosi, atque in lecto sudorem expectare iussi, vitata subitanea refrigeratione. Et dicere nequeo, quantum inde levaminis senserint ægrotantes, certusque sum, plus opis a sudoriferis in hoc malo curando expectandum esse, si gravissimi, quos patiuntur dolores concederent, ut in lecto quieti manerent ægrotantes, quibus sevientibus id ipsum frustra ab illis expectatur; quare sudorifera non, nisi ubi dolorum atrocitas remisit, usurpari queunt. Pro quarto scopo, & promovenda ventriculi digestionem, expectationi responderunt stomachica, aromatica potius & calidiora, quam acida: fermentum enim ventriculi plus aciditatis quam par erat obtinere, ostendebat fames, in plerisque, aucta, quare præscribebam essentias stomachales, ex absinthii essentia composita, Elixirio vite *Overcampii*; Elixirio proprietatis tartarifato vel volatili. Quod si lentore potius aut inertia peccare idem fermentum observabam, dedi etiam elixirium proprietatis *Paracelsi*. Omnibus autem remediis, cuicunque intenti onni destinatis, miscebam nervina, antispasmodica, & sæpius anodyna, ut quinto simul scopo satisfacerem, essentiam puta calcorei, cum simplicem tum volatilem, spiritum meum cephalicum, cum vel sine castoreo, liquorem cornu cervi succinatum & huiusmodi alia. Nec omittebantur externa, inunctiones scilicet nuchæ, & dorsi spinæ cum nervinis spirituosius, aqua Reginæ Hungariæ, spiritu lavendulæ, vini camphorato acutis; aut spirituosâ balsamica miscebam pinguibus oleosis: unguento nervino spiritum matricalem camphoratum, aut articulare externum. Ex oleo sequenti partibus modo dictis calide sæpius inuncto, levamen sentiebant plerique:

℞: Olei vulpin. ℥ij
 fl. chamom. Rom.
 Carvi, aa. ʒ℥.
 Succini. ʒss.
 Ruræ. ʒj.

Msc. S. Oehl zum Nacken und Rückgrad

Demum quando metho præscripta malum penitus remittebat, & in declinatione erat, ad discutiendam plane & evacuandam materiam peccantem, & morbo fomitem subtrahendum, suavi continuationem remedium præcedentium, & selectum ex iisdem pro circumstantiarum diversitate feci, & de li vel Elixirium proprietatis si a. cum essentia antispasmodica. *Disput. Medico-Pract.* Tom. VII. Z z thos,

thos, succini, castorei; vel antiscorbuticum remedium, ex trifolii aquaici, cochleariæ, corticis Winterani essentia, cum spiritu cornu cervi volatili. Aliis suavi sudores, bis in septimana in lecto provocandos, sumta vel tinctura bezoardica, aut essentia lignorum ad gr L. vel LX. in vehiculo convenienti. Egregios quoque effectus in hoc stadio ab usu balsami sulphuris terebinthinato, cum Elixirio proprietatis f. a. & oleo st juniperi aut succini deprehendi, quo nempe remedii genere morbi reliquæ per urinas felicissime evacuatae fuerunt. Nec in ipso quoque morbi progressu, & ubi sudorifera propter summas inquietudines, & anxietates, quibus commoratio in lecto impediabatur, simile remedium, vel alia quoque diuretica frustra a me data sunt, ita ut loco diaphoreticorum adhiberi, iisdemque in hoc morbo commode substitui possint. *Wilisio* quoque laudatur millepedum pulvis, ad ʒj datus, propter eandem, quam possidet vim diureticam, videatur de *Moor* l. c. p. 523. Notari tamen velim de usu diureticorum tam in morbo præsentis, quam aliis spasmi speciebus, minus tutum eum esse, ubi jam adeit urinae profluvium satis copiosum, quale in hoc morbo a me quandoque observatum fuit, ut & in affectibus spasmodicis aliis a *Wilisio* de morbis convulsivis, observatum est cap. 8. p. m. 53.

De diæta, cujus maximum in præservandis non solum, sed curandis quoque morbis est momentum notandum est, exactissimam quidem requiri in omni morbi stadio, quamvis ægrotantibus meis talem observare, propter vitæ conditionem non semper licuerit. Vitentur tamen quantum possibile est, omnia quæ concoctu sunt difficilia, salita, fumo indurata, acida, nimis acra, & quæ facile putrescunt. Aer frigidus, etiam diu superato morbo, nocentissimus est, & sæpe recidivas causatur. Corporis exercitatio, in ultimo hoc morbi stadio, remedii loco est, ut supra annotavi; & sæpius laudatus de *Moor*. p. 540. observat, scorbuticos non raro circa vesperam, ubi diu sederunt, insectari formationis sensu, qui inter deambulandum non sentitur, vel etiam evanescit: unde colligimus, exercitium ad progressivum sanguinis motum adjuvandum non parum facere.

Restat ut de cura speciali symptomatum etiam quædam hic subjungamus: quamvis enim horum pleaque ab eadem cum morbo causa dependeant, & præcisa adeo hac radice, cuncta simul coequantur aut tollantur, sit tamen sæpissime ut eorum quoque ratio quandoque sit habenda, quando scilicet vehementia sua nullas concedunt inducias, aut tanquam morbi effectus, etiam illo curato remanent. Dicam autem brevibus, qualia ipsis opposuerim remedia, propria experientia probata.

Angustia

Angustia circa præcordia, & cordis quædam *oppressio* multum negotii quibusdam faciebat, quibus spiritu salis ammoniaci anisato, vel succinato, spiritu gummi ammoniaci, essentia asie foetidæ commode medebatur. *Fumi camina* opponebam absorbentia, quibus addidi nonnunquam martis crocum, non sine emolumento, & præsertim absorbens *Wedelii* pulvis laudem hic merebatur. *Nausea* conveniebant stomachica, imprimis essentia absinthii comp. essentia Zedoariæ, cum elixirio proprietatis. *Vigilia* perpetuæ, plerisque molestæ, tollebantur usu nitroforum, cinnabarinorum, ut & externe applicatis temporibus balsamis, & oleis hypnoticis, ex ungt. popul. alabastriño, oleo nuc. moschatæ expresso, oleo succini, hyosciami, rutæ, succini, addito opio, aceto soluto. Quibusdam suasi applicationem & inunctionem ad tempora, factam medulla rancida, in capitis porcini fumo indurati, maxillarum diffracturum cavicibus reperiundam, a qua sæpius in aliis morbis, & præsertim febribus ardentibus cum vigiliis, egregios effectus observavi: sicut etiam hæc eadem præsenibus ægritantibus nonnunquam optime profuit, somnum blandum iis conciliando: nescio an hic sympathiæ aliquid subinde tribuendum sit, nec ne?

Diarrhæas, quamvis in quibusdam vehemens satis fuerit, nolui adstringentibus compellere, quibus humores acres, intestinis impacti, aut natura eo vergentes, maximo cum ægri damno retinentur, & temporis successu, erodendo intestina dysenteriam & alia mala graviora producere valent, id quod in aliis ægris observatum, est. Potius acrimoniam istorum humorum corrigendam, & spasmus intestinorum, si forte aliquis adsit, tollendum, simul vero humores peccantes eluendos esse censui. Prius absorbentibus, alterum theriacalibus modeste datis, tertium potu largiore, lactis calidi, aut si haberi poterat, jusculi vervecini non pinguis, ad mentem *Sydenhauui* oper. p. 154. facile compescui.

Epilepsia, quatenus materia morbifica ad cerebri intimiorem partem quasi translata esse videtur in qua nervorum omnium, motui non solum, sed sensibus quoque inservientium principium afficitur, & ubi nervi totius corporis omnes, totumque adeo nervorum systema partis affectæ nomine habendum est, tanto periculosus est symptoma, quanto pars nobilior ab eo afficitur, quare hanc moribundis familiarem fuisse tum nobis tum aliis observatum fuit. Ad terribile hoc accedens domandum, non Herculis quadam clava, sed solis antispasmodicis, præsertim pulvebus cinnabaris & castoreatis opus habui, doibus frquentius repetitis, a quibus plerique, exceptis tribus aut quatuor, mali violentia enectis, sese habuerunt. Certe puer octennis in prædio

S. gravissimis convulsionibus epilepticis vix non enecatus, unico remedio, quatuor vicibus exhibito statim convaluit, quod tale erat:

℞: Lap. 69. ppt.
C. C. f. Δne.
succin. alb. ppt.
Cinnab. nativ. ꝯā. gr. XV.
Castoreis gr. Viiij. Msc. f. pulv. in 4. doses dividendus.

Unius hic recorder, servi scilicet in prædio W. epilepsia demortui, cujus parens prohibuit, ne quis in paroxysmo accederet, aut membra convulsa extenderet, qualia tamen aliis, simili affectu laborantibus auxilio esse solent; satius ratus, ut dixit, filium absque auxilio relinquere, quam ejusmodi violentiis denuo eundem affligere.

Apoplexia mortis prodromus, qua paucissimos ante obitum correptos fuisse mihi relatum est, quamvis dubitem, num vera fuerit apoplexia, num stupor saltem, moribundis familiaris? Si a spirituum defectu oritur, qualem privativam apoplexiam non inepte vocat per ignem Philosophus *Helmontium*, tunc conveniunt confortantia analeptica, spirituosae, volatilia, spiritus bezoardicus *Buissii*, liquor cornu cervi, balsamus vitæ *Schroederi*, aut *Hoffmanni*, aquæ apoplecticæ, cum & sine castoreo, & hujus essentia volatilis. Sin a colluvie serosa in ventriculis aut tubulis cerebri collecta, ortum duxerit malum, conveniunt illa, quæ in apoplexia pituitosa passim laudantur ab authoribus, & si malum hoc acutum inducias concesserit, commendarem purgantia ad serum stagnans incidendum & evacuandum, clysteres acres, vesicatoria; non omittis graveolentibus, naribus applicandis, spiritu scilicet salis ammoniaci cum calce viva parato, & similibus. His vero omnibus incassum usurpatis, ultimum remedium ad excitandos ægros superest, cauterium actuale magnum, vertici capitis, dextra prius capillis applicandum, per quod nonnullos ex veterno excitatos fuisse memini. Hac occasione non possum, quin mentionem faciam medici cujusdam, diffusissima praxi quondam celeberrimi, cui, apoplexia prehenso applicabatur cauterium, eo capitis loco, quo sutura lambdoidea cum coronali jungitur, tali cum effectu, ut excitatus ad se redierit, atque recitata peccatorum confessione coram ministro verbi Divini, S. Cœna reficeretur, & demum sanitati pristinae in totum restitueretur. Falsus tamen mihi deinde est, se omnium, quæ postquam ad se rediit, acta fuerunt, ignorare, nunquam illorum, etiam si a suis narrarentur, recordari potuisse, quamvis sensuum omnium quam

quam expeditum & liberrimum usum eum tunc habuisse, exactionibus apparuerit.

Mentis alienatio, delirium, ut in ipsius morbi decursu aliquoties a me observatum est, ita semper fere curato malo primario simul cessavit; nisi quod in puella annorum 19. remanserit stupor quidam mentis, aut leve delirium, ita ut ad quæsitæ vel plane non, vel appositæ minus subinde responderet, aut sine causâ subrideret, & vigente interim appetitu, oblata quævis devoraret. Causam hujus mali a pituita lenta, aut serositate nimia, caput aggravante, & aliquali tubulorum cerebri medullarium obstructione derivavi, & præmisso purgante, ex pilulis de galbano *Sylvii*, dedi ejusdem authoris sal volatile oleolum, ter quotidie ad guttulas 30. cum cerevisia sumendum, quorum usu intra dies quatuordecim plenarie sanitati & rationi est restituta.

Tumores denique artuum, imprimis extremitatum eorundem, manuum scilicet & pedum, in quibusdam a morbo relicti, oriuntur a seri stagnatione, & coagulatione, & interne per resolutentia, incidentia, attenuantia, & diaphoretica sanantur. Externe vero applicanda sunt discutientes sacculi ex herbis aromaticis, penetrantibus, spirituosiss, salvia, lavendula, mentha, floribus chamomillæ, sambuci, & camphora, calide applicandi; ego magnam ad tumores tales resolvendos efficaciam observavi a spirituosiss, præsertim sequentibus.

℞: Sp. Vin. camphorat. ℥ij
olei Lumbricorum ʒj
Θ *ci. c. 4a parat. ʒβ. Mfc.

Quin & maximo cum emolumento ancillæ cuidam rusticæ commendavi linimentum.

℞. Ungti. nervini ℥j
Sp. Vin. camphorat. ʒiβ
Olei philosoph. ʒiβ. Mfc.

Hæc ipsa ancilla suavis mulierum rusticarum, applicuerat antea extremis tumefactis & dolentibus axungiam, qua currum rotas inungere solent rustici, maximo cum dolorum & tumoris incremento: obstructis enim magis magisque poris cutis a materia crassa, lenta, transpiratione partium istarum magis impedita, majorque humorum collectio in istdem facta fuit, unde aucto tumore & partium distensione, dolorum incrementum sequi oportuit: postquam vero unguentum istud rusticum removit, & absterfis probe membris laudatum nudo linimentum calide sæpius affricuit, dolorum remissionem & tumorum discussionem brevi experta est.

Z z 3

Atque

Atque hæc sunt ea . quæ de morbo convulsivo epidemio , in hæc terris hominum saltem memoria nondum viso , ejusdemque curatione , luci dare publicæ animus erat , partim ut Seculari solemnitati satisfaciam , partim ut proximo qualicumque hac opella inserviam : quamvis enim apud nos malum nunc plane sileat , fieri tamen facile potest , ut superveniente hiemali frigore iterum recrudescat , latiusque sese expandat ; aut ulterius progrediatur , & vicinas nostras infestet , præsertim cum anno superiori terris Megapolitanis idem hoc malum molestum fuisse , mihi affirmarint testes fide dignissimi . Fata autem nostrum omnium committimus Deo T. O. M. Cui pro cœlesti benedictione , qua conatus nostros elementissime hætenus beavit , sit laus , honor , & gloria , in Secula !



C C L V.

G. WOLFG WEDEL

ET AUCTORIS.

J. CHRISTIANI WOLF

DISPUTATIO.

De morbo spasmodico maligno in Saxonia, Lusatia, vicinisque
locis grassato, & adhuc grassante.

Jenæ 1717.

MORBI HISTORIA.

PRæterito anno post hyemem frigidam infecuta æstate & autumnno frigido humido morbus epidemicus multos homines miris modis, variisque symptomatibus convulsivis in Saxonia, Lusatia, finitimisque regionibus exercuit. Augusto, Septembri, cæterisque mensibus tragodia spasmodica acta fuit maximopere. Et quidem primo Tornavie rusticum quendam Veterum cum tota sua familia, ex septem personis utriusque sexus constante, excepto infante lactato, atque aliam foeminam Brunnerin cum filiis duobus Altenburgo Dubam venientem, Wittebergamque profecturam, & alium servulum in alienis ædibus equis & bovis pascendis a rustico Vandalo Kofak conductum, per diversas convulsionum species hicce vexavit effectus, alios vero Kofak domesticos, Venatoris Schumanni, rustici Kaisers, Krampens familiam mitius tractavit, dum affectus nominatus hunc vomitu, nausea, alium dolore capitis, alterum dolore præcordiorum, spasmo simplici corripuit.

Cum enim die 2. Sept. ex relatione Amplissimi Domini nostri præfecti *Johannis Caspari Maueri* perciperem, Veterum nominatum cum tota domo, aliosque in pago allegato Tornau morbo periculoso minaci affici, ratione officii statim promptum paratumque ad visitandos ægios
mo

me obtuli, si equus procuraretur: Quo facto die sequenti 3. Sept. illos variis spasms deprehendi laborantes.

Hunc enim tetanus, alium opisthotonos, ceteros emprosthotonos cum spasm cynico, strabismo, aphonia, doloribus cruciatissimis adeo affecit, ut si paroxysmus actus suos scenicos tragicos exerceret, vix sibi temperare potuerint, quin manus violentas sibi inferre, atque cultro vel laqueo, vel proiliendo in fontem ante fores constitutum vitam cum morte commutarent, dicentes: *wenn ihnen bey Zeiten nicht Hülffe geschaffet würde, müßten sie sich ein Leid anthun, indem es unmöglich länger auszuhstehen, es wäre als wenn Hölisch Feur im Leibe wäre, so brennete, und sobete es.*

Inquirens autem in causam hujus morbi diri, symptomataque gravissima, dicebant uno ore omnes, se nescire, cur tantis cruciatibus angrentur; frumentum æstivum materno (*Sommer- und Mutter-Korn*) manibus ab aristis privasse, atque hujus frumenti modiolum fulte tractasse, atque molæ immisisse, ut farinam ad coquendum panem nanciscerentur, ex qua farina aliquot panes coctos calide cum butyro comedisset, atque aquam frigidam superbibisset, quo die demum nausea, vomitus, dolor capitis atque præcordiorum secutus fuerit.

Miseris itaque hisce symptomatis cruciatis Apothecarium suavis vicini ad se vocasse, qui medicamenta diaphoretica fortiora volatilia liquida dederat, quæ ad nedium hausta in fenestra posita erant, inde vero ægroti antea ambulare adhuc atque negotiis suis fungi valentes peiores se redditos fuisse omnes testabantur, fortiori enim diaphoresi ad sudorem cogendos fuisse, se vero haudquaquam in lecto permanere per ordinatas ab empirico horas, atque sudorem expectare desideratum non potuisse, nisi in maniam vel delirium incidere voluerint, *sie hätten müssen narrißch drüber werden, oder wäre schon geschichen, wenn sie die Arzneyen fortgebräuet.*

Pater inter alia narrabat, quod ante paucos dies adhuc jumentis sylvam petere valuerit, licet nausea atque vomitus illum vexaverit, sed ab assumtis sudoriferis fortissimis, ceterisque medicamentis male se habuisse quam maxime, filiam aphonia post usum medicamentorum atque epilepsia correptam fuisse.

Quod cum æqua mentis lance hæc symptomata perpenderem, causam non æque huic frumento, sed alii communi ascribendam esse judicavi, inprimis cum *Thomam Willisium l. de Morbis convulsivis p. 103, 104. Gregorium Horstium in Oper. Tom. II. L. VIII. Observat. XXII. p. 422. de Morbo Convulsivo Maligno, & Epidemio, & in Cem. 10. Problematum Sympliciorum Quæst. VIII. p. 109. Tom. III. an spiritus pestilentialis eandem cum scorbutu curationem habeat? (quæ materia etiam in ejus Tractatu Germanico de Scorbutu p. 156. teutonice verba extat, &*

& in parte I. observat. ibidemque lib. I. *Epistol. medicin. sect. 3. tractata*) ac D. Johannem Dravissum de Scorbuto & quitem p. 72. Tit. II. de affectu scorbutico spasmodico, von der Schutbockschen Kriebel-Kranckheit in mentem revocarem, qui autores morbum convulsivum anno 1597. Haltsæ, Westphaliæ, Episcopi sui Colonienfi, & vicinis locis epidemicum optime descriperant, qualis affectus dicto Saxonico ut ovum ovo similis, quorum Lectorem Benevolum brevitatis causa ablego.

Mihi quoque non ignotum est D. Gottlieb Budaum, Medicum Provinciale Lufium de hoc morbo Consilium Medicum von der Krampf-Sucht, oder Kriebel-Kranckheit mense Januario h. a ex quinque plagulis, & postea D. Job. Christian Haberkorn Practicum Cameracensem, unvor-greifliche Gedanken von der Zube oder Nerven-Kranckheit ex una & dimidia plagella edidisse, sed cum unius etiam morbi plures possint esse causæ, & alia in Praxi præterito, hocque anno observare mihi liceat, atque, quod minime illi soli frumento hinc affectus in variis Saxonis locis grassatus adscribi queat, loco Speciminis Inauguralis de hac materia agere constitui, inprimis cum mense Decembr. Januar. Februar. Martio & Aprili hic morbus de novo affligerit multos, ex quo ulterius de causa inquirendum duxi.

Dubæ enim mense Januario & Martio Sutoris uxor nutrix 30. circiter annorum, salvo infante, licet unica modo mammilla lactaret, & intertum alii juveni lacte copioso gaudenti committeret, hoc morbo laboravit, quam quasi paralyticam prima vice sinistro latere ex usu vulgaris fudoriferi introducti pulveris cardui bene. cum rob. Sambuci (Füeder-Mutz) in larga quantitate sumti visitavi, postea spasmus hanc stationem reliquit, atque regionem dextram occupavit, ut flectere brachium, vel pedem nequiverit sine dolore summo, tandem modo in hunc vel illam pedem vel brachium malum se insinuavit.

Mense Martio uxorem doliarum ex usu allegati fudoriferi domestici 40. annorum hunc fere in modum hoc ~~malum~~ vexavit lecto quasi per 10. dies cum febre affixam.

Mense Martio rustici in pago Scene hoc malum æles adeo infecit, cum copix Saxonice, Regis Poloniarum & Electoris Potentissimi ex Polonia redirent, & nocte hospitia ibi quærerent, ut omnes post discessum militum ex Diaphoretico pulvere, quem aliquis Hagæ saxonum decens dederat, V. Snem vero dissuaserat, per dies 14. anxie decumberent, & cum nemo illos miseros, nec sacerdos ex metu contagii, quasi peste laborarent, visitatum iret, equus uno oculo cæcus esculenta & potulenta quærrens, cum nullus esset qui aliquid præberet, in fontem incidit atque obiit, cæteraque pecora fame fere perire, quod rusticus illius domus stupidus & quasi ebrius, auxilium meum anxie implorans, mihi denunciavit.

Disput. Medico-Pract. Tom. VII.

A a a a

Mense

Mense Aprili Cerevisiarii filia virgo 20. annorum mensum obstructionem legitime patiens hocce affectu spasmodico in pago Lausig correpta fuit, quæ nec micam panis hujus fecalis vel gustu vel oculis, ut cæteri omnes, percepit. In pago Gørslüz quoque mense Martio tota fere familia opisthotono corripì dicebatur, quæ vero meam opem non desideravit.

Sed cum alia exempla allegate supervacaneum esse ducam, & instituti ratio illud non permittat, paucis his præmissis ad rem ipsam progredior, divinum Numen amicitus precatus, ut omnia fausto eveniant.

DILUCIDATIO.

Morbum spasmodicum rarissimum in Saxonia epidemicum malignum consideraturi, explicandum esse judicamus, unde derivetur, & qualis sit hicce affectus.

Græca esse nomina spasmodicum, epidemicum, quilibet tyro Medicinæ facile videbit. Vocabulum vero spasmodicum convulsivum *ἀνὰ τὴν ἐνάλῳ* sive *ἐν τῇ τράβη*, contrahere, epidemicum vero contagiosum ex *ἐν* supra & *ἐν*usce populus dicitur, *allgemein ansteckend*, contagios, uti fere dysentericæ epidemicæ malignæ, Pestis, cæterarumque febrium malignarum genius esse solet,

Sciendum vero est, maximam differentiam esse inter dysenteriam epidemicam malignam, *die Contagiose Rote Ruhr*, & inter *der Contagion oder Pest selbst*. Novimus hinc confusionem hoc nomine ortam, cum medicus prius pronunciaffet, nec distinxissent, quos docebat, & contagionem putassent pestilentem intelligi, & de urbe prædicari, donec meliora ab aliis doctioribus edocti essent.

DEFINIRI potest hic morbus, quod sit affectus epidemicus, seu communis pluribus, a causa communi, speciatim miasmate maligno contagioso scorbutico, nervis inimico, acido, bilioso, putrilaginoso, irritativo constante, non nunquam absque febris, nonnunquam magis cum eadem.

Supra citati autores *Drabiti* & *Horsius* hunc affectum germanico nomine insigniunt *die Kriebel - Kranckheit*, *Krampfssucht*, *Ziehende Seuche*, recentiores vero *die Zerbe - oder Nerven - Kranckheit*, *den Krümmer*.

Hocce vero malum reveta epidemicum malignum esse testatur allegatus *Horsius l. c. p. 422. Cap. 1.* De natura & causis morbi convulsivi, quando illum morbum spasmus pestilentialem intemperiem contagiosam nervorum & tendinum ex veneratis mucilaginis & vaporibus provenientem nominat. Consentit & *Drabiti* p. 99. *diese Kriebel Kranckheit ist ansteckig*, inquit, *und können die Gesunden von den Kranken leicht angesteckt werden* &c.

Hiero-

Hieronymus Reusnerus Nordlingensium Poliater de Scorbuto exercit.

I. morbum hunc per agitationem convellentem ex peltilentibus ichoribus, & malignis vaporibus nervos vellicantibus scaturientem definit.

Diximus autem in historia narrata, quod varix species convulsionum in ægrotis visæ fuerint. Tetanus enim aliquos cum aphonía adeo affecerat, ut instar mortui, vel ligni recti jacerent, sicuti unicuique foeminae Altenburgensis filius a matre in hypocaustum ex camera altioris contignationis in linea recta extensus quasi mortuus portabatur, *Er starrete gleich hinweg wie ein Scheit Holz, und war ganz steif*, qui puer Wittebergæ postea obiit, neglecta cura, dicta, & V. S. ne, qualem tragediam etiam ludit cum supra dicto servulo rustici Koslaks 14. annorum, sine sensu & motu in stragulis circa fornacem *asping*, cum lethargo per aliquot dies jacente, & si iste se mente paululum colligeret, alvum expositurus, vel urinam emissurus, a domesticis, instar mortui distenti ante fores trahebatur.

Est vero TETANUS, quando corpus & cervix erecto positu riget, nec ullo motu seu versus anteriora, seu posteriora fl. cti potest, sed motu tonico, quem vocant, quamvis & in reliquis visendo, in eodem statu rigido consistit, qui affectus est pessimus, quia ex emprosthotono & opisthotono componitur, in illoque singuli musculi ante & retro hominem trahentes corripuntur.

Emprosthotonus præcipue puellam sex annorum cum aphonía, strabismo & spasmō cynico cruciabat per dies multos. *Es bieget ihr dieser Affect den Leib zusammen wie einem Sprengel, oder einen Reiff, & lecto insidere cogebatur, cum ceteri ad minimum, si paroxysmus scenam in theatro humano interdum mutasset, pedibus ire atque loqui, sed cum stupore & quasi ebrii possent. Sie saßen ganz stutzigt, und thum aus, als wenn sie sehr voll getruncken, oder in vielen Nächten nicht geschlossen hätten.* Prima vero species convulsionum est *incurvatus*, quando antrosum ejusmodi contractio fit, incurvata versus anteriora spina dorsali, & capite, ut mentum v. g. pectori incumbat, & tensis simul artubus. Huic contrario modo fit *incurvatus*, ubi iisdem partibus versus posteriora seu arcus incurvantur affecti, ut scapulis incumbat caput, simul quoque artubus eodem modo ex parte Germ. *Er wirft sie in die Höh, daß ein Knabe, oder ein starker Kerl unter ihnen durch kriechen konnte.*

Spasmus Cynicus vero est convulsio oris, ut etiam os claudere puella hoc affectu laborans non potuerit. *Sie sperrete das Maul auf, und konnte es nicht zumachen.*

Strabismus autem dicitur spasmus oculorum, torvi erant puellæ oculi atque rubicundi, ex motibus spasmodicis epilepticis (*sabte ganz febr. gräßlich, und grehmisch aus*) cum aphonía aspectum mirabilem

A a a a 2

repræ-

repræsentabat ista puella, ut terrorem atque timorem incuteret spectantibus.

Aphonia vero est convulsio linguæ, sive privatio loquelæ, ex a privativo non, & *non loquor*, ut velut muti viderentur & nimirum sermonis expertes.

Quemadmodum autem in Theatro actus scenici variantur; ita etiam in his personis theatrum humanum repræsentantibus variatio symptomatum atque specierum convulsionum in spectaculo tristi per lucida intervalla per multos dies observata fuit.

Spasmi ab aliis varie denominantur vel incompleti, quamdiu segniter, tarde, oscitanter obrepunt, & in fibris nerveis tantum sigillatim exercentur, earumque tensione & vibratione dolore illos acutos lancinantes, imo rumpentes veluti excitant & dolorum faces accendunt. *Es ist ihnen, als wenn alles drinne zerreißen sollte, und ein Feuer oder Licht drinnen brennte.* Vibrativos vero incompletos, contumaces, atque rebelles spasmos illos dicere possumus, quando non æque uno eodemque momento contrahunt, sed quasi motu tremulo fluctuante succussatorio micant, & veluti ex diastole & systole constantes inferunt ægrotis sensum interpunctorium, seu lancinatorium, formicatorium, ut conquerantur ægri de cruciatibus summis. *Es steche, sechte, wüte, poche, und tobe in Gliedern, als wenn eine Sege hin und wieder gezogen würde und Ameisen hin und wieder marchirten.*

Spasmodicus hicce morbus porro dolorem excitat lancinatorium, terebrantem, tremulum quasi scissilem & acicularum vibrantium instar. *Es reißet, zerreißt, sticht, tobet, grübles, zuckt, zittert in ihren Gliedmaßen.* Sunt qui vocem spasmi, per vocabulum Convulsionis minus recte exponi putant, & rationem afferunt, quod vellere motum impetuofum quandam repentinum iusta vocis acceptione designet; tanto magis vero convulsionis vox & convellere, & impetum similem & effectum omnino majorem vulgo exprimeret.

Tandem datur & spasmodicus morbus magicus dæmoniæ, per magiam illicitam, a malis hominibus mediante diabolo procreatus. *Dravisius c. l. p. 92. ex Fernelio de additiæ rerum causis Lib. 2. exemplum juvenis adducit, qui tertio mense Græce & latine locutus est, quam linguam nunquam didicerat, & arcana multa adstantium & Medicorum propalavit. Aliud videri meretur apud Zacutum Lusitanum in Praxi admiranda 7. 3. c. 139. p. 140. Morbi autem trans naturam, reinediis trans naturam curantur, ut graphice post Fernelium disseruit Cerverius ad libros Galeni de loc. affectu disp. 37.*

Casum Tragicum etiam producit *Dravisius p. 93. in Scenam Wittebergensis textoris filii 13. annorum, qui per quatuor annos a Chirurgis frustra tractatus fuit.*

Caven.

Cavendum vero est quam maxime, ne statim affectus nominati, vel alii morbi chronici rebelles cum empiricis deceptoribus pro incantatis habeantur, quo de plura legi merentur apud Dn. D. Westphalum Practicum Medicinæ Doctschii Celeberrimum, in Pathologia dæmoniaca.

CAUSAS quod attinet hujus morbi spasmodici, variz a variis traduntur, de quibus optime laudatus egit *Willsius de morbis convulsivis*. Hippocrates 6. Aph. 39. nominat quidem *πλησυν, & κενωσιν*, repletionem & inanitionem, sed mediatas illas magis. Hodie enim irritationem rectius vocamus IMMEDIATAM illam omnis convulsionis, tum tonicæ potissimum hujus nostræ, *τῆς* constantem, tum clonicæ, seu epilepticæ, in quam tamen in quibusdam quoque abiisse visa est.

Unde SUBJECTUM primarium sunt fibrillæ nervæ, una cum spiritibus animalibus, qui æther simul impenfus corporis cum corde & cerebro attendendi quam maxime, seu universum nervosum genus potius. Alii acrimoniam sanguinis & humorum agentem in genus nervosum. Alii ex recentioribus abundantiam sanguinis & statum spongiosum elasticum corporis pro causa efficiente materiali accusant, talem sc. in quo sanguis quantitate in poris musculorum ac meatibus continetur ac incedit, vasa vero habeat admodum angusta, exilia, unde majori pressione habet opus.

Acidum vaporosum, biliosum, scorbuticum, elasticum in infimo ventre peccare, & fomitem in ventriculo, mesenterio, hepate, liene hære, & gas elasticum venam portæ ingredi, atque succum nervosum cerebrum inquinare statuimus. Succus enim nutritius hicce nervorum corruptus sensum fornicatorium sæpissime prima vice excitat, quia liquor iste a miasmate maligno infectus statim animales spiritus supprimit quasi, ut expandere & diffundere se nequeant. Si vero liquor nervosus morbo ingravescente adhuc magis pervertitur in sua crasi, & nobiliora loca afficit, spasmos producit variis generis.

CAUSÆ MEDIATÆ PROXIMIORIS vicem sustinent HUMOROSÆ, & VAPOROSÆ, lymphæ, bilis, sanguis, plethora & cacochymia, imprimis acida, scorbutica, & status omnis generis, quantitate, qualitate, & motu varie peccantes.

Inter CAUSAS MEDIATAS REMOTIORES vulgus quidem frumentum illud æstivum cum materno conjunctum (*Sommer- und Mutter-Korn*) rore nebuloso venenato (*vergifteten Mehltau*) im prægnatum pro vera causa exclamavit, quod alii etiam non æque ex stirpe minorum gentium oriundi putarunt. Neque hoc plane omni reatu absolvi, absolute vero & unice minus id accusari potest. In se insons est; quotannis enim id enascitur quoque, & innoxium plane est, imo nonnullis quoque inter ipsa remedia refertur. De hoc latius

legi meretur & curiose agens *D. Johann. Brunner in Ephemerid. Acad. Nat. Curios. Decur. III. Ann. 11. Observ. 224. p. 346. & Claudius Deodatus panth. hygiast. l. 2. c. 21. p. 135.* qui tamquam secretum ad hæmorrhagiam & quancunque sanguinis e vulneribus effusionem sistendam commendant, in passione hysterica, & partu difficili vero a *Joh. Stocker. in Prax. aur. l. 1. c. 17. Job. Wittich. in Vade Mecum (oder teutschem Arzeney-Buch.) part. 1. pag. 137. Job. Schröder in der teutschen Pharmacop. p. 1140. Vide Riedlin. de Medicam. simpl. p. 48.* Interim certis calibus, annis & locis potuisse illud concurrere, vix negandum fuerit, quot & relatio superior confirmat

Referri potius huc merentur alie quoque reliquæ, nominatim ex NATURALIBUS TEMPERAMENTUM humidum, frigidum, melancholicum, biliosum, phlegmaticum, serosum, AETAS, SEXUS & alia disponentia.

EX NONNATURALIBUS, vero primo loco ipse ABR instar omnium est, & elogio Divini Senis *l. de statibus c. 4. t. 9.* maximus in omnibus, quæ corpori accidunt & autor & dominus, seu potens, inprimis ut ex ipso ulterius philosophemur, quando, ut hoc quoque nostro loco, ob summam communionem cum corpore humano præsertim, *memorandum: veniens præterea in ea, quæa ledit, morbidis sordibus in corpus se ingerit, seu quædam præterea membra in ea constituta sunt, extrinsecum, ab ære immixto infuso calori.*

Et si causas non naturales morbi convulsivi maligni consideramus, qui anno 1797. Hassiam cæterasque regiones infestavit, dicit *Horslius l. c.* qui locus insignissimus est commentarius hujus nostri morbi: Causas hujus affectus quod attinet, ægrotantium relatione scire licet, quod externa causa communiter in alimento, ad nutriendum minus idoneo & improporcionato, consistat, dum pauperes rebus ad vitam necessariis destituti panem impurum & male coctum longo tempore in summa famis urgentia devorant, interdum etiam poma acerba & austera, fungosque & similia deglutientes, se edulibus crudis, immaturis & astringentibus ingurgitant, de quorum depravata concoctione cruditates obortæ, & circa mesenterium, ventriculum, jecur, ac lienem collectæ, a partibusque nutriendis, ali nenti instar ob insatiabilem cupiditatem & intensissimam famem, attractæ, specificam tandem & malignam corruptionem inducunt. Ex cujus minera & fonte pestilentes vapores quandoque erumpentes, nervosumque genus impetentes, vim nervorum motricem ita irritant ac incitant, ut membra primum motu convulsivo agitantes, formicatum instar, vellicent, ac stimulent, quæ lucta non difficili neque sigesti, sed adhuc forte prævalentes in intimos usque nervos se insinuant. Quo facto membra, cum truculenta morbi & doloris exacerbatione mirum in modum incurvantur, & extenduntur, ac consequenter penitus convelluntur; nonnunquam etiam

morbus

morbus Hercules producit, tandemque ægrotantes adeo pessumdantur, ut vel paralyti, artuumque contractione, vel delirio ac velut mentis stupore corripiantur, ac iisdem longe detineantur.

Negandum autem non est, panem non bene coctum, atque calidum, vel placentas calentes, nauseam, vomitiones, dolores ventriculi, capitis, imo mortem in aliquibus dictis personis procreare potuisse, cum experientia, & *Casp. Hoffmanno* teste *Instit. med. Lib. V. C. VI. §. 6. p. 669.* panis calidus sit deterimus, quia continet multas fumidas exhalationes, unde sitis, inflatio ventriculi & hypochondriorum, dolor capitis. Quamque noxam panis iste calidus sequiori sexui inferat, aliisque, quod sæpius vitam cum morte mutaverint, exempla multa sunt in promptu. Et ita panis calidus primus magna cupiditate sumtus & potus aquæ largus frigidiæ impuræ haustus, cæteris male se habentibus, facile damnum inferre potuit, & jam olim divus *Cæsar* noxam hujus panis calidi de victus ratione in acutis observavit.

Notum etiam est cuique, qua aviditate, & desiderio tempore messis quilibet sibi optet panes calidos novorum frumentorum comedendos cum butyro, vel sine isto, & quod delectamentum sæpius exinde sentiant istæ personæ lautioris victus etiam, inprimis sexus sequioris: quo quæso desiderio & appetitu capient rustici nostri, quibus res angusta domi est, & laboribus quotidianis gravibus, frigori, æstui solis obnoxii, apud quos mala victus ratio, licet nulla fames, quod Deo laus sit, apud nos fuerit audita, uti apud *Gr. Horfium* c. l. querela est maxima.

Mentionem occasione frumenti hujus supra fecimus apud *JOH. CONR. BRUNNER*, qui quoque ipse panis calidi noxam affert: Mulier ad me adducta *inquit*, a chirurgo, lithotomiæ haud imperito, conquerebatur de convulsionibus quotidie circiter undecim recurrentibus: eadem monstravit manuum digitos, extremitatibus quasi adustos, emoriuos, rigidos, & induratos, sensus motusque expertes. In causam tam stupendi pathematis inquirens, a chirurgo cum stupore didici, degener illud frumenti genus esse causam, quod incohe sylvæ non tantum convulsionibus tententur miris, sed & extrema spachelo emoriantur, nec facilius hæc accidere, quam pane retens ex clibano extracto, calente adhuc comesto; noxam non tam facile percipi, siquidem refrigerat, & situ siccetur. Falsa est mulier, se scribitam (*Diemen*,) vocant calentem comedisse, indeque luere malefuada fame. Illud fecale æstivum maternum vero citatus Autor. c. l. per cornicula nigra describit: Degeneravit quoque fecale, & loco granorum alimentarium protulit cornicula nigra, grana fecalis degenerantia; quæ experti in sylva hercynia, qua tunc temporis ægebam, *Martini-Korn*, vocarunt. Dicitur alias germanice in quibusdam locis, *Korn-Mutter*, *Korn-Müttergen*, *Meel-Mutter*, *Todten-Kopff*.

Ex

Ex CAUSIS PRÆTERNATURALIBUS instar omnium est SCORBUTUS, qui novam quasi Pathologiæ medicæ faciem intulit, unde merito primum sibi vendicat suo comitatu, & latente etiam sæpe putrilagine, ac insidiis, unde ad hunc quasi reliqua possunt referri, hic dicenda.

Reliquarum causarum ordinem una CONTAGES supplere potest. Hincetiam id peste, dysenteria & similibus ut plurimum a sorditie, militia, incuria morbi ejusmodi incipiunt, sorditie crescunt, & ad *anquam* deveniunt, donec stragem edant insolitam, separati vero melius curantur, & sic contra ire licet magis.

Valeat & hic *et dicitur* Hippocraticum adeo, ut & manifesta sæpe sit alteratio, & inæqualitas aeris, quoad qualitates primas & secundas morbifica illa quam maxime, & sæpe tamen fallacia non causæ ut causæ committitur. Vix est dysenteria epidemica srevissima sæpe, ubi tamen fructus summe nocivi putati æstivi plane fuisse innoxii, & nullo modo accusandi, solo calore æstivo majori bilem exacuante, & acrem sanguini conciliante.

Hinc novimus sæpius in dysenteria epidemica maligna fructus horæos, pruna cerea, cucumeres, aliaque a magistratu tanquam causas procarnificas gratis prohiberi, vidimus enim in dysenteria epidemica maligna lenensii, Dübensii aliisque plurimos mortuos, qui talibus fructibus non usi fuerunt, cum interdum iste affectus contagiosus etiam detur, licet nulla pruna cerea, vel alii fructus horæi inveniantur, vel comedantur. Observare etiam nobis licuit in peste bovina, quæ præterito anno in Saxonia, Dessavienisque tractu in boves ac in vaccas irrepit, contagio affectos fuisse boves atque mortuos, licet domi in stabulis detinerentur, ne gramen atque brassicas rore farinaceo *Mehl oder Honigtau* maculatas deciperent, sed hæc *ut dicitur in prælo*.

Signa DIAGNOSTICA quod spectat, ratione GENERIS, præter hæc: nus jam dicta, & oculis obvia, vix opus est plura attingere. Ratione SUBJECTI specialis iidem, utri hæmorrhoidum, viscerum, & CAUSARUM, facile fuerit ex dictis eruere reliqua.

Quod vero attinet PROGNOSTICA, dubia quidem moveri possunt, si separatim febres acutas, & convulsiones acutas consideremus, & chronicas, utraq; enim dantur, & conjunctas. Absque febri morbus hæc convulsivus chronicus fere est magis; cum febris vero acutus magis, & ut plurimum lethalis. Tale enim additum tali, reddit illud magis tale, unde vel unica hæc notio specialis magis contagiosam, magis lethalem reddit, & definit. Tetano vidimus puerum 9. & alium 4. annorum, licet XIV. dies supervixissent, mortuos; Alius vero evasit.

CURAM tandem proposituris fons triplex se offert, sc. diæteticus, chirurgus.

chirurgicus atque pharmaceuticus, si prius METHODUM MEDENDI paucis debemus. Si ullibi enim, in morbis epidemiis & malignis hacce opus est, innixa indicationibus debitis, quæ uti non æque obviæ & sic obscuræ magis sunt; ita facile prius quamplures perire assolent, quam patescant remedia indicata.

Penitatis itaque dictis probe INDICATIO CURATORIA acrimoniam irritativam omni modo dissipandam & demulcendam indicat, imprimis per bezoardica & nervina appropriata.

PRÆSERVATORIA fermentum & putrilaginem acidam scorbuticam invertendam & debellandam attendere jubet; VITALIS roborandis nervis & visceribus invigilat & symptomatibus urgentibus. Hinc ex DIABETETICO fonte commendatur vltus tenuis, juscula avenacea, decoctum hordei cum radic. scorzon. atque rasur. CC. & serum lactis magni usus; yinum & cerevisia minus suadenda, cum calorem & morbum magis augeant.

Fons CHIRURGICUS vero non negligendus, & statim V. S. quæ optimum in hoc morbo, præmissis evacuantibus est remedium, instituenda in brachio, mediana, vel saphæna in pede, si menses suppressi adsint, in momento enim omnes ægroti levamen sensere dicentes: *Es sey ihnen doch gar so wohl ums Hertze, als wenn sie neu geboren wären.*

Wallis quoque sæpius laudatus l. c. p. 104. qui ægritudinem Westphalorum hanc simili prorsus typo insignitam, non raro apud se excitatam, & per totas familias, saltem in pueros & juniores grassatam, novit, me fecit alacriorem, ut secundum ejus manuductionem V. S. suaderem p. 120. dicens: circa febris hujus initium sanguinis missio fere omnibus convenire videbatur.

Hoc remedii genus sæpe in parvulis cum fructu expertus sum: quippe hoc modo cruoris massæ tacite ac cooperte effervescenti. fuliginisque suas in partes nobiliores spargenti, spiraculum quasi aliud aperitur, pruindeque efflorescentiæ ejus impuræ a cerebro & pulmonibus avertuntur. Quanquam igitur hæc febris mali moris aliquatenus maligna audiat, attamen in quantum sanguis hunc statim coagulari, sed fundi nimis & ferositates suas in partes nobiliores, nempe cerebrum & pulmones suggerere aptus fuerit; idcirco phlebotomia, modo in principio morbi celebretur, fere nulli non convenit. Speciatim servulus quoque boum præter spem in integrum unica V. S. ne a tetano restitutus est.

In stupore majori commendavimus VESICATORIA, emplastrum cantharidum cum empl. alb. cocto, ex præscriptione Wedeliana, ut materi peccans eo melius & diutius efflueret. Enimvero, si decenter id fiat, nec excedatur in applicatione, debito præbio & loco, non

Disput. Medico-Pract. Tom. VII.

Bbbb

dici

dici potest, quam salubriter se gerant, nec acrimonia majori ullam noxam inferunt.

FONTICULI quoque & scarificationes in^o malo rebeli, mania, delirio, stupore, lethargo licum habere possunt, chronico imprimis magis malo.

Ex **PHARMACIA**, purgantia *διυ, ή καθαυ.*, & imprimis vomitoria, statim a morbi principio, adhibenda. Hæc enim non modo coctionis primæ viscera evacuant, adeoque morbi fomitem primum & originalem subducunt, verum insuper a sanguine serositates emulgent, adeoque purgamenta ejus potius in stomachum & intestina, quam in caput, aut pulmones suggeri faciunt.

Una porro ab emeticis glandulæ, lymphæ ductuum exceptrices, cum successione magna vellicantur, ac succi nervosi superfluitates, ne cerebrum ejusque appendicem male afficiant, in viscera inferiora magis exprimuntur. Et in hunc finem crebro enematum usu alvus continuo soluta teneatur, *Willisio* sapiens laudato monente.

Curam Westphalorum, Halorum anno 1596, Academia Marpurgensis in Consilio medico germanice descripsit, quod consilium *Gregor. Horstii* post triginta annos, cum de novo hic morbus in Hælia grassaretur, in latinam Linguam transtulit, atque suo operi supra allegato inseruit, quæ tota cura ex Electuario purgante *Kriebel-Lawerge*, Antidoto convulsivo *Kriebel-Theriac*, & pulvere convulsivo *Kriebel-Pulver* constat, quorum lectorem ablegamus; quanquam *D. Drabitiu* l. c. p. 109 fateatur, Marpurgensium medicamenta omnibus non æque profuisse, & alia querenda.

Inter emetica laudem hodie meretur *radix Ipecacuanha*, de qua vid. *Disp. D. Præsidii*, cum *rhab. Alexandr.* vero: *pulsus* item *laxat. veget.* cum *tartaro resoluto* & *cimabari nat.*

Ex universalibus faciunt huc & **DIAPHORETICA**, ex quibus cumprimis antimoniatæ excellent: *ḡ. Diaphor. ḡ bezardicum minerale, martiale*: ex **DIURETICIS** **SUCCINATA**, essentia succ. volatilis, Sal succini volatile, & salia alcalia, & alcalina ipsa. Reliqua ut **ALTERANTIA GENERALIA** & **SPECIFICA**, bezoardica, scorbutica, nervina & stomachica, & quæ inter hæc partim in usum traximus, partim addi possunt, fuere sequentia: *Essentia Antimonii, liquorum viperina, scordii, serpentaria Vurgimiana, trifolii fibrini, castorei, carminativa, absinthii composita, tinctura bezoardica essentificata, mixtura simplex per mixtionem & destillationem parata, antiscorbutica, essentia cephalica, theriaca culestræ, liquor cephalicum, cornu cervi succinatus, tinctura corallior. & alia.*

Ex solidis species *diapnon. Specificum cephalicum Michaelis, cimabari nativa, pulsus epilept. Marchion. de chelis canceror.* Londinens. *Lapis de*
Cœn,

Goa, ut decocta & simplicia, cephalica, & cordialia, pulveres bezoardicos taceamus quamplures, & cordiales quoque. Huc referri possunt imprimis etiam martialia.

Non audiendi sane sunt, qui hodie denuo horum virtutes habent suspectas, cum sint omnino ex præcipuis, cum & sine antiscorbuticis, prout vel acidis, vel alcalicis debita salibus, edulcandi, absorbendi, roborandi & demulcendi usibus conspicua.

Extremorum locum tenent balsamum & unguentum spasmodicum mynsichti, spiritus paralyticus ejusdem, lumbricorum, formicarum, cornu cervi. Eis & ei. unguentum nervinum, martialium.

Colophonem addit accommoda ДИѦТА, sine qua frustranea sunt omnia. Vitandus AER frigidus, & humidus, inæqualis, incuria, & negligentia, Imo & amuleta & periapta non sunt de nihilo, ex radice paonia, diſſamno nostrate, radice plantagini, colchici, ungula alci, & cura publica ac politica pauperum.

Ex annonæ eorum caritate morbi epidemii ut plurimum radicem sumunt & incrementum, quamobrem divitiæ operæ debent esse in ejusmodi calamitatibus publicis. Non una cura sufficit medicorum, sed Magistratus & rerum-publicarum, omnium interest.

SOLI DEO LAUS, HONOR ET GLORIA.

CCLVI.
IVONIS JOANNIS STAHL

ET

FRANC. JOS. ERBENI DE SCHOENERBEN,
DE RANULA

Sub lingua speciali cum casu.

Erford. 1734

P R Æ F A T I O.

UT ut nobilis hominis vita , atque jucunda generi humano sanitas est , ita seve quotidie tela struuntur vita mortifera , fabricantur indies ingrata integræ constitutionem corporis latentia arma , quæ tam multifaria sunt , ut undique tum ab in tum extrinseco orta , aut e corpore non mature propulsa , conspici valeant . Nam & ea , quæ alias in statu natæ ali constituta nobis vitam & sanitatem conservant , sæpe hostili manu nos invadunt , interitumque minantur , ut sunt omnis generis humores utiles hauriunque fons & origo , ipse sanguis generatim sumtus . Hic enim quam primum deviat à sua quantitate siquæ naturæ onerosus , exoritur simul corpori multosus , elaboratur in propriis thalamis insidiosus sanitatis & haud raro vitæ hostis . Dum itaque hic succus vitalis aliis cum liquoribus laudabilibus tum prædictis , tum aliis distinctis modis , in motibus & qualitatibus constitutis , thesaurum vitæ , sanitatem nempe , ipsiunque fontem hujus thesauri , vitam videlicet , nobis auferre potest & solet : quid cogitandum erit de ipsi causis toto genere præternaturalibus , nullo modo spectantibus ad ipsum vitalitatis nostræ statum quæ in propria machina corporea animata generata , & ut feroces bestie illam infestant , ut sunt vermes : hi enim in illam malis in partibus ita seviunt , ut illam inanivertant , per mortem ab illa proliam , efficiant . At similem causam spectant quoque caleni , quorum enervitatem in multis partibus productorum corporis humani adhibere supervacuum mihi videtur , æt amici memorare liceat sedens , qui gene-

ratas

ranus fuit paucis temporis spatio sub lingua, atque produxit ranulam. Esi-
nam jamdum proferunt variae ranulae calculosae observationes, cum tamen que-
dam distincte circumstantiæ concurrerint, ut infra dicitur, hinc pro themate
inaugurali hanc mihi elegi materiam. Faxit D. T. O. M. ut hic Aca-
demicus labor in Divini Nominis gloriam vergat!

§. I.

Ranulam suam etymologiam in scholis medicis accepisse ab animal-
culo fluviatili aut potius paludoso, *Rana*, extra quidem contro-
versiam est, ob quam vero rationem, inter se nondum cuncti auctores
in totum conveniunt. Nam Riverius in suis operibus *Prax. Med. L. V. de affe-
ct. linguae* Cap. II. fol. 211. ait. ideo dici ranulam nostrum affec-
tum, cum hic similis sit partibus posterioribus ranæ. Alii derivationem
desumunt ranulæ à ranæ capite, quod huic similis sit, & præsertim
ajunt, ranulam convenire cum ranæ intumescencia illa molli cutanea,
quæ sub maxilla ejus inferiore in respiratione contingit. *Fonsæca* plane
statuit observari in ranarum ore aperto similem tumorem, ut ranula
sub lingua exhibet. Quibusdam placet derivationem desumere a diffi-
cultate loquendi, quæ observatur in iis, qui ranula sub lingua affecti
sunt, ut quasi instar ranarum coeant; at difficultas loquendi & in-
volubilitas linguae etiam in aliis morbis, tum linguae, tum faucium,
deprehenditur, hinc non solum ranula affectis hæc, sed etiam aliis mor-
bis detentis adscribi valet, per consequens ab hac ranulæ denomina-
tionem, aut derivationem formate non integrum mihi videtur. Qua
de causa illi potius subscribo sententiæ, quæ comparisonem facit ra-
nulæ cum supra adducta intumescencia sub maxilla inferiori inspiran-
tibus ranis, quæ etiam, si probe considerentur, non abinimilis est
ranulæ sub lingua. Possumus etiam favere menti *Fonsæcæ*, si ita res
se habeat. Celeberrimus D. D. *Joan. Erhard. Donaver* omnes has ety-
mologias vilipendit & derivationem desumere cupit ab ip'a lingua,
quod videlicet tumor, ranulam sub lingua denotans, sit quasi alia lin-
gua adjectiva, sedem habens sub lingua, hinc denominat hunc tu-
morem *Hypoglossum*, ut in *Miscellan. Physico-Medico-Mathem. Erford.*
conspicitur ejusdem observ. anno 1729. classe IV. articl. 5. von dem
sonst *Ranula*, aber von *Hippocrate accuratius Hypoglossum* Benannten Münd
Gewache. Ideo etiam ab aliis antecessoribus latine *Ranula* vocatur
lingula, quasi lingua parva, sive minor. Græcis audit *Rana* *βάρανος*,
unde Latinis etiam dicitur *Barbarus*. Ab *Hippocrate* quoque *L. II. de
morbis scil. V. fol. 471.* interprete *Foesio*, *Hypoglossis* intitulatur, ubi
dicit; si *Hypoglossis*, aut *tuberculum sub lingua* oritur &c. derivatur
B b b b z. enim

enim ab *ivó* sub, & *»»»»»* lingua. Leguntur etiam plura synonyma in *Dissertatione inaugurali de Ranula sub lingua* S. T. Celeb. *Rudolphi Wilhelmi Krausii*, ubi *Ranula* etiam appellatur *Ranunculus*, *Caruncula*, *Nodus*. Germanis *das fröscklin unter der Zunge frösch*, *die Kröte*, *ein Schwamm*, oder *Gewächs unter der Zunge*.

§. II.

Ranula est tumor sub lingua circa frænum, vel in utroque latere, vel in uno tantum, vel in medio, major vel minor, mollior vel durior, primarius vel secundarius, benignus aut cancrifus, sepiissime tunicatus, ab in eo varia contenta materia proveniens, respirationem, suctum, deglutitionem & locutionem plus minus lædens.

§. III.

Ranulam esse tumorem, sub lingua inter membranam dicti loci formatum, est extra dubium, attamen in hoc variat, quod nunc grandior, nunc minor observetur, & quo magis in hoc a semet ipso discrepat, eo etiam majorem vel minorem adfert molestiam in deglutendo, respirando, loquendo, sugendo. Hinc quandoque pisi, ciceris, fabæ, castanæ magnitudinem æquat: vid. *Riverius* citato loco. Contingit vero etiam sæpe, quod multo grandior evadat, ut fere penitus deglutitionem & respirationem aboleat. Quale exemplum habet *Tulpus observat. med. l. I. cap. § 2*. vid. *Aguapendens in operibus chirurg. citat. miscellan. Physic. Med. Mathemat. Erford.* ubi tumor recensetur instar ovi gallinacii magnus.

§. IV.

Est quoque hic tumor differens ratione attactus, hic enim, dum materia repletus est mucosa & viscida, aut mellaginea, tum quoque mollior est, eo, qui in se continet materiam tophaceam, aut calculosam; de materia viscida, aut mellaginea vero ut plurimum constare solet, rarius reperiuntur, interim tamen prostant exempla, tophi, aut calculi in eo, qualia collegit *Schenckius observ. 388. L. 10. & d.* monstrat in *A. N. E. observatio 144. Decur. I. An. IX. & X. à D. Samuele Ledelio communicata, de calculo sub lingua*. Nec aliud in *Misc. Physic. Med. Mathemat. Erford.* Observatio *D. D. Crameri An. 1727. mens. april. class. IV. artic. §. a Celeberr. D. D. Jo. Hartmann. Degner.* clarior reddita, videre licet; ut & nos hujus Celeberr. viri elegans observatio, de calculo sub lingua, citato loco possibilitatem calculosæ concretionis sub lingua docet. Et cum hæ observationes multum cum nostro

nostro casu conspirent; hinc eundem subjuncturus sum. Etsi in prædictis casibus prioribus, *Crameri* nempe & D. D. *Ledeli*, cum lo.us specialiter non allegatus sit, nondum certi sumus de vera Ranula, interim sufficiat nobis. possibilitas similis concretionis compactæ in dicto loco.

§. V.

Non abs re dixi, dari hunc tumorem sublingualem quandoque primarium, quandoque secundarium; illum enim esse statuimus, qui absque omni alio morbo prægresso contingit; secundarium vero eum appellamus, qui alium præcursorem morbosum habuit; ut in adductis observationibus factum est, ubi utrumque calculum præcessit inflammatio anginodes: Ita quoque nostro in casu, quem mihi communicavit *Exceil. Dn. Præses*, alii præcesserunt morbi, quos excepit *Ranula*. Subjectum erat præter propter aliquot viginti annorum, sexus melioris, temperamenti Phlegmatico-melancholici, faciei subtumidæ, vitæ sedentariæ magis, quam laboriosæ deditum; hoc enim 15. Septembris ann. præterito incipit conqueri de furunculo sub axilla sinistra, huic apponitur emplastrum diachyl. simpl. cum in finem, ut suppuratio contingeret, quæ etiam intra biduum aut triduum secuta est; aperto adhuc hos ulcere corripitur otalgia spuria, cui opponebatur ess. alexiph. stahl. c. liqu. C. C. Succinat. hæc duravit per 7. dies, fluente adhuc materia e non nato ulcere, tandem illa evanuit & commutata est in ranulam sub lingua in medio & quasi basi frænuli, aperto adhuc ulcere. Accersit chirurgus, videns hunc tumorem, nesciebat quidnam hic significaret, desiderans ab excellent D. Præsid. consilium, cui ab eo dictum, esse ranulam, qua de causa intrinsecus remedia resolventia interim adhibita fuere, extrinsecus vero chirurgus proprio motu meliorum cum unguento ægyptiaco applicavit; erat vero hic tumor instar minoris castanæ, aut præterpropter majoris nucis avellanæ, juxta chirurgi relationem; hanc ranulam comitabantur per biduum dolores gingivarum, loquendi & deglutendi difficultas; tertio die, dum patienti hic tumor molestus est, comprimit sponte cum duobus anterioribus digitis, quo facto prosilit lapillus, totus albus, friabilis, levis & tamen laevissimus: cessantibus dictis symptomatibus, lapilli mediocri carpinum fere quo ad figuram similis, nisi, quod in basi rotundior, in medio elatior, & in anteriori parte acutior, ita, ut potuerit in basin & apicem dividi: successu tandem temporis detersa basi, in conspectum venit nucleus, magnitudine & figura lentis, coloris paululum magis citrini, hic in posteriori parte basi firmiter adharebat, remota vero hac, sic erat totus liber instar aliorum nucleorum, in nucibus aut aliis fructibus reperibilium, & sin manu commovebatur hic lapillus, sic, ut acides.

acides, sonum edebat, quod manifestum est signum, illum in anteriori parte fuisse liberum nuclei: interrogatus & examinatus antea ranula affectus, quo ad omnes circumstantias, an non unquam antecederet aliquam sub lingua, vel faucibus molestiam passus sit, respondit, sua tota vita non neque etiam alia dispositio ad morbos, excepta ea, quæ e temperamento desumenda esset, inveniri potuit. Et quoniam adhuc aliquid residuum erat de mel. ros. cum unguent. ægypt. sic locum ranula antecederet obfessum ipsum subjectum inunxit & absterxit, & ita sponte consolidatio de reliquo facta est.

§. VI.

Datur nec minus Batrachus, sive ranula, vel benignus, vel cancrusus: benignus est ille, qui simplicem materiam vel viscosam, vel calculosam, vel mellagineam agnoscit: hic vero dicitur, qui signa cancri possidet malignæque indolis & corruptionis est, ut citato loco *Riverius* disserit: Periculosa etiam Ranula est, quæ nigra, aut fusca, & dura est, ad cancri naturam accedens, & illa non est attingenda. Dictum quoque est in II. §. sæpiissime in speciali tunica materiam contineri, quæ auferri quocunque modo debet, alias, ut infra dicetur, redire solet tumor, etsi per incisionem materia contenta subtrahatur atque sublata fuerit; quod quidem præsertim in eo tumore, qui meliceridis naturæ est, ceruissimum est; miror vero admodum, cur in observationibus desumptis ex *A. N. C. & Miscell. Physic. med. math.* §. IV. post exclusum calculum nulla fiat mentio de exstirpatione alicujus membranae, ut & etiam in nostro casu, ut dictum, nil specialiter adhibitum fuit, nisi quod *ziv. mel. ros. ʒj. unguent. ægypt.* permixtus fuerit; quod equidem non tam potens septicum remedium est, ut alias ab authoribus recommendantur, & tunica exposcit, quod ibi forsan sufficiens fuit, cum hæc ranula adhuc recens erat: Quamobrem appositum fuit sæpiissime, an fortassis sublingualis tumor calculosus absque speciali capsula constitutus sit; quod ulteriori scrutinio atque observationibus committendum esse duco.

§. VII.

Locus principalis hujus tumoris est sublingualis membrana, communis partibus faucium adæquatus frænum & lingua cæteræque huic annexæ aque vicinæ partes; unde ratio symptomatum deduci potest, cur involubilitas linguæ hunc sequatur tumorem, unde impedita respiratio, loquendi, fugendi & deglutendi difficultas exoritur.

§. VIII.

§. VIII.

Eleganter scripsit *Georgium Wolff. Wedelius* p. m. in *Patholog. med. Dogmata* sct. II. Cap. XII. de *conf. morb. conformat.* pag. 387. omnem tumorem in se continere causam proximam, quæ illum locum tumere facit; dum dicit: *omnis tumor a materia præternaturali dependet, seu per se tali, seu per accident.* Ita quoque, ut supra jam monuimus, noster sublingualis tumor pro causa proxima illud agnoscit, quod in eo latet, atque absconditum est; est vero illud materia plus, minus viscida, vel calculosa & taphacea, benignæ aut cancerosæ indolis.

§. IX.

Remote ad hunc somitem producendum varia concurrunt, maxime vero status M. S. viscidus & terrestris, nempe cacochymia phlegmatica & melancholica; in utraque enim humores visci sunt, qui, dum circulationis M. S. ad fauces, glandulas salivales quasunque ibidem sitas, membranam sublingualem porosum, & continuo in statu naturali liquorem salivalem effundentem, adferuntur, ob visciditatem & terrestritatem per poros excretorios dictæ membranæ non transcolantur, stagnant, cumulantur, extendunt nostri morbi sedem, faciunt & eandem tumere, generatur propria membrana, & ita oritur hic morbus sæpissime tunicatus; dum vero terrestrior & tartarea adest humorum conditio atque qualitas, sic enim quoque facile statim ineunt, qua facta successe tenue quidem vel transcolatur, vel evaporatur, ut in prædicto tumore etiam, crassius vero & tartareum accumulatur, concrescit, oriturque juxta suam propriam indolem materia compacta dura, taphacea, calculosa. Sin vero plane materia hujus tumoris humorosa putredine, corruptione, corrosivitate, more canceri in aliis partibus, afficiatur, sit malignus & cancerosus tumor. Coadjuvant generationem hujus morbi dispositio reperibilis in temperamento phlegmatico & melancholico, ut & plura remotius desumenda & rebus non-naturalibus; inter quæ notari meretur ipsam lac matris, cum hic effectus familiarior infantibus, quam provectioris ætatis subiectis est, tametsi hæc non excepta sint, dum enim illud crassum, viscidum, magisque caseosum est, similem etiam infert qualitatem humoribus, qui percolandi & transudandi sunt, qui, si remoram in dicto superius loco capiunt, hunc morbum efficiunt, atque causant. Concurrit immundities sancium in infantibus, in quorum ore viscosi & glutinosi tum a lacte, tum pulve, quibus ordinarie vescuntur, humores producuntur, obliantes & obstruentes poros, excernentes salivalem humorem, qui stagnans ibidem, evaporat.

Disent. Medico-Pract. Tom. VII.

Cccc

ratis.

ratis, aut quomodocunque separatis tenuioribus particulis, incrassescit & ranulam infert. Cum vero ranulæ locum dicimus esse supra adductam membranam, datis rationibus quoque, hinc ut eo melius hinc sententia subscribere valeamus, audiat *Petrus Dionis* in sua anatomia, *Demonstrat. VIII. fol. 396.* dum agit de Palato: *Circumuectus densa & corrugata tunica, quemadmodum interiores genarum & oris partes. Tunica istius substantia tota perspersa est glandulis conglomeratis &c. tandem pergit: Hujusmodi glandule serositatem quandam secretum: quæ in os defillant per innumeros tubulos, quibus hoc in cribri modum foraminatum est. Tametsi nunc hæc membrana per totam faucium cavitatem cribrosa sit, sic tamen in dicto loco ob majorem laxitatem magis ad concipiendum tumorem, quam in aliis locis, idonea & apta dicitur. Vid. Dissertatio allegata.*

§. X.

Antecedunt & concurrunt varii morbi, ut in recensitis casibus ex *Misc. Physic. med. marb. Erf. & A. N. C.* nostroque casu observatur, quibus jungere liceat alios morbos, præsertim catarrhosos capitis, in quibus serum inutile eninet, quod facile crassiusculum redditum & adductum in membranam dictam, in eadem stagnat & tumorem inducit. Nec minus notari merentur morbi glandularum faucium, gingivarum, ipsiusque linguæ; dum in illis materia congesta & stagnans per metastasin in hanc membranam impellitur. Et cum dicatur, neminem calculo laborare, nisi sit hypochondriacus, ita quoque possumus inferre probabiliter, illa subiecta, quæ ranula calculosa correpta fuerunt, quoque disposita fuisse salutem, si eodem non laboraverint, ad malum hypochondriacum.

§. XI.

Petetur nunc fortassis a nobis diffusior nostri casus elucidatio, quæ vtro facile proprio Marte ex supra adductis causis & rationibus, inveniri potest, superfluite tempore brevi, quo hic calculus generatus esse videtur; at, hujus aliam dare rationem non possumus, quam, quod ob continuum affluxum feri terrestrioris per frequentissimum M. S. Circulationem factum, etiam tam celer calculosa concretio exorta sit.

§. XII.

Quod attinet Diagnosin generaliter, hæc admodum facilis est, dum enim minor est ranula, elevata lingua digitis, aut alio quocunque instrumento in conspectum venit: cernitur enim tumor circa frenulum linguæ & venas caninas, ita ut hic tumor, ut supra jam monitum est
sit

fit vel in uno vel in utroque latere, aut in medio, tegens & abscondens quasi frænum. Magnitudo ejus per se patet; quid vero in se contineat, desumendum erit ex aspectu, sin enim admodum durus deprehenditur, absque notis canceri, probabiliter de calculosa indole judicium ferendum erit. Sin parvulum diutius tumor obsederit suum locum, suspicari potest de meliceride; sin minus, concludendum erit, foveri in tumore simplicem materiam viscidam & mucosam, quæ vero omnia evidentiora sunt post factam apertionem, per quam effluens materia optimum signum & nota est, antecederet contenti humoris, qui etiam ratione caloris variat; ita citrei coloris humorem observavit *Paræus*, instar albuminis ovi deprehendit *Bartholinus* *hister. anatom. cont. 1. hist. 78.* signa ranulæ cancerosæ jam ex *Riverio* allegata sum; est enim hic tumor varicoso- scirrholus, durus, nigricans. Primarius, vel secundarius tumor ex historia morbi & relatione ægrotantis patet. Hoc adhuc monendum; quod & quandoque lingua cum glandulis maxillaribus alisque tumeat, aut doleat, procul dubio, ob quoque ibidem stagnantem materiam lentam, mucosam.

§. XIII.

In Ranula quacunque, exempta cancerosa, nil mali pertimescendum habemus, nisi admodum grandis evadat, & ad manus nullus haberi possit chirurgus, aut per ejus imperitiam manum lasso quadam per accidens contingat; quod vero non constitutioni ranulæ, sed imperitiæ manui chirurgicæ adscribendum foret. Hoc tamen pertimescendum & prædicendum habemus Ranula affectis, quod, sin tunicatus sit tumor, ejus tunica vel per chirurgicum, vel pharmaceuticum fontem exstirpari debeat, ne alias a reditu ingratum hospitem iterum salutetur. Tempus curationis variat; sin etiam admodum magna fuerit ranula, expositens majorem apertionem & discissionem, tunc etiam longius temporis spatium pro consolidatione requiritur; idem valet, sin tunica majoris capacitatis erucenda est, uti supra citatus celeb. D. D. *Donner* in Ranula tunicata, ab ipso dexterrimè curata & exstirpata, debuit pro integra consolidatione impendere quatuor septimanas; cum veri sære minoris molis est, ut supra recensio differentium ranularum redidit fieri, hinc etiam paucis diebus ad felicem pergit finem; quod clare observavimus in nostro & aliis recensitis casibus de calculo sub lingua, & ranula nostra calculosa. *Forestus* intra biduum pulvere exteriori, qui inferius adducetur, puellam 12. annorum restituit.

§. XIV.

Raro quidem Ranula absque manu chirurgica tollitur, attamen dicit celeberr. *Heisterus* in sua *Chirurgia cap. LXXXVI. vom Frätselnt unter der Zunge fol. 573.* quandoque tumorem per se absque adminiculo chirurgico rumpi: simile quoque exemplum nobis suppeditat observatio D. D. *Leiselii* aliorumque, præsupposito nempe, fuisse ranulam: uberiori exhibet veritatem noster casus. Et cum vel sponte, vel absque majori industria apertura hujus tumoris quandoque contingat, & non laboriosam curationem requirat, ideo partem practicam pertractandam a leviore statu in me suscipio. Nam hec in casu, præmissis rupto tumore minori, nullo alio remedio indigemus, quam quodam absterfio commixto quodam septico, ut in omnem eventum eradicetur tunica, & præcaveatur regressus humoris. Est vero commune Remedium *Mel Rosar.* utpote abstergens & consolidans, quod vero non sit efficax esse solet: huc huic immisceri potest *unguent. ægypt.* aut, suadente celeb. D. D. *Heistero*, spir. vitrioli, qui non tantum abstergit, sed etiam corrugat cavitatem, inhibetque crebriorem humoris viscidii affluxum, quo remedio mediante penicillo sinus frequentius ab. & extergitur; convenit quoque postea, qua crebrioribus vicibus os elui debet. Possunt vero etiam adhuc remedia septica eligi, de quibus, ut & interius remediis, atque consolidantibus, in subsequente §. XVI. quædam dicentur.

§. XV.

In ulteriori ranulæ curatione formandæ erunt quædam indicationes: 1. Corpus aliquantulum ab humoribus inutilibus liberetur, quantum circumstantiæ admittunt. 2. Ranula suis cum inutilibus humoribus atque tunica propria, sin præsens sit, tollatur. 3. Consolidatio hiatus procuretur. 4. Cause adjuvantes quæcunque proscribantur.

§. XVI.

Recentiores operationi chirurgicæ solent præmittere, permittente tempore, quædam laxantia & remedia incidencia, resolutentia; illa ex hydragogis & menalagis præparant atque addunt merc. dulc. Altera incidencia component ex variis salinis, acris medicamentis, ut sunt salia media, alcalia, aromatica, Rad. Ar. Tinctur. Tart. Ess. pipirinell. alb. &c. Posthac ad ipsam operationem progressum instituunt; antequam vero hujus methodum indigitem, hic notandum quod veteres absque ea conati fuerint ranulam proligare; hinc *River.* allegato loco purgationes

tiones & V. S. præmittere suadet, arque subjungit pulverem, quem ex *Foresto*, cujus autor est *Nicolaus Florentinus*, desumpsit, qui, ut §. XIII. dictum, fatetur, se puellam intra biduum ranula effictam hoc pulvere liberasse; est vero sequentis compositionis: rec. cortic. granat. hyfop. sicc. Θ commun. an. \mathfrak{z} ij. M. f. Pulv. qui sub lingua detinendus & reiterandus est. Quidquid sit, sin præmittenda præmissa fuerint, absque mora audaciter ad operationem chirurgicam confugiendum est; ubi apex linguæ digitis sinistræ manus attollendo reprimatur, in majori vero tumore utendum speculo oris, dein per transversum totus in adultioribus subiectis tumor discinditur, & quantum fieri potest, simul membrana tumorem ferens excinditur, sin vero id fieri nequeat simul & semel, tunc tandem medicamentis septicis partim recensitis, partim fortioribus eradicatur; inter quæ collocavit D. D. *Donaver* mercurium sublimatum. Celeberr. D. D. *Wilb. And. Kellner* in *M. Phys. Med. Math. Erford. Class. IV. art. 6.* allegat ranulam, ope circumspecte adnoti butyri antimonii, post factam incisionem quidem, sed non penitus extirpationem membranæ, radicibus ablata. Unicum est notandum, ne afficiantur venæ raninæ & ductus salivales, hinc peritam, ut plurimæ operationes chirurgicæ, exposcit manum chirurgicam ranulæ discissio, sin adhuc magis extirpatio scindendo. Ad manus habeat chirurgus sanguinem silentia, quæ quidem expressæ non necessaria videntur, sin operatio circumspecte instituat: possunt vero septicis simul digestiva commisceri, prouti circumstantiæ atque intentio chirurgi id exoptulat. Dum hæc omnia peracta sunt, ipsique fovea vel cavitas mundata, apparente carne sana, consolidatio instituenda est, quæ liquamine myrrhæ, Balsam. de Per. de Copaiv. & ol. momord. obtineretur. In Infantibus vero sufficit tumoris per transversum discissio, & extirpatio lenioribus septicis. Cancrofa ranula nullo modo attingenda est; Calculosa apertionem, mundationem, membranæ extirpationem, sin adsit & consolidationem requirit. Cause coadjuvantes removentur iis, quæ dictis causis sunt contraria, & e materia medica peti possunt, observando legitimum diætæ regimen. Et hæc sunt, quæ succincte de Ranula differere potui.

CCLVII.

JO. GOTHOFR. SCHEID

DISSERTATIO INAUG.

Brevem historię mulieris cujusdam quę inopinato casu subito lo-
quelam amiscit, & ex inspirato repente recepit,
Enondationem sistens

Argentor 1725.

L. C. D.

P R Æ F A T I O.

Corpus humanum cum brutorum, quę sanguinea appellari solent, ma-
chini comparantes, magnam hinc inde analogiam deprehendunt; cum
bruta ista multas actiones edant actionibus humanis similes. Peraguntur
in eodem fere modo digestio, chylicatio, sanguificatio, sanguinis circuleo
& alie plures functiones: factum inde est, ut principum quoque numerus de
quidam in ipsorum corporibus residere putaverint; & certe, admiranda
iste a bestiis peracta functiones, ad stuporem sapius mentem alliciunt, ut
vix non assensuris illis, qui simile quid in iis latitare statunt, ut sub-
stare ipsa scriptura verba; animam ipsorum in sanguine latitare confir-
mantia. Nec porro quoque ratione situs præternaturalis magna intercedit
inter homines & bruta differentia; nam & hæc sunt patiuntur morbi,
licet non ita frequentes ac mortales homines. Divina itaque sapientia ab iis
nos distinxit, instando nobis animam rationalem, quę mediante, non so-
lum magis stupendis actiones producit, sed & actionum nostrarum quoad
magnam partem conscii relinquitur, plures diiudicamus atque dirimus. Hęc
insuper est, quę cogitationem intellectuque formet, & quod maximum est,
absque voce principio in omnipotentis & benignissimi Creatoris cogni-
tionemque nunquam potuerimus pervenire. Ab hoc etiam principio, iusto
cum sua habitudine, prodit stupenda ea & etiam, quę quam maxime a brutis
nos discernit, loquelam dico, quę quid præstantius quid admirabilius a Deo
concedi possit, non video. Licet enim bestię sentiant & appetant, deside-
rium tamen suum exprimere vix possint, homo vero omne indigentia ge-
nus & affectus exprimere potest; sua sensu atque mente concepta aliis de-
dat.

clarat, & quod quam maxime est celebrandum, in laudes sui Creatoris ire potest. Facile quis jam concipit, quanta miseria premantur illi, qui divino vocce beneficio, vel a natiuitate, vel alio casu privati vivere cognoscunt. Miserabilior certe persona existit cæco mutus, si vel ultimo loco allegatum vocis usum respicias. Haud raro autem ejusmodi infortunio torquentur homines, dum variis ex causis quandoque vix penetrabilibus apæni mutique fiunt. Concedis tamen simul nunquam dignis laudibus concelebranda diuina benignitas, ut tanto malo auxiliiatrices medicæ manus existant, aut illud sponte quoque cesset. Curiosa admodum est observatio, quam familia non solum mea, sed & universitatis venerandus senior Vir Nobilissimus, Amplissimus, Excellentissimus Experientissimisque Dn. Jo. Valentinus SCHEID Med. Doct. & P. P. O. Patruus, Patronus ac Præceptor meus ad dies vitæ omni pietatis cultu prosequendus, cum adhuc curæ nosocomii majoris præerat, contigisse annotavit. Equidem jam typis expressa extat in fine dissertationis, de polyo cordis sub ejus Præsidio a Viro Nobilissimo Experientissimoque D. D. MOSSEDER, prædico hujus urbis felicissimo, Medico Nosocomii dicti ordinario fauore æstimando. Verum enim vero, cum simpliciter tantummodo relata sit, ex consilio prædicti Dn. Patruus me non operam historiarum esse, censui, si illam pro themate inaugurali seligerem. Bene quidem gnarus sum, me accurato historiae hujus examini quam maxime incapacem esse: attamen cum in arduis & voluisse satis sit, facile me veniam impetraturum spero, si brevitati præsertim studens, dignam rudito orbi expositionem non proferam. Deus T. O. M. ingenium meum ita dirigat, ut omnia in ejus gloriam cedant. Benevolus autem lector rogatus sit, tyroni tenuem ingenii factum condones.

H I S T O R I A

Que ao. MDCLXXXIX. Mens. April. die 17. contigit.

ANCILLA quædam 24. circiter annorum per 5. annos ex veneficio, ut creditum fuit, muta, ideoque cœu persona, ut vulgo loquuntur, miserabilis in nosocomio nostro nutrita, die dicto circa undecimam nocturnam subito vocalis rursus evasit. Laboraverat ea ante quinque. & quod excurrit, annos sæda scabie, qua de causa e nosocomio cum aliis eodem morbo, aliisque effectibus quibus theinæ proficue sunt, laborantibus ad Ladenses, uti quot annis fieri solet, abgata est. Inde sanitati restituta rediens, dum servitiis domesticis in civis cujusdam domo addicta est, febre tertiana intermittenente corripitur. Exacerbatur eadem febris casu quodam, cum, paroxysmo ingruente, utcum aqua ex puteo modo hausta plenum capiti imponere volens, ri-

gore

gore jam correpta, super totum corpus effundit, unde ad nosocomium, quia servitius domesticis necessariis defungi non poterat, rursus delata est. Ibi, multitudinem ægotantium non aliter permittente, puellæ cuidam alii uno in lecto sociâ jungitur. Ita sociam ægre ferens, & plus, quam hæc nostra, benevolentiam tum apud Miniltrum, tum ancillas inferentes obtinens, eam verbis asperioribus factisque traclabat. Post aliquot dies, cum hæc nostra circa crepusculi tempus sorte fortuna in lecto fedens erecto corpore obdormisset, subito in vertice capitis sensit velut sibi baculo iussitum verber. Ad quod expergescens ultimam pro quinque annis vocem emisit, servatoris nomen ingeminando. Interea gestibus, digitisque monstrando tantum effecit, ut adstantes sociam interrogarint, utrum ab ea fuerit percussa: quæ tamen quæstioni instantibus nihil respondit, præter quam, quod sociæ, quæ tantum animi læsa gestibus significare poterat, castanæ fructum in eam capitis partem, qua se dolere misera monstrabat, projecisset. Procedente deinceps tempore, cum a febre convalesceret muta, nunquam ægotavit, aut medicamentis usa est, nisi, quod interdum præservationis causa purgante pharmaco, aut venæ sectione vacuata fuit, de nullo, quantum ex ipsa percipi potuit, symptomate conquesta, quam quod nihil omnino eloqui, ac nequidem aliam vocem, quam gemitum, emittere posset; ceteroqui auditu valens, omniæque, quæ quisque ipsi verbis indicabat, intelligens. Ita quinque fere annos exegit, omnium quicunque eam vidissent, commiseratione digna. Denique tempore supra notato, cum ab aliquot diebus male habere cepisset, atque quantum ab ipsa per iteratas quæstiones nutusque cognosci potuit, oris amaritudine, dejecta appetentia, atque deglutendi difficultate laborasset, suam ipsi fuit post crebriores oris collutiones vomitorium, quod tamen capitis motatione constante, abnuvit; interea semper, quantum intelligi potuit, de buccella veluti in faucibus, quam neque deglutire, neque excernere posset, hærente conquesta. His ita aliquot dies, uti modo dictum, durantibus tandem subito noctu circa undecimam, cum in lecto jaceret, neque ut ipsa post lapsa est, somno indulgeret, sed potius, uti præcedentes noctes exegit, ita & eam insomnem meueret, visus sibi fuit veluti concitatus quidam in faucibus fragor, quo facto, subito excretum sanguini permixtum pus, quod deinceps etiam lineo exceptum monstravit, liberam, ipsi vocem restituit, dum, in quo prius finiebat a se ipsa emissam vocem, nondum plane, num seminio de ut red ret mens, sibi conscia, rationem inire cepit, quod si hoc verbum esset potuerit, an non & plus eloqui posset; quare vicinas sibi in lectis recumbentes vocavit. Illæ tamen somno sepulcræ vocalem recens factam, nec jam tum clarius illas inflamare valentem non audiverunt. Proinde somnum vix capere audens, & ne, quam recuperaverat modo,

VOCEM

vocem rursus periret, sibi metuens, summo mane, ubi diluculum appetere cœpit, lecto surgens, illas, quas noctu voce ista sua nondum eliminata expergerere nequivit, tum tactu, tum voce submissiore, ut poterat, vigiles esse, secumque de recuperata loquela gaudere iussit. Expergefacti hinc cæteri, audita noviter rursus quamquam voce submissiore loquente, obstupescunt omnes.

Minister post certiores factos, qui in Nosocomio reddituum curam gerunt, ad Medicum pergit, casumque inexpectatum exponit. Inde ad Magistratum res deferitur. Hic Archistro amplissimo facultatis nostræ Dn. Senari Doct. Marco Mappo significari jubet, ut rem accuratiore examine exploret. Inter hæc, cum Medicus nosocomii ordinarius illico, audito mirando isto eloquio veluti renato, nosocomium ingressus fuisset, omne, quantum potuit, diligenter inquisivit; donec de adventu supra laudati Domini Archistri certior factus, ipso consentiente venam in brachio secari curavit, cum ranina sub lingua adeo commode pertundi nequiverit, gargarismumque & emeticum pro sequenti die præcepit; id verò ipsa averfata fuit, donec dolore capitis, cibi fastidio, aliisque symptomatibus, nescio, an præ gaudio recuperatæ vocis humanæ, an cacochymia, cujus sese non obscura exeruerunt indicia, correpta, ad medicamentorum necessarium usum coacta fuit. Iis postea restituta, nunc integra sanitate fruitur, atque in nosocomio nostro miseris ægrotantibus pauperibusque satis alacriter inservit.

§. I.

Antequam in causam rarissimi propositi casus inquiram, haud extra oleas vagabor, si pauca quædam de loquela prælibem. Ex ipso præmio facile patet, loquelam s. facultatem vocem articulato sono proferendi, & sensa mentis clarissime proponendi, soli homini esse concessam. Licet enim & animalibus brutis sua competat vox, imo quædam articulatos sonos hominum ad instar proferant, quorum in exemplum Psittacus atque Pica sistuntur: de quibus Persius Poëta canit.

*Quis expedit Psittaco summi xan-
Picaque docuit nostra verba conari
Magister artis ingenique largitor
Venter, negatus artifex sequi voces.*

Licet etiam in Scenam producatu canis loquens, attamen minimè proprie sic dicta loquela ipsis concessi; cum præsertim principio rationali sint destituta: multo minus capiti artificiali Alberti Magni tale quid concedi potest.

Valet enim hic quam maxime, quod Aristoteles in suis scriptis nobis reliquit, dicens. *ἡ δὲ φωνὴ ἀέρος τις ἰσὺς ἰσούσης. τὴν γὰρ ἀέρος, ἡδὲ φωνή, αἰσὺν καὶ ἰσούσιν ὁμοίαν ὄναι.* Vox autem est sonus quidam animati, nullum enim anima carens vocem emittit, sed per similitudinem vocem edere dicitur. Per loquelam namque animi conceptus, per ideas vocibus & litteris distinctus, ut Wedelius loquitur, exprimuntur, adeoque tanquam principale dirigens considerandus est intellectus. Loquela autem per certa instrumenta, vocalia dicta, peragitur, quæ paucis rece sebo.

I. Requiritur aer (a) rarissime autem iste qui inspiratur (b) sed qui expiratur tempore eliditur, juxta Philosophum citatum, cum Spiritum reddimus, disertis verbis ait, non cum capimus vocem formamus.

II. Pulmones, inprimis verò vesiculæ istæ membranaceæ (c) quæ aeris domicilia, si ita loqui licet, ut inspirationis, ita expirationis organa.

III. Larynx, (d) in quo aer è trachea & pulmonibus rediens vertitur in vocem.

IV. Cartilagine quinque (e) inprimis verò Epiglottis.

V. Tonsillæ & uvula de quibus varie disputatur, utrum requirantur ad loquelam, dum exempla tam affirmantia, quam negantia passim profert, & M. N. C. (f) narrent, ex amissis his partibus, notabiliter eam fuisse læsam; integram tamen remanentem vocem Bartholinus (g) & M. N. C. recentent. Interim probabile videtur ex illarum situ naturali aeris repercussionem promoveri, atque loquelæ formandæ (h) inservire.

VI. Fances (i) quarum ope loquela perficitur.

VII. Palatum dentesque (k) quorum utilitas & necessitas ex eo apparet, quod infantes aut ætate jam proveci homines illis carentes, aut penitus non aut minus distincte verba eloqui possunt, & contra loquuntur tanto distinctius, quando habent plures.

VIII. Ne-

(a) Vid. HELMONT, Alcph. Hebr. delin. c. 4.

(b) Exempla hominum qui inspirando vocem edidere, hancque ob causam engastriomythi vocati fuerunt. vid. DIERB. tr. de corp. nat. c. 28. p. 244. & M. N. C. A. 1. obs. 35.

(c) Vid. BERGER. Physiolog. c. de respir.

(d) Vid. Aquapend. de LARYNX vocis organo, & DIMEREA. anat. l. 2. c. 15. p. 471.

(e) Vid. BASTHOZ, Anatom. renov. p. 444.

(f) D. 2. A. 5. obs. 6.

(g) Anat. renov. l. 3. c. 12. & M. N. C. D. 2. A. 4. & 5. obs. 66.

(h) Vid. HELIETZ. Anatoni. corp. hum.

(i) Vid. FARR. ab Aquapend. de loquela.

(k) MORR. Physiol. cap. de dentib. & SÆTZ. dissert. de dent. & exercit. Buchol. p. 180.

VIII. Narium foramina (1) quibus obstructis difficulter admodum ac minus grate literæ exprimi possunt.

IX. Lingua (m) quæ mira velocitate mediantibus musculis ad omnes oris plagas fertur, extenditur, sursum & deorsum pellitur, quo itaque quid cupiamus eo promptius eloqui valeamus.

X. Os, (n) sicuti constat ore fingi sermonem, ita negari nequit eodem obstructo vel læso locutionem corrumpi ac destrui.

XI. Labia, (o) quorum beneficio aërem sonantem mediantibus musculis ex quibus componuntur, cogimus assumere variorum litterarum formam.

XII. Diaphragma & muscoli intercostales (p) qui expansioni & constrictioni thoracis dicati sunt, & hos aliquid contribuere ex eo apparet, quoniam & inspirationi & expirationi inserviunt.

XIII. Partium harum motus: (q) motum autem huicce provenire à musculis recensitarum partium, tum propriis tum communibus, facile quis videt.

Denique XIV. humiditas moderata (r) qualis est saliva & alii humores è glandulis secreti, quæ vox grata auribusque amœna fit.

§. II.

Videmus itaque admirando admodum modo loquelam perfici. Dum nimirum aëreum fluidum in expiratione hospitium deserit, & vocale fit, non sensum & quiete exsurgere (s) sed determinate expelli debet. Idem porro, ad corpora varia appulsum, varie modificatur; expressum enim è cellulis pulmonalibus, subit in exitu asperæ arteriæ ramificationes, è quibus dein ad cannam pulmonalem fertur, & per hanc ulterius expellitur. Aperuit enim, ut celeberrimi Bergeri (t) utar verbis, viam aëri divina solertia ex illa fistula spiritali, ut posset lingua minister o suo fungi, atque efflatum ex glotide aërem intra oris cavum, maxillarum ossibus dentibus circumscriptum, adjuta motione faucium, maxillæ inferioris

D d d 2

gis

(1) Vid. АММАН. dissert. de SURDO loquente.

(m) Vid. Helm. alphab. Hebr. БАТРОЛ. anat. renov. p. 441. МОСК. fundam. Physiol. p. m. 135. Aquapend. l. c. & Job. Alb. SEIZ. Exerc. Pathol. 185.

(n) Vid. БЕРГЕР. Physiol. c. de loquela.

(o) Vid. Helm. l. c.

(p) Vid. BERG. l. c. & FARR. ab Aquapend. de respiratione.

(q) Vid. БОЯНН. de loq. & voc. in instit. & Theod. ZWING. pract. Med. part. II. pag. 75.

(r) Vid. ZWING. compend. Med. Univ. p. 67. & БАТРОЛ. anat. renov. p. 434.

(s) Vid. БОЯНН. instit. de voc. & loq.

(t) Vid. de nat. hum. p. 313.

ris & labiorum, & si quæ præterea organa ad vocis articulationem conferunt, pulsibus suis ita modificari, extraque os propellere, ut tanquam interpret cogitationum unius, suo diverso ad aures appulsu, & commotione nervorum acusticorum, statim quasdam animi notiones, sive conceptus quosdam, vel ideas, in altero exciet, quas ejusmodi motibus assuefacti, hac illaque voce rebus significandis idonea, exprimere didicerunt.

§. III.

Vocem humanam, ratione quidem loquelæ, ut plurimum uno eodemque modo formari, nullum est dubium; sed discrepat tamen loquela, tum pro omnipotentis Jussu, tum pro organorum diversitate, gentium discrepantia aliisque, pluribus circumstantiis. Qua in re satis prolixus esse possem, si ad scopum meum ista divisio faceret. Verum cum hæc minime sit mens mea, igitur sufficiat, sequentem in modum protulisse divisionem, quarum I^{ta} Fortis & remissa. II^{da} Magna & parva. III^{ta} Rauca & sonora. IV^{ta} Dulcis & ingrata. V^{ta} Gravis & acuta. VI^{ta} Articulata & minus articulata. Posita hacce divisione, non abs re erit vitia loquelæ depravate his apponere. Discipiam itaque, quomodo vel lædatur, immutatur atque depravetur, vel plane etiam deficiat.

§. IV.

Inter vitia loquelæ sequentes potissimum eminent species. Una autem generali appellatione dicuntur dicitur difficilis seu (u) *μυδιαία*, cujus tres rursus species ab Aristotele recensentur, quarum I^{ta} aut *τραλίστης*, Blæstias, sic enim Aristoteles (v) ait, *τραλίστης ἐστὶ τὸ ὑπάρχοντες ἀπὸς τοῦ κρατῆος, καὶ τοῦ ἐν τῷ τοῦ κέντρου*; quando scilicet homo literas certas proferre nequit, sed unam in aliam mutat. v. gr. R. in L. II^{da} *αλλαστής* Blæstias juxta eundem Philosophum l. c. *ἐστὶ τὸ ἕρμαιν τὴν ὑπάρχοντα ἢ αλλασθῆναι*, cum syllaba aut litera in voce onittitur. Et III^{ta} *ορρυσία* Hæstias sive linguæ hæsitantia nuncupatur, & Philosophus eis. ait, *ἐκὰς προεῖναι ἀπὸ τοῦ μὴ δύνασθαι ἀποδοῦναι τὸν ἐκ τῆς αλλασθῆναι πρὸς τὸν ἐκ τῆς*. Quando quis verbum verbo, aut syllaba syllaba cum laboriosa pronuntiatione subinde repetit, & ita adhæret loquitur. Denique abolita censetur locutio, quando nihil, neque literarum, neque syllabarum, neque dictionum profertur; quem ultimum loquelæ affectum, ut plurimum aphoniæ titulo insigni-

(u) Vid. *Meib. Senniz. Specul. Med. Pract.* tom. 1. part. 2. Sect. 4. cap. 17. & *Lanc. Patbol. animat.* ad cap. 14. animad. v. p. 146.

(v) Vid. *Probl.* 30. Sect. II.

insigunt. Notandum hic statim venit, aliquibus vocabulum aphonizæ (w) minus arridere, existimant enim haud adeo commode posse loquelæ defectum hoc verbo exprimi, utpote quo saltem vocis defectus intelligatur. Quis verò nescit, vocis ablationem & defectum involvere loquelæ, minus vero locutionis cessationem (x) innuere statim vocis absentiam. Cum autem tres hæ locutionis depravatæ species, vitia ut plurimum sint à natura hominibus insita, hocque nomine non emendabilia, sicut & rautias, quæ à primo ortu contingit, aut plane non, aut arte quadam (y) difficulter corrigitur, idcirco illa misla faciam, & sollicitus tantum ero de defectu loquelæ, qui post nativatem accidit.

§. V.

Variis autem modis loquela depravatur, variasque agnoscit causas: quibus deficit. Nunc enim sunt externæ nunc internæ. Inter internas merito recenseri meretur mens, qua conceptus nostrus per convenientia verba exprimimus; quare necellum est, ut possideamus certum idioma ad loquendum (z). Ipsa enim dum nescit nomina, quibus alias res appellari solent, nullo pacto potest cogitata sua convenienti & articulata voce declarare. Quod & fit neutre male affecta aut variis imaginationibus occupata, quæ aliquando obmutescentiam inducit, suo exemplo doceat Melancholici, (a) qui sæpe obstinatissime obmutescunt.

Mentem excipiunt spiritus animales, quorum vitio, sicuti omnes fere corporis nostri partes, ita & loquela (b) quam maxime afficitur. Eorum namque defectum aut læsiones tanquam causam in plurimis experimur morbis, & sic quoque in locutione. Spiritus nimirum animales (c) defectu peccantes, vel penitus auferunt loquelam, vel minimum difficilem satis reddunt. Experientia edocti in iis hominibus diu longis ac gravioribus morbis vexatis, eos pene ob nimiam virium jacturam obmutescere, adeo ut vix verbum unum alternimve eloqui valeant. Non solus autem spirituum defectus loquelam nostram afficit & lædit, verum etiam influxus eorum denegatus.

Obstructis enim nervis succi nervei influxus impeditur, quo denegato, paralysis oritur; qua etiam nonnunquam lingua afficitur, atque loquela privatur; quod Platerus aliique docent. (d) Non secus ob spas-

D d d 3

modicam

(w) Vid. ETTMUL. op. de gust. lxx. p. 847.

(x) Vid. PAUL. ZACH. quest. Med. legib. L. II. tom. III. q. 8. p. m. 205.

(y) Vid. diss. AMMAN de loquel.

(z) Vid. LUDOV. Mercat. oper. T. I. L. 3. Part. 1. cl. 1. quest. 180.

(a) Vid. M. N. C. D. 3. A. 1. observ. 159.

(b) Vid. AB. SERIZ Exerc. Pathol. l. c.

(c) Vid. SENNERT oper. T. I. L. II. part. III. Sect. II. C. 4. pag. 444.

(d) Vid. PLAT. obs. Pract. Ll. p. 124. & p. 126. FOREST. L. 13. obs.

31. HORCESTET. obs. Med. Dec. 9. cas. 5. M. N. C. D. 1. A. 6. obs. 48.

modicam nervorum contractionem spirituum influxus impeditur & nascitur aponia. (e) Quod in epilepsia fere perpetuum esse vult Hæcchetterus. (f) De Muliere quadam in octavo gestationis Mense opisthotono correpta, & loquela privata scribit Schenkus. (g) Plura de vocis à convulsionibus interceptione vide in M. D. C. (h) aliisque autoribus. Nervorum etenim par vagum laryngi & linguae. (i) & post hanc aliis visceribus concedit ramificationes, manifestam hinc sympathiam infimi ventris, cum vocis organis constituit, propter quam lingua pro diversis animi pathematibus diversas vocum patitur differentias, quæ vera esse docent, qui obmutescunt ex passione hysterica, (k) colica, (l) lumbricis intestinis incarcerationis (m).

Sicuti autem paralytes & convulsiones nervorum loquela nostræ inimicæ sunt, ita & si dissecantur, aut ab aliis causis læduntur (n), loquela sæpius privatur. Dissectione enim nervorum facta, motus linguae ad sermonem maxime necessarius deficit: quod notum est in canibus, quorum nervos, si cultro anatomico vivos subjicere volumus, ne rem prodant, aut filo intercipimus, aut dissecamus, quod inventum non Vesalius modo, (o) sed & Galenus (p) annotavit. Idem in hominibus fieri probat Gal., dum affert exemplum alicujus, qui strumis puero incisis, nervis digitis disruptis pterum à strumis liberavit quidem, sed mutum reddidit. Plura vide in Schenckii & Zacut. Lusit. oper. (q).

Non æcus ab actionibus naturalibus impeditis sapiens loquela nostra afficitur: actiones enim naturales in statu physiologico ita se habent, ut semper id, quod illis molestum est, naturaliter per loca excretoria expellant; ubi vero talia retinentur, tunc unum malum alterum sequitur. Loco testimonii sit obstructio mensium, quæ, uti plurimorum ac gravium aliorum morborum sedulus faber existit, ita & loque-

(e) Vid. M. N. C. D. 2. A. 1. obs. 97. & BONET. Sequitur. T. I. L. I. de vitis vocis & sermonis. Sect. 22. obs. 15.

(f) Dec. 4. cas. 4.

(g) L. I. obs. 249.

(h) D. 1. A. 9. obs. 57. & 89. Tulp. L. 4. cap. 3. & BONNET in Sepulchr. lib. I. Sect. 22. obs. 15.

(i) Vid. WILLIS de nerv. c. 26. & VIEUSSSENS Neurolog. univers. de parivago pag. 181.

(k) Vid. LUSITAN. oper. T. 2. ubi de hist. prax. L. 2. cap. 5. obs. 3. & HECCHETTER. D. 4. cas. 2.

(l) Vid. M. N. C. D. 2. A. 1. obs. 81.

(m) Vid. M. N. C. D. 2. An. 5. obs. 27. FOREST. L. 24. obs. 33.

(n) Vid. SCHENCK. lib. 1. obs. 351.

(o) Vid. ejus hum. corp. fabr. cap. ult.

(p) Lib. 7. de admin. anat. & II. de decret. Hipp. & Plat.

(q) Vid. SCHENCK. obs. L. 2. p. m. 329. & Zac. Lusit. op. T. 1. L. II. hist. XIV.

loquelam sæpius lēdit, quod docet *Francisc. RUBEUS*. (r) à suppressâ gonorrhœa aphoniam subortam *Zacut. Lutitan.* (r) in obs. suis habet, & historice docent ex sudoris, (r) suppressione aphoniam ortam.

A Medicamentorum, quis crederet, ad sanitatem labefactatam restituendam, usu, malum hoc sæpius provenire, constat, quod venæ sectione probatur. *M. enim N. C.* (v) describunt historiam, mulieris cujusdam 52. annorum, quæ post *V. S.* celebratam loquelam omnem amisit, ita ut præter *ja* & *und* nullum aliud verbum eloqui valeret. Mirandum certe quod ab hoc remedio affectus tales producantur, cum notum sit, alias *V. S.* in aponia tanquam præsentissimum remedium adhiberi, eamque ab *Hippocrate* (w) commendari. Hic tamen plane contrarius effectus sicutus est. Plura adhuc infelicitum & funestiarum *V. S.* exempla in medium proferre possem, sed hæc sufficiant; concludo itaque disticho sequenti.

Discite mortales pretioso parcere succo

Tam vitæ sors est quam necis auctor idem.

Porro ab opio per clystima infuso, loquelæ impeditæ, historiam describit *Platerus* (x). Ab odore vinaceo (y), *ἀναλίσκω* ex potu subitaneo cerevisiæ (z), aphoniam ex aquæ fortis (a) potu, denique ex esu baccharum belladonnæ (b) obmutescentiam ortam, historice docent.

Nullis jam obmutescentiæ causis hisce, ad alias me accingo, etæ autem sunt ictus aut lapsus ab alto. Et mirum est, ipsam palladis sedem, arcem animi, & nobilissimarum functionum domicilium, caput, fat validis licet integumentis galeaque robustissima in adultis probe sit munitum ab externis tamen injuriis persæpe peti, quod quotidiana docent exempla. Tantus enim quantoque ferientis impetus, instrumentique violentia, ut loquelæ haud raro periculum subeat tacitus infelicitur homo; hujus rei notabile exemplum in *Valleriolæ* (c)

servo.

(r) In exercit. noct. p. m. 447. exercit. 40. & act. Hæm. volum. 1. obs. 7.

(r) Lib. 1. Hist. Pr. obs. 109.

(z) Vid. act. Hæm. vol. 1. obs. 12. pag. 20.

(u) Vid. *BENNETT* G. obs. cent. 1. obs. 12.

(v) D. 1. A. 1. obs. 97. & D. 2. A. 1. obs. 147.

(w) De viſit. and. sect. 37. dicit τὸ δὲ πρῶτον τὴν ἰκταδὴν γυναικαί, ἀναλίσκω ἀποκρίσας, ὅτι ὁρισμένην τὴν ἑσπέρην αἰὶν ὑπερβαίνον, ἢ ἄλλαν δὲ τὴν ἰκταδὴν. Ut aliquis deceptus voce privatus fiat venarum interceptiones faciat, si sine hoc contingat aliq̃ue manifestâ, aut alia forti causa.

(x) L. 1. obs. med. pag. 127.

(y) *RUBO*. obs. cent. 2. obs. 29.

(z) *M. N. C. A. 1. D. 1.* obs. 60.

(a) *FORREST*. lib. 14. obs. 30.

(b) *M. N. C. D. 1.* obs. 108. A. 10.

(c) Vid. anat. *LORETT*. obs. VI. 46.

servo habemus; qui casu ab alto, & in totum diffracto cranio mutus evaluit, & post septem dierum spatium vocem recuperavit. Similes Historias lege apud Schenck. & alios auctores. (d) Pari ratione ex cerebri lacione humorum influxus, ac consequenter loquela, impeditur, quod dudum jam Hippocrat: (e) in aphorismis suis annotavit. Quem Aphor. alii Auctores variis comprobant observationibus, & imprimis Schenckius atque Forestus (f).

Ordo jam atque dissertationis nexus postulat, ut etiam discipiam, quomodo vehementes animi & spirituum animalium motiones noceant loquelæ. Quemadmodum enim felix ter quaterque ille pronuntiatus est, qui animi sui affectiones ad ethicæ Christianæ cynosuram ita habet obediens ut in æquilibrio subsistant. Quod & Horatius aureis verbis inculcavit, quando dicit.

*Æquam memento rebus in arduis
Servare mentem: non secus in bonis
Ab insolenti temperatam
Lætitiæ: moriture Deli.*

Ita felicius est is, qui ab illis vincitur, illisque succumbit, quod experientia declarat quotidiana. Pathematum autem omnium animi, ad inferendum corpori damnum, promptissima sunt, gaudium repentinum, vehemens terror, tristitia, ira &c. Nam cum hæce celerrimi animi sint motiones, necesse quoque est, ut celerrimæ ac concitatæ præter naturæ ordinem, motiones spirituum & sanguinis consequantur. Inde fit, ut partim dissolutis & consumptis viribus mox excipiat, partim etiam œconomia motus vitalis evertatur, & via ad morbos struatur apertissima. Gaudium profusum ac insolens, spiritus tam vehementer dissipat, ut sanguine hisce destituto syncope vel morte repentina homo corruat, quod nonnullis obtigisse memoriæ proditum est ab observationum scriptoribus. Ex repentina gaudii exspirasse animam Polycratam nobilem feminam in Naxo Insula Aristoteles refert. Nec veteres latuit tam subitæ mortis causa: unde Heliodorus obtingere, ait, ejusmodi mortem *ἐκ τῆς περιπατικῆς πύρας ἐν ἀντιθέσει ἀνίσταται χαρμὴν ἰσχυράν*. Observatione etiam quotidiana constat, percepto improvilo & magno gaudio,

(d) Vid. SCHENCK. obs. L. I. obs. 39. obs. 53. 63. 64. & 70. M. N. C. D. 2. A. 1. obs. 91. & A. 3. obs. 52. D. 1. A. 2. obs. 120. D. 2. A. 8. obs. 16. & Art. 9. obs. 137. Heechst. obs. Dec. 4. cas. 5. Forest. L. XIV. obs. 33. in Schol.

(e) Aph. 58. sect. 7. ὁ νοσηρὸς δὲ αἷς ὁ ἐν τῷ κρανίῳ συνῆλθε τῶν πρὸς τὴν ψυχὴν ὑπερβαίνει. Quibus cerebrum, ait, concussum fuerit ex aliqua causa, eus statim voce privari necesse est.

(f) Vid. SCHENCK. L. I. obs. 40. 41. et 109. Forest. lib. 9. obs. 30. M. N. C. D. 1. A. 9. obs. 124. & D. 2. A. 2. obs. 29. & A. 6. obs. 25.

gaudio, vocem max deficere, atque lachrimas elici, quod noster ita dicunt. *Er hat vor Freudem kein Wort mehr reden können.* Cum e contrariis lenis & suavis lætitia spiritus recreat, excitet, & sanguinis circuli promptum expeditum ac liberum reddat, insolens autem, spiritus admodum consumat. Quod & facit tristitia, ea enim & necessitas sanguinem & spiritum à circumferentia magis ad centrum intro spalmode constringendo habitum corporis, compellunt, sique faciunt, ut retrocedentes ex organis suis, homines varie afficiant, imo sæpius *adans* (g) relinquunt. Unde *Salomo* (h) scribit tritis animus exsiccat ossa, it. C. XV. Sicut tinea vestimento & vermis ligno, ita tristitia in viro nocet cordi. Sequitur jam ira, qui affectus quoque est nocentissimus vitæ ac sanitati hominis; in iracundia enim sanguis vehementissime & maximo cum impetu ad externum habitum corporis movetur, quo fit, ut sub paroxysmo inflatur facies, oculi fiant feroces & rubicundi, in partibus sentiat tremor, dentes comprimantur, quin imo vox interceptiatur, quod docent M. N. C. (i). Nec minorem experimur noxam à terrore, & clarum est experientia quotidiana nihil magis provocare epilepsiam quam terrorem. Porro nihil magis aptum est, ad excitandum in gravidis abortum, quam inopinatus terror.

Quod ex terrore paralyfis, apoplexia gravis, obstructio mensium, hæmoptysis imo & aponia producantur in furo medico notissimum est; & testatur de ultimo affectu nominato *Galenus*, (k) qui historiam nostræ ferre similem in chartam conjecit. Similem huic historię aliam recensent act. Hafn. (l) hic & à spectris (m) cancris (n) lupo visis (o) & ob exortum incendium (p) aphonos tales perhibent. A Mœrore & luctu nonnunquam obmutescentiam oriri exempla, docent, & *Val. Max.* (q) Naulimenus, inquit, Atheniensis uxor, cum fili ac filię suæ stupro intervenisset, inopinati monstri percussa conspectu, & in præsens ad indignandum, & in posterum ad obloquendum, obmutuit.

Restat

(g) Vid. diss. cl. D. PAUL. de animi commot. vi medica Lips. 1700. habit. 18.

(h) Prov. cap. XVII.

(i) D. 1. A. 1. obf. 39.

(k) Vid. cons. & obf. med. 17. p. 541.

(l) Vol. I. obf. 101. & M. N. C. D. 1. A. 1. obf. 121.

(m) Vide RHODII cent. 2. obf. 29. & CRAVUSII diss. Jenæ. 1702. de Aphon

(n) Vid. M. N. C. D. 1. A. 2. obf. 145.

(o) Vid. ZACUT. LUSIT. lib. II. de med. prin. hist. 14.

(p) Vid. diss. cit.

(q) L. I. C. 8.

Disput. Medico-Pract. Tom. VII.

E e e

Restat jam ut etiam aliquid de amore immoderato, aut potius infano dicam. Plurimi certe ab eo non tam animo, quam corpore laborarunt. Qua de re videri meretur divus *Gregorius*; (r) indicat id Davidis filius, qui ex amore Thamaris agrotasse traditur (s). Et notum est experientia, ex amore perverso, nimio & immoderato lipothimias, arthritides, & inter alia innumera etiam obmutescencias excitatas fuisse. Quod patet ex M. N. C. (t) nec hic ebrietatem sicco pede praterite possum, quin & hujus mentionem paucissimis faciam. Quanta homini sit pestis vinum immoderate sumtum, quam corpus mentemque misere laeciet, doceant faciei nunc pallor, nunc turpis rubor, satens anima, obtusi sensus, ulceratorum oculorum ut & ingenii hebes moriensque acies, mors memoriz, tremulæ manus; nihil enim frequentius ebriosi contingit, quam manuum tremor, qui & sapientias quoque partes aggreditur, quod ex languido corpore, fractoque incessu passim videre est. Inprimis enim nervis bellum indixit, quare non mirum est, apud eos, qui Bacco indulgent, quod difficeret ac misere verba exprimant; aut penitus saepe obmutescant, quod *Hortstett* (v) annotavit. Et *Hippoc.* (w) aphor. egregium nobis reliquit; *ἐνθάδε ἰσχυρὸς ἀφ' οὗ τοῦ πλεονεξῆσαι, ἐκαστὸς ἀποθνήσκει*. Si ebrius quispiam, ait, derepente voce privetur, convulsus moritur. Cui multæ observationes ab authoribus allegatæ addi possent, nisi angustia chartæ B. L. ad illos remittere, me cogere: quare sufficere allegasse *FORESTUM* credo (x) qui hunc aphorismum Petri Delphii exemplo confirmavit. Confirmo & història quadam, à nunquam satis laudando ac devenerando Dn. Patruo meo sequentibus verbis annotata, mihique gratiose communicata. Adolescens quidem *Leucopetræus Saxo*, postquam noctu die 28. Mens. Mart. 1718. à largiore ingurgitatione vini generosioris jam gravi crapula correptus, enormem haurtum spirit. ceras. nigr. fecisset, profundissimo sopore oppressus, non solum per noctem, sed & in sequentem usque diem cum jactura sensus omnis, sudore etiam circa frontem syncopeo, ac frigore subinde extremarum, pulsu debiliore, & respiratione difficiliore, ut & sanguine ex ore & naribus fluente, jacuit. Unde cum mane in hoc situ in lecto repertus esset, advocati illico medici pariter & Chirurgi suorum. Ab iis tamen, utut vena in brachio facta, spir. sal. Armon. mediante pluma, naribus immersus, vesicatoria ad suras pedum applicata, clyster quoque acrior ano injectus fuissent, nullæ.

(r) Lib. 4. moral. C. 30. & lib. 3. dialog. cap. 24.

(s) Lib. 2. Reg. C. 13.

(t) D. 1. A. 6. obs. 136.

(u) Vid. Dec. 3. cas. 9.

(v) Aph. 5. sect. 6.

(w) Obs. lib. 12. obs. 33. in schol.

nulla arte excitari potuit; nisi quod interdum parumper nares & labia oris moverit, inprimis ubi post injectionem ol. amygd. d. in iustulo carniū & lactis tepidi per siphonem inflexum, aliquot muci quadantenus purulenti cum regurgitante liquore per os exorievit.

Permanit ita stupidus usque ad horam circiter XI. antemeridianam, qua immerso rursus à medico ipsi per plumam columbinam narius spir. sal. Armon. emissio uno alterove verbulo vocem & sensum recuperavit. Gavissus etiam postea usu rationis & sensus plenario per totum diem decursum fuit, adeo, ut, cum apposite omnibus adstantibus ad interrogata respondisset, non exiguam spem convalescentiæ fecerit, nisi quod acute admodum febricitaret, de insigni dolore & morfu ventriculi conquestus. Adhibita quoque fuerunt ad istos affectus compellendos idonea medicamenta interna pariter acque externa, sicut & antea idem factum erat, cum adhuc sensus expers jaceret. Non tamen propter corpus, uti postea anatome docuit, jam ante male quoad pulmones affectum, & morbi nimiam vehementiam pristina sanitas obtineri potuit. Siquidem hora post mediam noctem quarta dyspnœa rursus cum dispendio rationis correptus, hora post sexta exspiravit. In corpore defuncto hora post decima cultro anatomico dissecto, inventus fuit ventriculus quoad fundum, totus quantus interne inflammatus, circa superius orificium jam gangrœna scedatus, humore quadantenus glatteo ac livido foetente scatens. In corde nulli erant polypi, potius sanguis solito magis fluxilis, ex utroque ventriculo cordis adaperto effluxit. Pulmo vero utrinque inflammatione, & quidem fursitan jam ab aliquo temporis spatio, correptus, observatus fuit; quandoquidem, qua parte culter adactus fuit, ad pressionem digitorum prosectoris plus puris quantum quidem intra 24. horas generari potuisset, quam sanguinis ipsa pulmonum substantia produxit. Reliqua viscera nulla labe contaminata inveniri fuerunt.

Quemadmodum autem à spirituum dyscrasia alioque eorum vicio, insigniter turbatur locutio, ita ab organis respiratoriis, vario morborum genere laborantibus, non minus notabiliter læditur. Suprema nimirum Eolæ nostræ porta, sæpe nobis nolentibus constringitur ac comprimitur à rebus solidis devoratis (x) & gulæ inhererentibus aut à lapidibus asperam arteriam & nervum recurrentem (y) prementibus. Quin imo aliquando cum summo vitæ periculo ocluditur (z), aut ob tumorem (a) trachæ innatum, aut inter œsophagum & asperam

E e e e 2

arte.

(x) Vid. FORST. L. XV. obs. 28. Fel. PLAT. obs. med. p. 108.

(y) Vid. HOFST. Ienischr. lib. 1. sect. 21. obs. 1.

(z) Vid. act. HAFN Vol. 1. obs. 109. gulæ & varium coalitum à variolis M. N. C. D. 2. A. 9. ob. 49. pag. 8.

(a) Vid. BONET. Ienischr. lib. 1. sect. 22. obs. 2.

arteriam (b) aut faniem (c) loquela nostra afficitur. Plura de hac materia lege in FOREST. observ. (d). Aliquoties ab humorum tenuium affluxu nimium relaxatur (e), sicuti enim moderata ejus inundatio ad vocem absolute requiritur, ita plus æquo vocalibus instrumentis irritatis rauedo oritur, & enormius humectatis, sequitur omni-modi vocis ablatio. Sic & ubi fauces nimium sunt contractæ, sermo sæpius æstatur, teste FORESTO (f).

Præterea turbatur vox ubi pectoris cavitas vel sanguine, vel alio humore (g) est impleta, pulmonesque premit ut sese sufficienter expandere, neque se complicare recte possint, & diaphragma libere se movere nequeat. Unde nec aërem debite assumere, nec expirationis actu convenienter ad vocis formationem elidere possunt.

Absoluta hac generali vocis læsæ descriptione progredior ad organa, immediate magis sermonem constituentia, seu quæ sermonis genesis præprimis impedire possunt. Occurrit autem ex omnibus primo lingua. Hanc inter locutionis organa principatum tenere, extra omne dubium positum est. Testantur id omnes fere anatomici, testatur quoque experientia. Hac namque homo carens, aut si naturalem suam constitutionem deserit, atque ab ea discedit, vel penitus nos loquela privatur, vel saltem difficilem reddit. Quod HIPPOCRATES (h) atque ZACHIAS in quæst. Med. legal. (i) faciunt, alique multæ observationes affirmant; & imprimis TULP. (k) SCHENCK. (l) atque HORSTIUS (m) & licet repugnent huic sententiæ exempla sanctorum Martyrum, qui per miraculum, excisis à tyrannis penitus linguis, tamen locuti fuerint, ut de Libycis Episcopis, quibus Arriani linguas radicatus evulserant, Historiæ docent. Talia tamen vel miraculis sunt ascendenda, vel agnoscunt causas naturales, dum nempe loco ablatae linguæ partes aliæ ejus funguntur. Uti HOECHSTETTERUS (n) annotavit..

(b) Vid. TULP. lib. 1. C. 44. ROND. cent. 2. obs. 47.

(c) M. N. C. D. 2. A. 3. obs. 47. & D. 1. A. 4. obs. 67.

(d) Vid. lib. 15. obs. 14. usque 24. & BONET. sepulchr. lib. 1. sect. 222. obs. 16. 22.

(e) Vid. HORST. op. med. T. 2. L. 3. obs. 39. & FOREST. lib. XV. obs. 12.

(f) L. XV. l. c.

(g) Vid. PARISI L. 9. C. 31. p. 231. & Vid. Vid. de curat. membr. L. 8. C. 10. SINNER. Prax. L. 2. p. 3. C. 4. p. 143. & BONET. sepulchr. L. 1. S. 32. obs. 14.

(h) Lib. de princip. 19 §.

(i) Lib. 1. T. 3. quæst. 5. p. 415. & SCHENCK. lib. 1. obs. 399.

(k) Vid. lib. 1. cap. 41.

(l) Vid. lib. 1. obs. 181.

(m) Vid. T. 3. D. 4. quæst. 1. p. 114.

(n) D. 9. C. 8. p. 118. tumor sub lingua æmulus linguæ sive alia lingua p. r. & TULP. obs. med. lib. 1. c. 41.

notavit. Admirandam M. N. C. (o) describunt historiam, Salmuri in gallia ex variolis quemdam exspuiffe linguam totam, nec tamen loquendi promptitudinem amisisse.

Porro linguæ volubilitas, à certa quadam re impedita, si penitus cessat, aut saltem imminuta est, loquelam nostram lædit. Loco testimonii sit tumor, qui linguam tardam reddit, (p) aut impedit, quo penitus non moveri, ac volutari possit, quæ tamen versatilis valde existere debet. Perinde vero est siue tumor hicce sit natus, vel demum adventitius. De priori scribit SCHENCK. (q) M. N. C. (r) de posteriori mentionem faciunt M. N. C. (s). Motum quoque suum lingua absolvere nequit, quando à tumore quodam prope frenulum nominatum, hærente, impeditur, qualem SCHENCK. (t) atque TULPIUS (u) describunt.

Sed non raro etiam fit, ut sub linguæ, calculi, difficultatem ei movendi generantes existent, quales recensent M. N. C. (v) & SCHENCK. (w) aut pili in lingua geniti (x) motum ejus impedian, quo & loquela molestat.

Idem malum experimur à nimis parva et nimisque exsiccata lingua. Exsiccata nimirum, ut magnitudine non attingat molem consuetam tum non solum minorem solito acquirit dimensionem, (y) sed insuper ineptitudinem debite se movendi contrahit.

Denique à soluta linguæ continuitate lædatur sermo; quod observamus in iis, quibus vel instrumentis vel morsu vulnera inferuntur, vel si à nativitate lingua duplex existit, quæ totum fere oris cavum (z) occupat. At talia exempla admodum sunt rara, nihilominus si observantur bilingues isti, communiter censentur elingues, cujus rei rationem dant M. N. C. (4).

E e e 3

Sic

(o) D. 1. A. 1. obs. 13. & PARMUS L. 22. C. 5. p. 489.

(p) Vid. FEL. PLAT. Pr. p. 286. LANG. Pathol. anim. c. 14.

(q) Vid. obs. lib. 1. obs. 183 & 390.

(r) D. 2. A. 2. obs. 51. & BARTHOL. in obs. cent. 2. hist. 22. FOREST. lib. 14. obs. 28. & seqq. SAVANAROL. Pr. Tr. 6. C. 6.

(s) D. 1. A. 2. obs. 107. & D. 2. A. 7. obs. 51.

(t) Vid. lib. 1. obs. 389. tumor, inquit, hæc sub lingua existit, cui loquela adimit libertatem, ex quo BARTHOLO. Gæ. dicitur. Latinis tamda, et hoc lingue vitio correpti, coarctando magis quam eloquendo, sensa mentis enunciare videantur.

(u) Lib. 1. cap. 52. & FABR. ab Aquap. chir. oper.

(v) D. 1. A. 3. obs. 1. A. 9. obs. 144. & D. 2. A. 10. obs. 116.

(w) Lib. 1. obs. 138. & BARTHOL. anat. renov. L. 3. C. ult.

(x) Vid. SCHENCK. L. 1. obs. 186.

(y) Vid. SAVANAROL. Prax. Tr. 6. C. 6. rub. 5. & PLAT. Pr. p. 287. & RIVER. L. 5. c. 4.

(z) Vid. SCHENCK. lib. 1. obs. med. de lingua.

(4) Vid. D. 1. A. 9. obs. 137. & SCHENCK. obs. med. lib. 1. obs. 380.

Sic & propter male formatum linguae frenulum malum hocce nonnunquam oritur, quando nimirum illud vel nimis strictum & curvum est, vel nimis latum, longiorique linguae tractu adnatum, quod vitium fere semper post nativitatem contingit, illud autem saepe à prima nativitate dependet. Præter primam verò conformationem ulcus vel vulnus in caula esse potest, aut si cicatrix vel major, vel durior quam fieri deberet, succrescit, unde lingua expedite moveri non potest. In nonnullis infantibus impedimento est hoc vitium, quo minus papillas fugere, vel ad maiorem provecti ætatem, voces articulas exprimere valeant, nisi manus chirurgica opem ferat. Quod ipsum ex differtissimo ore celeberrimi nostri anatomici Viri Amplis. Excell. experientissimique D. D. SALZMANNI Patroni ac Præceptoris æternum de venerandi habeo, legique etiam potest in MSC. Collegio chirurgico (b). Quamvis autem hoc ligamenti vitium quandoque ne quidem habuiem homini inferat, (c) interim tamen saepius (d) mancā redidit loquelam, imo nonnunquam ejus defectum prorsus inducit (e). Observamus ulterius in labiorum consideratione, quæ in statu naturali mutum quoque in formandis & pronuntiandis verbis contribuunt, ex eorum mala conformatione insigniter lædi loquelam; quod in labiis leporinis (f) videmus. Haud minorem patitur læSIONEM uvula, naribus (g) aut palato, male formatis, quod docent lue venerea laborantes (h).

Et quis omnia loquelæ vitia à quacunque causa orta recensere possit, dum omnium historiographorum libri, variis observationibus pleni sunt. Alii enim à vermibus (i). Alii à frigore nervis accidens (k). Alii ab abscessu in pericardio (l). Alii ab humore concreto in cordis ventriculis (m) & iterum alii ob thymum (n) glandulam corruptis humoribus infarctum, aut ob abscessum in ventriculo (o) loquela privati fuere.

Nec

(b) Part. 2. sect. 2. art. 13. de incisione frenuli linguae.

(c) Vid. BARTHOL. Anat. renov. lib. 3. c. 13.

(d) Vid. SENNERT. Pr. L. 1. Part. 3. sect. 4. cap. 5. & SCHENCK. L. 1. obs. 391.

(e) Vid. PLAT. Pr. T. 1. de ling. & loq. vitis.

(f) Vid. Author. ab Excell. v. D. SALZM. colleg. chir. T. 1. sect. 1. art. 3. de natura labii leporini allegat.

(g) Vid. TULP. L. 2. obs. 25. & SCHENCK. obs. med. L. 1. ubi de uvula.

(h) Vid. FOREST. L. 33. obs. 22.

(i) Vid. M. N. C. D. 1. A. 8. obs. 100. & D. 2. A. 5. 170. SCHENCK. obs. med. L. 1. obs. 357. & differt. de aphonia periodico à vermibus orta. auth. ZIEGLER. Basil. 1724. edit.

(k) Vid. ZACUT. Lustr. op. T. 1. lib. 2. hist. 15.

(l) Vid. BOMBT. sepulchr. L. 1. obs. 2. sect. 22.

(m) Vid. L. C. obs. 12.

(n) Obs. 16.

(o) L. C. obs. 18.

Nec prætereunda est, ista aphonix species, silentiæ, quæ periodicæ dicitur, de qua vide M. N. C. (p), denique non possum non, quin & mentionem illius aphonix speciei faciam, quæ a fascinatione, uti in vulgus creditur, provenit, hujus enim exemplum existat in M. N. C. (q) ubi aphoniam à fascinatione ortam describunt. Quod & clariss. D. D. GRAVSIUS (r) muliere ex veneficio muta confirmat.

§. VI.

Finitis jam, quantum fieri ob temporis Angustiam potuit, historiis, paucis ad quasnam nostra pertineat perulstrare animus est.

Duo autem præcipuis occurrunt phænomena consideratu dignissima, alterum, quod subito & uno quasi momento vocem amiserit, alterum quod ex improvviso rursus eodem beneficio mactata fuerit. Circa primum quæri nique posset, an non fascinatio, uti quidam credere voluerunt, intercesserit, nec ne? ubi non possum non facere cum iis, qui in asserendis veneficiis cauti incedere jubent, cum constat, ex millenis historiis, vix unam alteramve historiolum fascinatorum veram esse, & certe imperium Diaboli, post gloriosissimum ab omnipotenti Servatore nostro de eo actum triumphum, ita imminutum atque fractum esse, ut vix amplius vel ipse vel ejus mancipia, tam stupendos in mortalium Lytro pretiosissimo redemptorum corpora, effectus producere valeant. Accedit illud, quod sæpius à causis maxime naturalibus tam miri morbi atque symptomata exoriantur ut iis laborantes non modo pro fascinatiis, sed & plane dæmone obsessis à male credula plebe pronuntientur. Aspicimus cum malo hypochondriaci passioneque hysterica consistentes ægros, & quandoque stabunt comæ, voxque faucibus hærebit. Quas & quantas fabulas ludunt vermes aliaque animalia, quæ ex ovulis in corpore fuere prognata vel in idem per os irrepere, trilis experientia docet, cujus rei testimonium satis facere potest lacertus iste ex stellionum genere, quem die secundo Novembris 1699. venerando Patruo meo ostendit, Viri Ampl. Excell. Experientissimique Domini Joh. BOECLERI Med. D. & P. P. O. cap. thom. Canon. meritiissimi, fautoris Patroni ac Præceptoris mei in æternum colendi, cujus fidelissimæ informationis & insignis favoris in omni vita memor ero, beatæ memoriæ Parentis amplissimus Dn. Joh. BOECLERUS. Med. D. & Prof. Sacri Palatii Comes, cap. thom. canon. nec non districtus argent: Physicus Provincialis qui vomitu à Pnella novem annorum in pago Lingsheim non longe ab hac urbe:

(p) D. 2. A. 2. obs. 40. D. 1. A. 9. obs. 183. Di 3. A. 3. obs. 130. D. 2. A. 100. obs. 197. & dissert. ZIFLER. cit.

(q) D. 2. A. 2. 169.

(r) In diss. Jenæ. 1702. habit. de Aphonía. p. 12.

urbe distante horrendis cruciatibus, mirisque contorsionibus exagitata, a sumpto medicamento simpliciter pulv. sc. cornach rejectus fuit, vivus adhuc, & satis vegetus, perque plures adhuc dies superest. Non itaque, dum extraordinaria symptomata occurrunt ad veneficia, fascinationesque multo minus ad obfessiones provocantur. Indignum hoc est Medico, præsertim cum lepitissime cum ipso mirbo & veneficium & Diabolus profligetur. Hinc eary nostro in casu non aliam nisi summe naturalem causam adfuisse credibile mihi quam maxime videtur. Quod si historiam bene perpendamus, plures videmur concurrere causæ; non dicam multa de constitutione corporis cacochymica, neque etiam de scabie, quippe quæ retrocedens vix comprehensibilis quædæ que et sit effectus, prolixus esse volo, sed potissimum uno considerandum offero terrorem, quo percussa fuit, dum febre correpta aqua frigida ex puteo hausta, super totum corpus perfusa fuit, unde tum spiritus in motu suo impediti, tum etiam reliqui humores in circuitu suo turbati fuere, ut a circumferentia ad centrum se receperint, organaque loquelæ interservientia, quasi paralyti a reliquerint, aut potius spasmodice contracti, non amplius debito modo commovere potuerint, præsertim cum illo loco ad talem contractionem quam maxime c miruisse videatur inopinatum illud signis, corpus rigore correptum, ulticius stringens. Unde postmodum humores in majorem ipsius ucinem redacti, non nisi depravate & insufficienter ad modo dictas loquelæ destinatas partes influxere. Accedit, quod, circa loca, sermone exprimendo, destinati, ab illo rigore condensati humores stagnarint, ibi que successive abscessum tormentarint, qui ob membranæ suæ duritiem nonnisi post longum temporis spatium potuit rumpi; ad quem abscessum quoque contribuisse videtur percussio capitis, si illa vera est, præsertim cum a tali percussione in præteritis internis abscessus formari posse, dubium non sit, quamvis autem in parte præcipue tumor ille reiderit, exacte quidem determinari nequit, a faucibus tamen non longe abuisse illud probabile reddit, quod semper de buccella veluti in faucibus, quam neque deglutire, neque excernere posset, hærente coarctata fuerit. Mirum equidem cuiquam videri posset, quod cum ejusmodi tumore juncta non permanerit febris præsertim cum deinde pus quoddam observatum fuerit; at experientia constat, ejusmodi tumores, præsertim cysti crassiori inclusos intra corpus diu absque ulla committante febricula subsistere posse, testes hujus rei existunt vomicae pulmonum, quæ diu lais, nullo tere modo laborante homine persistunt. Cum autem deinde hic tumor ad maiorem inclinaret, nihilominus aliqua febris species, quam non tam deglutienti difficultas ab crescente tumore orta, quam oris amaritudo, dejecta appetentia & alia, quæ forsitan tum aderant symptomata, indicare videntur, accessisse probabile est; improbable autem est à projecta castanea in eam capitis partem, qua se dolore misera monstrabat, veneficio quali, tale productum potuisse

potuisse malum, nisi velis dicere imaginationem & præconceptam contra verberantem sociam, quasi veneficam, opinionem aliquid hic contribuisse. Nec tristitiam plane excluderem, quam in tristi nosocomio, præsertim cum se à socia verbis asperioribus tractatam sentiret, conceperat; quid enim & hic affectus ad aphoniam valeat, supra jam indigitatum fuit, sicuti & mea quaecunque ratiocinia ex supra allegatis observationibus confirmari posse, spero. Cæterum licet re vera in statu p. n. fuerit constituta, dicta mulier, nihilominus suas deinde, à febre libera, functiones peragere potuit, quo magis tumor in tali parte hæsisse videtur, quæ absolute tum ad vitam, tum ad motum non erat necessaria. His itaque forsan ex causis aphona fuit reddita ægra.

§. VII.

Nihil jam amplius restat, quam ut paucis etiam exponam, qua ratione tantum beneficium rursus receperit. Variis equidem modis loquelam restitui, notum est: memorabile est exemplum filii Cræsi, qui à nativitate mutus, dum occisorem in Patrem irruentem videret, terrore amoreque in Patrem exagitatus, miraculo quasi linguae usu donatus est, ut hoc ipso præcaverit mortem Patris. Experientia etiam docet, quod aphonia sæpius diversis remediis fuerit subacta, de quibus tantum tractare longum nimis foret, quapropter etiam silentio involvo methodum Ammani, qua mutos & surdos à nativitate instruit, quomodo loqui queant. Nos tram quod concernit ægram, non adeo difficile erit exponere, quomodo rursus evaserit facunda? modo respiciamus ad ea, quæ supra dixi de apostemate organæ vocalis incumbente; dum enim illud successu temporis ad maturitatem pervenerit, accedentibus crebris & oris collutionibus tandem disruptus fuerit tumor, id quod ex pure sanguine permixto, & ex ore rejecto, facile cognosci potuit. Quod autem clara voce non statim intonnerit, mirum non est, cum partes, loquelæ destinatae, tamdiu ab usu suo quieverint. Accedit præterea illud, quod etiam cacoehyminica existerit, successu autem temporis, & post debita adhibita remedia, ulcere forsan beneficio naturæ sponte sanato, citram recuperavit vocem. Illud tamen ultimo silentio non involvendum esse dico, quod licet valitudine admodum secunda gaudeat, inebetioris tamen & debillioris sit nunc ingenii, cujus phaenomeni rationem forsitan non adeo inepte ab actu in caput, cerebrum concuiente, imo etiam à more derivate quis possit. Habes hic B. L. brevem casus sit curiosi delineationem, quam si minus exasciatam, & hinc inde vacillantem deprehendes, benignitate tua illum suppleas iterum, iterumque contendo.

S. D. G.

CCLVIII
 SIGISMUNDI SCHMIEDER
 SCHEDIASMA

DE

POLYPO OESOPHAGI VERMIFORMI RARISSIMO.

*A quotidiano pulveris Sternutatorii hispanici vulgo Spanioi
 abusu progenito.*

Delitii 1717.

I. J.

P R O O E M I U M.

Per varios casus, per tot discrimina rerum, eripimur terris. Omnes-
 immo hanc in vitam habemus ingressum, diversum vero atque variis
 ex ista egressum. Omnes una manet mors, sed mille dantur viae, per quas
 ad eam mortales ducuntur. Mille perveniendi toto die obveniunt die modi,
 Et iisdem semper illum gelida abripit Et suffocat aqua; aut insani maris ab-
 sorbent fluctus; illum immanis dilaniit fera ac misere discerpit; hunc extio-
 palis excipit furtivus, vel alia res vilissima, nulliusque momenti; illi inspera-
 to vitae terminum abbreviat herba letifera aut culex abiecit; isti nullum
 pretii acida mortem inopinata offert; hunc porro terribile proferunt ful-
 men; illum domus vel murus conquassat cornens, aut terra debilius magna-
 cum eiulata ad infemum trudit; illum latrones in via trucidans cruces,
 misceantque post se relinquentes spectaculum: Huic vitae filium tacite dis-
 sistit sinosa Et improba Venas; illi ignem vitalem extinguit immoderatus Ba-
 chus; isti saltem sub mexatorabili pectore stemus, ira rempe affluens at-
 que memor, cito offert interitum. Multos intervinunt morbi chronici; mul-
 tos acuti; multos denique lues initio, imo pro levissimi haberi, morbi omnem
 praeferam atque expellationem, viventium numero exturbant exterminant
 atque ejiciunt. Adeo perpauci, imo paucissimi, naturae moriuntur morte!
 Qualia multiformis vitae humanae exitus exempla suo in Theatro Tragico Da-

ADA-

ADAMI, dictus MISANDER, copiose congestis, omnibusque secure urventibus ob oculos pensanda posuit. Quibus juve meritoque annumerandus venit praesens casus, oppido curiosus ac rarus, cujus sequentem in modum se habet.

HISTORIA MORBI.

Caupo quidam in pago Posssewitz prope Pirnaviam, Johann Gottfr. GROSSE, Vir annum 43. agens, temperamento sanguineo-phlegmatico, habituque ad cacochymiam admodum proclivi, et lat notabili corporis mole gaudens, mirumque in modum pulveris sternutatorii Hispanici, vulgo *Spaniol*, deliciis effasciatus, A^o. 1714. circa tempus vernale dolorem quendam urentem, a nimia dicti pulveris aliquando facta per nares attractione, in medio oesophagi perlenit, inopinatoque non ita multo post deglutitionem nonnihil animadvertit impeditam. Quamobrem auxilium quærens, Medicum quendam convenit, & de dolore, nunc quidem sopito, at in deglutitionis impedimentum mutato, queritur, cujus affectus causam in pituitosa quadam ac viscida materia, interioribus oesophagi partibus adhærescente, Medicus ponens, convenientia pro illa incidenda, resolvenda atque educenda, ægro præscribit remedia, irritito tamen successu maloque indies indiesque adhuc ingravescente. Hinc æger nihil levaminis percipiens ad alium se confert, ejusve opem implorat, simulque affectus causam infra suo loco paulo specialius reddendam, sibi probabilem, ipsi refert, quam vero hic flocci æstimans, aliamque subesse asserens, ægro remedia, pro nescio quo, acido, spasmoticam hanc fibrillarum affectionem generantem, corrigendo atque eliminando, equidem exhibet; at iterum absque successu sperato. Nulium igitur secunda vice effectum salutarem, hæctenus tam anxie exoptatum, æger observans, in auxilium rursus vocat alium: & quidem me ticastrum rusticum, qui, prioris vestigia legens, pituitosam acremve materiam genantinam ac viscidam hujus impeditæ deglutitionis liberioris exitere causam, pariter pro re certissima asserit, certo citoque, ut imminens id hominum genus, gravi animadversione utique dignum, solet, impedimentum hoc sese ablatum, deglutitionemque liberiores redditurum, certissime pollicetur. Varia hinc ægro porrigit, quorum usus, insignis licet pituitæ copia fuerit educta, plane denuo fuit inanis atque nullus, cum ne minima levaminis cujusdam pars ægro inde fuerit allata. Derens ergo & hujus hominis vani medelam æger, naturæ & temporis sese tantum committere animi induit, sponteque sua forsitan hoc malum iterum cessaturum firmiter sperat. Interim vero *Pemulion Ventriculi*, vulgo *die Magen-Börste*, remedium illud barbarum, de quo multa ha-

Ffff 2

Ænus

Et nus inaudieret, consulit, istud applicat, ejusque ope sat notabilem e quidem educit pituitosæ materis coctam, nullo tan en inde subsequente levamine. Ad quæstionem, num ex applicatione peniculi tentaret dolorem? respondit: eum quidem se non sensitse, inter in tamen difficilem, imò in ventriculi cavitatem ejus penetrationem haud possibilem, ob quoddam in gula obstaculum perceptum, plcnarium periculi ingressum prohibens. Paulo post, loco sperati effectus salubris, magis magisque malum augeri animadvertit patiens, adeò, ut solida tandem alimenta haud amplius assumere valeret, sed liquidis tantum, e. g. lacte, jussulo avenaceo tenui &c., famem sedare corpusque valde jam emaciatum nutrire cogeretur. Imò, tantum hic affectus demum sumisit incrementum, ut recensita jam liquida tenuia libere exinde deglutire haud valuerit, sed mediante calamo stramineo ista absorbere necesse habuerit miser. Quamprimum enim paulo liberius largitusque ea sorbere voluit atque deglutire, ea statim cum sonitu regurgitarunt, præsentaneam ægrò suffocationem minutata. Tandem hic, de cetero sanus, liberaque respiratio gaudens, denur Medici cujusdam auxilium implorat, petique, ut sibi suppetat ferantur. Hic, in affectus hujus admirandi causis occasionales paulo curatius inquirens, variæque ex eo quærens, alia inter quoque ea, de quibus superius jam nonnihil fuit adductum, audit: ægrum nempe nimis in usum vocasse pulverem sternutatorium, eundemque dubio procul miserandi hujus mali primam extitisse causam occasionalem. Et, quo evidentior veriorque causa hæc appareat, factum fuisse refert æger, quod pulvis hic, præsertim siccissimus summeque volatilis, corpore aliquando calefacto, & sudoribus probe diffuente, naribus copiose intrusus, fortiterque inspiratus, non solum in asperam arteriam, verum etiam in fauces & gulam usque, penetrarit, tussim, eamque frequentem & molestam, nec non in gula ardorem, una cum dolore primum obtuso, sanguisque sputo, excitavit. Ex quo tempore statim dolorem haud lenem, & hoc evanescente, deglutitionis impedimentum, fuisse exortum, ulterius confessus est æger, sancteque affirmavit, nunquam in vitæ simile, nec etiam vel levissimum, in oesophago percepisse deglutitionis impedimentum. Hæc omnia Medicus percipiens, excrecentiam quandam cartilagineam, ex læsione oesophagi obortam, adesse, ægrumque in extremo vitæ periculo constitutum, pronunciat, cujus terminum, inevitabile nunc fatum, cui æger solum relinquendus erat, accelerare visum fuit. Ob nutritionis enim debitæ defectum corpus obesum adeo fuit extenuatum, ut magis *videbatur* ^{videbatur} ^{videbatur} quam vivi hominis, faciem repræsentaret. Ultimo liquidorum etiam ne guttulam quidem assumere amplius potuit, quo venit, ut post aliquot dierum spatium, mense Aprili anni 1715, fame sitique incredibili emaciatus fractusque misere tandem perierit. Cadaver quo aperiretur, causaque tam stupendi affectus detegere- tur inque lucem protraheretur, vivens adhuc æger petiit, hac tamen conditione,

ditione, ut absque sumtibus sectio institueretur, quod etiam ita factum fuit. Aperto itaque decenter nunc cadavere, ventriculus A. in fig. 4. partesque internæ, a statu naturali adeo remotæ non fuerant inventæ, exceptio tantum oesophago, qui a B. usque ad C. nonnihil contortus & pharyngem versus solito tenuior atque acuminatior apparuit, & quidem adeo, ut ejus apertura, alias satis ampla, vix pirum admittere fuerit visa. Quo autem, quæ intus forte laterent, nunc quoque luci exponerentur, ille incitus fuit, quo facto, ad omnium stuporem conspectui præiens delineata sese stitit insignis excrescentia carnea, per medium Fig. 1 & 3 d d d divisa, quæ in media oesophagi parte, eaque postica, qua spinæ dorsæ adjacet initium (circa quod aliquis cujusdam materiæ cruoris inspissati ad instar, cernebatur) sumens, ad pylorum usque sese fere extendens, longitudine sex digitorum transversalium, crassitie vero lumbicū insignem, tam in a quam in b, æquabat. cujus etiam faciem aliquo modo mentiebatur. Substantia hujus excrescentiæ (interdum c c c plicatæ, ut ex fig. 3. patet.) rectius polypi, erat carnosol-fibrillosa atque mollis, color vero ex alto rubicundus. Cultro anatomico, & quidem facillime, cum vel digitorum jam attactui cederet, auferebatur polypus sic rarissimus, quo ablato, pedes ejus vel potius radices, quibus in gulæ substantiam se insinuaverat, in conspectum veniebant, quarum velligia b b ob nimiam suam brevitatē, multo elegantius in oesophago aucto, quam ipso in polypo, utpote qui ante interiori adhærebat tunicæ, conspici poterant, uti ex fig. 2. luculenter patet. Et sic impeditæ deglutitionis mortisque miseræ causa, de qua nemini hædenuc quicquam fere in mentem venerat, detecta nunc conspicietur, dignaque judicabatur, quæ rarioribus medicorum observationibus infereretur, publiceque proponeretur.

Talis itaque fuit Viri hujus in optimo adhuc ætatis flore constituti lamentabilis vitæ exitus, cui procul dubio longius vitæ filum ducere fuisset concessum, dietam si servasset debitam, atque a nimio pulveris hujus usū provide se temperasset, ac in tempore, hoc est, in principio statim, oesophago adhuc dolente & sputo cruento nondum cessante, valetudinem suam rite indicasset. Tantum refert in tempore venire, quod omnium est primum! Cum vero omnis morbi vera cognitio dimidium, ut verissime dicitur, curationis absolvat partem, quæ id nostro, ut videtur, neglecta fuit, nemo etiam miretur, erroneam inde curationem, mortemque demum, ob malum inveteratum & admodum curandi, exortam fuisse atque secutam. Hinc etiam, ait HIPPOCRATES de morbis mulier. Lib. I. p. 615. edit. Fœsti, ἀμεινότερον ἐν ἀρχαῖς τοῦ νοσήσαντος τοῦ πρὸς τὴν ἰατρικὴν τῆς νόσου & paulo post: καὶ ἐν ἀρχαῖς ἀρίστη ἀντιμετώπις τῆ νόσου. Sed, quis polypum heic latuisse divinare potuit, alius in naso præcipue ac corde nidulantem? Ita autem profecto res sese habet circa ea mala, interioris latentia virumque nostrum plane subterfugientia, præsertim,

Εἴς 3.

cum

cum sæpiissime sub alterius morbi facie nobis illudant, cujus illationis exempla e multis in præsentii esse possunt: Abscessus latens, vid. Celeberrimus STAHLII Dissertat. de Hæctica Febre, abscessuum internorum comine; malum hypochondriacum & scorbutus, in *Christ. Johann. LAN- GII* Opp. Medicor. Theoretico-Pract. P. II. Cap. V. § 14 p. 33. & Cap. VII. §. 4. p. 38. Passio Hysterica, in SYDENHAMII Dissert. Epitot. p. m. 487., ejusque Processib. in morbis fere omnib. Curand. p. m. 718. qui etiam evolendi in Append. ad Ephor. Medico-Physic. Academ. Leopoldino-Imperial. annum. X. Decur. II. p. 143. ubi de affectione, in feminis, hysterica, maribus, hypochondriaca dicta; & Polypus Cordis in *Michael. Bernhard. VALENTINI* Pandect. Medico-Legal. P. I. sect. III. Casu XX. p. 344 346. 349. 357. & 34., nec non Praxi Medica Insallib. p. 196. seqq., item in ZITMANNI Med. Forens. Casu XXCIIX. p. 1367. 1369 & 1372 seqq.: Qui morbi, quantis se sub larvis sæpius occultent, ex scriptis ac opp jam allegatis, pluribusque Medicorum Celeberrimorum observationibus, constat, & diligenti prudentique Practico obscurum esse nequit. Sic de polypo cordis quodam, polypo mutabili, prolixum ac memorabile consignavit exemplum jamjam laudatus D. *Mich. Bernhard VALENTINI* in Praxi insallibili allegata, ubi polypus ille admodum curiosus, schemate asthmatis convulsi cum cordis palpitatione indutus, omnibus impotuit Medicis, cui larvam postea, omnium cum admiratione, cadaveris detraxit scissio. Unde clarissime patet, quod medicus prudens non statim hinc vel illi morbo, obscure se provideri, vel sub alius facie apparenti, fidem habeat, sed quam diligentissime in ejus ludificationes inquireat, cum & in Praxi Medica etiam illud: Qui facile credit, facile jam decipitur, obtineat. Quapropter prudenti diffidentia & perseveratione indefessa Medico opus est, imprimis, ubi signi debita non omnia adsunt, nec remedia, alias certissima probatissimaque effectum suum edere observantur salutarem. Et enim vero, hoc opus hic labor est! Debitis ergo & necessariis requisitis,isque tam Medicis quam Philosophis, & judicio præsertim practico exquisito, decenter sit instructus ille, verum hic a falso discernere cupiens. Sed agendum est, cum plura persequi, tum Historiarum præteritæ magnitudo prohibeat, ut ea exponamus & proferamus, quæ exoriri solent. Quare ad propositum nunc veniemus & in eo, quantum fieri poterit, præmissa definitione nominati & reali, atque divisione, generatim in polyporum subjecta, speciatim vero nostri locum natalem, quem descriptum dabimus. inquiramus: Deinde iterum nonnihil in genere polyporum causas delibabimus, speciatim vero præsentis occasionalem ac proximam scrutabimur; ac denique quanto phenomena nonnulla, adjectis quibusdam quaestionibus, ex historia morbi extrahemus; cave quinto soluta dabimus atque explicata. Tu vero,

O Deus!

O Deus! o Vite merito pars maxima nostra!
Virgilius Georgic. Lib. II. v. 40. p. m. 56.

Summe Deus! ventum lenem da vela patenti!
Idem versu, 41.

Da facilem cursum, nostris nunc annue captis!
Idem Lib. I. v. 40. p. 36.

Atque ostende viam, propius res aspice nostras!
Idem Æneid. Lib. primo v. 530. p. 136.

Tuque adeo votis jam nunc adsuesce vocari!
Idem Georg. Lib. I. v. 42.

SECTIO I.

Definitionem Nominalem & Realem atque Divisionem exhibens.

§. I.

Cum primis jam artis nostræ salutaris ætatibus in usu fuerit solenni, nomen ante omnia accuratius cognoscere usum, quo res, quarum notitia acquirenda erat, eo facilius paterent, majorum nostrorum vestigia dum lego, a scopo haud me aberraturum arbitror. in præsentis Dissertationis lumine, si de istius rubricæ significatu nonnihil fecero sollicitus. Scribit equidem Dn. Anton. REIES in Dissen. de Affectib. cum Hæmorrhag. uteri connexione habentibus, Argentorati mense Januario anni 1715. habita: (Dissertationem hanc Inauguralem servus quidam chirurgicus, homo literarum & morum plane rudis, mente Junio jam dicti anni, non sine Illustris Facultatis Medicæ Erfurtensis, verique Dissertationis Autoris, ignominia, turpi conatu, clam nempe ac furtive. sub suo nomine, adjectis multis carminibus gratulatoriis, imprimi curavit, eandemque pro suo labore publice vendidit, uti hoc testantur Acta Inquisitionalia in Curia Pirnaviensi) se nescire, quam vim in vocibus quidam querere soleant, cum parum inde utilitatis ad Medicas redundet, & hæc vocum evolutio non tam ad forum Medicum, quam potissimum Criticum, spectet. Sed quis non videt, hæc verba tangere Scarabæos criticos, qui nulla necessitate sæpius vana ejusmodi verborum aucupia insistant, quisquiasve tales inutiles magno cum susurro & labore congerunt. Usus habet laudem, crimen abusus habet. Nec Medici etiam sana critica carere possunt, quod multis exemplis ac testimoniis, si instituti ratio permitteret, probatum & confirmatum dari posset. Ibi-

liarii

liatri enim non tantum pilulis, pulveribus atque tincturis, adstringendi sunt, longe plura certe istos scire oportet. Verum, re eriamur unde dilapsi sumus. Descendit πολυπους. Jonice & Dorice πολυπους vel πολυψ, a πολυς, ὁ & ψ, ut in vi vocum Polypus idem sit quod multipes, ac rem quandam multis pedibus instructam, in sensu autem Medicò excrecentiam in corpore humano p. n. carnoso fibrosam, multis radicibus, tot quasi pedibus, quibus adjacentes arripit partes, easve iisdem firmiter tenet, donatam, denotat. Unde etiam Polypodium (quibusdam Draco dictum, Germanice ob innatam dulcedinem Engel-Süß, Süß-Wurzel, vocatum) multis radiculis, pedibus, quasi minusculis præditum, quibus in saxorum fissuras, quercuumque partes vetustate corruptas, sese insinuat, easque firmiter prehendit, nomen accepisse videtur. Celebrimus *Georg. Hieron. VELSCHIUS* in pereleganti ac eruditissimo suo Tract. de Vena Medin. conscripto, pag. 110. polypodium, quod annosis innascitur quercubus, pro excremento morbofo habet, quando ita scribit: Imo nec polypodium, quod supra draconem quibusdam dictum animadvertimus, quamvis sui generis sit planta, aliud quam morbus quidam annosæ quercus videtur, quemadmodum & viscorum species, radicibus nodosis & curvatis dracunculis haud absimiles. Quam vere hæc asserantur, perpendant Botanici ac historię naturalis scrutatores.

§. II.

Alii excrecentiam hanc carneo-fibrosam nomen suum à Polypope accepisse volunt, idque non tantum ratione multarum radicularum & pediculorum, quibus hic instructus dicitur, iudicio D. Mich. ETTMÜLLERI Colleg. Pract. Lib. II. cap. V. artic. II. in Tomo opp. II. pag. 361. edit. Weistphal, sed etiam ratione similitudinis substantiæ carneæ, ejusve multici atque tenacitatis pedum, dum omne, quicquid iisdem arripit, firmissime tenere fertur, unde etiam PLAUTUS in aulular. istos homines, qui & capaces sunt atque tenaces, cum Polypis non ineleganter comparat, inquiens: Eo istos novi Polypos, qui, ubi quicquid tetigerint, tenent. Ex quo loco porro videmus, quod hoc vocabulum, Græciæ licet suas debeat origines, in Latium tamen sit receptum, uti ex Horatio. Ovidio aliisque patet auctoribus latinis. Sic HORATIUS Epod. XII. versu 4. sequi. p. m. 128. polypi morbi his in verbis mentionem injicit:

- - - - - Namque sagacius unus odoror,
Polypus, an gravis hirsutis cubet hirsus in ulis;
& Sermon. Lib. I. Sat. III. versibus 38-40 p. 148. seqq.
- - - - - Amatorem quod amica

Tur-

*Turpia decipiunt cœcum vitia; aut etiam ipsa hæc
Delectant: veluti balbinum polypus agne.*

Verum apage sis turpis amator! habeas tibi colum hæc dapes, quibus apprime conveniunt illæ, quas *Manere*. SCAURUS, Consul Romanus, dicente SENECA de benefic. lib. IV. cap. 31. avide ore hæc excepit atque deglutivit. At enim vero redeamus iterum ad rem. Undecunque autem malum hoc, sive a convenientia cum polypo pisce ratione substantiæ istius, sive a pedum multitudine eorumque vim apprehensam firmiter retinendi (quod ultimum assertum priori videtur probabilius) suum acceperit nomen, diutius tamen circa ejus evolutionem, nioram ut neclam, opus non videtur, hinc ad polypi descriptionem pergens, dico, quod ille sit variarum corporis humani partium excrecentia præternaturalis, ut plurimum carnea vel carnofo-fibrosa, mollis, indolens, rubicundo aut incarnato colore imbuta, multisque radicibus instructa. Hæc descriptio, cum & nostræ excrecentiæ oesophageæ competat, jure meritoque etiam ratione substantiæ, coloris & configurationis, polyporum in classe collocanda venit.

§. III.

Cum vero experientia frequens edocuerit, omnem polypum non semper unius ejusdemque substantiæ, coloris atque mollietati, esse, studio in descriptione nostra ad ut plurimum fuit additum. Aliquando enim polypus, ratione coloris, ætatis, substantiæ, qualitatis, quantitatis, sensationis, non semper unus idemque deprehenditur, nec in uno eodemque invenitur loco; unde varietas ejus apud praticos exortæ fuerunt differentiæ atque divisiones. Sic v.g. ratione coloris dispecitur in album, rufum, incarnatum, pallidum & lividum; ratione substantiæ in fungosum, carnosum, carnofo-fibriliosum, ratione ætatis in recentem & inveteratum; ratione qualitatis in benignum, malignum & cancrum; ratione quantitatis in parvum, magnum, mediocre; ratione consistentiæ in mollem, durum, cartilaginofum; ratione sensationis in dolentem & indolentem. Vide PAREI Opp. Chirurg. lib. VII. cap. II. p. m. 232., SEBIZII Spicil. Med. Pract. T. I. P. II. Sect. VII. cap. IV. aliosque. Denique dividitur polypus ratione loci & proprii domicilii in superiorem & inferiorem, ac in polypum cordis, cujus hinc & inde apud supra allegatos VALENTINI & ZITTMANNUM aliosque praticos occurrunt exempla, quorum quinque ego ipse recordor; in polypum bronchiarum & tracheæ, cujus exemplum refert *Eduard. TYSON* in Thomæ BARTHOLINI Actor. Hafniensis. volum. V. observat. 30. pag. 94. sequ.: in polypum meningum cerebri, cujus inter alia mentionem injicit celeberrimus *Johann. Jacob. HARDERUS* in *Dissut. Medico-Pract.* Tom. VII. Gggg Epho.

§. II.

Prius verò quam hoc faciamus, oesophagi denominationis rationem reddere juvabit. Est autem oesophagus vox composita ex verbo *είνω*, fero, porto, & *αἶμα*, edo; ut ita vi hujus compositionis & *εισάγωγος*, locum qui cibum excipit, vel potius instrumentum, quod alimenta alio deponat, denotet. Alimenta enim ab ore & faucibus excepta, fistula hæc cibalis, sphinctere suo per dilatationem recluso, fibrisque hujus motricibus nunc rursus arte sese constringentibus, ulterius ad ventriculum ablegat.

§. III.

Ratione itaque originis gulæ, de situ ejus atque progressu, notandum venit, quod initium illa suum in faucibus sumat, ubi in sensu strictiori pharyngis gaudet nomine. Ab hac enim, utpote cui continua, porticæ & membranaceæ tracheæ parti connata; ad hujus & colli vertebrarum superiorum vel quatuor thoracis, quibus insidet, tractum, recta deorsum tendit, ad quintam vero thoracis vertebra perventus, aortæ descendenti cedens, non nihil dextrorsum, & ad vertebrarum nonam cum eadem lævorsum denuo reflectit, eandemque transcendens, (unde clare satis patet, cur nonnulli corpore vehementer conaffecto, & sanguine quasi fervente, hausto potu frigido, interdum in rigorem incidunt, ut plurimum postea in febrem hecticam & putridam abeuntem. Vulgus ait: *Die Leber ist geschuppet worden*). Ad diaphragm, thoracem & abdomen dividens, pervenit, quo ab ipsi in parte inferiore seu musculos perforato, nervis ab octavo seu pari vago oriundis, nonnullis concomitatis, abdomen ingreditur, demumque cum ventriculo intime unitur. Quo vero munis suis ite defungi queat, provide summum munus, necessariis ipsam ad hæc decenter obeundi, instruxit requisitis. Quapropter debitam ipsi non solum amplitudinem sed & virtutem sese nunc dilatandi, nunc construendi, nec non sufficientem glandularum, serum ad vias lubricandas plorantium copiam, alimentorum recte ad ventriculum perscendendum in gratiam, suppeditavit. Requisite autem jamjam allata sunt muscoli, vasa atque tunicæ, e quibus via hac constata conspicitur, ut in ejus jam paulo specialius evolvenda mirabili videbimus constructione, ad quam absque ullo ulteriori verborum nos nunc conferamus anfractu.

§. IV.

Primum pervenimus ad fauces, quæ omne id comprehendunt spatium, radici linguae ac gulæ interpositum est, quodque alias pharyngis

ryngis seu principii œsophagi condecoratur nomine, siquidem superius gulæ seu œsophagi caput non nisi muscularis faucium esse videtur membrana. Licet autem haud omnino collapsa deprehendatur pharynx, cum eam os thyroideum, quo aer absque ullo impedimento respirationis tempore per os nareve in fistulam spiritalem irruere, atque ex iisdem per eandem viam rursus exprimi queat, distentam servet atque expansam; magis tamen eodem deglutitionis tempore adhuc amplior redditur atque dilatatur. Quem in finem duo præcipue musculorum paria faucibus sunt inserta, quorum prius stylopharyngæum, alterum cephalopharyngæum, appellatur, e quibus illud ex radice processus styloidei, carneo, cove tenui, exoritur principio, atque oblique descendendo lateribus glandulosæ faucium membranæ inseritur; hoc vero ex parte, ubi cervicis caput primæ jungitur vertebræ, enatum descendendo in elationem pharyngis partem implantatur. Musculis hisce principium versus contractis necessario fauces redduntur capaciores, aptioresque ad alimenta eo felicius excipienda evadunt. Hinc iis nimium inflammatis atque contractis, cum hic alimentorum ex ore ad gulam transitus sit interceptus, difficillime, imo pessime, deglutitionis negotium procedere observamus.

§. V.

Perventis sic ex ore ad fauces alimentis, & ad deglutitionem a dentibus atque saliva præparatis, non diu hic moram necunt, sed statim a contractivo pharyngis motu in angustum fistulæ cibalis canalem exprimuntur, cui motui non tantum œsophagus seu gulæ sphincter, sed etiam pterygopharyngæi inserviunt musculi, qui principio lato gracilius ac carneo ex ambobus pterigoideis processibus atque radice lingulæ, nec non etiam partibus ossis hyoidei extremis enascuntur, atque carnis fibris semicircularibus excurrunt, quæ & supernam & posticam tunicæ glandulosæ pharyngis partem ambientes, in media quasi linea concurrunt, in quam etiam omnino inferuntur. Ad horum musculorum munus quod attinet, in eo consistit, quo fauces ad alimentorum in gulam expressionem promovendam coarctent, eoque simul tempore amygdalas reliquas, quæ glandulas iis substratas ad feri sui intus contenti emissionem constringant, ut alimenta eo facilius citiusque ad ventriculum demandari queant. Tandem adhuc œsophagus seu gulæ sphincter considerandus restat, qui non nisi musculorum jam nominatorum continuatio esse videtur: uti enim hi elatiorem, ita ille e contrario, inferiorem, pharyngis complectitur partem, atque ex utroque cartilaginis cricoidæ latere carnis enascitur fibris, quæ simili postea modo ad posticam pharyngis lineam protense in eadem terminantur, ut adeo iis contractis alimenta necessario in adnatum canalem, gulam nempe, expel-

expellantur. Nonnulli adhuc plures eorum numerant, ut VALSALVA, natione Italus, qui in tract. suo de aure humana, sequentia musculorum recenset paria, eademque æri incisa exhibet, nempe 1.) staphylopharyngæum, olim pro cephalo-pharyngæo habitum; 2.) glossopharyngæum, olim sphæropharyngæum nuncupatum; 3.) stylopharyngæum; 4.) hyo-pharyngæum; 5.) thyropharyngæum; & denique 6.) crico-pharyngæum. Verum enimvero, ad supra recensitorum principia & insertiones diligenter respicienti observatori perspicile patebit, horum multiplicationem præter ullam necessitatem fuisse factam.

§. VI.

Explicatio nunc faucium atque oesophagi musculis ulterius ad gula vasa, substantiam ejus percurrentia, sique tunicas, ex quibus hæc deglutitionis organa composita comparent, progredimur, ubi primum tamus, duplicis vasa esse generis, adducentia nempe atque reducentia. Ad hæc venæ pertinent ac vasa lymphatica; ad illa arteriæ ac nervi. Ad arterias, sanguinem in nutritionis gratiam adducentes, quod attinet, ista in collo a carotidibus, in thorace ab intercostalibus, nonnunquam etiam bronchiali Ruyschiana, & in abdomine a coronariis, suam ducunt originem. Nervi, quibus gula gaudet, motus & sensus causa spiritus animales, tertiam corporis humani partem essentialem, quæ nempe, constituentes, adducentes, pari octavo seu vago suis debent natales. Venæ sanguinem superfluum reducentes, vasisque majoribus iterum infundentes, similiter in collo jugularibus, in thorace azygo seu venæ sine pari, & in abdomine coronariis, inferuntur. Ad vasa lymphatica harum partium quod spectat, de iis nihil asserre possumus, cum eorum existentia, de quo tamen haud dubitari potest, nondum fuerit demonstrata atque detecta.

§. VII.

Vasa ulterius excipiant tunicae, quarum nonnulli anatomicorum tres, nonnulli quatuor, nonnulli etiam, ut VERHEYEN in Anatom. Tract. III cap. 10. p. 289., quinque statuunt, quarum prima, eaque externa, mera est membranacea, oesophago non tantum investiendo, sed eidem partibus vicinis alligando, interserviens. Cum vero interdum fibris perquam exilibus nerveis prædita conspiciatur, a non nemine inde membranofo-nervea quoque dicitur. Altera, quæ huic subjacet, carnosomusculosa appellatur, atque ex duplici fibrarum serie, longitudinalium nempe, ac circularium sive rectius spiraliū, componitur, quam duplicem fibrarum seriem WILLISIUS in Pharmaceut. Ration. S. Diatr. de Medicam. Operat. in humano corpore P. I. Sect. I. cap. 2. p. m. 7. G g g 3. equi.

equidem admittens, ratione vero earum progressionis ab aliis dissentiens, unam earum ascendere, alteram vero descendere, asserit, quam hanc ad deglutionem, illam autem ad vomitionem, facere contendit. At enim vero recte de hac opinione Willisiana Da. ΤΑΥΚΥ in Anat. sua nova Ration. Illustr. edit. Lat. p. 18. hunc in modum scribit: Cum impossibile sit præcise determinare, quænam istarum serierum ascendat, quænam descendat, cumque utriusque seriei fibræ easdem adhesiones & conexiones eandemque configurationem obtineant, cognosci non potest, an diversis interviant usibus, nec ne? In homine serierum una ex fibris longitudinalibus, altera ex circularibus, contexta est.

§. IIX.

Tertia, quæ vasculofæ nomen gerit, ex fibris irregularibus innumerisque vasculis laxè conflata est, siquidem infinita pene vascula œsophagi perreptant substantiam. Eam quod concernit, quantum ad me attinet, superfluum ac præter necessitatem ab Anatomicis exsculptum iudico. Quis enim nescit, omnes corporis partes permixtis instructas esse omnis generis musclicis, quorum e vario progressu & concursu paulo latiori ac compressiori li semper novam effingere vellemus tunicam, multis in partibus ea reliquis adhuc adjicienda foret. Videmus v. g. hoc in oculi structura mirabili, cujus tunicæ conjunctivæ, album oculi constituenti, insignis vasculorum sanguiferorum super injecta apparet copia, tunc demum sub visum cadentium, quando oculos inflammatos ruboreque insigni perfusos conspiciamus. Quis vero ideo hæc vascula, longe lateque tunicam hanc adnatam pervadentia, pro nova vellet vendicare membrana, atque peculiari. Sed hæc ^{sic de præteritis} VERHEYENII vasculofam quartam nunc excipit, glandulosa nempe, quæ membranam quandam, ex fibris secundum fistulæ cibalis longitudinem excurrentibus constructam, & hinc inde glandulis copiose conspersam, l. a. pag. 291. . . designat, ut adeo hujus tunicæ ministerio gula serum ejusdem lubricationi inserviens, conficiat. Huic demum adnata deprehenditur quinta, quæ teninea est, \ut alias vocatur, & ex fibris secundum longitudinem expositis coalescit, cujus superficies crassa villosa, lanugine quadam investita:

§. IX.

Ex his hæcenus adductis atque expositis dilucide satis apparet, quo officio fungatur œsophagus, quâ structura eaque mira ac subtili gaudeat, & quæque mala, viâ hac læsâ, inde oriuntur. Sc & deglutionis & respirationis negotium pessime procedere, ægrumve maxime mortis in articulo tunc temporis constitutum videmus, quando œsophagi

phagi latera, quod quidem raro fit, coalescunt, quale triste admodum exemplum clarissimus VERHEYEN l. a. 296., & BONETUS Medic. Septentr. P. I. p. 504. adducunt; vel quando hæc alimentorum via paralyti laborat, de qua WILLISIVS l. a. p. ita scribit: Novi quosdam ob paralytin in hac oesophagi tunica carnea excitatam, deglutitionis magna difficultate laborasse, aliosque, ob fibras penitus resolutas, fame interiisse. Vid. etiam BONETUS l. c. p. 500.; vel quando fauces atque gula, ut in hysteriis non raro observamus, spasmodica corripuntur contractione, adeo, ut ægrotantes de corpore quodam gulam ingressi, quod ex opinione plebeja uterus existimatur. *Die Mutter wäre ihnen in den Hals gefahren*, conquerantur, siepeque suffocationis inde incurrant periculum; vel quando fauces atque oesophagus, ut in angina fieri observamus, gravi afficiuntur inflammatione; vel quando glandulæ, juxta quintam thoracis vertebra oesophago accumbentes, nimis intumescunt, eamque viam valde coangustant, & ad deglutitionis negotium perficiendum ineptum reddunt, quales casus nonnullos se observasse testatur DIEMERBROECK opp. lib. II. cap. 16. p. m. 326. ita scribens: Hæc glandulæ nonnunquam ab humorum influxu ita intumescunt, ut nimium comprimant & angustum reddant oesophagum, sicque potui & cibo, omnique alimento, transitum præcludant, hominemque fame & siti enecent, quales tres quatuorve in praxi nostra occurrentes vidimus casus.

§. X.

Licet vero oesophagus vel coalitus, vel inflammatione correptus, vel paralyticus, vel penitus resolutus, vel spasmodicus, vel a glandularum intumescencia compressus, vel tunica sua spoliatus, vide BARTHOLINI actor. Hatinienf. volum. I. observat. 119. p. 212. & vol. III. observat. 30. pag. 62. seq.; vel plane cartilagineus, vid. BONETUS l. a. p. 504. fuerit observatus: Simile tamen exemplum, quale nostrum, vix ac ne vix quidem reperiatur, dignum ideo judicatum, cujus memoria eruditis inter retineretur.

SECTIO III.

Generatim polyporum, in specie vero præsentis causæ remotæ & proximæ exponens.

§. I.

Omnes Polyporum causas hic recensere occasionales, res non solum esset nimis proluxa, & ab instituto nostro aliena, sed quoque diffi-

difficilis, cum earum numerus prope sit infinitus. Nunc enim polypo occasionem subministrat vel causa interna, vel externa; ad quam priorem pravæ sanguinis qualitates; ad posteriorem vero variæ injuriæ externæ, v. g. contusio, hæmorrhagia, frictio, & sic porro, pertinent. Sic de polypo à contusione in naribus excitato videri potest *Job. van MECKERN* observat. chirurg. XI. & XIII; à frequenti hæmorrhagia narium & catarrhis acrioribus, *Mich. ET MULLERUS* tom. opp. II. pag. 862; à narium frictione frequenti & forti *KEACKRINGSIUS*, spicileg. anatom. observat. XIV. Sic porro Polypus cordis ab humoribus viscidis, glutinosus in sanguine hospitantibus, qui facile a superveniente terrore, hauftu potus frigidi, tempore ætatis corpore calente, generari possunt, oriri potest. Hoc enim modo gelatinosæ sanguinis partes atque fibrosæ in grumos abire solent, qui in cordis auriculis ventriculisque compressi, per quos una cum sanguine quia transire commode non valent, in ejusmodi corpus grumosum atque fibrosum radices postea figens, & à continuo appellente sanguine incrementum capiens, successive coalescunt. Alio tempore polypus cordis ab acido in sanguine hærente, nec non etiam à morore similibusque animi pathematibus, experientia *Michael. Bernh. VALENTINI* in pandect. medico-legalib. supra allegatis, verbo: ab omnibus istis rebus ac causis, sanguinem solito viscidiorum glutinosiorem reddentibus, spirituve animales absumentibus, excitatur.

§. II.

Ad occasionem itaque præsentis casus quod attinet, duplicem in nostro subiecto considerandam habemus, quarum una est cacochymica corporis constitutio, altera pulveris sternutatorii abusus, qua occasione, antequam longius progrediamur, de pulveris hujus sternutatorii denominatione, præparatorie, natura ac principiis, cum id à re nostra non alienum videatur, in præsentem non nihil asseremus. Vocatur hic pulvis sternutatorius a patria, ubi primum confectus fuit, *HISPANICUS*, vulgo *SPANIOL*, cujus præparationis modum *Dn. D. THEBESIUS* in Tract. von Rauch- und Schnupf-Taback cap. 6. p. 62. sequentem esse ait: *Die Spanier machen ihn auf eine andere Art* (paulo enim ante de Italorum eum conficiendi modo locutus erat) *aliso sie einen guten Crostharischen Tobak nehmen und in einem geheitzten Zummer sehr stark trocknen, daß er sich mit denen Händen leicht zerreiben läßt: Diesen also wohl getrocknet, thun si in zwey von klarer Leinwand gefestigte Sacken, welche ein eigener Mann, der sich die Augen, Nase und Mund, mit einem besondern Instrumet vermacket und verwahrt hat, (de incommodis & morbis eorum, qui hunc pulverem præparant, vid. *Christ. RAMAZZINI*, tract. de morbis artific. cap. 17. p. m. 114. seqq.)*

in

in einen andern Gemache stark zusammen rü'n und flossen muß, daß ein solches zartes Pulver, unter der Gewalt eines Rauchs, durch das dünne Tuch heraus fliehet, welches in dem ganzen Zimmer sich allenthalben anleget, so gesammelt und zum Gebrauch verworret wird. Dieses Pulver ist so zarte, als immermehr ein Staub-Meel seyn kan, und wird von seinem Vaterlande, wo es zubereitet wird, Spauul genennet. Eine andere Sorte wird uns aus Portugall überbracht, so nicht altzukulr ist, und zugleich als der roth-gelben Farbe in die grüne fället. Es wird auch von den Portugiesen zugerichtet aus den Blättern des besten Virginischen und Brasilianischen Tabacks, so zuvor in Rosen-Wasser geweicht sind, daß die altzstarke Schärffe etwas ausgezogen und gemindert werde, hernach werden solche wiederum getrocknet, und auf die nächst bequeme Art zu Pulver gemacht. Hic ille hactenus. Pulvis hic ultimus est optimus, cum non adeo volatilis, nec etiam tam acris, ac prior, observatur, cujus, alterius nempe speciei, usum ego dissuaderem, præcipue cum haud amplius genuinus, sed admodum adulteratus, variisque, ut percelli liquoribus, vetustus inprimis & vapidus, infectus ad nos deferatur.

§. III.

Ino, cum insignis & perquam copiosus pulveris hujus usus nostræ terræ incolæ istius præparationem per speciem quandam molarum manubris instructarum, vulgo *Hand-Mühlen*, quoque docuerit, dici profecto non potest, quantam adulterationem quamque depravationem execrabilis auri sacra fames atque habendi cupido huic adjecerit pulveri. Competum enim ipsemet multoties habeo, ut ab aliis etiam relatum accepi, istius confectores omnes quicquiliæ, omnes petiolos sui correptos, filiaque deperdita, simul conterere, inque pulverem convertere. Quæ inde igitur non exoriantur, prohi dolor! gravia mala, eaque haud vero tristia! Usus genuini laudem, ceterum abusus, habet. Modum itaque excedentes, propter virulentiam narcoticam & stupefactivam adeoque perniciosam, gravissima atque desperata sæpius incurrunt mala, qualia Exempla adducunt JACOBUS VI. Rex Angliæ, in pecul, Tractatu Misocapni nomen gerente, WILLISIUS Pharmaceut. Ration. P. I. Section. VII. cap. III. p. m. 200., *Johann. Chrysostom.* MAGNENUS in Eleganti Exercit. de Tabaco Exercit. IIX. §. 1. pag. 105. & 109., *Sim. PAULI* in Commentiz. de usu & abusu Tabaci & herbæ Theæ p. m. 6. seq., *Mich. ETMULERUS* Colleg. Pharmaceut. in SCHROEDERI Pharmacop. Medico-Chym., P. I. Sect. Class. I. Tom. Opp. I. pag. 614-616. edit. Westph. I., GREMBIUS Arbor. Inceptæ & Ruin. Homin. Lib. III. Cap. I. §. 37., *Adrian. SPEIGELIUS* in Corp. Humani Fabrica Lib. VIII. cap. 2. p. m. 243., *THEBESTIUS* in Tract. supra alleg. p. 65. seqq. ESTIENNE & LIBAULTIUS de Dispens. Mexico. Præf. Tom. VII. H h h h Pagricul-

difficilis, cum earum numerus prope sit infinitus. Nunc enim polypo occasionem subministrat vel causa interna, vel externa; ad quam priorem pravæ sanguinis qualitates; ad posteriorem vero varix injuriæ externæ, v. g. contusio, hæmorrhagia, frictio, & sic porro, pertinent. Sic de polypo à contusione in naribus excitato videri potest *Job. van MEËCKERN* observat. chirurg. XI. & XIII; à frequenti hæmorrhagia narium & catarrhis acrioribus, *Alib. ETMULLERUS* tomo opp. II. pag. 862; a narium frictione frequenti & forti *KERCKERINGIUS*, *Spicileg. anatom. observat. XIV.* Sic porro Polypus cordis ab humoribus viscidis, glutinosis in sanguine hospitantibus, qui facit a superveniente terrore, haustu potus frigidi, tempore ætatis corpore calente, generari possunt, oriri potest. Hoc enim modo gelatinosæ sanguinis partes atque fibrosæ in grumos abire solent, qui in cordis auriculis ventriculisque compressi, per quos una cum sanguine quia transire commode non valent, in ejusmodi corpus grumofum atque fibrosum radices postea figens, & à continuo appellente sanguine incrementum capiens, successive coalescunt. Alio tempore polypus cordis ab acido in sanguine hærente, nec non etiam à merore similibusque animi pathematis, experientia *Michael. Bernh. VALENTINI* in pandect. medico-legalib. supra allegatis; verbo: ab omnibus istis rebus ac causis, sanguinem solito viscidiorum glutinosioremque reddentibus, spiritibusve animales absumentibus, excitatur.

§. II.

Ad occasionem itaque præsentis casus quod attinet, duplicem in nostro subjecto considerandam habemus, quarum una est cacochymica corporis constitutio, altera pulveris sternutatorii abusus, qua occasione, antequam longius progrediamur, de pulveris hujus sternutatorii denominatione, præparatorie, natura ac principiis, cum id à re nostra non alienum videatur, in præsentem non nihil asseremus. Vocatur hic pulvis sternutatorius a patria, ubi primum confectus fuit, *HISPANICUS*, vulgo *SPANIOL.* cujus præparationis modum *Dn. D. THEBESIUS* in *Tract. vom Rauch- und Schnupf-Taback* cap. 6. p. 62. sequenter esse ait: *Die Spanier machen ihn auf eine andere Art* (paulo enim ante de stolorum eum conficiendi modo locutus erat) *also sie einen guten Crosthanischen Tabak nehmen und in einem geheitzten Zimmer sehr stark trocknen, daß er sich mit denen Händen leicht zerreiben laßt: Dessen also wohl getrocknet, thun si in zwey von klarer Leinwand gefertigte Säcken, welche ein eigener Mann, der sich die Augen, Nase und Mund, mit einem besondern Instrument vermalet und verwahrt hat, (de incommodis & morbis eorum, qui hunc pulverem præparant, vid. *Clariss. RAMAZZINI*, tract. de morbis acutis, cap. 17. p. m. 114 seqq.)*

in

in einen andern Gemache stark zusammen rü'n und stoßen muß, daß ein solches zartes Pulver, unter der Gestalt eines Rauchs, durch das dünne Tuch heraus fliehet, welches in dem ganzen Zimmer sich allenthalben ansetzt, so gesammelt und zum Gebrauch verwahrt wird. Dieses Pulver ist so zarte, als immermehr ein Staub-Meel seyn kan, und wird von seinem Vaterlande, wo es zubereitet wird, Spasial genennet. Eine andere Sorte wird uns aus Portingall überbracht, so nicht allzunklar ist, mit zugleich als der roth-gelben Farbe in die grüne füllet. Es wird auch von den Portugiesen zugerichtet aus den Blättern des besten Virginischen und Brasilianischen Tabacks, so zuvor in Rosen-Wasser gewaschen sind, daß die allzu starke Schärffe etwas ausgezogen und gemindert werde, hernach werden solche wiederum getrocknet, und auf die nächst bequeme Art zu Pulver gemacht. Hæc ille hactenus. Pulvis hic ultimus est optimus, cum non adeo volatilis, nec etiam tam acris, ac prior, observatur, cujus, alterius nempe speciei, usum ego dissuaderem, præcipue cum haud amplius genuinus, sed admodum adulteratus, variisque, ut percepi, liquoribus, vetustus inprimis & vapidus, infectus ad nos deferatur.

§. III.

Imo, cum insignis & perquam copiosus pulveris hujus usus nostræ terræ incolæ istius præparationem per speciem quandam molarum manubris instructarum, vulgo *Hand-Möhlen*, quoque docuerit, dici profecto non potest, quantam adulterationem quamque depravationem execrabilis auri sacra fames atque habenti cupido huic adjecerit pulveri. Comperit enim ipsemet multoties habeo, ut ab aliis etiam relatum accepi, istius confectores omnes qui quilibet, simul conterere, inque pulverem convertere. Quæ inde igitur non exoriantur, prohi dolor! gravia mala, eaque haud vero tristia! Usus genuini laudem, cumque abusus, habet. Modum itaque excedentes, propter virulentiam narcoticam & stupefactivam adeoque perniciosam, gravissima atque desperata sæpius incurrunt mala, qualia Exempla adducunt JACOBUS VI. Rex Anglæ, in pecul. Tractatu Misocapni nomen gerente, WILLISIVS Pharmacut. Ration. P. I. Section. VII. cap. III. p. m. 200., Johann. Chrysostom. MAGNUS in Eleganti Exercit. de Tabaco Exercit. IIX. §. 1. pag. 105. & 109., Sm. PAULI in Commentar. de usu & abusu Tabaci & herbæ Théæ p. m. 6 seq., Mich. ETMULLERUS Colleg. Pharmacut. in SCHROEDERI Pharmacop. Medicor. Chym., P. I. Sect. Cl. II. Tom. Opp. I. pag. 614-616. edit. Westph. I., GREMBIUS Arbor. Inintegræ & Ruin. Homin. Lib. III. Cap. I. §. 37., Adrian. SPEIGELIUS in Corp. Humani Fabrica Lib. VIII. cap. 2. p. m. 243., THEBESIVS in Tract. supra alleg. p. 65. seqq. ESTIENNE & LIBAULTIUS de Dysp. Meico. Praef. Tom. VII. & H h h h & Paginul.

l'agriculture p. 187. Hinc oleum *Tabaci* destillatum perniciosissimum venenum est: Sicut Florentiæ in Italia prostat o eum *Tabaci* destillatum, quod pro atrocissimo veneno habetur. Ibidem recipiunt *Tabacum* vino muceratum, huic introduunt acum, eamque ita madidam insigunt animalibus quibuscunque, quæ mox ab ictu pereunt. Paucæ certe olei destillati *Tabaci* guttulæ quodvis animal enecant: Si enim recipitur hoc oleum, in quo particulae *Tabaci* omnes concentratae, ejusque gutta unica linguae felis vel canis similique animali insilietur, ea statim exinde redduntur rabida, ac tandem moriuntur: item si filum oleo hoc destillato illitum & intoxicatum gallis aut gallinis similibusque cum acu per coxam, aut carnem in pedibus, traducatur, exinde mox intereunt. Si in vulnus gutta unica immittitur, statim interficit, cujus quædam exempla a Celeberrimo D. *Michael ETTMULLERO* in Colleg. quodam Pharmaceut. manuscripto, ab Illustris Academ. Nat. Curios. Socion. Astro. D. *Wesphalo* benevole mihi communicato, ex *RHEDI* Experim. Indic. allegantur. Interne quoque gutta unica olei hujus assumpta miras praecordiorum angustias, vertigines ac scotomias, inducit, experientia jam laudati *ETTULLERI*. Porro nec viperæ aliæque serpentes *Tabacum* ferre possunt; si enim circa spinam tantulo vini, oleo hujus destillato imprægnati, adsparguntur, intereunt; imo si *Tabaci* fumus serpenti aut viperæ afficitur, mox intoxicatae stupent & mortuæ quasi jacent. Conf. sæpe laudatus *ETTULLERUS* in Colleg. manusc. allegato, *RHEDI* Experim. circa res ex India allat p. 10. 40. seqq.; & *L'EMERY* Cursus Chimiçi P. II. cap. XIV. p. n. 602. ubi summi p. 604. refert, oleum hujus destillatum, subtili incisione cutis in coxa aut crure canis, mediante turunda imbuta nimissimam, eundem cum impetu supra & infra purgasse, utut alias animal. obusissimum: quod etiam ex *Tabaci* foliis clysteribus ad unciam dimidiam incoctis sæpe observavit suura allegatus. Academ. Naturæ Curios. Socius noster. testantibus ejus Litteris familiaribus: Sicut pariter *ETTULLERUS* in Colleg. Pharmaceut. ad *SCHROEDERUM* Tom. Opp. I. p. 615 edit. *Wesphal.* in *Traxi* expertus est, Clystina ex decocto *Tabaci* paratum corpus mere turbasse, ac convulsiones, sudores frigidos, maxinaque mala alia, induxisse, unde probe notanda, quæ Poeta Italus habet:

Molto Barco e Tabacco uccide un huomo.

§. IV.

Gravia igitur ob detrimenta a pulveris hujus abusu excitata quibusdam olim in Regionibus usus *Tabaci* sub utriusque forma a summo Magistratu admodum severe fuit prohibitus. Sic Dn. *OLEARIUS* in *Inn. suo* *Moscovit. & Persico* Lib. III. Cap. 6. p. m. 197. & cap. 19. p. 289. scri.

scribit : Moscoviæ Imperatorem , ob insignem utriusque Tabaci abusum , anno 1634. Mandato publico prohibente , ut ne quis Ditiori uæ & Provincis subiectus Tabacum inferret , vel in iis Tabaco uteretur , lecus autem qui facturus esset , & Mandato non pariturus , ei non solum peratissimam certo fore fustigationis aut virgarum poenam , sed & quæque alarum nasi bifidas sectionem. Cujus infamiae nota affectorum aliquot sibi luisse in itinere obvia factorum exempla nosse testatur auctor : quam gravem eandem animadversionem in Mandati Regii Perfici transgressores idem Lib. V. cap. 31. p. 645. annotat. Tabaci quoque usum subditis suis aliisque omni modo dissuasisse JACOBUM VI. Magnæ Britanniae Regem , legimus , qui hoc in Fract. supra §. III. allegato , assensu ROSTRERIO in Disputat. de Jure Tabaci §. 3. , sequens promulgavit Edictum : Tandem , o Cives ! si quis pudor , rem insanam abijcite , ortum ex ignominia , receptam errore , frequentatam stultitia ; unde & Nummis accenditur ira , corporis sanitas atteritur , res familiaris arroditur , dignitas Gentis senectis donii , vilescit foris : Rem visu turpem , olfactu insuavem , cerebro noxiam , pulmonibus damnosam : & si dicere liceat , atri fimi nebulis tartareos vapores proxime representantem. Alii hoc Edictum non de usu , sed de cultura Tabaci intelligunt : Vid. Hist. orbis Ferrar. Geograph. & Civit. , Francofurti ad Oderam Anno 1673. edita , Cap. 3. §. 4. , ubi : Tabaci culturam in Agris Gloucestrensi- bus non minori cum successu tentarunt , sed Edictis Regiis quanquam ægre retracti sunt , quod metueretur , ne , si in ipsa Anglia inflimeretur , Coloniarum Americanarum inde detrimentum caperent. Sed hæc & in *capit. 2.* cum heic non tam de fumigatione Tabaci , quam potius de pulveris illius per nares attractione , disseramus.

§. V.

Hæc enim adeo hisce temporibus increvit , ut in consuetudinem plane abiit , nec amplius remedii loco pulvis hic habeatur. Hinc in salutationum officio & magnifico prandiorum atque cenarum apparatu , magnum aliquod omisum videtur , nisi isto quoque tempore nuptiis pyxide nunc eburnea , nunc e testudinis marinarum scuto formata , nunc argentea , inaurata gemmisque splendidis condecorata , ut & imagine intus , plerumque lasciva & turpi , exornata , singulari quodam cum corporis motu verborumque circuitu , producta aliisque oblata , nares perpetuo hoc pulvere vexentur , atque insigni sternutationis strepitu , fuscis hujus pulveris produræ inspiratio , nescientes interea hujus perverse consuetudinis Amatores eam & contra decorum & munditiei leges esse , nares , cloacarum facies representantes , gerere. Imo legibus tantis pessimum hunc morem e Gallia ad nos aliasque Regiones profectum & versari , nemo fore credit , sed elegantia putatur ad Gallorum etiam hæc in re vi-

H h h h 2

vere

vere meatem. De qua stulta imitatione BARCLAJUS quoque in Icon. Animor. Cap. III. p. 89. edit. BUCHNER. ita scribit: Vicinæ autem aliaque etiam gentes. ridiculo errore deceptæ ad illorum quoque mores, per earundem vestium ac motuum variam imitationem, putant accedere ignaræ, leporis & gratiæ virtute in nonnullis hominibus uno genio cuncta placere; in aliis autem, in quibus natura ad hos mutabiles habitus propitius non est, ejusdem venustatis imitationem & curam ingratam esse ac ludæram. Immensam hanc sternutatorii pulveris libidinem non tantum Cives quam plurimos oppidanos, sed ipsos etiam Pagorum Rusticos, tam nostræ quam exterarum Regionum gentis, mirifice delectari, nasque pica vexari, conventus nuptiales, cautionarii &c. quotidie fere testantur: quod quadraginta jam hinc annis de Curlantiæ rusticis observavit Ducis Wurtembergici Archiepiscopus meritiſſimus, Academia nostræ sapius laudatæ focus nunquam otiosus, Dn. D. LENTILIUS, in Ephemer. Anno X Decur. II. Append. pag. 131. tabacino hoc pulvere minus, quam ipso pane, carere potentibus. Salutationis, pergit Vir Excellentissimus, quedam apud ipsos species, dum rustico rusticus sit obviam, ut n'cotianæ suam quisque thecam sibi vicissim offerant, quod ni fiat, incivile prorsus habetur. Quis non cum HORATIO Epist. XIX. Lib. I. versu 19. p. m. 249. jure meritoque exclamet: O Imitatores, serventur pecus! Arrigite igitur aures, quæ SENECA, homo gentilis, de vita Beat. Lib. I. p. m. 652. his verbis ait: Nihil magis præstandum est, quam ne pecorum ritu sequamur antecedentium gregem, pergentes non qua eundem est, sed qua iur: Atqui nulla res nos majoribus malis implicat, quam quod ad rumorem componimur: optima rati ea, quæ magno assensu recepta sunt, quorum exempla nobis multa sunt; nec ad rationem, sed ad similitudinem, vivimus. Inde ista tanta coærvatio aliarum super alios ruentium &c. Verum, eo hodie perventum est, ut omnes fere virtutes veræ exulent, tantasque inter alia prava hæc consuetudo, & sanitati & bonis moribus adversa, radices egerit, ut homines non amplius, ut jam dictum fuit, ad rationem, sed ad similitudinem, vivant. *Dann es werden heut zu Tage allerhand Dinge, sie mögen auch noch so abgefehnack herauskommen, als sie nur immer wollen, vor eine Galanterie geachtet, worunter die mit Schnupf Taback befreueten Nasen, billig mit oben anzusehen verdienen.* Exoptandum vero esset, quo corruptum hunc morem ad mundi genus se componentes tantum cohererent; Verum enim vero, ut lues epidemica pestilenti suo habitu promiscue homines afflat & inficit, ita & hæc prava consuetudo istos, qui modesti tamen & pii, vanitatesque mundi ex toto ejurasse videri cupiunt, tacite quoque corrumpit. Sic enim hodie quandoque unum alterumque in sacra cathedra stantem, ac de bonis moribus ex ista ad populum sermonem facientem, avide ex sua pyxide juxta se posita, bonam hujus pulveris partem digitis præhendere, natesque eo ad Auditorium

rium risum scandalumque conspurcare, & mihi & aliis observare licuit. Opus profecto hinc foret, publico mandato turpem hunc coercere morem, uti sub initio superioris seculi id factum legimus, cujus Clarissimus THEBESIUS l. c. his meminit verbis: *Hier fallet mir ein, was ich einmahl gelesen, daß die Prießer in Spanien den selben sich so stark angewöhnet, daß sie auch so gar bey Administration des Heil. Abendmahls und bey der Messe sich dessen bedienen, wiewegen auch zu Anfang des vorigen Seculi Pabst URBANUS IIX., auf Ansuchen des Decani und des Capituli der Haupt-Kirchen Seville, eine Bulle ergehen lassen, worinnen er alle, die inskünftige in der Kirchen Schnupf-Taback gebrauchen wurden, in den Bann thaten.* Hæc ille.

§. VI.

Occasione sternutationis questio, scitu omnibus necessaria, occurrit, cur sternutantibus precetur salus, osque simul signetur cruce? Initium consuetudinis hujus superstitiosæ ante Aristotelem, & sic diu ante Christi natiuitatem, apud Ethnicos incrementum sumissæ, testatur Strabo, p. 438. Siquidem & ethnici à sternutamentis auguria capere soliti fuerint, cujus etiam ARISTOTELIS, THEOCRITUS, ARISTÆNETUS, PETRONIUS, PLINIUS, ROBERT KNOXII'S in *cylionischer Reise-Beschreibung* lib. III. cap. I. p. 134. alique quam plurimi meminerunt, quam ideo AMMIANUS & AUGUSTINUS repudiarunt, imo ipse CICERO de divinatu lib. II. his verbis: Quæ si observamus, & pedis offensio nobis, & corrigiæ abruptio, & sternutamenta observanda. Apud Romanos quidem sternutatio olim inter minima erat omina: at apud Græcos omnis maximi habebatur, divinitatis enim quiddam contineri augurabantur, unde non solum certum observabant tempus, sed & latus, ubi sternutatio fieret: hæc ad sinistrum latus avertabantur; meridianæ faultæ habebantur, maxime si a latere dextro; matutinæ vero infaultæ, unde PROPERTIUS eleg. 3. lib.

*Nunc tibi nascenti primū (mea vita) diebus,
Avidus argutum sternuit omen amor.*

Vid. del RIO in *disquisit. magicar.* lib. II. p. II. Quæst. IV. sect. IV. p. m. 454. Antiquis nimirum his Ethnicis caput sacrum habebatur, hinc veteres Hebræi ac Græci per caput jurabant, ac sternutamentum capite editum, tanquam Deum adorabant, teste Xenophonte de Athen. Republica, & de rebus Græcor., Casaubono animadv. in Athen. lib. II. cap. 25. Formula eorum erat: Ζῷ εὖεν! *Jupiter serva:* cui votum nobis consuetum responset: *Prosit! Gott helfe!* Sicut etiam a Græcis sternutantes genu flexo salutabantur, teste Athenæo.

H h h h 3

næo.

næo. Ritus hic a veteribus, qui sternutationem a periculosa cerebri commotione oriri crederent, continuabatur, hinc sternutantibus salutem precabantur, ne apoplexia aut alio periculoso cerebri affectu corripentur: Quamplurimus enim sternutatio audit apoplexia parva, vel epilepsia quædam levis, ut jam olim AVICENNA lib. III. fen. V. tract. II. cap. 3. cui postea adstipularunt RIOLANUS particul. meth. cap. 17., UNZERUS de Epileps. lib. I. plurimique alii. Et quidem maxime cum sternutarent, per sternutamenta animam expulisse credebant, unde consuetudo hæc supersticiosa ortum duxit, ut sternutantes salvere jubeantur, dicendo: *Salus!* vel *Proste salui!* Ritus hic sternutantibus bene precandi continuavit per omnes fere nationes, etiam regnum turcicum, ut ad sternutationes epilepticorum similiumque capitis affectuum, ut & grassantibus morbis magnis pestilentialibus similibusque epidemicis contagiosis insectorum, aut caput densiscent, aut corpus inclinent, & sternutantes consueta hæcenus formula salutent: *Deus te adjuvet!* *Gott helfe dir!* Similis sternutationis malignæ contagiosæ in smosa illa Atheniensium peste grassantis mentionem facit THUCYDIDES de bello peloponnesi. §. 131. pag. 108. item Polybor. VIRGILIUS de Invent. rerum lib. VI. cap. 2. p. 454. qua omnes, qui aliquoties sternutassent, paulo post extincti sunt; quod etiam confirmatur ab HEYON. CARDANO in Hippocrat. Aphorism. 47. libri V. p. 559, & DIEMERBROECKIO de peste cap 5 p. 13. item lib. IV. histor. 13. de peste Neomageni anno 1639. grassante, qua durante neminem læpius sternutantium convulisse observavit. Videatur etiam PIENS de Febrib. p. 485. GIL. DUKANDUS in ration. divinar. officior. p. m. 152. & Carol. SIGONIUS histor. de Regno Ital. lib. I. qui quidem hunc salutandi morem a Gregorii magni pontificis tempore deducit, cui autem STRADA prælus academ. lib. III. protest. 4. de Pistorie suburbano, & Cornel. STALPARTUS van der WIEL obs. rarior. cent. II. part. prior. observ. VI. p. 50. contradicunt. Ipsam historiam morbi hujus epidemici pestilentialis, quo anno 588. tempore Gregorii magni, Pontificis Romani, homines infecti sternutando obierunt, ex chronico quodam Coldicensi manuscripto supra laudatus Dn. D. WESTPHALUS nuperrime mihi communicavit sequentibus verbis: Anno 579. wurde König Siegeberrus in Liger vor Tornay erstickt, darauf kommet Childbertus ans Regiment. Bey seiner Zeit anno 588. entstanden erschreckliche Ungewitter, und grausame Wasserpluthen, darauf erfolgte eine erbärmliche Seuche und Pestilenz in allen Lunden, daran wie'e Millionen Menschen hinsturben; so bald ein Mensch anfang zu niesen, war keine Rettung bey ihnen, daruon sagte man zu ihnen: Gott helfe nun dir! Dieses erschrecklichen Sterbens halber ordnete der Pa'p zu Rom Gregorius Magnus die Litaneey an, unter welcher zu Rom in einer Kirchen, ehe solche ausgegangen worden, 80. Personen, die gesund zum Anfange des Gesangs kom-

kommen waren, unter wählenden Niesen hinfieleu und starben. Potius ergo credendum, ritum hunc a gentiliu auguriis partim, partim erronea veterum opinione, qua sternutationem ab apoplexia, epilepsia, aliaque periculosa cerebri & totius capitis sacra commotione, sum traxisse originem. Econtra Medici Parisienses, ac hodienu nostræ gentis mulierculæ visitantes, bonum omen optimumque reconvallescentiæ signum habent, quando ægri sternutare incipiunt, quod illis alias, ob virium defectum, denegatur, unde vulgatum illud apud nos & Gallos ortum duxit. Sternutavit, salva jam res est! Vid. Misant. BRIOSTIUS in epistol. p. 204. Nimirum sternutatio critica omnino salutaris est, & aut futuram hæmorrhagiam, aut morbi saltem resolutionem & translationem indicat. Salutare quoque signum est in morbis serolis s. phlegmatis, ac soporosis, nec non in suffocatione hysterica, & materię morificæ in cerebro resolutionem & translationem indicat. In partu quoque difficili conducit, quatenus totum abdomen, & universum fere systema nervosum, fortiter concutit, adeoque in musculis abdominis conatum excitat & partum promovel. Conf. HIPPOCRATES sect. V. aphor. 35, & cyhemer. academ. nat. curios. ann. III. decur. I. observat. 138. p. m. 217. Verum in morbis acutis, malignis, pestiferis &c. sine criseos indicis, & cum symptomatibus aliis gravioribus, copiosior, frequentior & violentior, lethalis est, indicat enim causæ morificantis malignæ nimiam volatilitatem, acrimoniam, generi nervoso itatim insidiantes, unde etiam affectus epileptici similesque convulsivi, & in ætate grandævi apoplectici &c. subsequuntur. Minus quoque convenit in vulneribus & ulceribus capitis, affectibus oculorum, pulmonum, in specie in phtisi, cum convulsione tanta facile rumpantur ulcera, dilatentur vulnera, commoveatur & lædatur nervus opticus cum tunica retina, unde cæcitas sæpe oriri solet.

§. VII.

Sed missis his, ad pulveris sternutatorii Hispanici hætenus descripti abusum revertendum, qui, (utut alias, si bonitatis ejus, quantitatis moderatæ, temporis adhibendi ac temperamentorum, juxta habeatur ratio, neutiquam plane rejiciendus est ac contemnendus) præfentis nostri casus mera fuit causâ occasionalis, neutiquam tamen ægri constitutione cacochymica exclusâ, quæ obstetriciæ sustinuit partes, quo eo facilius oesophagi tunicas lædere atque erodere valuerit pulveris acrimonia. Proxima polypi nostri causâ, ut ex supra dictis patet, & ex ulterius dicendis intelligi poterit, tunicarum, imprimis glandulosæ, fuit corrosio, humorumque inde excitatus affluxus. Facta enim hac lesione particulæ sanguinis viscidæ atque gelatinosæ, extra sua vascula delatæ, primum in fibrillas, deinde successive in ejusmodi ex-

creve-

creverunt corpus carnosum, quod postea ob continuo accedens nutrimentum, adauctum fuit, & in suo incremento & descensu inferiora versus, hederæ adinstar arboreæ radices novas tunicis œsophageis infixit, per quas novum ipsi accessit nutrimentum. Simili modo ac opilionum & aurigarum canes veterani sepe rauci fieri solent, dum, equos oviumque greges per æstatem torridum sequentes, varios terræ pulveres copiose inspirant, qui tam laryngi, quam pulmonibus & alperæ arteriæ ramificationibus, impacti & cum lympa aliisque nutritiis succis in partibus glandulosis, horumque valis compacti, tumores duros & tactui renitentes constituere, imo & sæpissime acres laryngis tunicam valde sensibilem, vasæque sanguinea & lymphatica, arrodere solent.

SECTIO IV.

Phænomena quadam nonnullasque circumstantias atque quæstiones sistent.

Phanom. I.

Fuit vir hic temperamento sanguineo - phlegmatico, corporisque mole sat notabili, ad cacochymiam tamen valde proclivi prædictus.

II.

Copiosissime assumsit pulverem hunc sternutatorium.

III.

Corpore aliquando concalesceto, naresque hoc pulvere, eoque siccissimo, replevit, fortiterque cum inspiravit, quo factum fuit, ut non solum ad fauces, & œsophagum usque istum, penetrare observavit; &

IV.

Statim dolorem urentem, tussim frequentem sputumque cruentum, senserit.

V.

Temporis spatium quodam effluxo dolor, tussis & sputum cruentum, cessarunt, deglutitio autem sensim difficilior reddita fuit.

VI.

VI.

Causa hujus affectus a medico & medicastro, rejecta probabili-
fiori, enarrata, habita fuit copiosa materia pituitosa nimis viscida,
sed inepte.

VII.

Æger remediis prioribus incassum adhibitis, alii cuidam medico
affectum hunc ejusque causam, sibi probabilem, refert, quæ vero
iterum rejicitur, & in nescio quod, acidum sylvestre commutatur.

IX.

Medicamenta rursus nullum edunt effectum salutarem.

IX.

Deserit æger medicos; seque naturæ ac tempori, ut ajunt, com-
mittit, foreque sperat, ut sponte sua iterum hoc malum abeat.

X.

Adhibet penicillum ventriculi, vulgo *die Magen-Bürste*.

XI.

Hujus applicationem equidem difficilem sentit, minus tamen do-
lorosam, penetrationem vero in stomachum usque, ob quoddam ob-
staculum, plane impeditam.

XII.

Educitur hujus ope insignis equidem pituitæ; nonnihilque simul
cruris, absque ullo tamen levamine.

XIII.

Ab usu hujus penicilli fancium deglutitio, antea adhuc liberior,
nunc difficilior, animadvertitur, ita, ut non multo post solidiora
alimenta non amplius assumere valeat, sed ad liquida tantum consu-
gere opus habeat, quæ, ob malum indies accrescens, cunsum libere
degutire nequit, sed leniter ea per calamus stramineum absorbere
cogitur.

XIV.

Pau'o liberius absorpta cum sonitu regurgitant, præsentaneam-
que ægro minantur suffocationem.

Disput. Medico-Pract. Tom. VII.

III

XV.

XV.

Tandem ob plenariam liquidonum, etiam valde tenuum deglutitionem prohibitam, fame sitique æger fractus, ac sceleti cute tantum obducti faciem referens, misere moritur.

XVI.

Aperitur cadaver, œsophagusque ad latus dextrum nonnihil contortus, superiora autem versus solito tenuior, gracilior acuminatorque conspicitur.

XVII.

Ista œsophagi in faucibus apertura nonnihil durior contracta & ita exigua apparet, quo vix pisum admittat vulgare.

XIII.

Gula incisa, media ejus in parte, excrescentia vermiformis sat notabilis per medium divisa, radicibus nonnullis brevibus substantiæ atque tunicis œsophagæis infixis, conspectui se offert.

XIX.

Circa initium hujus polypi rarioris materia, sanguinis grumosi ad faciem nonnihil accedens, deprehenditur.

XX.

Substantia ejus adeo mollis erat, ut levi etiam digitorum tactui cederet, colore ceterum gaudebat ex rubicundo pallido.

Quæstio I.

An malum hoc fuerit hæreditarium, ut quædam voluerunt?

Quæstio II.

Annon in principio affectui huic medela afferri, ejusque incrementum impediri, potuisset?

Quæstio III.

Annon inveteratus hic polypus destrui atque auferri potuisset?

SECTIO V.

Resolutionem & Responſionem bacillus prolatam tradens.

I.

Circa temperamentum nomen, definitionem atque divisionem, de qua materia, cum permulta jam extent scripta, primoque statim inivitu, quid per istud & quale heic intelligatur, eluceat, non morabimur; nec eorum quoque novatorum litem, qui nobilem temperamentorum doctrinam omni, at vano, conatu evertere atque ex orbe erudito præscribere laborant, nostrum in præſenti faciemus: sed brevitatis causa ad Dissertationem infra allegatam remittimus. (Vide M. GREGORII Dissertat. de Temperam. Scriptiorib. Novi Testamenti, ubi in Proem. hæc controversia pertractata legitur.) His itaque inſis, ad asserti. probationem nos accingimus, ubi diximus; Virum hunc temperamento fuisse præditum sanguineo-phlegmatico. Nemo autem hic arbitretur, ob adjectum sanguini phlegma, temperamentorum numerum me credere quaternarium, cum eum tantum ternarium esse existimem, variis ex rationibus, tam sacris quam physicis, aliisque demonstrabilem. Temperamentum vero, vulgo phlegmaticum quod dicitur, peculiare non est, sed corruptum saltem, cum ad sanguineum pertineat, quod plerumque, accedente vita atque inordinata ac prava diæta, in hoc degenerare solet, quanquam enim non negem, ex utero quoque materno prodire interdum phlegmaticos, nostram hypothesein qui aliquomodo possent vacillantiæ reddere; verum enim vero res omnis in vado versatur, est & manet phlegmaticum temperamentum corruptum, qualis enim parentum constitutio, talis quoque spermatis natura deprehenditur; sed hæc materia alio tempore paulo curatius forte fuerit examinanda. Sanguineum autem in nostro subiecto valde cacochymico primum adhuc obtinuisse locum, actiones non tantum in vita morales, sed & corporis sat notabilis moles, qua sanguinei ut plurimum, præſertim vitam tranquilliores degentes, gaudent, nec non habitus aliaque circumstantiæ demonstrant, quæ corporis constitutio autem, ut superius dicta, vitæ genus nempe inordinatum dictamque juxta sex res non naturales perversam, quo vitio plerumque Caupones laborare solent, admodum fuit depravata, colorque & habitus antea vividus & laudabilis, in pallidum nunc atque cedematofum aspectum mutatus, actusque morales multo tardiores nunc facti fuerunt observati. Quibus ex causis hæc corporis constitutio nullo alio, quam sanguineo-phlegmatici temperamenti titulo, condecorari potuit debuitque.

II.

De pulveris sternutatorii hujus nomine &c. Sect. III. §. 3. Jamjam fuit actum, nunc paucis istius in principia inquiremus, quo planior ejus fiant natura seu temperies operandique modus. Ad partes itaque constitutivas istius quod attinet, odor non solum gravis & sapor acris de sulphure & sale volatili testantur; sed etiam analysis chymica satis clare ista imo plura adhuc demonstrat. Comperimus enim insigni hunc 1.) pulverem olei fetidi ac sulphuris impuri & narcotici; 2.) salis admodum acris alcalicæ naturæ; & 3.) phlegmatis acidi, præditum esse quantitate, qua ex compositione facile patet, quanta pro temperamentorum diversitate immoderatus atque insanus ejus abusus procreare valeat incommoda. Hoc autem probe notandum, quod partes hæ constitutivæ non semper in una eademque reperiantur copia, sed earum mixtura, nunc ratione vetustatis, nunc ratione soli natalis ac climatis, nunc etiam ratione præparationis, diversa deprehendatur. Ex quibus causa reddi potest, cur interdum operationes in uno eodemque subiecto huic adueto tam diversæ observentur, quamquam & temperamentorum diversitas non excludenda veniat. Sic enim v. g. salis volatilis, ut ex experimentis chymicis institutis didici, major copia, quam olei & sulphuris narcotici, elicitur; alio tempore plus phlegmatis acidi, quam salis & sulphuris, sicque porro, deprehenditur. Ut plurimum a. ille pulvis, qui in nostris terris præparatur, aut adulteratur, multum acidi; ille vero, qui vere ex Hispania ad nos fertur, multum sulphuris & salis volatilis acrioris, in se continet, semperque acerrimus animadvertitur, quod ex præparatione clarum est, dum solia non ad halorum & Portugallorum laudabilem temperantur modum, sed statim absque ulla correctione conteruntur, inque pulverem convertuntur.

III.

Ex quotidiana observatione notum est, quod pulvis hic nimis excruciat, multo vehementius nares earumque interiora afficiat aliisque penetret. Veritatem hoc esse conforme, multa probatione non intelligit, modo quis ad majorem h. m. partim volatilitatem pulveris; partim etiam ad pororum relaxationem, quæ in corpore vel motu vel alia causa calefacto contingit, attendere velit. Quomodo vere ad fances, imo ad gulam usque, fuerit delatus, per facile est intellectu, qui enim quantitatem assumptam, & nasi structuram internam, intelligit, possibilitatem statim videt. Forti namque ac celeri facta inspiratione, qua præcipue hujus pulveris amatores delectantur, *denn darinne soll eine sonderliche Delicatez stecken*, cum impetu ille per narium meatum ad oris & gulæ fundum porrectum, eo fuit compulsus, quod assertum quilibet, de ejus viri-

ritate

ritate dubitans, in se experiri potest. Confirmat etiam istud Dn. D. ROHN-
NIUS, atque Dn. D. THEBBESIIUS, quorum prior Traët de Offic.
Medici - duplici Clinico atque Forensi p. 200. ita scribit: Nec, qui Ni-
cotianæ pulvis sine steruatione & insensibiliter magis errhini nomine vim
suam exerit, omni culpa vacat, cum ejus notabilem semper portionem,
nobis non advertentibus inspiratione per nares facta, ad laryngem &
pulmones cum aëre deflectere, probabile sit; Alter vero in Traët. supra
cit. p. 65. seq. sequentem in modum disserit: *Dieses aber stut vornehm-
lich der Spanobl, als welcher so sehr subtil, daß er wegen seiner Leichtigkeit
hin in die Lufft - Rohre gehet, und indem er so scharff ist, dergleichen Eßstü-
ck verursachet; & ulterius: Inglichen haben ihn diejenigen zu meiden, so an
der Lungensticht laborieren, weil er durch die Nase gezogen, durch das runde
Loch bey der Nase in Kopffe in dem Halße, und in oler wenigstens an
die Lufft - Rohre gehet, und daselbst diese ungesundliche Orte irritieret und grof-
sen Husten verursachet.*

IV.

Hoc phaenomenon antecedentis veritatem confirmat, cum imme-
diate post copiosam assumptionem, dolor in gula urens, tussis frequens,
atque sanguinis sputum, fuerint exorta, manifesto argumento, pulverem
hunc eo usque penetrasse, ibique hos excitasse affectus. Modus perfora-
tatu haud est difficilis, modo quis pulveris naturam supra explicatam,
individui nostri constitutionem cacochymicam, & a calore relaxationem,
perpendat consideretque; magnam etiam ejus portionem ad oesophagum
una cum saliva simul inter deglutiendum delatam fuisse non adeo impro-
babile videtur.

V.

Ex hoc & antecedente phaenomeno clare satis patet, pulverem hunc
genuinam polypi nostri exitiis causam, eumque hoc tempore suum sum-
misse initium. Quamprimum enim caro ejusmodi luxurians evasit, ut
plurimum dolor cessat, indolensque ejusmodi observatur excrecentia.

VI. & VII.

Quot capita, tot sensus, dicitur vulgo, & quidem verissime. Unde
vero hæc discrepantia? Unde hic inter Medicos dissensus? Audiamus Ce-
leberrimum STRALIUM in Programm. de Dissensu Medicor.: Si
jam hoc malum, dissensus nempe mutui, inquit, causa & origo non ma-
gis, quam objecti & affectuum dignitas consideretur, fieri non potest,
quin pensitatis Medicinæ & artis fundamentis, quæ experientia & arte ab-

solvuntur, quasi sponte resultat, dissentientes illos aut plane falsa insinuatione inter se mutuo certare: aut rationis, vel experientiae, expertes esse, utrosque aut alterutrum ad minimum. Sicut enim non semper succedit, ut inter duas contrarias sententias alterutra sit vera, quando videlicet tota relatio, circa medium nempe objectum, circa quod versari debet, non recte instituta est: ita fieri certe subinde potest, ut neutra sibi mutuo oppositarum sententiarum sit vera, sed vel media quaedam potius locum habeat, vel si oppositae illae a tramite suo oberraverunt, nempe debitum verum respectum ad usum objectum non retinuerunt, plane illa, quam hac via, quaerenda sit veritas. Hæc ille. In præsentem autem Casu nullum hæcenus medentium rem acu, quod ajunt, tetigisse, inde est, quod neuter malum debite examinavit, inque circumstantias rite inquisivit, sed suæ tantum opinioni fictæ fidem adhibuerit. Hinc ingens, ulterius l. c. ait STAHLIUS, experientiae scandalum, & ab omni ævo probabile est, illa & rationis & circumspeditionis experimentalis aliquando inopia, aliquando quoque inadvertentia, ut bonus etiam eventus, licet manifesto laboriosus, & quod sane commiseratione dignum est, tanto magis ipsos laboriosiores, communiter suæ arti imputare gestiant Medici, & e talibus rebus experientias suas formare aut fovere. Unde, paulo post pergit, profecto nihil familiarius est, quam ut illi, qui nullo rationis aut experientiae laboriosiore apparatu subnixas, eoque ipso mira facilitate ipsis commendabiles vias suas methodos & positiones i'lis, quæ aliter sese habent, non solum apud se ipsos anteferre soleant; Sed etiam quacunque, non magis data, quam arrepta, occasione illas diversas insectari, & tam rebus quam hominibus, apud imperitos contemptum moliri. Hi, si meliorum illorum patientiæ tandem vim faciant, & defectum propriorum suorum placitorum demonstrationes extendant, quid possunt inde expectare, quam sui quoque circa talia existimationis detrimentum. Quare fit, ut sicuti illi alios apud imperitam plebem, ita se ipsos apud peritiorum cohortem, contemptui exponant: adeoque tandem utrinque non tam solum personarum amplius, sed & ipsius artis ludibrium, radices agat. Hi sunt demum fructus illi fetidi atque virulenti, quos multorum inconsideratus atque irrationalis profert Medicorum dissensus atque imperitia, quod sane quam vehementer est dolendum.

IIIX.

Hoc non mirum, cum causa genuina non fuerit perscrutata, qua alias rite detecta atque remota, nisi *adventitia* occurrat, medicamenta suos edunt effectus speratos, malumque removetur atque cessat.

IX. Ita

I X.

Ita Genius hominum hodie est comparatus, ut, si non statim animadvertant aliquod levamen, extemplo Medicum priorem deferant, & vel ad alios, vel ad medicastro, currant, vel plane remedia seponant, putantes, naturam optimam mali semper fore medicatricem. Quam perverte autem id fiat, uberrima docet atque testatur experientia, dum saepius hoc modo non solum morbus levior in malignum degenerat, sed quoque ob intempestivam ejusmodi remediorum abstinentioniam plerumque incurabilis evadit.

X. & XI.

Constituerat equidem æger apud se firmiter, nullum se amplius adhibiturum remedium, sed mali medicationem & ablationem a natura, ejus minister est Medicus, expectaturum: Verum consilium mutabat, aliudque in usum vocabat remedium sat barbarum ac violentum, peniculum nempe ventriculi, *die Magen - Borste*, de cujus structura & utendi modo in præsentia, cum res sit notissima, ac paginæ angustia insuper etiam vetat, non faciam verba. Cui autem volupe est, plura de hoc instrumento legere, is Actor. Erudit. supplém. T. U. Sect. IV. pag. 183., binas Dissert. Jenenses de Excit. Ventric. & de novo Instrum. Repurgator. Ventriculi conscriptas, nec non Dni. D. WOLFII Physici Dubensis, *gründliche und vollständige Description der sonderbaren und curiösen Magen - Borste*, adeat, ubi voti sui compos fiet. Causam applicationis difficilioris hujus instrumenti, denegatique ejus in stomachum ingressus, ut longis adducamus verbis, opus non est, cum ea evidens sit atque clara. Difficilis enim aditus dubio procul a constrictione & crispatura fibrarum oesophagi, ab hæcenus crebra per remedia acria facta earum irritatione exorta, ortum duxit suum.

XII.

Unde copiosa materia pituitosa mediante peniculo hoc, licet non in ventriculum ingresso, originem traxerit, undeque proflexerit, intellectu adeo difficile non est, modo quis ad glandularum vellicationem atque pressuram, hoc instrumento factam, præcipue in hoc subiecto cacoehymico, attendat. Videnus ejus rei veritatem in subiectis perfecte sanis, ubi circumforanci experimento suo vulgari, per pulverem quandam arcanum adjectum aut jactatum erraticum, sat notabilem viscidæ materiæ quantitatem per os ac nares educere norunt, quam operationem Catarrhofam Extractionem, *das Fluß - Abziehen*, appellant, eamque præservantem in gratiam sequentem in modum sedulo hominibus suadent atque inculcant. Primo jubent, ut ille, educationem catarrhi putativi desiderans, capite sedeat

sedeat prono; deinde mediante stylo quodam ligneo se diducat; & tertio pulverem jactatum per nares attrahat. Hoc enim facto brevi post, ad omnium adstantium admirationem, per os atque nares notabilis viscidæ ac tenacis materiæ copia effluit, quam baculo vel virgula postmodum ejusmodi agyrtæ arripiunt, circumvolvunt, extendunt, multumque de ejus nocumeto ac periculo, feliciter nunc amolito, garrere & b'aterare solent. Quis vero prudentium ejusmodi homuncionum non videt vanitatem, non tam proximi sanitatem, quam potius ejus argentum, cupientem & anhelantem? De hac catarrhorum extractione vid. B O N E T U S Medic. Septentr. P. I. p. 217. & Ephemer. Academ. Naturæ Curios. Ann. I. Decur. I. Observat. 31. p. 110-112, item in Append. ad hunc Annum p. 9. se. q., nec non Ann. IX. & X. Observat. 117. p. 283. Sed Mundus vult decipi! Quilibet in se hunc feri effluxum quotidie experiri potest, dummodo methodum indigitatum observet, atque nonnihil de pulvere cujusdam vegetabilis acrioris, s. radicis pyrethri vel raphani rusticani, euphorbiæ, vel amylo, (ex quibus hunc pulverem maximam partem compositum, instituto multifario ejus examine, ipsemet deprehen- sif naribus immittat. Seri autem hoc mo- lo per nares atque os effluentis facilem egressionem non parum etiam adjuvat dictum salivalem per oris diductionem facta apertura, muscutorum tenis pressio, proniorque capitis situs, quomodo non fieri non potest, quin majori in copia quam alias fieri assolet, humores effluant. C L U S T U S e Nicol. M A N A R D E in Simplic. Medic. ex Novo-Orbe delat. corticis cujusdam meminit, qui pulverisatus, & naribus inditus, idem præstat, eumque ob effectum corticem rheumaticum vocat, eumque ita describit: Ex Peru mihi missus est crassus quidam cortex, quem vult ex arbore ulmo simili, cum amplitudine, tum forma, detractum ferunt: nascitur ad ripas fluminis cujusdam viginti quinque leucis a Lima distantis, nec alibi in India reperitur. Indi in capitis defluxionibus, rheum tismis, aut alioqui corporis gravedine laborantes, hujus arboris corticem in tenuissimum pulverem comminuunt, & naribus imponunt; humores insigniter educit, qua ratione liberantur; quod verum esse ipsi experti sumus. Hæc ille. Quod veroeducta materia adeo tenax observetur, ut extendi queat, inde est, quod corpus egressa, aerique nunc frigidiore exposita, particulæ calidæ ac volatiliores aufugerint, solasque gelatinosas & salinas post se reliquerint. Cur autem nos ter æger, multa licet ablata picuita, nullum plane senserit allevamentum, nemo miretur; causa enim mali præsentis non fuit remota, qua alias imminuta & abiata effectus quoque imminuitur atque cessare observatur.

XIII.

Peniculi applicationem deterioris hujus conditionis veram fuisse causam, quis non intelligit atque evidenter videt? major enim fibrarum ad
culpa-

erisputuram jamjam aptarum irritatio, contractio atque contorsio, fuit oborta, quæ, iisdem non statim in pristinam suam sedem delatis, successively confirmata atque consolidata fuit. Unde & aliter evenire non potuerit, quam ut hac ex causa accedente simul partium corporis contabescencia & flacciditate, & solidorum & demum liquidorum deglutitio non rite processerit, eaque sensim sensimque difficilior reddita, in tandem plane ægro denegata fuerit.

XIV.

Hujus phaenomeni rationem clarissime exponunt phaenomen. 16. & 17. Oesophago enim contorto, principium versus solito tenuiori, graciliori & accedente simul tam parva ejus apertura, non potuerunt non regurgitare liquores paulo liberius absorpti.

XIV.

Causa hujus phaenomeni plana est; qualis enim nutritio, talis corporis habitus, & virium quoque constitutio.

XVI & XVII.

Hic primo videmus usum insignem, quem cadaverum sectio, a nullo practicum, præcipue occasione ad eandem instituendam affulgente, negligenda, sed omni studio atque persuasione quærenda, arti nostræ salutari præstat, cum per eum tanta detegantur, quæ & sanæ & vitæ & causarum perferuationi, & medelæ hujus vel illius mali, alio tempore egregie consulere observantur. Contorsio oesophagi ab irritatione & contractione fibrarum a remediis antea acrioribus. ad pituitam imaginariam incidendam acceptis, maxime vero a violentia peniculi, fuit excitata atque exorta tenuitas & gracilitas inconsumeta, nec non apertura solito longe minor & durior, a fibrarum nimia in se strictura ortum duxerunt. Cujus rei veritatem in fune videmus: hujus enim fila, quo laxius sibi invicem incumbunt, eo crassior ille; quo vero arctius inter se coherent, eo etiam gracilior, tenuior atque durior, observantur.

XIX.

Cum polypus noster figuram habuerit vermiformem, cur non contiguus, sed per medium divisus, fuerit observatus, & undenam suos acceperit pedes, res quidem explicatu adeo facilis non est, cum ejusmodi excrescentiarum intus latentium generatio virum nostrum sub-

Disput. Medico-Pract. Tom. VII.

K k k

terfus.

terfugiat, quo itaque minus debito modo attendere queamus: interim tamen frequentem in modum ejus generationem factam fuisse, mihi concipio. Quamprimum pulvis sternutatorius per fortem inspirationem in gulam fuit delatus, eam non in uno, sed diversis in locis, (en divisionis originem!) ob tunicæ, præcipue hoc in subjecto, tenacitudinem & molitiem, suamque nimiam aerimoniam, statim corrosione agressus est, unde etiam momentaneus dolor urens, tussis frequens ac molesta, læsionem adhuc multum exasperans, & denique sputum cruentum. Hanc gravem œsophagi læsionem, exemplo pulveris assumptionem insecuram, statim, ut intellectu facile est, excepit humorum viscidorum & acriorum affluxus, qui extra sua vascula delati, in coagulum pedetentim abierunt fibrilloso-carneum, quod, propter continuo ipsi accedens nutrimentum, sensim sensimque in hanc notabilem, partim ob gulæ configurationem, partim etiam ob humores deorsum fluentes, inque suo progressu hederæ arboræ in modum radices spargentes, stricæ instar, excrevisse videtur, molem elongatam pedibus donatam. Unde quoque causam videmus figuræ vermiformis, quam non parum, ut probabile est, adjuvit alimentorum, licet postmodum imminuta, deglutitio. Ab his enim versus inferiora exerescentia hæc sapius pressa effectum fuit, quo non in corpus globosum aut latum, sed longum atque teres, lumbrici crassioris faciem representans, fuerit commutata. Vellet quis asserere, radices nostri polypi uno eodemque tempore statim post factam multiplicem œsophagi læsionem fuisse exortas, ego ipsi non valde repugnarem, cum non adeo improbabile videatur, ex læsione hac diversis in locis facta, humores egressos, interjectis his intervallis, demum coaluisse; & sic quoque ratio aliqualis, & earum ordinis & brevitatis, dari potest. Interim ita conicere liceat, donec quis probabiliora asserat.

XIX.

Materiæ cruentæ particula, quæ ad polypi caput adhæsit, unde eo deveniret, difficile scrutatu non est, modo hætenus dicta si contideremus, & phenomenon duodecimum præcipue perpendamus.

XX.

Quod adeo mollis polypus hic fuerit obsevatûs atque pallidus, nulla alia fuit causa, quam quod per tres, & longius adhuc dies, cadaver jacuerit, indeque postea utique aliter evenire non potuerit, quam quod substantia atque color alterati mutatiqve fuerint.

Quæstio I. II. & III.

Quæstiones hæcæ non protulissim, nisi existissent, qui mihi easdem euodandas proposuissent. Ne itaque & hi putent, singulare quid

quid in re & arte fundatum se scire atque de isto, ac de vero, opinari, ad eas breviter tamen, daturus suam responsionem. Ad primam igitur quæ d spectat respondeo negando, idco, quod a prioribus annis usque ad initium hujus mali deglutitionis impedimentum non perceperit, quod tamen fieri debuisset, si polypus hic hereditarius fuisset, dubioque procul iste, cum ejusmodi excrescentiæ perpetuo crescant, ægrum multo citius e vita sustulisset. Exorta autem fuit inde hæc de malo hæc editario imaginario opinio, quod ex defuncti cognatis non nemo aliquando dixerit, matrem & aviam demortui iidem aliquoties ex deglutitione difficili laborasse. Quis vero hoc fundamentum admodum esse lubricum non videt? Secundam quod concernit, canonem æger in mentem utique revocare debuisset notissimum: Principiis obsta, sero medicina paratur. In principio enim, dolore adhuc sputoque sanguinis durante, remedium convenientium apparatus malo opponi. Sicque ejus incremento apex forte poni potuisset. Tertio, quod plane hoc fuerit impossibile, quæcunque etiam fingantur instrumenta & encheirises, adjuvans adfuit curandi malum. Primo enim manibus pars affecta tractari non potuit, & quis polypum hic quæsit? Deinde, si etiam hac sede sua vi quadam instrumentali deturbatus & avulsus fuisset, quis hæmorrhagiam, quæ sine dubio hanc operationem periculosissimam fuisset insectura, compescere, & pro symptomatibus periculosis inde non exorituris, vel pro non amplius futura ejus germinatione, spondere voluisset?

Sed properandum est ad finem, circa quam hac occasione variâ curiosa, & physica & moralia, ut: Symbola, emblemata atque proverbia, de hocce polypo, a quo, ut supra monitum fuit, malum præfens accepiße dicitur, proferri possent. Cum vero id nimis longum foret, adeat, qui velit, GESNERUM, *Uss.* ALDROVANDUM, MERCKLINUM FRANZII *Histor. animal. tract. III. c. 6. p. m. 686.* Camerarii emblemata, PICINELLI mundum symbolicum, PIERII Hieroglyphica, ERASMI adagia &c. ubi abunde desiderium explere poterit tuum. Ne tamen vero & hac in parte plane ætymologice discendam, præfens noster polypus œsophagus, vel volupçatis nocivæ, vel hominis malevoli, sub sinceræ amicitie larva, alcerius detrimentum quærentis, imago esse potest, cum epigraphic: *Ampræstatur, ut strangulet!* Interea lectorem benevolum, hæcenus prolata ut æque bonique consulere velit, peramanter peto, Deoque trunio optimo maximo decentissimas pro viribus concessis persolvo grates cui etiam.

*A quo principium rei dependet, in ipso
Principium ut operis fuerat, sic fit quoque.*

K k k k 2.

I.

A Sanguinis qualitate & corporis structura temperamenta & mores dependent.

II.

Ingeniorum diversitas a diversa cerebri fabrica ejusque constitutione proficiscitur.

III.

Medicus moralista multo facilius feliciusque depellit morbos, quam alius hac doctrina destitutus.

IV.

Qui animam rationalem pro nulla substantia, sed mera potentia, ex organorum machine humanæ combinatione resultante habent, & scripturæ sacræ & sanæ rationi contradicunt.

V.

Hypericum fugare dæmones malos, spectra, veneficas & sagas, fabulis annumerandum est anilibus.

VI.

Phygiognomia non rejicienda, sed tantum a superstitione purganda est.

CCLIX.

JO. FRID. ZIESNER

RARUS OESOPHAGI MORBUS

Regiomonti 1732.

§. I.

Oesophagus est canalis quidam, ex diversj generis membranjs compositus, esculenta & potulenta in ventriculum deferens. Initium capit, ubi pharynx desinit, & terminatur in superiori ventriculi orificio. Tanta gaudet longitudine, quantum inter ambas illas partes intercipitur spatium. Principium Oesophagi, pharynx sive gula audit, figuram infundibuli satis amplam referens. Ut vero aimenta masticata & saliva in ore mixta, eo melius in canalem Oesophagi impelli queant, necessatio musculi, seu instrumenta motus, dilatatorii & contrictorii, à Deo T. O. M. creati sunt. Quamvis autem Autores adhuc maxime inter se discrepent, quot paria musculorum constrictioni & dilatationi inserviant, dum alij tria, uti *Heister: in compendio anatomico* p. 147. alij quatuor, uti *Barthol. Anat.* p. 448. alij quinque, uti *Spigel. Anat. lib. IV.* p. 173. alij sex paria ad dilatationem, & unum Oesophagæum, ad constrictionem facere autumant: nihilo minus tamen ad constrictionem pharyngis, Hyo-Thyro & Cryco pharyngeorum paria musculorum facere exillino; pro facili ori vero introitu deglutieridorum, paria, Itylo Cephalo-Pterigo-Salpingo & glosso pharyngeorum, ut nimirum sese dilatent, à provida natura data sunt. Facta enim hac dilatatione satis amplum locum potulenta æque ac esculenta ibidem inveniant, quo eo melius per constrictionem trium parium musculorum modo nominatorum ad orificium Oesophagi perveniant, sicque in cavo ipsius sub pharynge hætere possint.

§. II.

In thoracis cavitate Oesophagus est collocatus, colli, dorſi vertebris, nec non parte membranacea posteriori arteriæ asperæ firmissime adhærens: a faucibus ad quartam vel quintam dorſi vertebram recta linea excurrens: ubi aliquantulum dextrorsum vergit; donec circa nonam

nam recurvatur, ac perforato diaphragmate sinistri lateris, ad undecimam circiter vertebrae progressus, sinistro ventriculi orificio communicatur. Inter quarum & quintam thoracis vertebrae corpus aliquod glandulosum Oesophago adnascitur, aliquando ex duobus tribus vel pluribus glandulis constans, ad lubricam efficiendam viam datum, quo deglutienda tanto expeditius per canalē, ventriculum petere possint. vid. *Vesal. lib. V. cap. 3. p. 415.*

§. III.

Cum in primo §pho de musculis pharyngem distantibus, & constringentibus egerim, necessarium esse judico, curatius perpendere, cur deglutienda, quae in oesophago sub pharynge haerent, in ventriculi cavitatem propellantur?

§. IV.

Interfessa ac perfecta disquisitione anatomica constat, oesophagum ex membranosa, cellulosa, musculosa, glandulosa, & nervosa tunica contextum esse. Omnes hae recensitae membranae, suo non carent usu. Bten in exteriori membranosa, utpote tenui & fibrola, a pleura ortum trahente, & cum ipsa contigua, ceterae sunt involucae. Cellulosa, pro corporum diversitate, magis vel minus conspicua est, & multa pinguedine referta; ut fibrae musculares mobiliiores reddantur: hoc observare licet in hominibus obesis; alii in maeilentis non item, nisi statu cellulas expandere velis; vid. *Clar. Raysh. Thef. VI. p. 9.* Musculosa ex duplici fibrarum serie est composita, nimirum longitudinali & circulari; siquidem fibrae longitudinales, dum abbreviantur, oesophagum constringunt. Sicque masticati, attenuati, humidi, lubricati, cibi, actione voluntaria & naturali in ventriculum propelluntur, ne diutius in cavo canalis permaneant, vid. §. I. & III. Glandulosa, nervosae tunicae incumbens, succum pinguem lentumque ab arteria oesophagica *Clariff. Rayshio Ep. 6. Tab. 7. f. 3.* delineata, paratum, in cavum canalis per emissaria exprimit; ne vero parcius aut abundantius iste humor fluat, fibrae aliquo modo carnosae constructa est haec tunicā, pro majori aut in minori contractione. vid. *Mang. The Anat. lib. 3. p. 523.* Papillo nervosa perquam multum facit ad sensationem, quia papillae ex nervis extremitatibus factae, agminatim inter se dispositae, copiosissima ibidem reperiuntur. Ex his quoque papillis, crustam sive tunicam villosam oesophagi contextam esse patet: ex verbis *Clebr. Raysh. in The anat. VII. p. 21.* reperi luculenter tunicam villoram pro labi- rum, buccarum, gulae, stomachi, & intestinorum ejusmodi fere esse con-

„stitutionis, scil. nil nisi corpus compositum ex papillis nervosis, vasis-
culis sanguineis, tomenii aut gossypii instar tenuibus. „

§. V.

Duo quoque vasa arteriosa totidemque venosa ambiunt oesophagum; prima arteria ex intercostali oritur, & oesophagica dicitur, de qua §. IV. altera e cœliaca prodit. Aft aliquando ex ipso arteriæ aortæ trunco, arteriarum ramusculos exurgere ad huncce canalem, *Cel. b. Heist. docet not. 67. inquit*: „Ego vero non semel, sed sæpius, duas, tres, tales „arteriolas distinctis principiis, ex arteria magna, oriundas vidi ac „demoustravi quæ cera repletæ erant. „ Vasa prior in Azygon terminatur; altera inferiora petit & in stomachicam coronariam se inserit.

§. VI.

Nervus ad oesophagum excurrent dicitur vagus, quia pluribus partibus opem fert, ex corporum olivarium lateribus profilit, juxta sinus laterales duræ matris cranium perforat, cumque vena jugulari interna prodit, multos furculos tam ad musculos cervicis, ossis hyoidis, laryngis, quam ad ipsas fauces & oesophagum propagat. Tandem ulterius descendendo ad latus arteriæ asperæ, in sinistram & dextram differtitur ramum; hi vero, ad orificium sinistram ventriculi concurrentes, ibidem plexum nervosum, circa oesophagum constituunt, *ut patet ex Fig. Barthol. p. 678. p. p. p.*

§. VII.

Rite jam omnibus hisce perspectis, quæ tam ad pharyngis, quam ipsius oesophagi situm, connexionem structuram seu fabricam, morumque in statu naturali pertinent: facilius judicium reddi potest, de statu ejus præternaturali seu morbofo. Quemadmodum enim omnes, in tota nostra machina reperibiles partes, variis obnoxie sunt morbis, sive sint fluidæ, sive solidæ: ita quoque, & oesophagum diversis obnoxium esse lesionibus, ne functionem suam rite peragat, quotidiana edocet experientia. Isto enim læso, hæditur deglutitio, aut in tantum: quando nimirum musculorum pharyngis paria solum; *vid. §. I.* aut in totum: si simul & ipsius oesophagi fibræ circulares & longitudinales *vid. §. IV.* paralyti laborent; ut cibi & potus sine ullo exquisito sensu, in ventriculi cavum, propria gravitate, cum sono & strepitu, quasi in lagenam vacuum irruant; quod quandoque in febribus acutis observatur, ob insignem virium resolutionem & defectum spirituum animalium. Nec raro accidit, quod aliquando deglutitio imminuatur aut depravetur, sive

sive id fiat a tumoribus externis, internisve, abscessu, strictura fibrarum ex spasmo suborra, quo hypochondriacæ & hysterice passionēs, pertinent, uti infra patebit; sive a cartilaginosa substantia ipsius œsophagi; sive ex obstructione propter variā deglutita, in pharynge vel œsophago hærentia, uti sunt ossicula, spinæ piscium, aciculæ &c.

§. VIII.

Prout vero tonsillæ vel glandulæ maxillares, a lymphæ cujusdam viscidæ collectione infarctæ, liberum sanguinis motum, & naturalem transitum impediunt; sic quoque tumores interni externique, modo majores modo minores, nunc a leviori, nunc graviore inflammatione, oriuntur, quæ inflammatio notha seu spuria appellatur. Vera interim inflammatio, acutus sane & periculosissimus est morbus, quo æger subito interiri potest, nisi cito liberetur; nam in partibus musculosis laryngis, pharyngis & ipsius œsophagi fibris hærens, non minuitur, sed augetur, sicque viam & respirandi & deglutienti præcludit, & cum febre continua vel continente est conjuncta; hinc talium febricitantium lingua sæpius arida, sili, observatur, imo materia viscida nunc nigra, nunc alba, tam lingua quam fauces sunt obductæ.

§. IX.

Et sane si tonsillæ obstructæ, internos externosque tumores constituentes, deglutitionem impediunt; nullus dubito, quin, quo rigidiores, densiores, compactioresque fibræ, seu membranæ œsophagi sunt, eo minus ad motum suscipiendum, aptæ existant, quin potius prorsus actionem destruant, & ita quidem, ut nec liquida nec crassa ad cavum ventriculi ope causalis deferantur. Nam quemadmodum omnis humorum motus, impulsus atque progressus fibris ac membranis morricibus promovetur: sic quoque œsophagi actio, ab his ut dependeat, necesse est; nullatenus vero fibris rigidioribus, compactioribus, quæ jam cartilagineam inducere substantiam absolvitur. Quod autem paulatim cartilagineam imo ossæam consistentiam aliquando acquirat œsophagus, constat ex observatione in *Sepulchret. Anatom. Boneti libr. 3. Sect. IV. p. 749. de deglutitione læsa* annotata. Verba sunt sequentia: „In dissec. cavæ, dævere, totus est pura cartilago, neque erat pervius, nisi cavitate, valis minuta, vix setam porcinam admittente, sed integra substantia, cartilaginea solidior. „

§. X.

Jam ad rarum œsophagi morbum progredior, quem pro virium memorum

orum tenuitate denotare & explicare, omnem navabo operam. Morbi autem rari illi dicuntur, qui raro corpus nostrum infestant, & rationis ætatis, temperamenti ac structuræ partium diversimode ingruunt, atque ex variis causis, & inter has, uti in hoc casu, ex passione hysterica, accidere possunt.

§. XI.

Equidem notum, passionem hysterica, affectum esse chronicum & complicatum, scvissimorum molinorum spasticorum matrem, circa venarum porarum & viscera prope adjacentia, a congestione sanguinis abundantis & spissioris ortum. Hacce jam existente, non solum vehementissimi dolores cardialgici, cum spasticis exacerbationibus, circa præcordia conjuncti observantur; verum etiam atrocissimi, lancinantes, vertiginosi quandoque capitis dolores, in temporibus, vertice vel occipite concurrent. Temporaria respirationis interceptio, cum frequentibus cordis palpitacionibus contingit. Deglutiendi difficultatem cum tali exquisito sensu percipiunt, ac si nucleus, aut alia res dura œsophago esset inclusa, præcedentibus pandiculationibus & oscitationibus. Appetitus ut plurimum vagus est & absurdus, cum intercurrente aliquando nausea & vomitu, materię biliosę, acidę ac peregrini saporis. Ructus, flatus, borborygmi, alvi obstructions communiter observantur. In paroxysmo graviore aucto emissã urina, quidem apparet limpida, est interdum lateribus vasorum granula rubra adfixa adhærent, quę deinceps fundum petunt. Personę vero temperamenti melancholici, aut sanguineo melancholici, ut & cholericı; vitę sedentarię addictę; lochiorum perturbationes, cessaciones mensium, expertę; diæta crassę, flatolenta, viscidã, potu coffe abutentes; & denique animi pathematibus v. g. tristitię, mœrori, aut aliis affectibus dedite, frequentius huic malo obnoxie sunt.

§. XII.

Hęc modo recensita symptomata varios, graves, diversissimosque motus in corpore excitant, quo vigor tam animi quam corporis, minuitur atque pervertitur, hinc sani corporis functiones, rite procedere nequeunt. Cum vero in tota rerum natura, fere nihil, sine ratione fiat, ideo hi perversi & mutati motus, ex certis causis proficiscuntur, quas medicus rationalis probe, perspectas habeat, quia labor medendi, maxima ex parte in accurata & prout fieri potest exquisita cognitione causarum morbosicarum versatur. Hanc sententiam Venerandus Senex Hippocritates lib. de natura humana §. 25. p. m. 278. confirmare voluit his verbis: *enarrationem insituere oportet, ut causę morbi nos opponamus.* Sic enim utique solvitur id, quod morbum in corpore fecit. Minime

vero causa huius morbi in principio quodam, quod sensu interno, intentione ac sapientia instructum & naturæ expers quaerenda; nam corpus humanum licet immateriali & materiali principio constet, nihilominus tamen in plurimis morbis causæ a machina sola, & ejus affectionibus proveniunt.

§ XIII.

Igitur causas mali hysterici ex principio materiali, derivandas esse arbitror. Nam si persona temperamento gaudens sanguineo melancholico, mox circa hypochondria, mox circa lumbos, mox circa præcordia, doloribus gravioribus & atrocioribus vexatur, causa formalis & proxima erit vehementia spasmorum, genus nervosum afficiens. Talis nimirum indolis sunt spasmi, ut vel universum corpus habitum, vel nervorum ac membranarum compagem, constringendo corripiant. De prioribus mihi hic non erit sermo, quia in hystericiis passionibus haud observatur, quod tubuli excretorii, in tota peripheria corporis delitescentes, ita a spasmis coarctentur, quemadmodum in omnibus febribus intermittentibus contingere solet, ut sanguis ab extremitatibus ad partes nobiliores, & materia excrementitia perspirabilis ad interiora repellatur. Illorum vero motuum spasmodicorum nunc fiet mentio, qui nerveas & membranosas partes solum corripiant, doloresque atrocissimos pariunt. Quam primum dolor in lumbis sentitur, spasmus ad plexum mesentericum pervenit, renes afficit, & urina tenuis secernitur; si, in hypochondriis dolor exiit, hepar & lienem spasmus corripit; si præcordia aggreditur, in primis viis tyrannidem suam exerceat, & in oesophago deglutendi difficultatem; circa ventriculi officia dolores cardiacos: & in intestinis flatulentiam nimiam parit.

§ XIV.

Tanto vehementiores sunt hi motus spastici, quanto impuri & spissi sanguinis congestiones, quæ ad basin aut stagnationem præ majoribus, & quo exquisitioris membranae sensationis irritantur. Vera igitur & efficiens materialis causa mali hysterici recte in congestionibus sanguinis spissi & impuri quaeritur. Quamvis enim tales congestiones sæpius occurrant, & in prima ætate caput, in media pectus, in consistente abdomen afficiant: nihilo secius, tamen nec plethoricæ, viæ sedentariæ & otiosæ deditæ personæ: nec laeta diu abutentes: nec fluxu mensium inordinato vel plane destructo laborantes: a talibus congestionibus ad superiora versus, immunes permanent. Hoc interim non negandum, corpora plethorica sæpius & diu, sine ullo incommodo vivere, quamdiu humida superflua puta, vel impura, perenni atque circulari motu agitantur,

tur, ac per excretorios tubulos ultimosque vasorum fines in naribus, recto vel utero ejiciuntur. Vasis uterinis vero nimium constrictis aut coarctatis menstrui vel lochiorum fluxus legitimus retardatur vel supprimitur, adeo ut illos morborum in corpus muliebri ingruat, non ex eo fundamento, ac si venarum aut corruptum quid partibus istis inhæreret, (est enim sanguis menstruus in se & sua natura optimus, nutritioque succo refertus,) sed quod redundans ac regurgitans, qui per minima vasa venosa uteri ac vaginæ erat evacuandus, circulum sanguinis æqualem impediat, robur fibrarum & contractionem cordis vasorumque infringat.

§. XV.

Cum ergo in hysteriis affectionibus, a lochiorum vel mensium fluxu retardato aut imminuto, congestiones oriuntur; sunt exinde spasmi; hinc sanguis per hancce stricturam canalium, in vasa aperta in majori quantitate irruit, infarctus, stases, stagnationes & inflammationes efficit. Ad eundem modum, simul ac spasmus præcordia aggressus, tubulos ac canales arteriales venososque, circa orificium ventriculi sinistrum delitescentes, ita constringit, ut sanguis, ex mensium vel lochiorum suppressione, ad superiora redundans, ad oesophagi quoque vasa propellatur, inde fit in arterioribus canalibus obstructio. Impressus sic cruor per aliquod temporis spatium ibi subsistens moveri desinit, quiescit, transitum fluentis novi sanguinis impedit, vasa dilatat atque extendit; dolores, inflammationes excitat; quæ nisi cito resolvantur in spissum, tenacem, glutinosum & album humorem concreverunt, & veri peris naturam induunt, ut tali ratione non solum abscessus, sed vera quoque gangrænosæ & sphacelosæ corruptio oriaur. Hinc ista congestio, stagnatio & inflammatio, quæ oesophagum lædit, tam interne quam externe, & in suppurationem vel abscessum vergit, periculo non vacat, sed mortem minatur.

§. XVI.

Nullo enim chirurgicæ artis auxilio talis abscessus aperiri potest, præsertim si fere mediam ipsius oesophagi partem occupaverit, quo factum vel collectum pus, inter membranas siueunicos hujus canalisis hærens vid. §. IV. exprimatur; ideo in isto loco adhuc clauso augetur, attenuatur, putrescit, acre fit, membranas & vasa corrodit, ut sanguine mixtum effluat. Ast exteriori membrana, a pleura ortum trahente, sana adhuc existente, in ventriculi cavitatem irruit, vel vomitu ejicitur, reliquum per oscula vasorum venosorum erosa absorbetur &

LIII 2

sanguis

sanguineæ massæ miscetur, quam inquinat & successu temporis viscera nobiliora etiam corrumpit.

§. XVII.

Nec interna medicatio, quamvis perite adhibeatur, quidquam præstat. Signa enim diagnostica, malo hæc incipienti aut incrementi intricata & minus evidenter sunt. Quapropter cum simul symptomata plurima quæ in hysterici §. XI. observavimus, hic quoque concurrant: scilicet quod dolores cardiaci cum vomitu & dejectione ingestorum graviores observentur; regio itidem inter scapulas per intervalla doleat; nec Argus ipse obstructionem in minimis præviat. Quando vero inflammatio jam in suppurationem abit, ægrique pus excreat, morbus quidem patet, sed curatio frustra tentatur, licet optimis remediis; donec ægrotus vel inedia, cum cibi licet probe masticati & saliva mixti, ob læsionem continui œsophagi, ventriculi petere nequeant, vel ex rationibus §. 15. allegatis, miserrime perit.

§. XVIII.

Totam rem luculentissime, ex casu nunc recensendo illustrabo. Matrona quædam honestissima, celebris mercatoris hic Regiomonti, nunc desideratissima conjux, pluribus retro annis de symptomatibus variis ex passione hysterica oriundis, conquerebatur. Mox enim spasmis & doloribus circa hypochondria, mox circa lumbos, mox circa præcordia corripiebatur, quibus juncta erant, appetitus vagus, pulsus debilis, urina cum sedimento roseo: aliquando rubra tenuis, cum granulis rubris, in fundo viiri in ætervulum coactis, & post conquisitionem valis fundum petentibus; continuus fere mensium inordinatus fluxus, & cum insequens fluor albus, diebus aliquot perdurans: sumptis nihilo minus medicamentis, affectus hi, miscebant in tantum, ut res domesticas, licet ægre peragere, sacras ædes frequentare, & aliquando excursions facere possent. Integram interea restitutionem vebant, corpus laxum & spongiosum, pravis humoribus repletum; temperamentum; ætas; diæta ad nimium usum Coffee prona; animique perturbationes; refrigerationes inter curas domesticas; puerperia duo: post quæ lochia pauca, impuritatibus uterinis vero dilfluebat fere. Accidit, ut circa initium anni præteriti, puerpera foret, & filiolum ex grato conjugio nancisceretur, quem partim amore, partim necessitate ducta, ipsa lactabat. In isto tempore, primis statim lactationis diebus, conquecta est, de doloribus obrutis inter scapulas & in præcordiis, qui vero datis diaphoricis cessarunt penitus. Cum vero inter lactandum, pectus sæpius denudare oportuit, interim quod lactantibus, ut plurimum

mum commune est, menses subſtiterunt plane; hinc ortæ ſunt exinde varix afflictiões: utpote teuſiones in abdomine, circa ventriculũ ſanguinis congeſtiões, & exinde affectus cardialgici doloribus ſimilimi; deglutiōis læſio; dolores recurrentes aliquando inter ſcapulas. Poſt aliquod tempus dicebat ſe inter deglutiendum obſtaculum in præcordiis ſentire, poſt idem obſtaculum, gravius recurrere pronuntiabat, cum dejectione eſculentorum ſtatim poſt paſtum, & vomitione muci tenacis copia. Medicus ordinarius advocatus, cupit, ut fruſtum panis comedat; illa panem bene malticando & ſaliva optime permiscendo, deglutit, inter deglutiendum nihil ſentit, niſi quod, ſimul ac panis in regionem præcordiorum pervenit, ſe ſtatim ſentire renitentiam, quem in præſentia medici, cum muco haud pauco evomit. Medicus ægrota conſtitutionem ſciens, atque rem bene examinans, hæſitat, eſſe aliquid in cauſe ipſius œſophagi, quod deglutiōnem impediat, & per conſenſum nervorum, in ipſo oriſicio ventriculi dolores creet; itaque, ut per Chirurgicum Caſtreſem Primarium dexterrimum, ſilum argenteum, cum globulo argenteo annexo, per œſophagum intrudatur curat. Id quod non ſemel factum, neque tamen Chirurgus aliquid obſtaculum, vel a tumore vel a caruncula ortum, per totum œſophagi tractum, neque in oriſicio ventriculi ipſo obſervat, ſed libere fundum ejus inſtrumento petit; neque ægrota ſenſum moleſtum ab inſtrumento deprehendit. Quapropter patiens ad conſilium medici inſanctum lactare deſiit ſimulque ſecum reputavit medicus, ut materies viſcida & acris, quam ſemper poſt aſſumpta vomitu rejecit, corrigatur & evacuetur; quod factum dato blando emetico & a'vum ſimul leviter ſtimulante. Res bene ſucceſſit, quia ægra poſt medicamentum levamen in præcordiis perſentire, & ſicubi prius non niſi pulſes, nunc jam juſ gallinaceum, cum pauca carne minutim ſciſa, in ventriculũ perveniſſe, ibique manſiſſe, lacta innuit. Itaque ut ſpaſmi oriſicii ventriculi demulcerentur, ſanguinis afluxus ad ventriculũ arceretur, perque loca conveniētia excerneretur, cogitatum eſt, adhibitis inſimul variis remediis tam internis quam externis, ipſa VS. non omiſſa. Nec inutilis deprehendebatur hæc curatio, ſiquidem ægra ambulare, & nundinas frequētiare potuit. Cum vero niſi loſecius mox de doloribus & deglutiōis difficultate conquereretur; conſiciebat medicus eſſe aliquid, vel in ſuperiori ventriculi oriſicio, vel non procul ab ipſo, in œſophago, quod moleſtum & periculofum morbum minetur. Ideoque omnia tentabat, quæ ars præcipit; ubi vero in caſum ſingula cedere animadvertēbat, in Conſilio Medico mentem ſuam de toto morbo libere aperiebat. Nec decepit ipſum conjectura, ſiquidem poſt aliquot ſeptimanas vomitu dejecit plus ſanguine permixtum. Hinc unitis viribus, data ſunt remedia, quæ ſaltem excogitari poſſunt, omnia, donec ægrota, auctis ſymptomatibus, inſtimis reſponſibus vehementiſſimis cir-

ca ventriculū , anxietatibus maximis , lypothimiis supervenientibus , febre lenta , exhausta , placide , aliquot post habitum consilium medicum septimanis , obiit.

§. X I X.

Ubi defunctæ corpus ad preces mariti cultro anatomico examinatum erat , sequentia animadvertebantur.

Aperto abdomine ventriculū stricte perreptabant rubræ.

Hepatis pars concava , ubi vesicula fellea adjacet , putredine erat correpta.

In mesenterio multæ nigræ aderant maculæ a stagnatione sanguinis ortæ.

Substantia interna amborum renū erat putredinosa , & in pelvi sinistri renis pauca quantitas materiæ purulentæ inveniebatur.

Uterus cum ovario sinistro a sanguine copioso in ibi stagnante , inflammatione erat correptus , dextrum vero ovarium bene se habebat.

Stigmata in pulmonum lobis , sternō remoto passim observare licuit.

Cor erat flaccidum atque pericardium multa pinguedine cinctum.

In œsophagi interna superficie , abscessus disruptus reperiebatur ; nucis juglandis magnitudine ; a quo in duas partes divisus , ac si scapello per tunicas discissus fuerit ; sola exteriori tunica leviter adhuc coherente , licet & hæc sphacelo erat corrupta.

Vertebam quintam & sextam , ubi abscessus locatus fuerat , etiam sphacelo arrosas vidimus.

Anterior œsophagi pars ut trachæ & pulmonis postica , sphacelo quoque infecta deprehendebantur.

T A N T U M.

C C L X.

J. O. MILLETER,
DE MORBO TSOE MOER,
HUNGARIÆ ENDEMIO.

Leid. 1717

P R O O E M I U M.

PREclare cecinit Poëta *Æneid. Lib. VI.* Quisque suos patimur ma-
nes ; quod non minus circa res medicas, quam alias sffragantem
habet veritatem. Testantur illud abunde humanæ vicissitudines ac morbo-
rum insulsus diversi, magisque vel minus familiaris, non solum pro tem-
peramentorum, ætatum, vitæ generis, sexus, anni temporum differentia ;
sed & locorum in quibus nascimur vel vivimus varietate ;

Hinc aliis alius semper locus est inimicus
Partibus : ad Balthum scorbutus in oribus usit :
Turgida sic collo dependet struma Sabaudis,
Alpinisque viget : siccum, sic phthis, Iberum
Fortior insurgit solito detrudere nisu.
Ungariamque febris comburit certa : calore
Anglia sic sudat proprio : venerisque malignus
Indorum morbus deturbat viscera : & instat,
Austriacis nodosa pedes tardare podagra.

Sicque plicat varie tricus *Ciragra* Polonos quales plures in dissertationibus
suis cruditis exhibent morbos celeberrimi in arte medica *Viri F. HOFF-*
MANNUS de morbis certis regionibus & populis peculiaribus, & *RIVI-*
NUS de morbis endemiis. Nec regiones solum aut integræ provinciæ sub-
jectæ sunt certis quibusdam morbis, verum particularia quoque loca non-
nulla peculiare suos fovant morbos. Sic Liber Baro de *VALVASOR*
in descriptione *Carniolæ* sub titulo : *Die Ehre deis Hertzogthums Crain*
in publicum emissâ *Lib. III. p. 323.* notat, maculam quandam nigram
lentis

lentis magnitudine variis in corporis partibus spectabilem v. g. pectore, dorso, artibus, quæ aut exceptionem pruritus excitet, viscitis in certis particularibus Carniolæ locis: (aust. de Karst, und an den Poick, detsgleichen im Vipacher Boden) familiarem esse, quam iidem frictione forti cum alio profigunt, asserentes sine frictionis usu hominem in spatio 2. aut 3. dierum ea succumbere debere: testaturque in superiori & inferiori Carniola nihil de hoc morbo observari. Notitiam huiusmodi endemiorum morborum, sui usu suo medico minime carere facile quisque artis medicæ gnarus annuat, ita jam Hippocr. libr. de Aer. loc. & aquis medicis eam ceu utilem commendavit. Non sufficit verò solum scire, quinam peculiare morbi, vel qui frequentius aut rarius in hoc vel illo loco & qua de causa occurrant, sed interest etiam novisse quid peculiare in hoc vel illo loco respectu benignioris, vel malignioris indolis, aut aliarum circumstantiarum hic vel ille morbus, præ aliis locis gerat? quamvis remedia chirurgica æque atque pharnaceutica magis vel minus in diversis in locis ex usu sunt, calidiora magis vel temperata? Alterantia vel evacuantia, & quæ ex his in genere magis proficua, fortiora item vel mitiora, majori vel minori dosi data, esse soleant? Differunt enim secundum Celsum in præfat. Lib. de Med. p. 8. genera medicinæ, pro natura locorum, aliudve opus est Romæ, aliud in Ægypto, aliud in Galliis esse Sic febrem semiterrianam, quæ alibi raro in malignam transit, Romæ magna ex parte valde periculosam esse scribit BAGLIV. L. I. Prax. Med. c. 15. Longior, & difficilior est curatio paralytis scorbuticæ Eubæ, quam Hamburgi, teste Severino Engaleno in libro suo de scorbut. p. 99. In Hispania vulnera capitis summe periculosa esse JUNGKEN Chir. man. p. 81. refert. Coberus Vestphalis fortiora, Surois mitiora purgantia propinanda esse annotavit D. III. obs. 2. in schol. Wolffgangus HOEFERUS in Herc. Med. I 8. c. 2. monet Bavaros levissimis, Hungaros non nisi fortissimis purgari, feminasve Hungaricas, ut & Austriacas prægnantes Bals. Embryonis ceu nimis calidum offendere. Galli trepanum feliciter, Dani minis ferunt, teste Bartholino: In Gallia futura tendinum vulneratorum, operatio bubonocæles & curatio ulcerum chironiorum, feliciter succedunt, contra in aère Romano secundum Bagliv. c. 1. Sic HOLLER comment. in Aph. 2. sect. 1. Hippocr. scribit. Narbonenses medicos reprehendere Parisios, tanquam ad aperiendam venam audaciores. Parisiis tamen facile phlebotomiam ferri; quæ, ut alia mittam, cum ita sese habeant, totus in eam, ut quid in patria circa has res obtineat, cognoscerem; missis itaque copulatis questionibus medicis de rebus utilibus & necessariis mihi visis ad modernos nonnullos patriæ nostræ practicos, triplex responsum à celeberrimis nunc in Hungaria, doctrina non minus, quam felicitate in medendo & fama inelyris practicis obtinui, videlicet Posonio à D. Carolo RAYGER juniore Med. D. & Celsiff. Palatini Regni Hungar. Archiatro. Neosolio à D. Carolo Ottone MÖLLER, Med. D. & inelyri cuncta

comitatus Zolienſis, nec non Regiæ liberæque civitatis Neſolienſis Phyſico ordinario. Ac Sophronio à D. Joh. Adamo GENſELIO, Med. D. Academ. n. c. Germ. Collega, & Civit. Sopronienſis, Phyſico ordinario: quorum ſingulari erga me benevolentiam hoc ipſo comprobatur: non poſſum non digno celebrare encomio: ex quibus excepta quædam, dum de morbo Hungariſ endemio ago, non inutilia, neſ a præſenti tractatione prorſus aliena fore exiſtimavi, ſi curioſi lectoris in gratiam in fine diſſertationis annecterem, ea bona fide communicando, qua ipſos mihi ſcripſiſſe in litteris ſuis reſtabantur. Dum autem thema quoddam inangurale mihi eligendum eſſet, primum quidem conſtitueram apud me de febris vulgo diſſa Hungarica agere, & cum in diverſum abeuntes auctores tam pertractantes non ſolum in limite circa determinandum nomen & ſpeciem febris, verum & circa ſymptomata, cauſas, remedia offenderem, miſeram denique proluxas quæſtiones ad ſupra memoratam trigam celeberrimorum Hungariæ medicorum ſperans fore, ut obtento benigno reſponſo ab iis, facilius demum mihi innotefcat, tum nativa ipſa huius morbi, qualis in Hungaria deprehenditur, tum ratio diſſenſus auctorum, cum alias difficile ſit iudicium, an cauſa verius rejici debeat in diverſas annorum conſtitutiones, vel diverſitatem locorum, aut etiam medicamentorum adhibitorum differentiam: mutandum tamen brevi fuit conſilium, dum acceptis ex patria triplicibus litteris, parens & amici dulciſſimi quam proximum urgerent reditum: cumque animus ſemper fuerit morbum aliquem Hungariſ adſcriptum pertractare, in morbo Tſemor tandem acquievi, cujus nomen apud Hungaros receptum malui in diſſertationis titulo eo uſque uſurpare, dum ex tradita genuina ejus Hiſtoria, quodnam latinum ipſi magis competere videatur, innotefceret: & cum Hungariſ perpetuus quaſi ſit hic morbus, id eſt, omnibus annis, omni annorum tempore affligens non unum, ſed plurimos, endemium eum appellandum cenſui. Tameſi vero, ut hominum mores ſunt, male forte audire poſſem à quibuſdam, me huiusmodi morbum evolvendum in me ſuſcepſiſſe, cujus curandi ergo raro Hungariſ ſolicitare ſoleant medicum, ii tamen meminere popularem Hungarorum curationem tanti non eſſe, quæ indubie ſemper proſtigit morbum hunc, & pejora prohibeat conſuetudina, cum ſæpi febres intermittentes, continuæ, & ipſa febris Hungariſ ſuccedere ſoleant adhibitis licet eorum remediis, cujus tamen tempeſtively ſucciâ radice morbi hi popululare minime poſſent. Unde jam FORESTUS L. I. de febr. c. 1. in Schol. eo ex capite reprehendit medicos febris diariæ tractationem ſeu benignæ negligentes, quod videlicet nonnunquam in periculoſos tranſire obſervent morbos. Antequam autem ipſam tractationem aggredior, lubet paucis auctorum, qui de morbo hoc egerunt, & hiſtoriam ejus tradiderunt, mentionem injicere: Coberus itaque primus eſto, cujus decades tres obſerv. caſtren. præcipue autem prima ſæpius Languoris Pannonici, Hungariſ (ut ipſe dec. 1. obſ. VI. in Schol. Diſput. Medico-Pract. Tom. VII. M m m m lio

lio dicit). Tschemmerle dicti (rectius tamen Tsomör audi) mentionem faciunt, tamen si vero auctor hic pro aliis bona fide communicatis laude sua defraudandus mihi minime videatur, in eo tamen humani quid passum ipsum esse suspicor, quod morbum Tsomör à morbo Hungarico sive febris Hungarica, Hungaris Hagymaz, Germanis H-ubt Kranckheit dicta minus probe distinxerit, adeo quæ lectori facile inponat, ut quæ symptomata huic competunt, illi promiscue omnia ab eo consignata tribuenda esse credat. Videtur equidem D. 1. obs. VIII. p. 42. Languorem ab ipso morbo Hungarico discernere, dum dicit: nisi tantis ictibus corpus jam purum satisque laudabilis constitutionis concussum fuisset hunc tam gravem non amplius languorem, sed morbum perfecte Hungaricum facile effugere potuisset, & dec. ejusdem obs. X. p. 53. Plenis gressibus ad languores pannonicos, in furorem tandem morbum terminandos deferrebat &c. nihilominus aliis in locis. & cumprimis p. 32. Obs. VI. D. 1. hinc hos morbos invicem miscet, dicens, languorem Hungarico. anno 1366. insana prorsus rabie pestis instat in omnes grassatum esse, cum tamen cuilibet Joradamum anno 1566. in Hung. castrensem medicum agentem, de phanomenis pestis. c. 19. evolventi liquido patere possit, eo tum non languorem Coberii pannonicum, sed ipsam febrem vulgo Hungaricam dictam tanta cum strage grassatam esse, ut taceam, quæ ibidem de contagio & intermissione hujus languoris memorat, & obs. VI. D. 1. p. 31. in Schol. de Petechiis languori huic familiaribus, morbo Tsomör nulla ratione tribui posse. Id insuper hand injurie forsitan desiderari a viro bono posset, ut luculentior & prolixior paulo historiam morbi hujus Tsomör tradidisset, cum præter obs. VI. & X. D. 1. pauca quædam tralita phænomena, in reliquis fere solo nomine languoris pannonici contextus fuerit, nisi in reliquis suis decadis (mentionem enim facit decadis IX in D. II. obs. 1.) defectum hunc suum supplere studuisset, quas tamen una cum celeberrimo, dum viveret Meibomio in Præf. ad decades III. obs. castri. Coberianas mihi videre non licuit. Proximus Cobero sit Malachias Geigerus, qui in microcosmo Hypochond. Monachii 1652. edito in IVto de morbo Tsomör quædam complectitur, quem cum nec in Saxonia, nec hic obtinere potuerim, verba ejus a D. D. Reimanno bona fide communicata in historia morbi hinc inde citabo. Wolfgangus Hæferus junior pariter in Herc. suo medic. brevibus mentionem hujus morbi facit p. m. 326. & D. Job. Paterfon Hain in Ephem. N. C. Ger. D. 1. an. 11. obs. 23 D. Samuel Koleferi denique de Kerefer, Phil. & Med. D. Sacr. Cæs. Regiæque Majest. Rei metallicæ per Transylvaniam Inspector, in tractatulo suo de scorbuto mediterraneo Cibiny in XII. edito anno 1707. genuinam magis & prolixior paulo morbi hujus historiam exhibet, qui tanto majorem laudem mereri mihi videtur, quo honestius semper duxi institutum, si quis patrias res studiose investiget, & easdem memoriæ commendet, quam si quis peregrina sectando, ante pedes posita & quotidie oculis usurpanda despicat,

despiciat, negligat. Aetate 2. annos prodiit Erfordiae quoque differt. Inauguralis de Languore Pannonico, auctore Joh. Theophilo Windisch amico & condiscipulo quondam meo Jenae, pleraque omnia tamen ad historiam & causas hujus morbi facientia, si unum vel alterum excipias, quod a contraneo nostro eo tum Jenae commorante sciscitando rescivit, ex Cobero mutuavit. Hi sunt de quibus certus sum, morbum hunc scriptis suis persequutos esse. Promisit equidem D. Carolus Raygerus Senior Endemiorum, & Epidemicorum Hungariae libros 2. in Praej. ad Pauli Spindleri obs. Medic. Centuriam, ubi haud dubie, pro more suo erudite, de morbo Tsomör quoque commentus fuisset, sed cum nec ex patria, nec ab eruditius exteris vel bibliopolis comperiri habere possim, an typis vulgati sint, suspicione moveor, praematuram sorte mortem laudabilibus viri hujus conatibus obstitisse, & editionem suspensam mansisse. Praeter horum vero auctorum de morbo Tsomör annotata phaenomena, in responsionibus supra memoratorum D. D. Raygeri junioris, Molleti, Genselii communicata: non minus, quae à fautoribus & amicis meis integerrimis D. Joh. Adamo Reimanno Med. D. & Practico Experienti, nec non D. Adamo Bacsmegyí Inchyti Comit. Gomorien. Physico ordin. per litteras accepi, ut & quae a contraneis Wittenbergensibus, Hallens. Jenens. cujatiibus empiscari potui, historiae morbi inferam, citatis inferius breviter autoribus. Faxit divinum numen, ne in evolviendo hoc morbo caligent oculi, & à veritatis tramite deflectat ratio, verum totus conatus hic meus cedat in nominis sui sanctissimi gloriam, proximique salutem.

HISTORIA MORBI.

AD ipsam rem jam progressum faciens necessarium duco praemittere historiam morbi, ut huic praecognitae reliqua dicenda firmiori inniti queant fundamento. Estque haec:

Post assumptas avidae carnes vervecinas vel suillas, aliudve facilis concoctionis edulii genus (1), aut etiam post quemvis laudabilem cibum singulari cum dulcedine atque aviditate praecipitante nimis & magna in copia ingestum (2), semisaturum (3) vel ultra satietatis limites oppletum, corripit fastidium ciborum (4), cui jungitur aliquando sensus tensus vel gravativus ventriculi (5), nonnunquam anxietas praecordiorum inquietudine comitata (6), ructus (7), conatus vomendi (8), interdum ipse vomitus (9), iactatio abdominis

M m m 2

statu-

(1) D. Moller. Rayger. Reiman. (2) Moller. (3) Kaleseri.

(4) Kaleseri, Genselius. (5) Rayger Genselius. Moller. Reiman. Bacsmegyí.

(6) Bacsmegyí. (7) Gensel. (8) Genselius, Bacsmegyí.

(9) Genselius.

stultenta, torminosa (10), diarrhæa (11)]: mox languor atque lassitudo quædam membrorum (12) sensim sensimque incrementa sumens, ut tandem gravativo, contusorio, profundum dolorem exhibeat (13), cum sensu gravativum, in nonnullis tractorio & tensivo dorsi inter scapulas (14), [qui non nunquam versus nanus successively sese, extendendo oneris cuiusdam veluti ad extrema manuum delibentis sensum infert (15), & dolor capitis gravativus (16). Hinc oriuntur pandiculatiæ, torpor sensuum (17) & cogitationum (18), disciplicentia sui (19), in aliquibus propensio in somnum fere ineluctabilis (20), inapetentia (21): succedunt paulo post horripilationes modo majores, modo leviores (22), apud aliquos cum æstu volatico initio alternantes (23), jam calor major vel minor (24) cum augmento doloris capitis (25), [quo durante calore circa tempora pulsatorius, ardens, nonnunquam lancinans, vibrativus observatur dolor (26)] noctes inquietæ (27), insomnia turbulenta, alvus astricta, venarum solito major turgescencia, articularum pulsus febrilis, & tubercula dura [quæ pressa exquisitè dolent (28),] per totum corpus (29) imprimis vero in spina dorsi, collo, nucha, circa tempora, maxime circa carpos manuum externe (30) supra radium palpabilia (32), modo majora, modo minora (32), [instar pisi, seminis lini, nucum juglandium (33)] pro ratione scilicet subjectorum, in iis etiam qui sæpius frictione morbum hunc profligant, majores observantur (34). Corripit alias morbus hic sanos (35), altioris æque atque intimæ sortis & utriusque sexus homines (36), frequentissime famelicos, ac post prægressum jejunium (37), omni annorum tempore (38): inter temperamenta frequentius cholericæ vel cholericæ-melancholicæ (39), peregrini in Hungaria commorantes nunquam vel solum rarissime hoc morbo corripuntur (40). Et respectu frequentiæ etiam inter Hungaros diversitas quædam intercedit, nam quos Comitatus Hungariæ meri Hungari incolunt unice lingua patria Hungarica utentes, iis familiarior hic esse solet morbus, quam aliis, ubi Germanica vel Schlavonica simul viget &c. Solvitur malum hoc totum spatio unius vel alterius horæ, vomitu, imprimis

- (10) Rayger. Mollerus. Reiman. (11) Kalsferi.
 (12) Hæferus. Kalsferi. Rayger. Möller. Reiman. Bacsmegyi.
 (13) Conterranei. (14) Conterranei. (15) Conterranei.
 (16) Hæferus. Rayger. Möller. Reiman. Bacsmegyi. (17) Kalsferi.
 (18) Conterranei (19) Reiman. Rayger. Möller. (20) Conterranei.
 (21) Kalsferi. (22) Geigerus. Kalsferi. Reiman. Rayger. Möller.
 (23) Hæferus. Conterranei. (24) Kalsferi. Rayger. Möllerus. Reiman.
 (25) Conterranei. (26) Conterranei. (27) Kalsferi. (28) Kalsferi.
 (29) Kalsferi. Geigerus. Reimannus. (30) Hæferus. Reiman. Möller. Rayger.
 (31) Ex Conterraneorum relatione & ostenso loco hoc scio.
 (32) Conterranei (33) Geigerus. (34) Reimannus. (35) Möllerus.
 (36) Kalsferi. (37) Möllerus. (38) Genselius. (39) Moikvus.
 (40) Möllerus. Genselius. Rayger. (41) Möllerus.

primis ab initio sponte superveniente (41); nodis autem jam præsentibus & actu incrementum fumentis solus vomitus non sufficit (43). Solvitur etiam per sudorem sponte oborum (44), aliquando etiam per diathesam (45). Curatur a popularibus frictions validas instituendo, iis præcipue in locis, ubi tubercula præmemorata deprehenduntur (46) ope aceti allii, piperati (47), spiritus vini (48) inprimis oleo aliquo destillato remixti v. g. succini (49), vel viribus Rad. Levistici inprægnati (50), aut sola saliva (51). Alii butyrum in hunc finem eligunt (52), pinguedinem alii asinerinam, imo porcina, prius tamen ad ignem modicum calefactam, aut liquatam (53). (Quod remedium in inprimis in adfuetis, sæpe totam curam absolvit, præcipue vero repetitum, & initio morbi susceptum (54), interdum minus feliciter impedit subsecuturos morbos (55).) Remedii insuper loco ipsi est abstinentia a cibo (56) vel spirituosorum v. g. vini generosi (57), spirit. vin. cum pipere (58), aut decocti abietis assumptio (59), & denique motus corporis vehementior, susceptus cursu equestri vel pedestri aut velocius solum deambulando, vel laboribus (60). Terminatur ut plurimum unius, 2. 3. vel 4. dierum spatio (61). Neglecto vero initio malo, nec adhibita frictione vel alia medela, excretionibus supra a legatis spontaneis etiam emanantibus, ut plurimum succedunt febres intermittentes (62) vel continuæ (63), ipsa quoque febris hungarica (64): vel longissimo interdum tempore valetudinatum hominem relinquit (65) cum inappetentia, lassitudine, & alvo adstricta conficiantem (66). Stata recurrendi tempora minus observat, sed errores dietæ sequuntur supra dictos (67), hac tamen cum differentia, ut in adfuetis vel levissima ex occasione eorum denuo tragediam suam ordiatur (68). Aliis morbis non complicatur (69). Nunquam contagiosus est (70). Multo minus petechiis stipatur (71). Nec, quod *Höferus* ex relatione quorundam Hungarorum recenset, sc. initio neglectum, spreta frictione, hominem intra triduum neci dare, experientiam adstipulantem habet.

M m m m 3

TRAC-

- (41) Mollerus. (44) Mollerus, *Kalefieri*, *Reiman*. (45) *Kalefieri*.
 (46) *Höferus*, *Conterranei*. (47) *Coberus*, *Kalefieri*. (48) *Kalefieri*.
 (49) *Kalefieri*. (50) *Conterranei*. (51) *Rayger*, *Möller*.
 (52) *Conterranei*. (53) *Conterranei*. (54) *Möller*.
 (55) *Genselius*, *Conterranei*. (56) *Kalefieri*. (57) *Conterranei*.
 (58) *Conterranei*. (59) *Raygerus*. (60) *Conterranei*.
 (61) *Kalefieri*, *Conterranei*. (62) *Reiman*, *Genselius*.
 (63) *Genselius*, *Möller*, *Reiman*. (64) *Kalefieri*.
 (65) *Kalefieri*. (66) *Kalefieri*, *Rayger*. (67) *Möller*. (68) *Reiman*.
 (69) *Genselius*. (70) *Möller*, *Rayger*, *Genselius*.
 (71) *Möller*, *Reiman*, *Conterranei*. (72) *Raygerus*.

T R A C T A T I O.

EXposita Historia Morbi lubet de nomine ejus quædam prælibare: Hungaris itaque trium nationum, videlicet, Germanis, Schlavis & stricte sumptis Hungaris communi nomine venit Tsömör. Nec in Transylvania Hungaros, Saxones & Valachos inter diversum fortitur nomen teste D. D. *Kölestri*, de cujus vocis origine tametsi certi quid determinari vix possit, si tamen conjecturæ locus, existimarem ab Hungarica voce Tsomo, quæ nodum significat ortum suum duxisse, unde primitus forte Tsomos-ér, id est, nodosum vas, vel simpliciter Tsomos, id est, Nodosus, (sc. morbus) à tuberculis instar nodorum hoc in morbo palpabilibus, appellatus sit, successu vero temporis per abusum o in ö, & ultimum s. in r. mutatum, ut nunc Tsömör audiat, licet aliqui etiam loco ö, simplex e. & loco Ts. Cs. adeoque Tsmer vel Csemr scribant : & cum vox Tsömör communis nunc nomen sit omni nausæ apud Hungaros, forte à nausea cum hoc morbo subinde concursante, transumpta demum sit appellatio ad simplicem quoque vel cum aliis morbis complicatam nauseam.

Latinitate nomen diversos apud scriptores diversum legitur, *Coberus* quippe & D. *Vindisch* eum Languoris Pannonici & Hungarici titulo insigniunt, licet illi alibi quoque sub morbi Hungarici. *Luis Pannoniæ* titulo veniat. *Wolfgangus Hæserus* l. c. & D. *Joh Paterfon Hain* pariter supra alleg. loco, Hungaris nauseam eum dici exponunt. D. D. *Kölestri* denique loco nausæ scorbuti mediterranei nomen magis attulit. Quodnam autem nunc dictorum nominum latinorum morbo huic convenientius esse videatur, tametsi paulo scrupulosius de eo disquirere, supervacaneum ipsemet censeam, quod in verbis faciles nos esse conveniat, dummodo rem eandem, diverso licet sub nomine complexamur; nihilominus, cum nomina sæpe nos manuducant ad ipsarum rerum cognitionem, & ipsam rei naturam expriment, non omni ex parte inutile fore spero paucis de eo disquirere.

Ad Languoris itaque nomen quod attinet, *Coberus* quidem nullibi, quod sciam, denominationis suæ rationem diserte exprimit, nisi forte ex eo peteret, quod dicat ipsum languorem esse per se, & non morbum D. s. obf. VI. in scholio, unde etiam ibidem eum definit per dispositionem ad morbum. D. *Vindisch* vero, tametsi contra *Coberum* fateatur affectum hunc esse morbum, nihilominus quod cuncta corporis humani membra vehementem in languorem conjiciendo, in eo præcipuis malitiam suam exserere ipsum scribat, languoris nomen ei competere

petere dicit : verum enim vero priori denominationis rationi obstat , quod utique in hoc affectu variarum partium functiones more solito & statui naturali conformi non exercentur , ex quarum tamen mutato habitu recte ad statum præternaturalem & præsentiam morbi concluditur . Vel si forte eam ob causam dubitasset hunc affectum inter morbos referre , quod quandoque præcedere soleat febrem stricte dictam Hungaricam [quamvis D. *Vindisch* neget ullum morbum eum insequi , cui fundamento innixus , nescio , nam nec suam cum temporis experientiam interponere , nec ad aliorum Hungarorum consensum ante questionem motam provocare potuit] adeoque languor hic dispositionem quandam ad illum involvat , & præcursorem illius agat , eo ipso quidem agnovisset diversum esse hunc affectum , & sæpe tempore priorem illo , perperam tamen conclusisset , ipsum eo ex capite à morborum censu debere excludi , nisi hæmoptisim phytisim nonnunquam pedissequam habentem , & alios consimiles affectus pari ratione à morborum classe arcere velimus . Ad D. *Vindisch* vero rationem [ut malisiam , quam huic tribuit , mittam] sufficere reponere . 1. Non semper languorem huic morbo familiarem molestissimum reliquorum esse symptomata , quod ex nausea , cardialgia & anxietate præcordiorum cum hoc morbo concursante evidens esse potest . Nec 2. à molesto aliquo symptomate justam semper denominationem simplicis ejusdem morbi desumi , cum enim simplex morbus quicumque solennia essentialia quædam juncta habeat symptomata , ex quorum syndrome & nexu de certi alicujus morbi præsentia & nomine informamur , & non nisi in complicatis morbis , ubi pluribus affectibus familiaria phænomena , simul obversantur , ab eo , quod majorem læsionem ostendere videtur , vel magis urget ; denominationem sumamus nescio , cur in tam simplici , & ut mihi videtur , veteribus noto morbo , ad aliud nomen confugere debeamus . Nauseam quod concernit , tametsi facile subscribam D. D. *Köleferi* , eo nomine non semper compelli posse hunc morbum , quod conatus vomendi non semper adsint , reliqua vero symptomata huic morbo propria simplici nausæ minime adscribi queant , confido tamen virum cæteroquin eruditum (prout ex scriptis ejus comparere) id ipsum non indigne laturum , si ratione scorbuti nominis diversum ab eo sentiam , partim quod scorbutus proprie dictus , admodum rarus sit Hungaris morbus , teste *Reygero* seniore in nobis ad *Spindleri* observationes p. m. 160. cujus verba hæc sunt : apud nos scorbutus valdè rarus est , in primis in indigenis & Patriæ filiis , apparent quidem quandoque symptomata scorbutica , ut maculæ in cruribus , gingipedium , sed ab alia causa proveniunt , & aliter curari desiderant , propterea nec antiscorbutica apud nos magnum merentur applausum , aut eam præstant efficaciam , qualem in vero scorbuto inque illis locis , ubi grassatur , præstare solent : cui ratione infrequentię hujus morbi D. D. *Möller* quoque

quoque & D. *Roygerus* junior suffragantur in respons. suis ; partim vero quod complura symptomata scorbutum itipari solita minime deprehendantur in hoc morbo , diversamque scorbutus indolem foveat , exempli loco esto gingivarum laxitas, eruentatio & sensum quasi in tabum resolutio, ulcera livida mali moris , maculae scorbuticae, ossium corruptiones, pruritus in externis partibus, dolores variarum corporis partium, non gravativi solum & tensorii, sed pungitivi, rodentes , ut plurimum vagi, lypothymia, paralyfes, convulsiones, deliria & alia, &c. de quibus *Severin*, *Eugalenus* libr. de scorbuto, & celebr. *Stahlus* in diss. sua de scorbuti & Luis Venerae differentia confetti possunt : scorbutus insuper contagiosus sit, morbus Tsömör minime. Nausea vero, vomitus, languor & tumores tametsi similitudinem quandam ostendere videantur, diversitatem utique non levem involvant; cum nausea, vomitus scorbuticus ex improvise saepe oriantur, nulla praecedente causa simili occasionali ut in morbo Tsömör, nec tamen salutarem effectum post se trahant, comparem illi, qui ab his excretionibus tempestive procedentibus in hoc morbo provenit. Languor vero apud nonnullos scorbuticos tantus est teste *Eugaleno*, ut ad lypothymias proclives sint ægri, si in rectum statum sese erigere velint, cum quo tamen Hungari in hoc morbo non solum citra lypothymiam metum erecto corpore pedibus inaiti, sed & progredi queunt. Tumores denique illorum oculis etiam usurpari possunt, qui in morbo Tsömör non nisi tactu deprehenribiles sunt teste *Geigero*, *Reimanno*.

Si jam quæ mea animi sensa de hoc morbo exponere fas sit, ex historia morbi colligo, morbum Tsemer, modo simplicem esse nauseam, modo febrim stomachicam ephemerae veterum ex cruditate & repletione ortæ analogam, adeoque motus extraordinarios a natura provida (animam intelligo humanam, immaterialem, vitaliter agentem, & pro diversitate necessitatum atque periculorum corpori humano imminuentium diversimode, proportionate tamen ut plurimum organa corporis impellentem,) provocatos ad vitia primæ concoctionis (ex qualitate ciborum prava, vel quantitate laudabilium licet esculentorum nimia & præcipiti deglutione cum insufficiente eorum masticatione oriunda) per copiosorem humorum ad organa chylicationi velificantia affusionem vel corrigenda, vel ad expeditiorem motum facilitando tandem per superiora ex corpore eliminanda, aut si cum ipso jam sanguine mora temporis communicata fuerint, celeriori per porosas peripheriæ corporis portas transpersione attenuanda.

Dico esse interdum simplicem nauseam, videlicet, dum non solum conatus vomendi, actu, languori membrorum & dolori capitis gravativo in hoc affectu iungitur, sed si insuper huic vomitioni vomitus superveniens vel diarrhæa totum malum solvit, ut reliqua hunc morbum comita-

comitari solita phaenomena penitus emanant, adeoque nullius febris complicatae vel nauseam excipientis suspicio relinquatur.

Febris vero nonnunquam concurlum augaror ex circumstantiis communi medicorum ore febris adscriptis v. g. horrore, calore nunc plures horas durantibus, pulsu denique arteriarum febrili, cum reliquis febrilis motus constans. Stomachicam vero appello febrem ex subiecto materiae morbosae primario, imitatus eos, quibus febres infantum ex lacte corrupto, vel vermibus in ventriculo nidulantibus, aut denique cruditate ciborum, occasione adiphagiae, subnota oriundae stomachicarum sub nomine veniunt: Esse autem ventriculum primariam sedem materiae morbosae vel ex eo patere potest, quod exonerata tempestive vomitu sibilurra in ventriculo contenta totum malum paucarum horarum intervallo disparcat, succellive tamen quandoque in massam sangu. quoque derivari labem, inde suspicor, quod ortis tuberculis, & zestu incrementum sumente soli vomitui non amplius cedat morbus hic, sicut nec tali in casu purgans propinatum totum malum tollit teste D. D. *Mollero*. Dixi insuper febrem hanc esse ephemerae veterum ex cruditate oris affinem; ephemeram enim eam esse terminus ejus intra .1. 2. tresve dies evincit, quem si transcendat, vel in continuam febrem, vel intermittentem desinit, an etiam instar aliorum diariorum in hecticam vel lentam febrem nonnunquam mutetur, ex languore equidem diuturno, inappetentia cum alvo adstricta eandem aliquando excipiente suspicor, destitutus tamen plurimum phaenomenorum febris lentae indicia manifestiora exhibentium testimonio confidenter asserere dubito. Affinitatem vero hujus cum veterum ephemera ex cruditate ortum ducente (de qua Galen. 8. Method. Medend. c. 5. Aëris tetrabibl. 2. Sermon. 1. c. 68. *Alexander Trallianus* u. l. 12. c. 1. *Avicenna* Canon. Medic. lib. IV. sect. 1. tr. 1. c. 26. & *Sennert.* de febribus l. 1. c. 6. agunt) innuere videntur tum causarum praegressarum ex ciborum qualitate vitata, vel quantitate nimia conformitas: tum symptomatum v. g. ructus, distensio ventriculi, conatus vomendi, alvus modo soluta, modo adstricta, languor corporis & dolor capitis praeter febrilia phaenomena. Vid. *Sennert.* c. l. pariter, (nili forte tubercula hoc in morbo palpabilia quisquam illi veterum ephemerae minime competere dicat, quae tamen, cum ex mea sententia tendinum initia sint, a veteribus forte neglecti sunt tam studiose annotari, utpote nil vel parum momenti ad morborum accuratorem notitiam praebentia) curandi denique ratio eadem; commendabant enim vel vomitoria, vel alvum subducentia, aut stomachica duntaxat, pro conditione scilicet materiae morbosae; *Avicenna* vero insuper inedia suadet, & dicit huic febre praecipue biliosi corpora esse obnoxia, conformiter morbo *Plomör*, qui etiam cholerici vel cholerico melancholicis familiarior est.

Disput. Medico-Pract. Tom. VII.

N n n n

Dum

Dum vero uterque hic morbus definiendus mihi veniat, nullum aptius genus, utriusque morbi indoli conveniens, deprehendi, quam motus extraordinarius, esse enim in utroque morbo motus, & quidem alios, quam pro ordinario naturæ cursu, neminem credo inficias iturum, qui symptomata eorum perpenderit, quapropter prolixiore etiam probatione hujus supersedeo; id tamen non undique omnibus expeditum videbitur, quod motus hoscæ naturæ, sive animæ immateriali tribuam, cujus tamen probatio cum non uni, sed pluribus momentis innitatur, ad ipsorum symptomatum enodationem, seu opportunior locum, ne crambem recoquere cogar, eandem reservabo, ubi si quantum per breviter fieri licuerit ostendero, a materialibus causis phenomena morbi proficisci non posse, eo ipso documentum erit ab anima seu altera hominis parte eandem peti debere, dum tertia pars hominis, quæ ab aliquibus in subsidium vocari solet, magis luci veritatique fuerit asserta.

Dixi vero vitia concoctionis primæ ex qualitate ciborum prava, vel laudabilium licet esulentorum quantitate nimia & insufficiente eorum masticatione oriunda causam esse, cur natura motus hoscæ extraordinarios suscipiat: Constat enim ex historia morbi morbum hunc nonnisi errores dietæ sectari, & contra tempestive oborto vomitu vel ulvi fluxu præsentem mitescere, evidenti argumento errata dietæ, quatenus digestionem promptam eludunt, constituere debere non solum occasionalem, sed simul continentem causam huius morbi: turbari vero digestionis negotium ab erratis iis in historia morbi allegatis, paucis impræsentiarum probandum erit, 1. itaque qualitatis ratione, suppono seu notum a postetiori, cibos æquali quantitate assumptos, alios facillioris esse digestionis, alios magis refractarios sese gerere, ex horum vero censu pingua quoque esse, quæ sive oleosa sua ramositate, salinas menstrui particulas obtundendo & in motu præpediendo, aquosius vero ab intimiore sui ingressu arcendo, sive denique totum ventriculi aliqua ex parte relaxando agant, frustrari sepe deprehenduntur concoctionem, jam cum caro vervecina & suilla communiter copiosa pinguedine luxuriare soleant, evidens esse arbitror, cum eodem quoque præ aliis cibis difficilius admittant concoctionem, idque tanto magis, quo avidius ingestæ fuerint, uti enim læuocinium gustus vel fames prægressæ hujusmodi aviditatis sepe numero auctores, raro longiorem masticationi concedunt moram, ita non probe præmansas carnes has tanto difficilius etiam in ventriculo resolutionem subire debere ex mox dicendis constabit. Quantitatem vero nimiam 2. ciborum etiam alias facile concoctioni auscultantium, ingens momentum habere ad frustrandam concoctionem, præter veritatem a postetiori, a priori quoque confirmari videtur ex eo, quod in omni resolutione

L111100

mixtorum, certa proportio intercedere debeat, menstruum inter, & corpora resolvenda, non solum ratione qualitatis, sed & quantitatis, unde & in resolutione ciborum, quocunque tandem nomine eandem exprimere placeat, idem obtinere debere, probabile est, tollitur autem proportio hæc quantitatis, menstruum inter ventriculi & cibos resolvendos in ingluvie & adiphagia, quare & digestionem labefactari necesse esse sana docet ratio. Masticatio vero 3. uti rite & sufficienter instituta duriores ciborum partes discerpendo, comminuendo, salivalemque humorem intimius cum aëre iis immiscendo non uno nomine resolutioni ciborum favet, ita insufficientem, brevem, minus preparatos, & magis refractarios concoctioni tradere cibos eodem ex fundamento verosimile est. Monendum hic duo Coberum non solum a cibis, sed & aquis insalubribus D. 1. obs. VII. a vini immoderato usu D. 1. obs. VIII. Ex ira D. 1. obs. IX. Ab aëre Hungarico D. 1. obs. X. & a vigiliis D. 1. obs. XI. languorem suum Hungaricum deducere: Tamen si vero in dubium vocare nolim, causas hæc inducere potuisse languorem, pendeo tamen animo, an non sub languore ejus has causas excipiente febris vulgo dicta hungarica, quam sæpe cum morbo Csomor confundit, vel alia febris ephemeræ species latuerit, cum notum sit languorem tam febrim Hungaricam, quam Ephemeram concitari, & non raro ephemeram ab ira, spirituosius potulentis, fervore aeris nimio, vel transpiratione impedita (quæ si ullibi, sane in Hungaria familiaris, imo quotidiana est, cum æstate fervidissimum licet diei tempus præcesserit, sub noctem tamen frigidior aeris sit constitutio;) vigiliis denique natales suos ducere; aut si utique morbus Csomor fuerit, dubium an non ciborum quoque concursus accesserit, cum in caltris vix non quotidie circa hos delinquatur, quo sensu etiam *Hæferi* in *Herc. med.* & *D. Paterson Hain* in *Misc. N. C.* loc. cit. accipienda esse arbitror verba, dum uterque præter cibos a potu quoque morbum hunc ortum sumere scribit. Cur autem a supra memoratis Coberi causis & potu non proficisci hunc morbum credam, inducor ex eo, quod nec *D. Raygerus*, *Möllerus*, *Genselius*, *Reimannus*, *Bachmeiji* mentionem harum causarum ullam faciant, nec me unquam in Hungaria eas ob causas quenquam morbum hunc incurrisse recorder, nec ab aliis contrerraneis certi quid ea de re explicari potuerim.

Dixi præterea in definitione data, scopos naturæ præfixos esse in motibus hæc extraordinariis adornandis, ut directione sanguinis copiosius versus interiora augeat secretionem humorum chyificationi inservientium, ad vitia illa concoctionis vel corrigenda, vel solum ad expeditiorem motum prædisponenda, quo subsequis tandem motibus excretoriis sive per superiora, sive inferiora tanto promptius obsequantur, & sic feliciter e corpore eliminantur: Esse enim hic peculiarem ta-

Item directionem humorum ab externis ad interna sensus tensivus & gravativus artuum, non minus horror testantur, de quibus inferus: Augeri vero secretionem a copiosiori humorum collectione circa internas partes vel inde elucescere potest, quod copiosiori sanguine distenta magis vasorum, imprimis arteriarum latera, utique patentiores quoque reddant poros & orificia vasorum lateralium in organis secretoriis, per quæ magis hiantia copiosiore quoque fieri debere secretionem, sanæ rationi obvium est. Eo ipso autem dum ob majorem secretionem humorum salivalem, ex ventriculi itidem glandulis & denique pancreate & hepate major sit affusio humorum menstrualium, facile quoque intellectus est, exceptam ante hac digestionem sub hisce circumstantiis absolvi, adeoque vitia concoctionis corrigi debere, aut si cruditates hæc adeo difficiles concoctæ sint, ut non nisi longiore mora demum sapescere & emendari queant, diuturniori vero hujusmodi correctioni natura insudare nolit, palam est, ad minimum abstergendis quasi iis & lubrificandis, vehiculi denique loco commodam, locare operam hanc copiosiorum humorum affusionem. Præter hos vero humorum directiones, alios quoque excretorios nonnunquam cieri motus natura ad vitia primarum viarum sive per superiora, sive inferiora proturbanda & ex corpore proscrubenda, vomitus & diarrhæa testantur, quibus initio rite succedentibus brevi victus dare manus, morbus assolet. In sanguinem autem mora temporis indigestus chylus delatus, ne cum aliis sanguinis moleculis per subtilissimos capillarium vasorum maxillos pressus obstructionibus hinc inde facile ansam præbeat, huic quoque occurrere providam naturam dixi, transgressionem fortiore, celeriori & frequentiori sanguinis per porosas peripheriæ partes, uti enim sub æstu febrili fortius & celerius circulari sanguinem per habitum externum corporis vix quicquam amplius hoc tempore inficias ibit, ita hoc eodem motu fortiori attenuari sanguinem, & cum eo indigestas quoque chyli moleculas discerpi & subtilisari debere, necessarium consequens est.

Hactenus de nomine & definitione, jam ad ipsorum phenomenorum in hoc morbo obvicium enodationem transitum facio. Prægressa itaque ciborum vitia, excipere solet fastidium eorum, quod in plerisque tantum est, ut non solum sine peculiari difficultate & repugnantia eosdem deglutire, sed ut contrarietate quidam suo ipsius exemplo mihi fidem fecit, ne odorem quidem perferre, imo nec oculis sine singulari quadam animi aversione contemplari possint, idque non modo durante morbo, sed morbo etiam jam profligato, imo aliquando per quadrantem anni & amplius post superatum morbum: Fastidium hocce animæ adscribendum esse, uti a plerisque omnibus assensum mihi pollicetur, perpendentibus fastidium & aversionem, involvere voluntatem aliquam quasi negativam, quam corpori tribuere a sana

a sana ratione alienum esset, ita tamen nova moveri posset quaestio, utrum anima hic sese active habeat, vel passive, id est, an non ob ventriculi fibrillas nervicas a materia morbifica sive pondere, sive alia quacunque ratione mechanica irritatas, vellicatas, verbo, certo modo affectas in fastidium trahatur, prout ab objectis externis organa sensoria afficientibus in sensum & perceptionem cietur? Ego priori suffragor, hisce ut alias mittam, inductus rationibus, quod cum fastidio ciborum non semper sensum aliquem gravativum, vel quemcunque alium ventriculi concurrere observent aegri, & quod palmarium, exonerato licet ventriculo a contentis suis, nec vestigiis ulla morbi amplius relictis, tamen in longum tempus protrahatur fastidium, manifeste indicio non a materia morbifica passive in hanc aversionem compelli naturam; sed potius active cibum eos averfari, a quibus novos cibi parari labores metuit, idque tam diu, donec sensum senilique excuso vanido metu eos denuo appetat, eadem sc. ratione, qua complures cerevisiam vel quaecunque alia ventriculi locum cum pugantibus data in longum tempus fastidiunt..

Sensum ventriculi tensivum & gravativum, non a sola copia ingestorum deduco, cum etiam semilaturis, adeoque necdum tanta mole intarctis, quae ventriculi latera & distendat nimium & gravet, obtingat: nec a praecipiti ciborum deglutitione cum evenire suspicor, quod longae etiam a pastu adeoque sensu insolito ab impetu deglutitionis profecto jam pridem cessante tamen observetur, supponunt nempe nonnulli ad intestina propulsione arctari, quod utique ex dissectione cadaverum longe vel brevi post pastum demortuorum, non minus vivisectionibus animalium diverso tempore susceptis, palam est; ex quo inferunt, si in contractum ventriculum cibi solito impetuosius intrudantur, ob insolitam vim, renitentiam majorem ventriculi oriri adversus ingesta, unde tensio & gravitas, hos tamen premit janr allegata ratio, ut aliam mittam, qua sequi deberet ad primi mox boli praecipitem deglutitionem hunc sensum oriri, qui tamen non nisi jam semi futuris evenit: quibus persuadeor, ut potius ob actionem noxiae, vel molestiae materiae praesentaneam concoctionem frustrantis, a natura renitentiam hanc ventriculi cieri credam, a qua demum sensus ille ortumumat.

Ab eadem activa ventriculi renitentia, vel ut magis perspicue exprimam, motu tonico ventriculi a natura aucto dependere dico & anxietatem praecordiorum inquietudine comitatum, & conatus vomendi & ipsum vomitum, sive copia ingestorum & expansiva eorum inflatio simul concurrat, sive minus, & parva ingestorum quantitas praesto

N u m . 2 .

fit.

sit: Natura enim videns sibi obijci novas difficultates circa concoctionem, breviori via, scil. per vomitum sese oneribus hisce expedire mavult, quam longiori mora concoctioni eorum difficili studere, præprimis cum damnum ab ejectione assumptorum metuendum facile reparabile sit per magis conducibilia fercula, hinc in iis subiectis, qui ad vomitum faciles, aucto superiora versus, contrario naturali, motu constrictorio ventriculi, in consensum etiam diaphragmatis motum descendens forium associando, superius vero oriñcium ventriculi relaxando, non solum conatus vomenti, sed si materia mobilis sit, vomitus quoque feliciter ciet: In aliis vero, quorum vel in genere indoles segnior, negligentior, vel solum ad vomitum minus proclivis, aut omnes hujusmodi renitentes motus omittit, solo fastidio & aversatione ciborum, a quibus vitia cumulari nectuit concoctionis, contenta; aut languidos duntaxat motus instituit, sensum gravativum, tensivum exhibentes: Anxietates vero præcordiorum in specie, si ingestorum copia & inflatio concurrat, dico partim a distentis, per contenta, ventriculi fibris, partim harum erga materiam renisu dependere, unde acutus dolor anxios & inquietos reddit ægros; a sola enim distentione ventriculi per materiam in eodem contentam non oriri inæde suspicor, quod sæpe nimium quantum etiam tumefacto stomacho, minus tamen anxios sentiat dolor: Si autem pauca sit materia præfens, & tamen ab his causis eveniat anxietas præcordiorum, fieri id dico a constrictis undiquaque fortius ventriculi lateribus, & materię ventriculo inclisæ (inprimis necdum probe dissolutæ) quali quali renisu, quo mutuo fortiori afflicto auctus dolor, pari ratione molestiam ægro, & hinc inquietudinem infert: Non proficisci vero motus hosce vomibundos & cardialgicos a materia morbifica physico quodam causandi modo, sc. vel copia sua gravando, aut acrimonia rodendo, stimulo ventriculi latera, inde evidens esse puto, quod hæc etiam citra insignem ingestorum copiam eveniant, suspensionem vero stimuli amoveant assumpta sæpe nil minus, quam vel acrimonia prædita, vel ullius alterius efficacię, quæ contractionem ventriculi physica quadam ratione inducere possit: testis est caro vervecina, suilla, placente cum butyro frixæ, panis recens tepidus butyro inunctus, a quo postremo, Conterraneus hujas præsentissime morbum Clamor sese incurrere mihi assueverat, nisi forte rancidam acrimoniam hic quisquam in.usare vellet, cui tamen difficile probatu esset tam brevi temporis mora v. g. butyrum, lardum recens &c. in rancorem abire. Ut adeo sanæ rationi magis consentaneum esse videatur, naturam motus hosce active suscipere, non stimulo aliquo molesto impulsam, sed propter æstimationem materię noxæ vel molestæ concoctioni, a qua proinde motibus hisce sese liberare satagat.

Rufus

E. M. L.

Ructus nil aliud sunt, quam flatuum ex resolutione ciborum in ventriculo insufficiente proguatorum, per constricta ventriculi latera, relaxato crificio ejusdem superiori, expulsio. Pari ratione inflatio abdominis torminosa flatibus originem debet, qui distendendo intestina abdomen in majorem molem elevant, simul vero dum contrahentibus sive constrictis intestinorum fibris ab uno intestini loco in alium propellantur (in primis si a fermentescenti acri quadam materia producti sint) torminosos passionibus vim ferunt.

Cum nunc memoratis symptomatibus primarum viarum, vel etiam sine his & solo cum fastidio ciborum complicatus languor atque lassitudo membrorum, ut impotentiam quandam, sive minores in movendis artibus vires involvit, ita spontaneam hic potius remissionem virium naturæ circa movendos musculos, subesse, quam actuale quandam impotentiam, realem virium defectum supponendam credo, quod videlicet, alit minus tenera animi indole præditi, obfirmato quasi animo motus corporis vehementiores v. g. cursu, laboribus &c. suscipiendo, membrorum hunc languorem eludant, qui si actuali virium defectui ortum deberet, tantum abest, ut motibus his fortioribus superari posset, ut potius magis magisque vires prostreri deberent; remittere vero naturam ab intentione suarum virium circa motus voluntarios eunt ob finem probabile est, ne videlicet vires suas, nunc circa actiones vitales magis necessarias in externis prodigat.

Sensum gravativum artuum & tractorium dorsi, ut & sensum oneris ejusdem delabentis ad extrema manuum, derivo a musculorum in artibus & dorso strictura tonica successive magis aucta, ob quam cum sanguis per arterias advectus tanta copia in porosas musculorum partes non admittitur, a tergo vero pulsu urgente sanguis pro ingressu suo facilitando adversus strictas ita porosas partes nititur, ex hoc sanguinis nisu, & fibrarum muscularium reactione, atque repressione sanguinis, nascitur sensus gravativus, ut & tractorius, qui, si a scapulis & dorso initium fiat stricturæ hujus tonicæ auctioris, & versus extrema manuum successive definit, æmulatur delabentis ejusdem oneris versus extremitatem manuum sensum: Concurrere vero cum sensu gravativo artuum stricturam tonicam auctorem, tum manifestus pallor ita correptorum, secundum Contrerænei confessionem, tum ipse sensus dorsi & scapularum tractorius evincit; quæri tamen merito hic posset, utrum strictura hæc consensualis sit cum stomacho, intermediis nervis, vel citra ullam spasmum ex ventriculo, cum fibris nervis artuum communicationem accidet, & si hoc, an revera materia quædam stimulando, vel quoquomodo afficiendo fibras musculares artuum, causa hujus motus tonici aucti sit, vel citra ullam proportionatæ materiæ suspensionem eveniat? Ex ventriculo sane consensualiter per ner-

vos:

vos stricturam hanc non proficisci, testatur id, quod nullis etiam molestiis circa ventriculum affectis, (nisi quis forte fastidium ciborum eo annumerare vellet, de quo tamen supra) eveniat: materię vero artus stimulantis absentię id arguere mihi videtur, quod materia hæc vel ante commissos dięte errores in sanguine jam præexistente hoc n-cto admittenda sit, vel quod ex ventriculi demum cruditate, & in sanguinem derivatis, cum eo ad mufculos deferatur; prius retellit strictura harum partium, non nisi errores dięte sectans; posterius partim materię ventriculo inclusę conditio sæpe stimulationi inepta, partim stricturę hujus in artubus præsentia, antequam cruditates ventriculi cum sanguine communicatas esse probabile sit, nam primo mox morbi cum ingressu sensus tenforius, tractorius, gravativus sese exerit, quo tempore cruditates ventriculi jam in sanguinem delatas esse, illud dissuadet, credam, quod vomitu initio sponte superveniente vel arte provocato brevi tota symptomatum cohors evanescit, quæ si sanguini illata labe jam fuisset, tam præfenter minime excretionē hic dissipari posset, ut adeo veritati proximius esse videatur, stricturam hanc sponte naturę institui, ut non admittā in ambitu corporis ordinaria quantitate sanguinis, tanto copiosius circa interna viscera cumuletur, pro facilianda secretionē humorum in internis partibus, de qua superius.

Confirmat hanc circa internas partes sanguinis regurgitationem dolor capitis gravativus, cum gravitate aruum concursans, non admisso enim per peripheriam corporis sufficiente sanguine, interne cumulatū distendit solito magis sanguifera vasa, uti alibi, ita etiam in capite, a qua distensione, molesta ponderis quasi cujusdam oritur sensatio, unde & dolorem hunc magis profunde, & interne sentiri conterraneus mihi asseveravit.

Pandiculationes, & oscitationes, voluntarios judico esse motus, susceptos ab ægris, ad declinandum sensum gravativum corporis, a cuius molestia, ut & obtusos reliquos sensus & cogitationes, displicentiam quoque animi derivō.

Torpor sensuum & cogitationum, propensio in somnum sunt me Judice remissiones spontaneę activitatis naturę circa sensum & rationis exercitium, ne videlicet distrahat res suas pluribus objectis & actionibus, nunc præcipue circa concoctionem primam impendendas, velut in sano quoque statu post cibum, inprimis paulo largiorem (nisi contraria consuetudo interceperit) observamus proclivitatem in nobis, majorem motu, inodo minorem, ad somnum capessendum, rationisve & sensuum exercitio tantisper vacandi, quem torporem & in somnum propensionem brevi post pastum nonnulli equidem derivant a chylō sanguini infuso, qui sanguini junctus hujus molem augeat, adeoque vasa corticalia cerebri magis distendendo fibrillas medullares comprimat, ut hinc spiritus animales minus debite

debite influere possint: in eas, premit tamen hanc hypothesim illa difficultas, quod 2. vel 3. horis post pastum, dum copiosiore jam chylo sanguis turget, hæc proclivitas ad somnum minus urgeat, quod tamen ex hac sententia necessario fluere deberet.

Inappetentia, uti pariter voluntatis quendam diffensum circa assumendos cibos indiguit, ita Naturæ eam merito in accepto fero, quæ ultro ob jam præsentia vitia circa digestionem, novorum ciborum appetitum negligit, ne videlicet, horum usû concoctionis negotium tanto magis gravet, & intempestive interrumpat.

Horror motus tonici in peripheria corporis augmentum supponit, vid. Celeb. STAHLII Diss. de motu tonico vitali, quo contractis porosis partibus sanguinis transitus intercluditur, & hinc cum succussatione corporis, frigoris quidam incurstantis sensus inducitur. Calor vero ab eodem motu tonico in peripheria corporis relaxato provenit, ob quem admissus copiosus in porosâ peripheriæ partes sanguis suo transitu caloris sensationem fibrillis nervis inprimit, idque tanto magis, quo aucta simul pulsus energia & celeritate cum frequentia, majori vi per easdem transpimitur, qui tandem venis copiosior exceptus eas magis turgere facit. Hæc nunc dicta febrilia symptomata, videlicet, frigidum horrorem, calorem, pulsuum febrilem, si quis ab indigestis chyli moleculis sanguini infusus accersere velit, quæ in extremis capillaribus arteriis peripheriæ corporis ob crassitiam hærendo, liberum sanguinis transitum in venas impediunt, & ob retardatum sic motum frigoris & horripilationis sensum inferant, iis vero tandem pluribus a tergo prementibus cordis impulsibus resolutis, ob liberiozem in venas transitum & per eas progressum caloris ortui ansum præbeant; per me quidem licebit, ut suo abundet sensu, obstant tamen varia, quo minus huic sententiæ subscribere possim, ut alia mittam, dico solum, ex hac hypothesi concipiendam esse obstructionem, si non omnium, tamen plurimorum capillarum vasorum in extremo habitu (ob frigoris sensationem universalem) qua durante observari necesse esset non solum tubercula plurima in superficie cutis, inflammatoria quasi, sed cum ob obstructas sic extremitates vasorum, in vicinis eorum productionibus sanguis cumulareetur a nova semper expressione sanguinis sub cordis systole, adeoque vasa magis dilatarentur, pulsus etiam ob arterias magis distentas v. g. in carpo manuum, magnus deprehendi deberet, quorum tamen nihil sub frigore observatur, & cum circa extremitates obstructas magisque sanguine repletas sub systole cordis major oriatur particularum sanguinis attritus erga vasa, major quoque ex eadem hypothesi calor illic oriri deberet, non frigus; hac autem de frigore præfiguratione carente, etiam reliqua de calore lubrico innitentur fundamento; Vel si cui ad acrimoniam chyli particularum confugere volupe esset, a qua phaenomena

Disput. Medico-Pract. Tom. VII.

O o o o

hæc

hæc derivanda censeret, is mox inpingeret in materiæ morbificæ conditionem, quæ sæpe ab acrimonia proportionata fovenda aliena est; Ut adeo verosimilius mihi videatur sub horrore, sponte naturæ, sine stimulo aliquo, aut obstructione, motum tonicum in peripheria corporis augeri pro excludendo sic sanguine ab externis partibus, & contra magis cumulando in internis ad augendas secretiones abstergendis vitis primarum viarum inservientes; Sub calore vero remitti eundem tonum, ut chylosæ indigestæ particulae in habitu externo attenuentur, prout supra jam monitum fuit.

Incrementum doloris capitis sub calore, & mutatio gravitativæ in ardentem, pulsatorium, nonnunquam vibrativum, lancinatorium, confectarium est distensionis majoris vasorum sanguiferorum, & porosarum partium in capite, admissio quippe in externas capitis partes copiosiori sanguine propter relaxatum motum tonicum, non solum partes continentes magis distenduntur, sed & aucto cordis motu fortius impulsus sanguis, majorem caloris sensum imprimit, unde dolor ardens, cunisque vasa arteriosa sub hisce conditionibus magis solito distenta singulis momentis pulsus fovum impetum per sanguinem a corde recipiant, nil mirum pulsatorium sentiri dolorem; vibrativum vero & lancinatorium subinde intercurrentem evenire suspicor, si singulares vel panciores tantum fibrillæ huic a sanguine distensionis spastica quasi momentanea tensione reluctantur & remittuntur, ob quarum tensionem, & sanguinis fortorem impulsum hic molestissimus dolor provocatur.

Noctes inquietæ sunt partim ob caloris, maxime tamen doloris capitis molestantiam.

Alvum adstrictam, (quam ex ordine symptomatum in historia morbi recensitorum durante calore evenire suppono, retinui vero ordinem, si invicem excipientium symptomatum D. D. KÖLBERGII, & non nisi hinc inde plura ab aliis communicata vel deprompta suis locis inferui). oriri existimo sponte naturæ, dum enim ob reduantem successive in sanguinis massam indigestum chylum, natura versus peripheriam corporis humores dirigit, ut ibidem transpressione per porositas partes attenuetur, resolvatur, circa interna vero viscera motum tonicum augeat, ut hic exclusi, eo tanto copiosius impellantur, sit, ut in minori copia in intestina admissus sanguis minorem etiam quantitatem mucaginosæ materiæ eo exoneret, ob cuius defectum contenta minus commode per intestinorum canalem provolvuntur & hinc segnius longe ad exitum promoventur; non secus atque in aliis febrilibus morbis, in quibus natura ad peripheriam corporis humores pellit, ut ibidem quidquam heterogenei ex iis vel deponat, vel ex corpore penitus proferbat, non urinæ solum proventum minuit, sed & alvum eadem ratione claudit.

Tuber-

Tuberculorum durorum phaenomenon priusquam enodem, ante omnia de subiecto, quod nodos hosce constituit, disquirendum erit, videlicet an glandulae tumefactae, vel vasa arteriosa, venosa, lymphatica, nervi, aut denique musculorum quaedam partes hos nodos formen? Glandulas esse ea de causa minus verosimile est, quod vel cutaneae esse deberent, vel subcutaneae, illae esse nequeunt, quod non solum non probabile videatur eas in tam magnam molem, spatio aliquot horarum assurgere, simulque indurari posse, sed insuper vilum necessario incurere deberent, cum tamen nodi hi oculos subterfugiant, & non nisi tactu deprehendantur. Hae vero utique de genere conglobatarum esse deberent, quales tamen iis in locis, in quibus nodi comparent, v. g. (ut alias mittam partes) prope carpum in externo latere manus supra radium minime deprehenduntur. Nec arteriis vel venis nodi hi ulla cum veritatis specie tribui possunt, quod praeter complures alias difficultates, tumor horum vasorum non nisi mollis esse possit, velut in aneurismate & varice, nodi autem hi duri sunt. Multo minus pro vasis lymphaticis verosimilis ulla militat ratio, tamen si enim facile forte in tumorem assurgere possent juxta valvulas, tam subito tamen indurari contentam lympham, & vasa ipsa tantum robur adipisci posse, ut fortem Hungarorum frictionem sine disruptione sustinere queant, vix quisquam admiserit. Nervos supponere vellet, esset contra eorum naturam, qui vel compressi aut ligati non intumescunt: proximius itaque ad veritatem me accessurum confido, si subiectum horum nodorum eam cumprimis musculorum extremam constitutam partem, quae initium tendini praebet, id quod suadere mihi videtur tum locus in genere nodorum, deprehenduntur enim in musculo tendinoso partibus nostri corporis, invenientibus hoc D. BACSMEGYI, conterraneis, ex parte GEIGERO, RZIMANNO, tum in specie nodi illi notissimi circa carpos manuum, quos veluti reliquias ab hoc morbo sub nodorum forma, conterranei olim saepius ab eodem vexati, mihi in manu sua ostenderunt; hi enim nihil aliud sunt, quam musculorum pollicis extensorum extrema in tendines jamjam terminatura, quae etiam in sano statu & non solum apud Hungaros, sed omnes peregrinos quoque tactui nodos annulantur, atque quisque in manu sua eosdem, videlicet 1. vel 2. pollices transversos supra carpum in externo latere manus, supra radium (scilicet e regione pollicis) offendere potest, si paulo durius premendo ducat verb. gr. pollicem alterius manus nonnihil a carpo versus flexuram cubiti; id tamen monuerunt conterranei hos nodos sub morbo Clomor majores evadere. Notandum insuper duco, iisdem conterraneis docentibus nodos palpabiles non ubique in eodem subiecto eandem habere magnitudinem, sed alios magis, alios minus protuberare, unde aliqui etiam non nisi hos nodos, circa carpos manuum & spinam dorsi occurrentes, mihi nominare poterant. 2. Quod nodi non mox initio morbi appareant ita increti, sed post complures demum horas, quod

D. D. MOLLER etiam innuere videtur, dum dicit vomitus salutares esse, si ab initio mox morbi contingant, antequam nodi appareant & æstus incrementum sumat, ut adeo non nisi sub æstu eos increscere probabile sit; Quibus præmissis facile conceptum esse arbitror, tubercula hæc ea ratione efformari, quatenus extrema fibrarum muscularium in tendines terminantia sub æstu magis distenduntur, quæ cum alias etiam & majorem duritiem, & pressa majorem dolorem, quam medius musculorum venter exhibeat, nil mirum dura hæc in morbo quoque apparere & fortiter pressa exquisitum dolorem ciere. Non difficilis etiam esse potest ratio, cur pro diversitate subjectorum majora vel minor deprehendantur hæc tubercula? quod videlicet pro ratione ætatis, magnitudinis personarum, & temperamentorum magis vel minus torosæ esse soleant muscularum fibræ. Cur vero in iis majora tubercula deprehendantur, qui sæpius frictione morbum hunc profigunt, in præsens non determinabo, cum nesciam an etiam extra morbum majores nodos exhibeant, in iis enim, qui in manu nodos mihi ostenderunt, modo æquales meis, modo majores erant, differentie ratio tamen illico patebat, quod hi torosiores etiam me fuerint. Nec tubercula circa tempora impræsentiarum explicanda in me suscipiam, cum alii eadem negant, alii qui in nonnullis ea deprehendi audiverunt, locum in specie certo determinare non poterint, an videlicet superius prope bregmatis ossa, vel alibi observentur, qua de causa certi quid elicere mihi non licuit: Ex hac mea tuberculorum explicatione jussa consequentia inferre quis posset, tubercula hæc in aliis quoque morbis & in aliis regionibus deprehendi debere, cui uniique non refragabor: tanto quidem minus, quod D. D. REIMAN scribat D. Matrem suam lumbagine rheumatica detentam cum horrore prægresso & calore insigniori ostendisse in dorso palpatibus similes protuberantias. D. D. GENSEL vero testetur se in Italia quoque aliquoties vidisse hujusmodi nodos, licet in quibus morbis, non commemoret. Quod vero hæcenus non observati sint paulo curiosius, suspicor inde provenisse, quod frictionis usus tantus hodie non amplius vigeat, a veteribus vero frequentius frictionibus utentibus sponte illorum neglecti sint annotari.

Hæcenus paulo prolixius explicationem dedi symptomatum morbum hunc concomitantium, subnectam brevibus reliquorum præcipuorum phenomenorum in historia enarratorum enodationem.

Cur itaque famelici, & post prægressum jejunium, homines frequentius huic morbo obnoxii sunt? evidentem arbitror esse causam, quod hi ipsi tanto procliviores sint ad excedendos temperantie limites, latrans quippe stomachus raro patitur sibi præscribi leges, unde vel præcipiti ingurgitatione, vel mole nimia laudabilium aut difficilium

CLERMONT

etiam concoctum ciborum facile ventriculum onerant, sonitumque huius morbo succedunt.

Quod cholérico & cholérico-melancholico temperamento familiarior sit hic morbus, tribuo indoli animi eorum, hi ipsi enim, uti circa moralia non patiuntur facile impune obijci sibi impedimenta, omnesque nervos ocyus intendunt ad amolenda ea, ita pari quoque ratione sese gerunt circa actiones vitales, eadem enim anima est, quæ rationales & quæ vitales perpetrat actiones, unde hæc ipsa temperamenta quoque in genere febribus magis obnoxia sunt, teste celeb. *Stablio* in diss. sua de febris historia in genere.

Quod peregrini in Hungaria commorantes nunquam vel solum rarissime corticiantur hoc morbo, mirum videbitur iis, qui *Coberi* scripta evolverunt, is enim morbo huic plurimum militum in Hungaria mortem, quam qui hostilibus ceciderunt armis, adscribit, videtur tamen in eo confudisse febrem stricte dictam Hungaricam cum hoc morbo, nam illa utique non solum familiarior est peregrinis quam indigenis, inuventibus id *D. Molero*, *Koyere*, sed deleterior quoque illis præ his, teste *D. Molero*. Non diffiteor interim scipius sane febrem sic dictam Hungaricam morbo huic vestigia legere posse in castris, cum non solum commodissima illi occasio sit suscitando huic morbo (& quidem peregrinis, si non major, cum ipsimet non facile extra castra divagentur pro more Hungarorum, ut magis salubria conquirere possint edulia, tamen æqualis) qui demum neglectus, præcipue aliis causis simul concurrentibus in febrem illam degeneret peregrinis inprimis periculosa; verum ipsomet *D. Kaleseri* id indigitare videatur in præfatione sui tract. de Scorb. Medit. Ut adeo de infrequentia hujus morbi dicta sumenda existimem non nisi de illis peregrinis, qui in civitatibus agunt, hi enim cum forte in cibis majorem temperantiam sectentur, quam Hungari ibidem nati, & hinc minus frequentem formam supponant huic morbo, rarius etiam eidem obnoxii vivunt, aut si æque intemperantes essent, & tamen rarius eodem corripentur, adscriberem id peculiari Hungarorum indoli præ aliis gentibus, quod sicut alias in moralibus facile offendi soleant, ita nec in vitibus facile ferant ullas molestias, qualis animi habitus cum in peregrinis non addit, facilius etiam vitia concoctionis tolerant.

Quæ duo videlicet temperantiæ studium majus & animi mores magis compositi, cum apud Germanicæ & Slavonicæ nationis Hungaros, nisi fallor, deprehendantur, iis etiam ea de causâ rarius evenire morbum hunc auguror, quam stricte dictis Hungaris.

Cur vero in illis, qui sæpius morbum hunc perpeffi vel ob læves diète errores repullulet? cum materiæ minus proportionata hic fubfit conditio, longe verius credo hanc repullulandi proclivitatem naturæ aflimationi adferibi poffe, quam cuicumque tandem materiali vitio, qua cum sæpius circa digellionem primam moleftias paffa fit, eas vero five vomibundis, five alvinis excretionibus, aut denique transpreffione per porofas partes aufpicato fuperavit, non modo cautior inde facta vel a levioribus erroribus diète fibi metuit, fed etiam eandem motuum repetit fecnam, ut in herba adhuc quali fuffocet, & præcaveat ultiora damna: Tela enim prævifa minus nocent.

Cur vero initio neglecto malo, nec adhibita ulla medicatione, fpontaneis etiam excretionibus emanentibus febres intermittentes vel continuæ fuccedant? ratione febrium intermittentium quidem manifeflus intercedit nexus, inter caufam materialem illarum & hujus morbi, cum enim utrique hi morbi circa primas vias collectas cruditates pro caufa primaria habere foleant, facile reliquæ hujus morbi, illas provocare poterunt. In continuas vero & inprimis febrem hungaricam transformationem hujus morbi, non quidem unice ab hac caufa materiali primarum viarum derivandam effe exiftimo, fed concurrere eo tum alias quoque caufas fufpicor, v. g. ex transpiratione five ante morbum, vel fub hujus morbi febrilibus motibus fuppreffa, collectas fubtiles falino fulphureas acres particulas, quæ cum agiliffimi motus & certo refpectu fermentativo putredinofæ efficaciz fint, facile inde continuis aut ipfi febri hungaricæ materialis fomes fuppletari potelt, prout videmus alias ephemerarum fpecies ob fudorem & transpirationem cohibitam in continuas putres degenerare. Vid. FORESTUS l. 1. de febr. ephem. obf. 3. in Scholio. In aliis vero cum laffitudo, inappetentia & alvus adftricta remanere fcribantur, equidem ea moveor fufpitione, quod forte alia fymptomata fimul concurrant, & febricula quædam lenta fubfit, fi tamen non nifi hæc allegata effent, indicium foret naturam tædio quafi captam effe ad vegetiores denuo motus fufcipiendos pro expugnandis vitiis illis circa concoctionem, eo quod prioribus fuis conatibus operæ pretium non fecerit ob refractariam materiæ conditionem, unde jam non nifi fuccellivæ correctioni materiæ ftudent, & ne nova fibi impedimenta objiciantur, fponte averfetur novorum ciborum ingellionem, fimul vero ab activitate circa movendos artus remittat, ut illi fuæ intentioni tanto majori ftudio non diftractis viribus incumbere poffit, unde laffitudo & inappetentia, cumque laffitudine preffi raro motus fufcipere foleant corporis, ex fedentaria vita, & ob motus defectum, neceffario feignities alvi induci debet. Tantum de Phænomenis.

Ordinis

Ordinis ratio exigeret, ut nunc signa diagnostica & prognostica, non minus causas, traderem, sed cum illa in historia morbi exhibeantur, de causis vero jam supra in evolutione definitionis, occasione sic fereute egerim, actum agere mihi viderer, si hic denuo easdem recoquerem. Ad curationem itaque me conféro.

Antequam autem ipsemet curationem subnectam; lubet de populari Hungarorum curatione pauca monere, consistit illa in 4. veluti remedium generibus, frictione sc. abstinencia a cibis, motu corporis vehementiore & spirituosorum assumptione, quæ subinde ita invicem subordinare solent Hungari, ut abtineant a cibis simul vel frictione utantur, vel spirituosâ assumant, vel motus corporis instituunt, vel ab omnibus simul medelam possant.

Ad frictionem vero in specie quod attinet, validam eam instituunt, & cum aceto alliata, piperato, ut plurimum adornari solet, *Coberus Koleseri & Vindisch* rebus hisce, quibus administratur, unice fere curandi partes deferunt, ob earum acredinem atque particulas salino-sulphureas, quarum odore fuligines cerebri dissipari *Coberus, D. Koleseri* vero & *Vindisch* stagnantes in extrema cute humores crassos incidi & resolvi volunt. Dissolvit tamen, quo minus ex ratione frictionem opem ferre credam, frictionis cum pinguedinibus acrimonie sensibilis expertibus instituta par efficacia, qua inducor ut credam ipsi frictionis actui meliori jure primas curandi partes decernendas esse, quam rebus illis, cum quibus ea instituitur, licet & has symbolum quoddam secundario conferre negare nolim; rationem autem, qua frictio subinde profliget morbum, antequam tradam, juvabit præmittere & supponere, i. ex historia morbi, non semper frictionem eum habere usum, ut vel morbum hunc tollat, vel alios subsequuturos averruncet. 2. Frictione cieri affluxum humorum ad peripheriam, quod uti a priori ratio dicitur, quatenus pressione musculorum sanguis ex fibrarum muscularium intersticiis in venas reprimatur, ea vero remittente ex arteriis in evacuatos poros copiosius admittitur, ita a posteriori quoque ex effectu confirmatur, quod videlicet juxta conterraneorum relationem post frictionem magis inclescere observetur corpus; cui scopo etiam faver apud nonnullos Hungaros receptus mos, ut partes frictioni submittendas v. g. dorsum, brachia foco ardenti obvertant, & post frictionem lectum petant pro promovendo hoc affluxu, & si fieri possit proliciendo sudorem: Non minus ipse res, quibus frictio administratur, illud suadent, cum vel emolliendi fibras efficacia vel acredine sua ad affluxum humorum provocandum apta & idonea sint: Quibus præmissis judico frictionem ea ratione abigere hunc morbum, quatenus affluxum humorum versus peripheriam provocant.

vocando (quem natura sibi relicta pro concoctione iuvanda magis versus interiora ciere in animo habet) naturam a proposito suo avertit, eodem sc. modo, quo in aliis morbis v. g. variolis, ubi natura ad habitum corporis materiam morbiticam expellere conatur, dato alvum proritante medicamento, a prioris sua intentione avocatur, atque ad intestina copiosius humores pellit, licet hic ob materiam morbiticam magis activæ & noxiæ efficacia æque impune non ferat hanc sui seductionem, ac in morbo *Csemor*, cum hic longiori mora adhuc sensim sensimque corrigi queant concoctionis vicia, inprimis si abstinencia a cibis & spirituosorum assumptio simul in subsidium vocentur, quibus si non cedant cruditates & refractariæ magis sint, sive ob molem, aut viscidam nimis tenacitatem, aliamve earum qualitatem pravam, nihil utique frictione obtinetur, ut vel morbus hic cesset, vel alii subsequuturi morbi præcaveantur: Et cum alias quoque non raram observatu sit circa actus naturæ, eam a semel cepto proposito non æque facile & uno contrario educto motu sese pari abduci, non difficilis quoque potest esse ratio, cur frictio magis repetita & sæpius in usum vocata sine demum suo potiat. Consimilis fere frictionis efficacia celebratur ad uvulam relaxatam restituendum in Misc. Ac. N. C. G. D. II. An. II. Obs. 58. a D. *Joh. Ludw. HANNEMANNO*, ubi non solum adducit Blancardum in Collectæis suis Physico-Medicis mentionem facientem felicitis hujus modi curationis per frictionem brachiorum uvulæ relaxatæ, sed ipsemet quoque suo & domesticorum suorum exemplo fidem facit, sæpius sibi & suis uvulam prolapsam hac methodo priori loco citra aliud adminiculum restitutam fuisse, admo-nens tempore procidentis uvulæ exiguis nodulos sub cure in brachio 2. digitos supra pollicem deprehendi, quos nodulos uti nil aliud esse existimo, quam initia tendinum pollicis extensorum, quæ etiam alio tempore nodos fingunt, (de quibus superius) ita rationem quoque curandi eandem hic esse, quæ in morbo *Csemor* suspicor, cum enim uvulæ relaxatio congestionem ut plurimum humorum versus fauces pro causa agnoscat, (unde & tumor vicinarum partium eam plerumque stipare solet) frictio vero brachiorum affluxum humorum ad brachia alliciat, natura frictione pellecta priorem intentionem deserit, & ad brachia demum copiosius humores pellit, unde cessante ad fauces majore affluxu, itagantes humores sensim in venas resorbentur, sublata vero sic causa distendente & emolliente fibras, hæc denuo priori tono sese restitunt. Eodem ex capite frictiones alibi quoque a practicis commendari solent, v. g. iis in affectibus ubi affluxus humorum ad certam aliquam partem alliciendus est, uti in ariditibus partium, ad mensum fluxum facilitandum, in pedibus; vel contra ubi affluxus humorum ad aliquam partem vel effluxus arcendus venit v. g. in hæmorrhagiis narium nimis fricando pedes vel brachia; sed de frictione nunc dicta sufficiant.

Transito

Transio ad abſtinentiam a cibis, hanc plurimis ſæpe morbis remediū loco eſſe teſtatur vulgaſſimum illud: Multi magni morbi curantur abſtinentia & quiete: Cur vero in hoc morbo ex uſu eſſe ſoleat? vix quemquam ſubterfugere poteſt ratio, perpendendo, novos non ingeri cibos ſub ea, adeoque vitia vitii non cumulari, ſecretionem vero humorum menſtrualium jugiter peragi, quibus poſitis obviū utique eſt, majore menſtrui copia ſacilius etiam vitia concoctionis ſemitem huic morbo præſentia ſuperari poſſe.

Spirituſa vero aſſumpta uti calorem ventriculi augendo, menſtrum in activitate ſua, & ventriculum in tono ſuo roborando, & denique pro diverſitate eorum, cruditates etiam ex parte reſolvendo non ultimum in morbi hujus radice ſuccidenda merentur laudem; ita motus corporis vehementiores aſſuxum humorum ad peripheriam provocando, & ſi forte indigeſcæ quædam chyli moleculæ ſub hiſce motibus ex ventriculo inæmpeſſe & expulſæ & in ſanguinem delatæ fuerint, eaſdem attenuando, reſolvendo, morbi hujus depulſioni ſervent.

Ad curationem autem medicam, quod attinet, ex ſuperioribus conſtare poteſt, cauſam hujus morbi conſtituere errata diæta, quatenus diſgeſtionem elidunt; dixi inſuper in antecedentibus naturæ intentionem eam eſſe, ut vitia concoctionis in primis viis vel corrigat, vel ad motum prius diſponendo dein e corpore eliminat, aut ſi jam in ſanguinis maſſam redundarint, eorum attenuationi ſtudeat: Hos itaque ſcopos mediis pariter ceu naturæ miniſter ſibi præſtigere debet, ſi naturæ commodas porrigere velit manus; judicio tamen opus eſt, an unice correctioni cruditatum res tota committenda ſit, vel præſtet evacuare eas? & ſi natura ipſa motus excretorios ſuſcipiat, an ubi non rite ſuccedat excretio ſub hiſce motibus, hos augere vel materiam ſolum ad ſaciliorem exitum diſponere conveniat? In genere itaque tenendum, ſi ipſa natura ad vomitum inclinet ſub conatibus vomendi, fruſtra illie propinari emetica, quia naturæ motus vomibundi utique ſufficiunt ad excutiendam ſaburram ventriculo inharrentem, quod vero ſub illis motibus nulla contingat excretio, unice materiæ h. l. ut plurimum viſcidæ & tenaci, quæ a lateribus ventriculi diſſiciliter avelli ſeſe patitur, id in accepto ſerendum eſt; unde majus hic opere pretium impetratur digeſtivis, incidemibus, abſorbentibus & diluentibus, quam novo ſtimulo excretorio non præparata ad exitum materia. 2. Si nullos hujusmodi motus excretorios natura ſuſcipiat, ingeſtorum qualitas & quantitas medici quadrantenus determinare poteſt judicium, an correctioni ſolum materiæ, vel ejusdem evacuationi incumbere debeat, ſi enim laudabilia fuerint eſculenta, & ſolum in inſufficiente maſticatione erratum fuerit, nec in quantitate ingens admodum exceſſus commiſſus, vel ſi cibi laudabiles bene præmanſi, ſola forte quan-

titate nimia molestias concoctioni creent, spes est utique corrigi adesse posse hæc concoctionis vitia, adeoque in moribus prius remediis tentari debere materię morbificę subjugationem. Ubi vero refractaria alias concoctioni assumpta fuerint, & vel quantitas eorum simul concurrat, vel masticationis defectus accesserit, aut, si laudabiles etiam cibi & quantitate & præcipiti infarctu simul occasionem præbeant huic morbo, tunc uti longe minor spes inpetrandę correctionis, ita iustior quoque indicatio, eadem ex corpore proturbandi, ne paulo diutius naturę laborem facessant: non minus vero si alterantibus adhibitis in priori casu spei non respondeat eventus, ad evacuantia confugere licebit. Et cum tam per superiora quam inferiora in hoc morbo utiles deprehendantur evacuationes, observatis iis individualibus circumstantiis ex methodo medendi notis, quę usum vomitorium vel purgantium suadent aut dissuadent, poterunt in genere, si cruditates in veniculi adhuc stabulari indicium sit, commodius per vomitum necnon breviori viam eadem rejici, vel si ad intestina jam detrasas esse suspicio fiat, per alvum subducentia eliminari, aut utręque evacuationes simul in usum vocari, pro abstergendis sic ventriculi æque, ac intestinorum sordibus, subjungendo demum pro rei exigentia & circumstantiarum ratione tonum ventriculi & intestinorum roborantia aromatica, anara &c. semper tamen in evacuationibus suscipiendis, prius materia ad motum prædisponenda remediis mox dicendis.

Prior jam scopus medici nri. materię correctio, impetrari potest partim salinis digestivis, incidentibus, v. g. Tart. vitriolato. Arcano duplici. nitro depurato, antimonjato. Sale digestivo Sylvii, vel salibus alcalicis fixis: Card. Ben. absint. Centau. min. partim absorbentibus, v. g. Chel. ocul. cancr. Testis ovorum calcin. Coral. præp. conchis præp. &c. partim aromaticis: Pipere, Zingibere. Rad. Zedoar. Galangę. Cardamom. Cubebis &c. partim amaris: ex absint. Centau. min. C. B. Rad. gentian. rubrę &c. partim acris: Rad. ari. sem. synapi, erucę &c. partim vino generoso simplici vel aromatizato, & denique ex his nunc enumeratis paratis vel compositis medicamentis v. g. Speciebus, Pulv. Stomachicis, Conditis, Electuariis, Essent. Elixiriis &c. Ex quibus uti facile pro assumptorum qualitate magis idonea seligi, aut alia aliis pro circumstantiarum ratione invicem combinari, ita in varias quoque formulas redigi poterunt, quales hic proluxe adferre supervacaneum duco, inprimis cum hæc ipsę lectori compositionis medicamentorum gnaro magis tædium, quam utilitatem parere soleant.

Secundus scopus, nri. evacuatio materię morbificę, prout monitum, aptitudinem ad excretionem prærequirit, cui fini inserviant pro causarum diversitate tum digestiva, tum absorbentia ex jam dictis repetenda, tum denique diluentia, uti juscula esculenta v. g. cerevisia aut aliud
ju scu-

juscum butyro imprægnatum, decoct. avenaceum tenue, serum lactis &c. quæ sola eo in casu ubi natura motus excretorios ciet, excretionem materiæ promovent; ubi vero illi deficiunt, cum fructu, præmissis sic materiæ præparantibus provocari poterunt, datis (ut alia prolixitatis evitandæ causa mittam) Tart. Emet. gr. j-ij. pro subjectorum & locorum in Hungaria diversitate (vide miscellanea medica in fine annexa) cum sachari, Antim. diaph. vel salis digestivi alicujus v. g. Tartar. Vi-triolati gr. vj - viij. in pulv. Aut cum Extracti alicujus appropriati v. g. Card. Bened. gr. vj - vij. in pill. pro dosi. Vel quibus spuria dicta vomitoria magis arriderent, irritatis penna vel digito faucibus, aut aqua vel lacte diluto tepido copiose ingurgitato eundem effectum experiri poterunt. COBERUS Escentiæ Rud. Afari & Raphani Austriaci aliquot duntaxat guttas sæpius se efficaces deprehendisse in Hungaria testatur. D. 11, Obf. 111. in Schol.

Si per inferiora educere consultius videatur, satisfaciet decoct. ex fol. Sennæ 3ij - vj. (pro subjectorum itidem & locorum diversitate) cum salini alicujus v. gr. Chryst. Tart. & sem. anisi una 3ß - j. aut Rhabarb. ad ʒj - ʒj. cum vel sine stimulo vel incidente aliquo salino. Vel Emulsi quædam ex Ref. Ja'ap. Scammon. gr. vj - xij. Amigdal. dulc. excortic. aut Vitel. ovorum q. f. aquæ denique Ros. Cinam. vel alius appropriatæ q. f. v. gr. ʒiij - ij. parata & edulcorata, ut mercur. dulc. & alia æque commode & tuto intestinorum canalem abstergentia & evacuantia tam simplicia quam composita, variis formulis inservitura taceam.

Evacuata vero sic materia morbifica, si necesse visum fuerit, nec circumstantiæ aliæ diversum suadeant, inprimis post emetica propinata, subjungere mox licebit aromatica, amara stomachalia, vinosa, inprimis vinum ustulatum cum aromatibus v. g. cariophyll. macerc. cardamom. cort. cinamomi &c. quæ tam ventriculum roborando, quam relictas forte adhuc cruditates resolvendo ex usa esse poterunt. Atque sic paucis duplici indicationi prospectum esset.

Restat, ut tertiz quoque paucis satisfiat, si videlicet febrilia emicent symptomata, quæ cum salutares naturæ motus sint, ad attenuandas viscidas chyli particulas in sanguinem delatas suscepti, circa eos quidem vel augendos, vel imminuendos, medico nil temere suscipere fas est, ne demum sero facti poeniteat, magisque continentia tranquilla, cum temperato regimine & sufficienti injuncto potu cerevisiæ tenuis, feri lactis, vel decocti hordei cum Rad. Fœnic. Scorzone pro diluendo sanguine simul proderit, quam varia calida, urinosa, opiata, theriacalia, utpote motibus naturæ recte procedentibus pervertendis magis quam gubernandis accommodata; Est enim febris hæc sibi relicta omni modo benigna; Si ta-

men quædam propinare placeat, conducent salina media supra allegata cum fixis diaphoreticis & pauxillo cinab. v. g. Antim. diaphor. Conchar. præp. arcant. dupl. ana gr. VII. Cinab. nat. gr. iij. in pulvere, vel cum aquis diaphoreticis v. gr. Scord. Card. B. Fl. Sambuc. (aucta nonnihil pulverum Dusi) in Potiunculae formâ, edulcoranda. Aut mixt. simpl. non camph; vel Efflent. Bezoard. Stahlî; aut, si hæc non habeatur, Efflentia ex Rad. Helen. Vncetox. Pimpin. alb. Ab. scord. & aliis lenioribus alexipharmacis, simul rariem materiam viscidam incidentibus, & secretiones per urinam ac diaphoresim promoventibus parata &c. quæ postrema spirituosâ, inprimis tepescente jam æstu majorem spondent efficaciam, si ad gr. XX. XXX. &c. propinentur.

Hinc hætenus dictis præservationis sine ab hoc morbo adhuc breviter superaddi potest, ut sive æstui jam huic morbo, sive minus, temperantia studeant, fercula difficilioris concoctionis, quibus facile offendi sese deprehendunt, quoad fieri possit vitent, & non nisi bene præmansos cibos deglutiant: Aëstui vero leorim meticulosus & scrupulosus nimis cogitationes circa qualem qualem sensum alterationis post assumpta esculenta animo excutiant, & quibuscunque gratis siue colloquiis, siue aliis mentem divertant, ne indulgendo nimis meticulosus ideis tanto promptius morbum hunc incurrant.

Atque sic coronidem impono, Deoque T. O. M. pro clementer concessis ad institutum hocce exsequendum viribus, devota mente persolvero grates. Tu vero Lector Benevole, si quæ errata in nunc dictis animadverteres, ea pro humanitate tua excusabis, & siquidem rectiora noſti, candide monebis, quod non solum non ægre feram, sed obstrictum quoque me tibi ex eo profitebor, probe gnarus, non eam intellectus nostri esse certitudinem, & scientiæ perfectionem, ut nil desiderari queat, quin imo dum mens maxime sub veritatis specie sibi ablanditur & applaudit, sæpe eam falli.

S. D. G.

Sequuntur Miscellanea quedam Medica in Hungaria observata, & ex Responsionibus Celebrerrimorum Hungariæ Practicorum D. D. RAYGERI, MOLLERI, GENSELLI excerpta, curiosi lectoris in gratiam Dissertationi annexa,

- I. Crises in Hungaria vere exquisitæ observantur frequentes in febribus acutis continuis, sed vel sibi relictis, vel non male tractatis, & quidem

quidem pro ratione causarum variae, nempe: vel per diarhæam 4. & 7. die, vel per sudor in 7. & 9^{mo}. In continentibus, imprimis in subjectis junioribus, per hæmorrhagiam narium 4. & 7. die, & inter dum 11. sed non ita commode. In inflammationibus cum febre, non ita exactæ crises observantur, excepta Peripneumonia, in qua sæpius septimo die largo sudore totum malum intra paucas horas solvitur, MOLLE^{RU}S. Rarius fiunt crises per vomitum & urinam, & ut plurimum imperfectæ. Congingunt quandoque salutare crises etiam intercalaribus diebus, octavo tamen & decimo ut plurimum funestæ, in primis nocturnæ. Metastases etiam frequenter observantur. GENSEL. Per sudorem, quæ contingunt, frigidum ut plurimum totius corporis sudorem fiunt. RAYGERUS.

2. Medicamenta in Hungaria magis conferunt temperatiora, mitiora, & diffusæ vires habentia Galenica, quam calidiora, volatilia salina, spirituosæ & alia chimica concentratas vires possidentia, ob clima calidius, & vini generosi, piperatorumque aromatum abusum teste RAYGERO, GENSELIO & MOLLERO.

3. Prout: in febribus quoque acutis positiva sudorifera calidiora iidem improbant, & contra fixiora terrea, nitrosa utilia esse dicunt.

3. Doses alterantium imprimis volatilium & opiatorum minores esse debent in Hungaria quam in Saxonia teste MOLLERO. Secundum GENSELIUM soponium opitu ut plurimum vomitum causant, & salia volatilia non nisi in restructa dosi propinari audent. Opiatorum & salium volatilium usum cautum admodum esse vult Junior RAYGERUS, id quod Senior etiam, dum viveret, RAYGERUS in Scholio suo ad obs. 47 SPINDLERI monuit.

4. Emetica Hungari pro varietate morborum bene ferunt, etiam largiori dosi propinata, exceptis feminis; & purgantia nisi sint vehementiora, nihil operantur secundum GENSELIUM. Secundum MOLLE^{RU}M vero tam Emetica quam purgantia drastica, aut in majori dosi exhibitâ pessimos nervosi generis affectus post se trahunt. RAYGERUS dicit purgantia melius ferre Posonienses, quam Emetica, quæ apud eos in usum non trahuntur, quia natura perferre non possunt, in caltris tamen in febribus intermittentibus æque ac continuis statim ab initio cum fructu propinari. REIMANNUS in sua Epistola, vomitoria mitia & parcissima in dosi, purgantia vero majori in dosi quam lenæ conferre dicit. In infantibus & gravidis vomitoria & purgantia RAYGERUS & GENSELIUS vitanda volunt; MOLLERUS non nisi mitiora, non animonata, mercurial. ea usu esse dicit. Clysterum usum GENSELIUS & RAY-

GERUS frequentem esse dicunt in suis partibus, MOLLERUS autem in suis rarum dicit, ubi tamen adhibentur, op. inue. conducunt, imprimis infantibus & sceminis hysteris.

5. Venæ sectiones nec infantibus, nec senibus in Hungaria admi-
strari solent, teste *Mollero* & *Raygero*; In variolis, exanthematis ante
eruptionem usum quidem habere solent, neutiquam tamen iis jam erum-
pentibus, momente *Genselio*, *Raygero*, *Mollero*, qui postremus in statu
earum spontaneas quoque sanguinis excreciones funestas semper esse dicit,
imo in febribus continuis epidemicis observavit idem omnes, qui quo-
cunque morbi tempore, etiam in statu eximie plethorico constituti V. S.
adhibuere, certissime mortuos esse. Pleuritis vera etiam commodius sine
V. S. curatur, quam illa adhibita, nisi status summe plethoricus urgeat,
quo in casu, non nisi 1. vel 2. die administrata prodest, teste *Mollero*,
Raygero; *Genselius* omnes absque venæ sectione curat, pluresque obser-
vavit cum, quam sine venæ sectione mori.

6. Hirudinum usum rarum in Patria esse, *Raygerus*, *Genselius* &
Mollerus exponunt, nisi quod 2. priores in dolentibus eccis hæmorrhoi-
dibus & cephalalgia atrociore eas applicari testentur: postremus vero effi-
caciæ earum, ubi adhibita fuerint, semper bonam fuisse fateatur.

7. Trepanatio ut & aliæ difficiliore chirurgicæ operationes ob ra-
ros peritos chirurgos, rarius in usum vocantur, imprimis tempore pa-
cis, teste *Raygero*, *Mollero*, *Genselio*, alias feliciter ferunt trepanum se-
cundum *Raygerum*.

8. Phthisis non tam frequens observatur in Hungaria atque Anglia
teste *Raygero*, *Genselio*, imo rarus in Hungaria morbus est secundum
Mollerum. Rachitis secundum *Raygerum* & *Genselium* infrequens morbus
est in Hungaria, *Mollerus* tamen in 2. & 3. annorum infantibus frequen-
ter eam observavit. Febres malignæ sudatoricæ in Anglia frequentes, a
Mollero non sunt observatæ, a *Raygero* raro. Plicam Polonicam in Hun-
garia *Genselius* & *Raygerus* non observavit. *Mollerus* dicit occurrere eam
in Confiniis Poloniæ, licet non tam frequenter ut in Polonia.

9. Febres intermittentes simplices tam quotidianæ, quam tertianæ
& quartanæ frequentes sunt in Hungaria, testante *Genselio*, *Raygero* &
Mollero, licet tertianæ frequentissime secundum hunc: Intermittentes du-
plicatæ rarius a *Genselio* observatæ: Tertianæ duplex a *Raygero* sæpius:
Mollerus vero dicit per 4. annos epidemice grassatas esse intermittentes du-
plicatas, & quidem vere tertianæ duplices, autumno quartanæ duplices.

In intermittentibus calor fere semper frigus excedit teste *Mollero*, *Genesio*, *Raygero*.

10. De morbis epidemicis & eorum curatione, quæ *SYDENHAMIUS* annotavit, imprimis quod diversæ annorum constitutiones, diversas quoque indicationes & remedia exigant, *Mollerus* etiam a 15. annis in Hungaria quoque ita se habere observavit. Epidemicos vero morbos, qui annuatim in Hungaria grassari solent *Genesius* recenset petechias, variolas & morbillos, mense martio & aprili frequentes, diversa ob symptomata pro annorum constitutionibus diversas quoque indicationes & remedia poscentes. *Raygerus* pariter exanthematicos morbos adducit aestiva & vernali tempore grassantes, & per 3. annos cum ingressu veris Pleuripneumonia epidemicam observavit: frequentissimas tamen ex exanthematicis esse petechiales consentiunt *Genesius*, *Raygerus* & *Mollerus*, qui postremus eas dicit post hyemale solstitium atque ante & post æquinoctium vernale epidemicæ grassari, sine discrimine ætatis, frequentius tamen sanguineos & cholericos, rarius melancholicos corripere. Febres catarrhales secundum *Genesium* ut plurimum hyeme epidemicæ grassantur, sub quarum larva petechiales sæpe latent, lethales sæpius, nisi succurratur tempestive. A *Mollero* autem, ab An. 1710. ad 13. catarrhales malignæ petechiis comitatæ epidemicæ fuisse dicuntur, & quidem circa æquinoctium vernale, & solstitium æstivale, usque ad æquinoctium autumnale, quæ nec regimen, nec medicamenta calida ferebant.

11. Dantur & particularia Hungariæ loca, in quibus uni præ alio morbo frequentius obnoxii vivunt Incolæ. Sic non modo popularis rumor in Hungaria fert de Cremnizienfibus, eos frequentibus strumis laborare, sed & *Mollerus* idem confirmat tam de civitate ipsa, quam territorio Cremnizienti, causas rejiciens in aquas subulosas (*kiesichte Wasser*) vocant: ex fodinis metallicis promanantes. Idem de Leucsoviensi urbe *Reinmannus* affirmat (tamen si egomet non recorder me tam frequentes & grandiores strumas illic offendisse ac *Schemuitii* vidi in metalli fossoribus) ipse causam Leucsoviensium strumarum refert in aquas montanas limosas, quales conterraneis quoque inde orinndus mihi testabatur, quod ætherea vasa, in quibus alias aquæ decoqui & pro variis utensilibus ablucendis prompta asservari solet, sensim sensimque calcaria limosa materia incrustentur. Verus quoque est rumor de Cassovia teste *Mollero*, *Raygero*, peregrinus paululum commorantes illic, febribus corripì non solum intermittētib; sed & continuis acutis, a quibus semel vel his liberati dein immunes vivunt, eandem prior aëri jugiter nebulo & crasso ascribit cum crebro usu vinorum generosorum. Idem D. D. *Moller*

Neosolii.

Neofolii quoque per totum annum frequentissimas febres grassari dicit, in cerevisiam crassam, crudam & saturatam, non minus aërem ex fumo carbonum, qui circa civitatem cremantur, & minerarum cupri exhalationibus, quæ illic torrentur & præparantur, infectum, culpam devolvens.

12. Arthritis in superiori Hungaria frequentius vaga infestat, quam fixa, ob vinâ generosiora, minus tartari feracia, quæ nec doliis tartarum affigere solent, teste *Mollero* & *Reimanno*. In inferiori vero Hungaria frequentius fixa observatur quam vaga, iisdem asserentibus, licet *Genselius* utrasque frequentissimas esse dicat, deprehenduntur vero hic vina magis tartarea, monentibus *Mollero*, *Reimanno*, *Genselio*, qui potestemus omnia fere vina ibidem doliis tartarum affigere dicit, inque mensa effusa maculam gypseam & calcariam relinquere; (præter Sixfardiensia & Somlogensia, quamvis nec hæc plane tartari expertia sint.) Idem ipse asserit post paroxysmos ordinatæ topheos illic relinqui. Cæteroquin in genere artritidem tam vagam quam fixam in comparatione causarum pro illis excitandis vulgo suppositiarum satis raros affectus esse dicit in Hungaria *Mollerus*, incessantes subjecta sanguinei & spongiosi corporis habitus, & ut plurimum *Genselio*, *Mollero*, *Raygero* observantibus circa æquinoctia dolorum facies succedentes, licet *Mollerus* etiam tempestatibus humido frigidis, prægresso errore in diætâ, vel animi passionibus, tragœdiam suam ordiri eas deprehenderit. Juniores arthritis vaga, annosiores, nisi hæreditarium sit malum, podagra ut plurimum corripit, teste *Mollero* & ex parte *Raygero*. In paroxysmo Balsamum Carpathicum, *Kranbholz-Oehl* Germanis nuncupatum, absolute noxium observavit *Mollerus*, consentientibus etiam *Genselio* & *Raygero*.

13. Calculus tam renum, quam vesicæ non est adeo frequens in Hungaria, testibus *Mollero*, *Raygero*, quorum primus frequentiores renum esse dicit præ vesicæ calculo, minus tamen familiaris calculus illis est, qui aqua vel cerevisia utuntur, bene vero qui vino meraciori indulgent, observante *Genselio*, *Mollero*; Balsamum Carpathicum interne exasperare magis calculum quam ex usu esse solet, consentientibus *Mollero*, *Genselio*, *Raygero*, *Reimanno*. Cum neæ his mentio facta sit balsami Carpathici, pauca tamen, quod sciam de eo apud aucthores proferunt (præter *Rygerum* enim seniore in scholio ad obs. 58. Spindleri, ubi pauca de eo exponit, & Misc. Acad. N. C. Germ. D. I. Ann. 11. obs. 28. in scholio, ubi nomen fere tantum ejus habetur, nullibi recordor me quidquam de eo offendisse) non ingratum Benev. Lectori futurum spero, si quæ de eo ex patria accepi, communicavero, cum idem non solum per Hungariam magnis encomiis circumferatur, sed Viennam usque D. REIMAN deportari scribit: Primo itaque

que ab amico D. *Georgio BUCHOLTZ*, Rectore Nagy-Palugyensi communicata hæc sunt; (quæ ipsius verba sunt) Balsamum Hungaricum, vel etiam carpaticum dictum, oleum est destillatum ex ligno curvo, Germanis *Krumholz* Schlavis *Kopotreva* dicto, (de quo inferius plura) cujus rami viridiores præprimis in summitate glandulas habentes una cum foliis frustillatim dissecantur, dein vesicæ, sive ollæ destillatoriæ injiciuntur, atque aqua superfusa, oleum modo destillatorio extrahitur, quod aque supernatans ab eadem separatur; aqua vero destillata loco balnei usurpari potest, quod multos homines morbis inveteratis laborantes sanitati pristinae certo restituit. Inventor olei illius erat Med. Doc. *Christianus Augustinus* ab hortis *Ferdinandi III.* Imperatoris Medicus & aulæ familiaris, nec non Regiæ liberæque civit. *Keszmark* Archiater Ordinarius, qui circa annum 1640. Carpatum conscendens, oleum hocce primus ibidem destillavit nemini ante hæc cognitum. Idem dominus inventor domine novercæ mæx parens exstiter, & a sac. Cæsar. Reg. Majestæte libertate nobilitari Hungarica (siquidem *Silefus* Nisâ oriundus erat) gratiose donatus est. Usus internus, si pro dosi una 7. aut 9 plus minus guttulæ sumantur pro ratione videlicet personæ, ejusque naturæ in liquore aliquo convenienti v. g. vino vel spiritu vini, rarius jussulo, mane jejuno stomacho, & vespere 2. ad minimum post cœnam horis, est sequens. 1. Obstructiones hepatis & renum potenter aperit, & hypochondriacum malum arcet. 2. Impuritates sanguinis sine molestia per copiosas urinas & paucos sudores e profundo etiam venenoso genere elicit, alvumque levat. 3. Arenas & renum calculos confringit & pellit. 4. Mênstrua & hæmorrhoides movet. 5. Gonorrhœam & catharros frigidos sistit. 6. Dolores capitis inveteratos discutit. 7. Tussi etiam & inveteratis pectoris morbis, nominatim vero Phrysi & ulceri pulmonum optime medetur. 8. Punctiones laterum internas sedat, si interne 10. guttæ sumantur, externe autem 20. gt. latera dolentia inungantur, calidisque linteamentis tegantur. Externus, 1. omnia vulnera recentia, si non nimis magna sunt aut profunda, in spatio 24. horarum sine ulla supputatione & notabili cicatrice sanat; majora vero vulnera intra triduum aut quadriduum, si solummodo aliquot guttulæ instillantur, debet vero linteum ceratum ad instar emplastri super inponi, quo vulnus operiatur, alias oleum evporat, virtutemque amitteret. 2. Scabiem in facie & capite infantum humidam intra triduum funditus exliccat & tollit nullo relicto vestigio aut cicatrice; item humiditates aliæ ex quibus proveniunt pustulæ, faciei ignis, scabies aliæque ulcera in facie, capite, vel pone aures intra 6. vel 7. dies tolluntur & sanantur, si locus affectus oleo illo leniter tingatur. 3. Ulcera antiqua, serpentia ulterius & excedentia, qualia plerumque sunt in cruribus per spatium

2. septimanarum, si modo illinantur, linteumque ceratum superinponatur ex fundamento sanatur, debent autem inungi loca infecta ter de die, mane videlicet, meridie ac vesperi. 4. Frigidis etiam fluxionibus, sanguinis concreti retentionibus, tumoribusque, ex quibus plerumque paralysis aut contractura nervorum diuturnae oriuntur, ad miraculum tollendis efficax est, quae omnia intra 2. plerumque septimanas restituit. In summa, tam interne, quam externe sine periculo contra multarios morbos tanquam Panacea adhiberi potest: Unde oleum hoc ab Imper. *Ferdinan. III.* qui virtutes ejus medicas, efficaciamque sentiebat, Balsamis Hungaricus non immerito dictum est. Observandum autem, ut oleum illud purum aquiratur, nam communissime adulterari solet per piccam, praesertim a Turocienibus oleorum circumforaneis. Si velimus ne destillat, oleum cito amarescat, sed in suavitate sua recentique sapore & odore diutius conservetur, recondendum est in locis opacis & frigidioribus, sicis tamen & non humidis. Tantum ille. Forte & mihi missum ex patria aestivo tempore in itinere suavitatem suam exiit, & *Rogerus* simile olim degustavit, nam odore & sapore meum (quantum recorder) oleum therebinthinae aemulabatur, pariterque *D. Rogero* simile se praebuit, volatilius tamen nonnihil oleum therebinthinae esse videbatur mihi. Praeter nunc enarratas vires in alio germanico Msc. mihi ab amicis transmissio celebratur ejus virtus etiam interne in ventriculi vitiis & febribus, externe in podagra, paralyticis & spasmodicis affectibus. An vero undique encomiis suis par praeced. interne virtus ejus deprehendatur, vel non nisi sub certis conditionibus laudabilem aliquem usum exhibeat, uti ratione posteriore suspicor, ita ulteriori experientiae commendo. Hoc scio celeb. *D. D. Schlegel.* Prof. Jenensem, Patronum Praeceptorem & Hospitem olim meum debita semper observantia colendum quondam coram me mentionem injectisse, se feliciter olim balsamum hoc in exulceratione vesicae interne foeminae cuidam propinasse. *D. Mollerus* vero testatur externe in contractura, paralyti & nervorum frigidis affectibus laudabilem praestare efficaciam. Arboris jam ipsius, ex cujus summitatibus destillari solet hoc oleum habitus hic est, ex *D. D. Reiman & Bucholtzii* descriptione. Folia habet tenuia, rigida, gemina semper ab una vagina vel theca exeuntia, majora & longiora quam in abiete, incano virore nitentia; conos duriores magnos, sub quorum squamis nuclei bini delitescunt; ramos (qui vel minimum laesi, resinofum quid plorant) prope terram circumcirca emittit aliquot ulnarum spatium protensos, ita invicem contortos & complicatos, ut si accidat equum aut bovem inter eos incidere, non facile inde explicari queant, faciliusve crura frangant: quin & hominem supra eos transeuntem nimis circumspiculum esse oportet ne inter ramos & rupes incidens vel col-

collum luxet, vel pedes frangat, crescit in elevatioribus montium carpatiorum jugis inter rupes & saxa, omni anni tempore virens, ita ut inanimadvertenter deciduis vetustioribus nova protrudantur folia, altitudine ad orgyam, crassitie vero ad sesqui alteram spatamam teres aurgit: Unde quidem facile subscribendum reor D. *Reimano dicenti*, lignum *Krumholz* nihil aliud esse, quam pinum repentem, eam sc. speciem pini, quæ Mathiolo Mugho dicitur, cum is in herbar. suo germanice edito, & a *Joachimo Camerario* Ao. 1586. Francofurti recusio in fol. non minus in commentario in Dioscorid. lib. VI. p. m. 78. huic ramos circumquaque a radice prodeuntes & humi repentes spatio cubitorum 10-15. tribuat (cujus Dodonæus etiam in stirpium Histor. Pemptadis VI. lib. V. cap. XII. meminit) & paulo prolixior hujus descriptio in Flora Norimb. a D. D. *Volckauero* tradita in omnibus suis circumstantiis (si flores excipias, quorum non meminerunt D. *Reimano* & *Buchholz*) cum descriptione ligni *Krumholz* coincidat, virtutes etiam oleo pini in Miscel. Ac. N. C. Ger. D. 11. An. 111 obf. 32. adfertæ hujus balsami viribus respondere videantur. D. *Raygerus* Senior loc. supra cit. arbitratu esse speciem pinastri, quæ a Clusio in historia Stirp. rariorum appellatur pinaster pumilio austriacus, cum autem historia hæc mihi ad manum in præsens non sit, benev. lectorem eo remitto. Datur & aliud oleum in Hungaria destillatum ex alia specie pini, quod *Linbaum-Oehl* vocant, sed cum instituti ratio non ferat de eo hic prolixius differere, impresentiarum tacebo.

14. Hæmorrhoides in Hungaria internæ æque ac externæ, tam fluentes quam cæcæ sæpe observantur, teste *Genselio*, frequentius tamen internæ occurrunt quam externæ secundum *Mollerum*, qui vini generosi & allii abulum sæpe fluxum earum concitare dicit; fluxus earum bene succedentis utilitas & a pluribus morbis vindicatio, non minus suppressarum confectaria, sc. diversorum morborum incrementum vel ortus, eadem ratione sese habent, uti in aliis regionibus teste *Raygero*, *Mollero*, *Genselio*. Notandum hic duco in Ephem. N. C. D. 1: an. II. obf. 28. D. *Job. Paterson Hain*, morbum quandam Hungaris familiarem tribuere, qui strint ab ipsis vocetur, qui locus non mihi solum imposuit, ut inter alias quæstiones etiam de morbo strint responsum exorari a D. D. *Mollero*, *Raygero*, *Genselio*, (neutri tamen horum quidquam sive de nomine, sive historia morbi constabat) sed & viro celeb. D. *Frider. Hoffmanno*, qui in Dec. selectiorum suarum Dissert. Phys. Medic. Diss. III. p. m. 102. Hungaris ex eodem loco uxoribus strint adscribit, post comparatas tamen epimerides incidit in An. III. ejusdem Dec. ubi sub finem annexitur annotatio ad obf. 117. An. II. atque inter alia scribitur, prædictum D. *Hain* animadvertisse in

Q q q q 2

sphul-

sphalmata quædam suis observationibus An. II. Eph. Germ. insertis illapsa, monendo loco *Czemer*, legendum esse *Czemer*, & pro strint legendum *Szül*; verum ne sic quidem ab omni errore Typograph. vindicatæ sunt hæ voces, nam loco *Czemer*, scribendum *Czemer*, de quo dissertatio; loco *Szül* vero, süly: Uti autem *Szül* Hungaris, quantum mihi constat nullum morbum significat, nec in Diction. Hung. D. *Papai* vocem hanc inveni, ita ex adverso per süly frequenter hæmorrhoides indigitant. Sic D. *Papai* in tract. suo medico patria lingua scripto & pax corporis intitulato hæmorrhoides externas vocat Rülio Süly: internas Belfo Süly: cæcas, Dagado Süly: fluentes, Folgo Süly.

Tantum, in præsens.



CCLXII.

MARIANI SEGUER,

SCHEDULA MONITORIA

DE

JUSCULO PULLI LIENTERIÆ SPECIFICO.

Valentia.

§. I.

PULLUM eviscera, ipsique adde rosarum siccarum unciam unam, vel siccarum, & balaustiarum ana unciam semisem, in medio rosarum adde pulveris infra notandi, pro adulto tres dragmas, duas pro puero grandiori, infante, vel minoris ætatis etiam: confuatur sursum, & deorsum pullus, ne inter coquendum, rosæ elabantur, quoque pullum in scutelis duodecim aquæ ad consumptionem duarum, vel in scutelis quindecim ad eandem consumptionem, pro adulto in decem & octo, ad decem & sex scutelas, quæ contineant aquæ uncias decem singulæ: & conserva jusculum calidum, sine ebullitione ulteriori, immitendo ollam in aqua calida igni admota.

§. II.

U S U S.

De hoc jusculo capiat æger scutellam unam quam primum, singulis binis horis repetendam, præmissa inunctione ad os ventriculi cum unguento comitese vel balsamo catholico, aliove roborante, superimposito cataplasmate, ex mica panis facto cum vino, in quo decocta sint absintium, mentha, rosæ siccæ, & balausticæ, eaque repetantur singulis binis horis, & jusculum exhibeatur. Si dormiat patiens a somno excitetur, & jusculum, inunctio, & cataplasma repetantur, idque continuetur donec absumpta sit tota jusculi quantitas, nullo alio interposito jusculo Gallinæ; quod si lientericus debilis admodum sit, prop-

Q 449 3

ter

ter prægressam nimis evacuationem, nihil impedit, ut in cocleari bino hujus jusculi confectionis alchermes completæ, vel incomplete, prout necessitas urgeat, dragma semis propinetur, admotis etiam exterioribus roborantibus naribus, ut in his casibus fieri solet. Quod si, assumpta tota decocti quantitate, henteria persistat, repetatur iterum necessum est, eodem ordine proposito. Nec mirum videatur, quod æger à somno excitetur singulis binis horis, pro decocto capiendo; nam somnus frequentissime decoctum insequens, non à remedio narcotico, & opiato admixto provenit, sed à mirabili, natureque amica jusculi bonitate: unde spes conciliandi iterum somnum, novo jusculo, provocat, & movet, ut æger à somno excitetur novo jusculo conciliaturo. Quamquam fere omnes practici oppositum sentiant, innixi proloquio illo vero: quod somni omnes excretiones moderatur præter sanguinis, & sudoris; tamen hoc comprobante experientia, quæ optima est Magistra, & ubique, quavis humana auctoritate seposita, sequenda.

Hac methodo non tantum fera illa sitis, qua henterici torquentur, sine potus solamine mitigatur, sed subsequenter una, vel altera alvi egestionem, henteria cessat, ægerque frequentissime convalescit. Peracto jusculi usu, semel, aut bis, pro ut opus fuerit, jusculum primum Gallinæ capiat.

§. III.

QUIBUS CONVENIAT.

In diarrhœa cruda, & henteria præcipue, in quibus ventriculi, & intestinorum fibræ crispatae sunt, aut levi inflammatione tenentur à catharro: vide Boerhaave *Praxim Medicam*, part. 3. pag. 350. qui omnium melius de diarrhœa scripsit, divinum fere medicamen existit: item quando ab humoribus acerbis fibrillas stimulantibus ad expulsiorem, quod ex ingenti siti, & aliquali dolore ventriculi cognoscitur, ut optime notat Gallorum Hippocrates Dursctus super Hollerii *Praxim in adnotatione*, pag. 340. editionis in quarto: si autem diarrhœa cruda, & henteria ab humoribus frigidis, solaque intestinorum laxitate, sive ab aphnis ventriculi, & intestinorum, vel hæcica harum partium intemperie proveniat; subsequantur ut febrem hæcicam confirmatam, vel pthysim, aliumve inmedicabilem morbum. his in casibus, poterit jusculum pulli evacuationem aliquatenus minorare, inducias ferre, at curationem conciliare nequit: diarrhœis ferosis, biliosis, quoniam his in casibus acrimonia dominatur, medetur, etiam si febris adsit.

§. IV.

§. IV.

Illud sedulo notandum velim, ne pulli decoctum exhibeatur in dejectionibus liquidis quidem, sed cinericis omnino, & crudo lixivio tam germanas, & similes, quam lac lacti; quas ex observatione Caroli Pisonis notavimus in declinatione febrium intermittentium, & continuatum; quasi hæc dejectiones lientericæ sint, cum salutare, & critica, & minime cohibendæ haberi debeant. Vide laudatum eximium practicum, de *colluvie serosa*, pag. 265. editione Lugduni Batavorum, curante Boerhaave jam denato. Si post secundum, vel tertium jusculum æger dormiat, sitis remittat, etiam si una, vel altera evacuatio subsequatur, continuato jusculi usu, frequentissime convalescit æger, ut pluries vidimus.

§. V.

METHODI PROBATIO.

Cum nihil magis ægrotantes diarrhœa, vel lienteria noceat, quam multis ingurgitari cibis, jusculisque pinguibus, ut solide practici docent insequendo Græcorum dogmata, non timui jusculum pulli ad praxim deducere, & ripulante experientia; deinde quia Sennertus tom. 3. de *Lienteria*, pag. 441. ait: *Cibus sit paucus, & æger inediæ quantum potest ferat.* Paulus Sorbait cap. de *colera*, & *lienteria*, pag. 136. suæ Praxis, secundæ editionis, ait: *Cibus sit paucus, concoctus facilis, grævus, & ostringens, ne materie quantitas gravet, & corrumpatur: hinc etiam ab Avicena omnino prohibetur, & ejus loco rerum fragrantium jucundi odores, recreandis viribus aptissimi, substituantur.* His innixus rationibus: puellum decem mensium febre, & lienteria laborantem, lac sine ulla mutatione tandem per alvum vacuantem, siti maxima, ut vix mater fœmina robusta, beneque cibata lactationi sufficeret, methodo usitata, ex roborantibus, absorbentibus, nirosis, juxta Harris methodum (quæ mihi in morbis puerorum curandis instar omnium est) nihil præstare potui; sed puellum fere funeri destinatum jam, decocto pulli singulis binis horis, laudata methodo, propinato, quamquam lac suggeret, liberavi.

VI.

PULVIS PRO JUSCULO PULLI.

Ad compositionem pulveris quod attinet, vere artificiosam esse, & indicationes quæ, §. III. recensentur adimplere experientia constat, ipsaque

ipsaque manifestabit jusculum pulli, pulvere adjuncto, remedium efficacissimum. Unica est ejus præparatio, quæ feliciter adhibetur, non ab extero homine communicata, sed ex manuscripto codice *Ludovici Colado Medici Valentini anno 1570. celeberrimi desumpta, & nostris temporibus ad praxim tuto deducta* (de cujus erga rempublicam medicam meritis, & practica felicitate vide *Mangetum in Bibl. Ill. Medicorum, tom. 1. part. 2. pag. 100. Rodriguezium in Bibl. Valentina, pag. 297. col. 1. notitias nostras Medicorum Hispan. in supplem. ad Bibl. Manget. edendas*) hæc à nobis aliquatenus aucta juxta *Stahlîi*, praxim decoctum pulli constituit adimplens mentem Hippocratis 6. *Aphor. sent. 1. & lib. 2. Epidem. sect. 2. sent. 22 & Valesij commentatoris sententiæ maximi. Sapienti sat !!*

VII.

Nec mihi grave foret utramque pulveris compositionem manifestare, justis tamen de causis, silentio prætereo, contentus unice jusculi pulli efficaciam à priori demonstrasse. Si autem lector benevolus velit: pulveris, quo ego utor, pro decocto pulli, doses aliquas petat, remittentur enim continuo. *Troch. Ramich.*

VIII.

Quomodo jusculum pulli operetur, sive temperando acres humores, sive roborando solida, fugata crispatura, inductaque blanda laxitate in ventriculo, & intestinis, sive id. eveniat ratione jusculi diluentis, sive ratione pulveris roborantis, & tonum visceribus restituentis, nondum ariolari possum? Denique si in pueris, aliisque abdominis intumescantiam usus jusculi pulli creet, aut urina parce fluat, silente alvo, jusculi beneficio: tunc hæc partes oleo absinthii, & bacarum lauri inungantur, vel oleis scorpionum simplici, violarum, & lumbricorum, sic urina provocabitur, & fugabitur abdominis intumescantia.

EPILOGUS.

Dixi, Schedula hac, quæ alii sanctiori silentii peplo, & in arcanis involvenda senserent, eoque magis, quod hæc talia, non ludendo, sed attenta sagaci, & multiplici observatione didici, practicumque lectione assidua. Ast plus apud nos obtinet Dei Optimi maximi, quam reipiscimus, & devote veneramus gloria, praxinique salus, quam quorundam elumbium numeretum cupiditas, Rogo autem lectorem, ut sequentia serio penset, & valeat.

CCLXII.
MOUNSON SMITH,
DE COLICA

APUD INCOLAS CARIBIENSES ENDEMICIA.

Leid. 1717.

Quotidiana rerum experientia abunde confirmatum est: pro diversa civitatum regionumque positura, pro variorum motu ventorum, aquarum natura, consuetudine, proque multiplice annorum indole, sive propter vapores e terra exhalatos, sive astrorum imperium, sive tandem propter quamcunque aliam causam mortalibus penitus inscrutabilem, inducta; abunde, inquit, confirmatum est, morbos quosdam (juxta divinum senem *τὸς ἰατροπλάτῃς*) exoriri, hanc vel illam regionem vel civitatem occupantes, translatos autem in peregrina loca plerumque, pro more plantarum, minus florescere; vel exolescere omnino.

Nemini non innotescit, Regiones, Bataviam, Cimbricam Chersonesum, Sueciam, Norvegiam scorbuto esse maxime opportunas; Indos lue venerea, Poloniam plica, Britannos rachitide, Americanos inter Caribas permanentes colica familiarissime corripit: de quo morbo dissecratiunculam hanc, quantum in nobis est exaravimus, præ academice auctoritate hujusce, quæ propter situm loci, studiis commodissimum, & indefectus tyronum labores, qui medicinæ disciplinam perinde ex oraculo quasi promulgatam semper audiunt, summo cum fructu & delectamento ad tantæ instar magnitudinis emicuit, ut hodie sit facile princeps omnium; præ auctoritate, inquit, academice hujusce, quæ instituta conferuit, ut, qui augustum Doctoratus honorem ambiturus sit, inaugurale opusculum conscribat, ut literatis liquido pateat, quantum in Re medicinæ publicæ ipse profecerit.

Morborum insilii multifariam periclitantur organa *τὰ ὑπερσπληνικὰ καὶ τὸν σπλῆνα* infervientia, (quæ apud Hippocratem dicuntur *αἱ νόσος αἰ τῶν σπλῆνός* *πρὸς τὸν ἀδελφόν*) scilicet ventriculus & intestinalis fistula: quos morbos frequentia & magnitudine *τῶν συμπτωμάτων* longe exuperat, saltem æquat colica.

Disput. Medico-Pract. Tom. VII.

Rrrr

Morbus

Morbus hic, ut nobis videtur, est singularis humorum immutatio, qui per arterias mefaraicas delati, secretique ex glandulis, postquam eo ferocitatis & pravitatis perventum sit, ut ideo morbi cuiusdam forma propriis symptomatibus insignita induatur, prædicta organa impete aggrediuntur.

Quoad autem inter se discrepant causæ hujusce immutationis humorum, acute vel chronice ingruit colica: primo loco scilicet, ubi peractis summo cum discrimine decursibus sub brevissimum temporis intervallum, mors vel vita adjudicatur; altero autem, ubi causæ peccanti *Milis* multo tardius nec cum eo periculo, vel nunquam perficitur.

Qui de colico morbo, quoad chronico scripsere, eum in plures classes, arthriticam, nephriticam, hystericam, biliosam scilicet &c. discriminavere.

Prætermisiss hisce autem, morbum suprà propositum, qui scilicet in florem juventutis Americanorum in novo orbe inter caribas exoriorum grassatur maxime, solummodo discutimus.

Quapropter *tum evanescens* seriem, medendique rationem proponere stat nobis sententia.

Morbo incipiente jam, tum demum choream ducunt *ta evanescens*. Virtute stomachi percunte, a cibo cujuscunque generis abhorret animus; suppressa alvo per plures dies prægressas, laborat ægrotus; ructibus & plerumque inani d a eructandum conatu, elusa spe, infestatur Si quid excrementorum prodeat, parcum quid est, haud sine lucta ingente, & instar stercoreis ovinis. Umbilicali regioni infixus hæret dolor obtusus, magis pro constantia quam vehementia, id temporis terribilis. Hinc æger, quo melius inquietudinem consopiat, Compotorum frequentiam anxie confectatur, verum tamen inter eos, mæstum, melancholicum, cogitabundumque vultum præ se fert, hilaritatem aliquando simulat, invita tamen minerva. Domi suæ semper studet inebriationi, ineffrenata cupiditate præcipitatus; posthabitis amicorum consiliis, & sua ipsius ratione. Et etiam sæminæ (qualis qualis causa sit, ut hunc in morbum incidant) in eodem versantur errore; quibus usu poculorum inebriantium interdiciunt qua modestia, qua calida cœlorum inclementia. Res ita quum sint, astanti medico integrum erit, foedam malorum tempestatem audacter prædicere.

Dum morbus niagis magisque gliscit, mirum in modum torquetur æger, inter respirandum summo laborans opere, erecto corpore incedere impotens; intumescit abdomen, maxime tum, cum vesperscit. Nunc obtusus ille dolor umbilicalem regionem vehementer perterrebat. Quicquid in ventriculum ingeritur cibi, potusve (nisi spiritus fertis sit) extemplo vomitione (quæ alias etiam spontanea est, nunc piculiosa, nunc biliosa, pro peccantis materiei indole) expellitur.

Plerumq

Plerumque Medico sciscitanti constitetur æger, sentire se frigus circa superius ventriculi orificium, inter vomendum. Si morbus ab ægro sæpius toleratus fuerit, & cum eo consuetudinem quasi familiarissime habuerit, tum alvo laxata, viridifcentes feces frequenter effluunt, nec profunt.

Obiter tamen notandum est, quosdam, qui ab hoc malo olim convalescerant, licet prædicta symptomata usitatus tumultuari occupent, ut supra dictum est, nec opinato opprimi, dum inter socios sub dio pergræcantur, torminibus abdominis subito ingruentibus; verisimiliter hac ratione; quoniam scilicet morbificus fomes, in sanguinis gremio delitescens, haud satis adhuc copiosus, at tandem ob calidos succos in sanguinem transmissos excitatus, accensis quasi flammis, sine mora ad organa τῆς ἐντερικῆς τῆς τροφῆς destinata determinatur, & imprimis in eam intestinalis fistulæ portiunculam (cui ab anatomicis nomen Κῶλον inditum fuit) quippe quæ ex textura & officii magis sit huic malo opportuna ubi dolor intenditur. Quandoquidem à natura ita comparatum est, ut intestina necessariis chyli ex ventriculo delapsi, non satis adhuc comminuti, ulterius comminuendi propellunturque per chyliiferorum officia vasorum, fungantur officiiis, & deinde sæces, subtilioribus intra lactea vasa, & lymphatica absorptis particulis, in crassiora intestini transmittantur, contingit, ut Κῶλον acceptas partes spissiores, ob curvatam suam longitudinem, diu morerur, hinc Κῶλον glandulis quaquaverum dispersis donatur, quæ humorem secernant, ad vias humectatas lubricasque reddendas, quo facilius feces ob molem accumulati molestæ jam, e corpore prorrudantur: quod si, deficiente hacce humectatione, ob calorem insitum indurescant feces, adeoque ad motum minus aptæ reddantur, ob novum materiei sæculentæ à tergo subsequenter appulsus, sensiles, vehementer distensæ lancinantur divellunturque membranæ. Quin etiam fluxus elasticus, qui tunc temporis maxime παραδύνα, ob denegatum exitum, malum adauget.

Sed ut ad rem redeamus. Febri aliquoties laborat æger. Pulsus est velox & plenus (pro sanguinis & virium copia) præ summo dolore incitatus. Urina est ruberrima, ad nigrum usque colorem fere vergens, latericio sedimento in vasis fundo stipata.

Mehercule animadversio postremo hocce signo, non modo morbus ἐσχατὸς esse dignoscitur, sed diuturnitas etiam τῶν συμπτωμάτων præmonstratur.

Linguae crusta obducit squalosa, spissa & subflava, aliquando albida.

Ægrotantis unum vel utrumque testiculum dolor semper adoritur acutissimus, contrahiturque; id quod divinus senex, in libro suo de internis affectionibus, ubi symptomata crassus morbis, ita dictis, incidentia eleganter depingit, jam pridem notaverat hisce verbis, ὅτι ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἐκ τῆς ἀσθενείας, καὶ ἐν τῇ ἐσχάτῃ τῆς ἀσθενείας

R r r 2

Quam

Quamquam, inter atrocissimos hujusce morbi *παρόντων* dolor, qui fortissimos stoicorum animos facillime conficeret, adeo sevie; ut ægrotus per plures dies noctesque incredibiliter invigilarit, intacta tamen vita vires & musculosas corporis partes summummodo exhaurit.

Hinc licet inter morbum hunc, & biliosam, hystericamque colicam à nunquam satis laudando Viro *Sydenhamio* descriptam, aliqua intercedat similitudo, hac autem in re discrepant potissimum, quod colica à nobis depicta *τῆς μεταστάσεως τῶν παροξυσμῶν* facillime patitur, vel ex symptomatum indole, sponie exacerbescientium, vel ex enormi medici opera, vel ex ægrotantis impotentia. Hisce modis aliæ colicarum species, quæ in cæteras regiones indiscriminatim, sub autumnum, pervagantur, hujusce naturam & indolem induunt.

Diuturnam colicam excipit subflavus cutis color, nec raro podagra optabilior.

Ex quo tempore *παρόντων* imminet, brachia, femora & crura ad motum inhabilia sunt, torpore obfessa supervenit *Ραυξοδο*.

Hæc symptomata quum indies præ doloris vehementia & virium jactura petulum eant, tum laxa musculorum, membris inservientium, immobilitas derepente obrepit, & si malum dudum invaluerit, æger *ἀπὸ τῆς ἀσθενείας* tabescit; cui demum perit vox. Sic demum truncus corporis in lecto supinus procumbit, ad lutæ instar massæ, in humanam icæneulam subactæ, cui vitam inesse, tantummodo indicant motus thoracis, jactatio oculorum, pulsusque debilissimus.

Forte fortuna contigit, id quod nostræ observationi occurrit, ut, qui motum membrorum, ob damnosam medici operam olim deperditum recuperaverat, licet præcedente nocte lectum petiisset, præterquam quod dolerent testiculi, cætera sanus, mane expergefactus in paralyfin nullo modo expugnabilem incidere.

Si musculus, qui volam constituit, gracilis interea maneat, dum cæteræ partes trunci nutriuntur musculosæ, de membrorum sanitate conclamatum est.

Opifices, qui argentum vivum, æs, plumbum, tractant; quique sunt coctiliarii, prius de alvi duritie per plures dies prægressi, de nausea, de intestinorum torminibus, conqueruntur, vomitionibus laborant; & tum demum paralyfi obruuntur membra; hæc ex ipsis operariis, in celeberrimo sancti *Thomæ Nosocomio* Londinensi Valetudinariis, non ita pridem nosmet audieramus.

Postquam colicæ obsidione liberatus fuisset æger, obtusa tamen gravitas lumbos ventremque occupat, juxta ac si fultus fuisset dolatus, sensu exoriationis circa cardiacam perstringitur, ut ne sorbitiones quidem sine anxietate quâdam deglutire possit; paucis autem diebus intervenientibus, pro recuperate sanitatis ratione, labores hi evanescent.

Si

Si quis farcinato corpore vel sanguineo colore, temulentia humores suos nimis calefecit, & ideo colica correptus, naturæ debitum de repente reddidit; dissecto cadavere; inflammationis speciem exhibent intestina; huiusce rei conscius Medicus, si dolore colicæ pessundato, eo quod pharmaca pertinacissime obtulisset, ægotanti mortem inulcerit, intrepide in astantium conspectu, quo melius existimationi suæ caveatur, pronunciat inflammatis visceribus perniciem acceptam referendam esse. Sic salva res est.

Qui rem autem animo accurate contempletur, idem capillo nigriore medicum certe signaturus. Quippe sanguineorum vasorum diametri tunc temporis vehementer, ob summum illum dolorem, contrahuntur, & materies elastica in motum excitata ob calorem & denegatum exitum, horum vasorum latera arctissime premit, ideoque cursu sanguinis clauso & impedito, viscera inflammantur. Hinc propter dolorem, minime quidem ob jactatam, nescio quam, malignitatem inflammationis, quæ anxietatem præeuntem revera consequitur, enecari videntur ægri.

Quoties hoc modo confecti homines oculis nostris occurrerunt? Quoties præ hisce fabulis, medicos impuie evasisse cognovimus?

Abdomen, imo perscpe universum corpus eorum, qui ita commoriuntur, incredibiliter intumescit, contracta nigredine, nec sine fœtore.

Affectionibus colicæ accurate perpenſis, nobis viderur assignanda *ætiologia* culpa. Hinc exoritur chyli ineptitudo in naturalem sanguinis indolem transeundi. Hinc quicquid ex glandulis secernitur, depravatur. *Tæ ætiologia* ansam præbet nimia ciborum æri materię abundantium ingurgitatio, quæ materies virtute ventriculi non debite subacta, sanguini communicata & per arterias meseraicas in rigosas intestinorum plicas delata, membranam nervosam lacinat.

Secundo nimium temulentie & pergræcationis usus. Tertio, subita calefacti corporis in frigido aere expositio, unde, quæ per cutaneas glandulas transpirare debuerant, intra corpus præclusa, in vasa lymphatica resorpta, in massa sanguinea tumultuantur.

Quarto venerei concubitus *ætiologia* frequentia.

Quinto continua vel intermittens febris prægressa & male tractata.

Omnia hæc, vel quædam conjuncta, in unam eandemque rem conspirant; unde factum est, ut ventriculi virtus debilitetur. Inde pro sanguinis vicio & proclivitate regionis (quæ est calorum inclementia) ad procreandum hunc morbum singulari, ad organa *ætiologia* inservientia cum propriis symptomatibus determinatur peccans materies.

Medicus - fidius à veritate haud quaquam abhorret hæc sententia,

R r r 3

nimirum

nimirum pergruacari & ultra modum scortari, hujusce morbi causas esse longe omnium usitiores, potentioresque.

Inebriatio enim, aquosioribus sanguinis particulis dissipatis, lentum, viscidum pitnosumque quid, tunicis ventriculi & intestinorum impactum, ad vim inferendam paratum. causa emergente, generat.

Sic amplissimus Vir SYDENHAMIVS, dum de Podagræ ortu, & multorum aliorum, qui chronice ingruunt, morborum origine eleganter disputat, *τὴ ἀναιμία* acriter inculcat, edisseritque, quibus modis depravata hæce coctio in homines obrepit, ipsissimis verbis: „neque tamen dicta voracitas & liberalior ciborum ingestio ita fecit, quenter (licet id haud raro contigerit) podagræ via stravit, ac vesana & immoderatio vini compotatio; unde fermenta, coctionibus variis dicata penitus prosteruntur, præcipitantur ipsæ coctiones. Pergit idem, quamvis enim calorem aliqualem in transitu impertiat, certissimum est tamen, fermenta corporis ab eo subjugari, & avocari spiritus naturales atque fugari: unde est, si bene conjicio, quod bibaces atque nepotes isti male feriati, podagra, paralyti, hydrope, aliisque morbis frigidis sere perimuntur, adde quod jugis & immodica vini ingurgitatio corporis ad instar corporum scemarum minarum emollit laxatque; perstat idem adhuc nimium veneris usus, sum redargere: in istis enim, qui huic morbo sunt obnoxii, cum jam vel ætate fuerint confecti, vel in effrænata morum licentia senectutem accesserint, spiritus animales per totum corpus deficiunt, immodico functionum in juventutis calore vegetissimarum exercitio consumpti, verbi gratia, præpropere nimioque veneris usu”. Hæc ille.

Enimvero ex nimia veneris frequentia coctionem læsam esse innuit Hippocrates, hisce Aphorismis. *Παῖς ἐν ποδάγρῃσιν πρὶ τῷ ἀφροδισμῷ.* *Ἐν αὐτῇ δὲ ποδάγρῃσιν.* Hoc est, podagra species morborum chronicorum cum sit, quia *ἀπὸ τῆς ἀναιμίας* dependet, qui venere nisi non sint, iisdem nihil est ab hoc malo periculi. In usu veneris, proculdubio & a tederis annis, fit totius naturæ commotio, ut vires tum enerventur potissimum, & partes sanguinis subtilissimæ & maxime oleosæ exauriantur.

Unde morbus hicce, de quo exortiamur, juvenes a vigesimo primo ad trigessimum annum natos frequenter opprimit, utpote qui sanguine vegetissimo incalescentes, impotentes tamen ferocem animi libidinem cohibere, se ipsi penitus dederint coitioni, & præsertim cum sæminis africanis: nec tamen hoc nobis assumentibus hujusce affectionis causam effluviis relegare, quæ ex earum corporibus exhalata inter coeundum, intra resorbentes maris venulas excepta, sanguini Europæorum sint adeo inimica: de hac re disputent homines cordati: pro certo autem habendum est, juvenes istos, qui cum iis sæminis rem habeant, in morbum hunc frequentius incidere.

Quasi

Quasi vero lineas curationi præducamus; hæc tria sub considerationem venire debent.

Imprimis dolor impræsentiarum conspiciendus est.

Iterum feces sunt amolientæ, glutinosa materietunicis ventriculi & intestinorum adhærente, hospitio tanquam ejecta.

Tertio æque adjuvanda, & sanguis corroborandus est, quo melius transmissum chylum in naturam suam subigat.

Jam autem, ut primo satisfaciamus scopo, medicamenta, quæ torporem inducunt, et inopiam dicta, & quæ acrimoniam incarcerationis, propinamus.

Meheicule, quemodum incredibile detrimentum cepisset res medicinæ publica, Meconio utendi facultas si fuisset nulla; quippe quod periculossima symptomata à dolore provenientia adeo efficaciter averruncet, quæ aliter cæteris pharmacis, hodie cognitis, minime cessissent, ita vis Meconii inconsulto administrati longe omnium terrima; adeoque æque hoc in morbo, ac in cæteris, occasiones meconii propinandi sunt apprimè perpendendæ; quippe non raro contingit, ut ex una parte vehementis doloris tortura, quæ omnem animi constantiam fecus superaret, Meconii exhibitionem enixe efflagitet, ex altera autem parte dissuadeant & laxatio fibrarum musculosarum, imprimis artuum, & facilis successus; adeo ut timiditate fluctuans dosim propinet minorem, quam dolori subjugando par sit; æquo autem largiorem alter medicus, temeritate adactus: unde opera sua in præjudicium accersit, viam adversæ sternit valetudini, hujusce morbi periculo in futurum peropportuna. In scopulum hunc sanatio fere impingitur. Adeo concinne dixit Poeta:

Incidit in syllam, qui vult vitare Charibðm.

Nec censorium eorum, qui ægro interfunt, supercilium ita facile secus evitarent Enpirici isti (qui, dignissimo medicorum nomine sibi ipsis vindicato, medicinam quo jure, quave injuria faciant) nisi quod vulgus existimet, omnia mala accepta naturæ morbi esse referenda.

Vult populus decipi, decipiatur.

Hi, revera homicidæ, obstreperunt, qui secus sine Meconio mortalibus divinitus concessio, larga dosi repetitaque exhibito, huic morbo obstitueret? Quis ægotantis quærelas suserret miserrimas? Nonne nobis arridet maxime Clarissimus Sydenhamius? "Nec unquam, inquit, mihi contigit, dolores vehementiores sedare posse, nisi dosi narcotico-rum largiori & reiterata; quæ enim alteri malo par esset debellando,

„ ab hoc vincitur, violentia doloris remedii vires frangente : Tutissime
 „ autem repetuntur narcotica , urgente hujusmodi dolore. Hæc ille.

Nobis autem affulgeret spes, fore, ut horum inscitia audaciaque
 refutentur, nisi quod, juxta Poëtam,

• • • Hos

Defendant numeri, junctaque turbone Phalanges.

Operæ quidem pretium est, paulisper animadvertere, prudentem illum
 virum, aëre Anglicano, de colica biliosa scripsisse; ubi id periculi non
 est à Paralyti, cui ut obviam eat in colica nostra, enixe laborare de-
 bebūt medicus ingenio virtuteque pollens. Ea de causa ne, qui hunc
 morbum aggreditur, duplici incommodo opprimatur, ne scilicet, mi-
 nore dosi τὸν νοσητικὸν exhibita, quies desiderata minime concilietur;
 vel auctiore dosi, ægrotus in τῆς παρηγορίας discrimen abducatur, nol-
 met quidem arbitramur præstare; dosim uno tempore suppeditare eam,
 cujus vires statim dolori compescendo sint omnino pares, & dosim
 dimidiatam reiterare eandem, ea intercapedine interjecta; ut alteri jam-
 jam peritura succurrat: quo facto res pro votis melius succedet, præ-
 cipue si medicamenta, absorbentia dicta, quæ, sparsis darorum nar-
 coticum interpositis, oportet administrantur, acrimoniam humorum
 in primis viis grassantium interim infringant: & hoc est alterum illud
 remedium, quod ad primum scopum attingendum satis duximus.

Sed ut, Caudide Lector, rem penitus percipias, exemplum in me-
 dium proferamus. Si sub primum introitum videas, ægotantis vires
 spontanearum vomitionum & doloris paroxysmo exhaustas debellatasque
 esse, & omnia tumultuari, æquum est, ut æger, interposita mora nul-
 la, refocilletur cardiaco, quod explent viginti guttæ alicujus narco-
 tici liquidi, exempli gratia, laudani Sydenhamii, & uncia una & se-
 mis aquæ cinnamomi fortis cum duabus aut tribus uncis aquæ lactis
 alexiterii, cum uncia una syrupi caryophyllorum simul commixtis; re-
 petatur dimidiata hæc dos alternis horis, vel citius pro re nata; in-
 terim tertia quaque hora interjecta, capiat pulveris sequentis scrupu-
 los duos, usque dum dolores certissima comminuantur, id quod plerum-
 que fit cis viginti horas.

R. Sal. absyn. sperm. ceti ana gr. X.

Pulv. e chel. cancr. ʒj, misceatur.

Pulvis, ex paucis coel. jusculi calidi sumendus.

Quod si sit, cur assumpti pulveris expulsionem metuas, ob continuam
 ad evomendum proclivitatem satius ducimus, pulverem eundem cum
 cardiaco

cardiaco commixtum exhibere. Jam autem ex variis opii præparandi modis, nobis cordi est Jonesii Panacea, quæ hunc in modum paratur. Digeratur upa opii purissimi portiuncula in triplicata aquæ pluvialis distillate parte per triduum: tum trajiciatur digestum per filtrum: quo facto, ab omni vitio efficacissimæ virtutes hujusce remedii defenduntur, cujus maximam dosin nescis est quadraginta guttas semel datas exuperare: quin etiam, liquida præparatio hæc cum sit, cum qualibet compositionis formula; cum haustu, vel bolo scilicet, commisceatur facilius. Sed ut eo, unde digressi sumus revertamur.

Ni curationem ita moliamur, fieri haud potest, quin in malum ante dictum nosmet ipsi impingamur; quippe atrocitas dolorum (ad lacerationis instar caninæ) copiam narcoticorum auctiorem, reiteratamque impensæ efflagitat, unde propediem ingens fibrarum laxitas indubitanter subsequetur, cum multo sudore, à quo ut caveatur, præclarius ille *Baglivius*, hisce verbis utitur; "In colica, inquit, peritineæ si sudor copiosus & universalis superveniat labefactis & resolutis viribus, brevi paralylin expectato; cave igitur ne opiata compositius in ea exhibeas.

Hanc mœdendi rationem clare percipiet, qui τῶν ὀπισθενίων vestibulum transiturus est, longe aliis antecellere: nimirum terminum & vomitionum τῶν ἀπορροήων præsens in tempus coercere virtute τῆς ἀπορροήων interea exhibitorum, dum peccantes humores, qui nervosâ ventriculi intestinorumque membranas obsidione cinxerat, absorbentibus remediis subjugantur. Quo fit ut organa τῆς ἀπορροῆς τῶν τροφῶν destinata, naturalem suam vim, calidumque insitum quadantenus recuperent, hostemque efficacius pellere possint tum, cum subsidio veniunt cathartica, quæ sub hoc tempus sunt apprimere necessaria, nec maturius.

Nunc videamus, quid faciendum sit, ut alterum expleamus propositum, vitiis humorum primis viis adhærescentium, & stercoreum amotionem scilicet, quam effectam reddimus, si administrentur pharmaca, quæ ad fæces submovendas mediocriter fortia sunt, vel quæ leniter stercorea subducunt, τῶν ἀπορροήων dicta, vi peristaltico intestinorum motui haudquaquam inimica. Est autem cavendum, ut eo temporis intervallo propinentur, quo stupor intestinorum inducitur ob vim Narcotici novissime dati propemodum perit: id quod intra octo vel decem horarum spatium fere contingit. Præterea etiam formula ea esse debet, quæ, præ mole, nauseam quam minime moveat, ne inverso ventriculi motu omnia sursum expellantur, & de novo fremant symptomata, prius sopita. Si hæc incommoda subsequantur, quæ interdum, præter voluntatem & operam omnem, obtinent, opus intestinorum expurgandorum interim procrastinandum est, dum tumultus in ordinem vi narcoticorum iterum redacti sunt, & spatium temporis antedictum viam scopo attingendo præstruxit.

Disput. Medico-Pract. Tom. VII.

§ § §

Nobis

Nobis affolet, dolore temperato pro norma, de qua jam nunc supra meminimus, catharsin instituere hunc in modum. Verbi gratia, si, octava noctis hora, largam narcotici dosin propinassemus, interposito decem horarum spatio, catharticum imperamus sequens.

R. Rad. Jalap. subtilis. pulv. ʒ. β. merc. d. gr. x. Syr. e spina Cere. q. s. fiat Bol. quem capiat æger, hora præstituta.

Sin hoc modo alvus minus commoveatur, in subsidii sint dux vel tres uncie mannæ purissimæ, cum drachmis tribus cremoris tartari, & sæpius bibat æger jusculum multo sale aspersum; re huc usque peracta, nihil est dubitationis, quin opera posita sit ex sententia successura.

Nosmet quidem satagimus potius de imperandis pharmacis, quæ τὰ ἐκκαθαρτικά dicuntur, ob molem fastidiosius licet, quam de iis exhibendis, quæ ventrem fortiter purgant, ob formulam compositionis concinnioribus, revera tamen longe periculosisioribus, ob rationes tantum non statim proferendas.

Dum munere rite suo perfungitur catharticum, pace fruitur ægrotus, saltem dolores admodum mitigantur. Mehercule non semel nobis observatum fuit, assumpto cathartico, non ita multo post in fugam dolores perinde verti omnes, ac si auctior cardiaci dosis fuisset exhibita; quo signo emergente, licuit nobis certius prævidere, fæces cathartico feliciter cessuras esse.

Atqui symptomata colicæ juxta ac in cæteris chronicis morbis, præsertim exacerbescunt, ubi primum nox appetit. Hinc periculum est a resuscitatis tumultibus, adeo ut præ maxima τῶν ἐνπνευστικῶν inflatione, parum abiit, quin æger summa respirandi difficultate penitus opprimatur, nisi suppetias peropportune ferant τὰ νάρκωτικά hora quasi quinta pomeridiana, pereunte cathartici vi; imo longe citius, si minima de nova inquietudine suspicio nata sit; quo pacto minor opiatorum dosis rem magis prospere conficeret, quam auctior, serius data.

Fæcinarum quidem, (id quod notandum est) quæ hystericiis paroxysmis vel melancholia, vel febri intermittente, male tractata exagitantur, colicam contraxissent, fæces aquam atramento intinctam cum paucis excrementis referunt, usque dum humores naturalem suam indolem quadantenus recuperarint.

Eo loci perventum quum sit non sine fausto eventu, defunctos esse nosmet ipsi auguramur munere periculosissimo; extra omnem enim dubitandi aleam positum est, quin, si alvus astricta maneat, ἡ θάνατος morbi summo periclitetur opere; eo quod morbi fomes non certe subigatur, nisi fæces sponte, vel coactæ, moveantur. Ex hoc, qui audacter, utcunque

utcumque absurde, medicinam faciliant, illam veritatem præsentientes, hac in re toti fuere, ut intestina expurgentur, habita ratione nulla, de viribus ægotantis, de morbi natura, de occasione & modo purgativorum administrandorum: qui oscitanter opinantur sunt, quo fortius catharticum, eo felicius succellurum esse; ex *Sydenhamii* argumento, in libro suo de colica biliosa, pro fortibus cathartics: verum tamen ab experientia liquido patet, morbum hunc, quem scribimus, a fortioribus purgativis admodum abhorrere, e contra autem ad fæces abstergendas certius conducere τὰ ἰσχυρὰ, quippe quorum exagitatio sit vermiculari intestinorum motui magis amica.

Qua ratione autem homines refutemus istos, permanentes in regione, quæ in turpitudine ab impericis perpetrata conniver, & impericis, iniquimus, perpetrata, qui ignorancia, impotentia, & lucro obcecati, id nominis sortiti sunt, quo quosdam jam pridem distinxerat divinus Senex? Eos, ita redarguit Vir hicce, οὐκ ἔστιν οὐδὲ τοῦτο παρυστοχίμωτος πρὸς τὴν ἐν τῇσι τραγῳδίαις. ἵνα γὰρ ἰσθὺς ἄνθρωπος μὴ τοῦτο εἴη πρὸς τὴν ἀποκαταστάσιν τοῦ σώματος, ὅτι ἐν τῇσι δὲ τραγῳδίαις, ὅταν τις ἐν τῇσι τοῖς μέν πολλοῖς, ἔργον δὲ πάσχειν. Nonne revera sunt histrionum similes? Nonne fama magis, quam medicinæ eruditione valent? Quin etiam pergit Vir idem. καὶ γὰρ ὅταν μὴδὲν ἰσχυρὸν εἴναι ἀρκούντες ἀμύνησθαι, τὸν δὲ μὴ ἰσθὺς ἄνθρωπος, φῶτος, δὲ ἀποκαταστάσιν, τῷ σώματι ἐν τῇσι, παρυστοχίμωτος, φῶτος, ἔστιν. Anne istis facultates hæc expectandæ sunt? Anne isti instituta medicinæ, à teneris annis, in locis ad hanc rem extructis imbiberunt? Anne id ingenii istis largita est natura? Utrum istorum studia perfecit æque tempus, ac industria? Nonne bonis omnibus & amicis destituti, lanceolæ usu, vel Pharmacopolio occupati, in peregrina loca aufugientes, quæstum ex medicina facitanda accipere? Putantne isti, cælo mutato, mutari mores, intellectumque?

Calum, non animam mutant, qui trans mare currunt.

At Homunculi isti, populi imperitia, & sua ipsorum audacia suffulti, medicamentis ad alvum subducendam utuntur etiam fortissimis, quæ, ob parvam molem concinna quidem, summa cum violentia corpus exagitant, calefactis humoribus. Istis solenne est, pilulas ex duobus propinare: Quum autem catharticum hocce ex colocynthide & scammonio, & oleo caryophyllorum compositum sit, sanguinem necessario incendit, undè tumultuantur omnia. Quod si vires alterius cathartici deficiant, altero dato (hocce flagitium?) adjuvantur. Hinc orbicularibus intestinorum fibris se contrahentibus, & in eo statu manentibus (quæ aliter pro motus vermicularis lege contrahi & relaxari debuerant) præcipue circa locum, ubi fæces induratae hærent, ob tormina, quæ mor-

§§§§ 2.

bifica

bifica materies per se prius induxerat, adacta jam adventitiis medica-
menti stimulis, fæces suas dimittere nolunt intestina: ex quo fit, ut
dolores exacerbescant, quanti in homines maximi possint incidere.

Unde non raro agmen cogunt convulsiones (quæ quidem fre-
quenter misérias omnes de medio tollunt) aut oboritur *paralyticæ*: quippe
quæ obtrudendorum cathartidorum perinde constantæ, ac liberaliori
usu vaporum usui ortum debet suum: id quod quidem ex plurimis
exemplis intelleximus: ex quo malo tot juvenes, florente ætate, hoc
morbo bis terve confictati, impensa homunculorum istorum opera, luunt
peccatum, in posteram vitam semper manci, ad rem nullam apti.

Quin etiam hoc in morbo præmaturæ clysterum injectiones, sunt
æque criminose. Imprimis enim clysteres non opus sunt, si *si Symptoma*
pro ratione a nobis tradita, sit instituta; iterum; ambiguum est an
scopum attingant propositum; sin minus; symptomata prius sopita ad
bellum inferendum de novo sollicitantur. Adeo recte dixit magnus ille
Sydenhamius, de clysterum usu in colica biliosa edisserens, cum, inquit
„ en-mata carminantia, eo sine injecta, ut humores acres exterminet,
„ crabrones irritent tantum, & concitato humorum tumultu, diu-
„ turniorem reddant morbum.

Nunc restat, ut emetica ad trutinas aliquantisper revocemus. Eme-
ticorum enim exhibitio est multiplex ad suspicionem. In hoc quidem
morbo fere nihil profunt; & certe omnibus horis remedium pericu-
losissimum. Nec somnatoribus, nec magis opinatoribus, qui in Hy-
potheci (splendidis quidem nugis) toti sint, obtemperandum est, ex-
perientia repugnante. Quicquid enim utilitatis acceptum vomitoriis o-
portet referatur in cæteris colicis, quæ a sordibus sub autumnale tem-
pus collectis producantur, iis tamen in hoc morbo habenda fides non
est. Etsi nihil negemus, quin viscida illa materies, intestinis inlesta,
solidis & fluidis, vomitoriorum vehementer concussis, facilius ali-
quando excutiat; verum tamen exinde non laxatur alvus; quum
fæces, induratae si fuerint, ut supra notatum est, spontè vel coactæ
debeant secedere: Quin etiam non modo *visc* non adjuvant, sangui-
nem non corroborant, sed debilitant etiam. Quid? quod periculum
est, ne dolore ad punctum magis fixo, vires spontaneis vomitionibus
prius exantlate, novis vomitorii concussibus oppressæ collabantur om-
nino, & cis paucas horas inter evanescendum animam efflet æger, a me-
dico vere jugulatus. Hactenus de vomitoriis.

Expurgatis intestinis, & temperatis symptomatibus, oportet, in
auxilium medicamenta sollicitentur; quæ *si Symptoma* profunt, sangui-
nemque corroborant. Hoc enim capite præcipuam incendii faciem
restinguimus, unde a novis insultibus caveretur, & pristinae valitudini
citius certiusque restituitur ægrotus. Quemadmodum enim naturæ vis
(id

(id quod ex prægressis affectionibus clare patet) fuit subversa , unde sit , ut morbificæ materiei semina in sanguine pullulantia & collecta , *Epomæi* rû *Empuraria* rû *Epomæi* destinata adorianur , ita quæcunque naturæ auxiliantur , obtinendo huic proposito conducunt. Ergo huic rei conferunt , radices gentianæ , ari , chinæ ; cortex peruvianus ; folia absinthii , centaurei , dracontii ; castoreum , viperæ ; theriaca andromachi ; chalybs ; & similia. Sit tibi , benevole lector , si placeat , hæc formula.

R. Folior. & flor. Betonicæ ℥iij.
Cort. radic. capparidis , Tamarisci ,
Rubi sylv. Trichomanis . ana ℥ij.
Limat. mart. ℥ss. cum vini B. Viij.
In frigore infundantur. De colat.
Capt. æger ter de die ℥ij.

Medicato hocce vino plures dies utatur æger ; enim vero non raro expectationem fallunt remedia præstantiora , quippe quæ non satis copiose singulis vicibus , nec satis diu administrata fuissent.

Ex huiusce remedii usu ; si virtus stomachi ad se redeat , si vires restarentur ; si lateritium sedimentum in urina evanescat ; si sordibus albis , biliosis , crassis liberetur lingua ; si gingivæ & labia rubescant ; si hilaris vultus sit ; si faeces pro cibis assumptis quotidie exonerentur : hæc signa ad salutem sunt omnia.

Ut autem in *Septentio* , medicamentorum ope inchoata , promoveatur , alicui exercitationi se ipse assuefaciat æger. Huic rei maxime conducit equitatio ; quam quidem in tractatu suo de podagra commendat Sydenhamius ipsissimis verbis , „ & sane diu multumque mecum reputavi , „ quod si cui innotesceret medicamentum , quod & celare vellet , æque „ efficax in hoc morbo , & in chronicis plerisque , ac est equitatio „ constans & assidua , opes ille exinde amplissimas facile accumulare „ possit. ” Alibi idem sic expatiatur . „ Et ut , quod res est , loquar , „ non in hoc tantum casu , sed in morbis aliis chronicis quam pluribus „ hoc exercitii genus nunquam non cum uberrimo fructu usurpatum „ memini , modo quis in illo improbius perseveraret. Si enim nobis „ cum reputemus ventrem inferiorem , in quo disponuntur organa se „ cretoria , hoc maxime exercitio vibrari , eaque succussionibus aliquot „ mille uno in die exagitari solere , facile credemus , eadem succum quem „ libet recrementitium ibi impactum ope dicti exercitii posse excutere , „ & (quod majoris adhuc est momenti) validiore illius caloris nativi ex „ citatione ita corroborari , ut munere , quod iis mandavit natura , in san „ guine depurando recte defungantur.

Propterea etiam divinus senex exercitia in chronicis morbis , ut in libro de internis affectionibus abunde liquet , summo suadet opere.

S s s 3

Jam

Jam autem obiter notandum est, si symptomata non ita vehementer efferverint, & morbus recens sit, e re maxime fore, purgativis prætermisiss, narcoticis quietem conciliare, & vino medicato præscripto, vel aliis medicamentis id genus, curationem aggredi; licet enina ad septimam usque vel ultra diem maneat astricta alvus, intestina tamen, hisce modis confirmata, innato revivificante calore & etiam vigore, hostem à parietibus suis tandem per se profligabunt. Hanc methodum optato eventu non frustratam fuisse, frequentius experti sumus. Meretule est partium medici, bene ante perpendere, quidnam detrimenti ex catharticis expectandum sit, quam ea administrentur. Ab ambiguitate enim, an iis retinendis suppetat ventriculus, & a periculo, ne suum officium non faciant, etsi retineantur, negotium medico facessit difficultissimum. Jacta hac alea, adjudicantur exultatio medici & sanitas ægrotantis.

Si juvenis sit, multo sanguine, facie ruberrima, cui dolet caput; si metus sit, ne phrenitis, neve convulsionibus subsequatur sint; vena tundatur, antequam imperentur opiata vel cathartica; secus; curationi insilendum est, prout supra dictum est.

Quod ad dictæ rationem spectat, difficilis quæstio non est, quippe morbo adhuc recente, necdum omnino debellato, nil nisi ea, quæ sunt digestionis facilioris, natura duce, appetit ægrotus. Dum convalescit: dicta sit increscens, quales sunt pulli teneriores, pisces & hujusmodi. Ab omni spirituosorum liquorum potatione religiose caveat: liquores enim hi morbum, paulisper confopitum licet, post hac pertinaciorum reddunt. Quin pro potu communi sequente utatur decocto.

R. Cort. Lira. recent. ℥ss, decoque in aq. font. ℔. ij. fs. ad ℔. jii. cum frustulo panis. F. decoc. in usum præscriptum.

Hic potus stomacho apprimè gratus est, suumque levat.

Consulto, non casu de externis tacuimus remediis, qualia sunt fomenta, adnodyna emplastra ad regionem umbilicalem applicata & similia, utpote quæ nihil adferant emolumenti, quoad percepimus, saltem minimum, idque ad aliquod tempus tantum; quandoquidem methodo & remediis prius institutis annititur medela maxime.

An utilis sit morbo imminenti balnearum usus, experientia relinquendum est; pulchre consistemus, nolmet nescire, quantum possit id remedium.

Paralysis membrorum (nisi jam inveterasset morbus) medendi rationi & remediis iisdem, quæ coctioni & sanguini profunt, præscriptis cedit omnino. Externe adhibeantur, si placeat, emplastra, quæ corroborantia dicuntur.

Alig

Alii miserrime manci, pecunia emuncti; ad quasdam thermas (quæ peritorum medicorum vice funguntur) sitas ab orientali parte insulæ, quæ hodie Jamaica appellatur, se ipsi conferunt, haud sine summo emolumento. In has aquas semel iterumve in singulas dies immerguntur, & iisdem pro potu communi familiariter utuntur, quo factum est ut, ne pluribus quidem diebus interpositis, confirmata sit valetudo ea, quam promittere non ausa sunt pharmaca; neque vitio scx rerum non naturalium prompte perfundatur corpus ita sanatum. Medius fidius hisce modis pleraque mala pertinaciora juxta externa, ac interna egregie debellantur. Valerudinariorum autem frequentiam prohibent & difficultates itineris & incommoditas Holpitii. Tanto constat divinum illud remedium, & naturæ forte consilio, ne vivendi pravitas impune grafferetur: alii autem in Boreales regiones demigrando pulcherrime revalescunt; eo quod frigus externum debilitatas jam pridem fibras reddit fortiores, & succus ex optimis edulis expressus ventriculi virtute, & in sanguinem receptus in naturales corporis humores promptius transit. Ergo *γυαλασμορεια* non est contemnenda: enimvero audacter constanterque asseveramus, fomite morbi subacto, remedia ad restaurandam valetudinem ex chronicis morbis amissam non esse æque pulchra ac ea, quæ nutritioni & pinguedini corporis favent, imprimis omnium, præsentæ juventute. Quid? quod amplissimus ille Vir *Boerhaave*, cujus gloriam in re medicinali partam æternitas ipsa semper intuebitur, sententiæ huic arridet maxime. "Debilium, inquit, fibrarum curatio obtinebitur nutrimento, in quo materies glutinosa, tenuissima, aquosa, inpinguisque abundet, quodque jam fere ita præparatum sit, ac in corpore sano & forti fit. Lac, ova, jura omnium, decocta panis bene fermentati, vina austera, primaria, sunt". Hanc igitur medendi rationem ab *Hippocrate* institutam clare videmus, qui ea, quæ nutritioni & pinguedini corporis conducunt, in libro suo de internis affectionibus, post judicationem morbi, impense suadet.

Ex experimentis indubitanter elucescit, nervis tribuendum esse omnem morum sensumque; pertæsum autem est explicare, quinam singularis sit ille motus, quo nervi afficiantur, paralyti cuilibet parti corporis superveniente, vel quo, intestinis male affectis, motus membrorum pereat; ne perfergere ad sacram nervosi liquidi anchoram videamur; id quod tanquam minus probabile, nobis denegatur a plurimis. Quis naturæ leges, quibus obsecundant origines, augmentum, & declinationes morborum, intelligentia consecutus fuerit? „Quam bellum est, inquit, eximius orator ille, pulchre confiteri potius nescire, quod nescires, quam ista effluentem nascesse, & ipsum tibi displicere. Partium autem inter se, (ut nobis videtur) proprio consensui relegendum est *παραδοσις*, quæ colicam subsequitur.

Quis autem proprium consensum hunc prorsus negaverit? utrum eundem

CCLXIII

ANDR. ELIÆ BUCHNER

ET

J. CAR. EHRENFRIED HEBENSTREIT

DE

SCIRRHO MESENTERII EXULCERATO.

Hall 1756.

C A S U S.

Nobilis quidam annorum XLIV. temperamenti melancholico - cholericus, habitusque corporis idcirco stricioris, in regione quadam minus salubri, ob aërem crassum, humidum, vaporibusque putridis continuo fere inquinatum eandem ambienteis, educatus, cibis crassioribus & dyspeptis nutritus, crebrioribusque ac variis corpus admodum defatigantibus laboribus semper obnoxius, a primis statim annis ad ultimum usque vite terminum variis chronicis, infini inprimis ventris viscera adsligentibus, excruciatum fuit morbus. In etate enim infantili atrophica cum febre lenta laborabat, qui morbi aptis quidem remediis tandem tollebantur, remanente tamen præternaturali quodam expansione duriori abdominis, circa regionem umbilicalem & lumbarem tam dextram, quam sinistram, inprimis conspicua, quæ nulli arte penitus auferri, sed aliquo saltem modo diminui poterat. In puerili dein etate frequentius colica vexabatur biliosa, conjunctis molestis vomendi conatibus & tensum, qui, rejecta denum per vomitum saburra biliosa-viscida, ordinarie iterum cessabant. Ab his quoque incommodis liberatus, per aliquot annos tranquilla quadantenus gaudebat sanitate, donec sub adolescentili ætate febres accedentes intermittentes, tam quotidianæ, quam tertianæ, modo regulares, modo anomale, mox cessantes, mox inopinato redeuntes, sicque in etatem usque virilem continuantes, ac tandem in quartanam regularem transeuntes, dolore quodam obtuso comitatas, qui ex regione dextra hypochondriaca ad lumbarem & umbilicalem usque sese diffundebat, eademque ratione continuabat, postquam quartana simplex regularis in duplicatam imitata erat. Succedebant hæc tumores pedum œdematosi versus superiora ascendentes, utrumque humillevem subsequens forsitan hydropis ascitici incutientes, qui tamen, feliciter sub-

Disput. Medicæ. Krauß. Tom. VII.

Tttt

lati,

latu, congrua medendi methodo, tumoribus istis & dolore antea memorato, prorsus evanescebat, ita ut per unum alterumve annum, præter supra dictam abdominis expansionem, & subinde intercurrentes leniores colicos dolores, nihil amplius incommodi sentiret.

Adpropinquante vero quadragesimo ætatis anno gravissima excruciebatur colica spasmodico-convulsiva, lethalem prorsus eventum minitante, qua tandem non sine multa difficultate mitigata, satis notabile coepit incrementum supra memorata abdominis expansio & durities, præsertim in sinistro hypochondrio. Superveniebat hu incommodis circa medium quadragesimi ætatis anni febris lenta, orinarum non solum symptomatibus, sed insuper quoque peculiari quodam tumore, prope scrobiculum cordis assurgente, & primo ovi columbini, post duorum vero mensium intervallum anserini magnitudinem referente, stipata. Proinde etiam non solum expansio, durities & inequalitas abdominis ulterius insigniter augebatur, sed etiam spasmus torminaginis vagæ & flatulentie continuo fere ægrum adstrebant, ita ut alimuntorum assumptio & deglutitio perquam difficili redderetur. Jungebantur hu postea alvi segnitiei, parvior urine excretio, respirandi angustia, sitis pene inextinguibilis, tumor pedum adematosis recurrent, ipsaque febris hectica, cum sudoribus colligativis & reliquis eandem comitantibus symptomatibus ardens, sub quibus tandem gravissima eripropne, in catarrhum suffocativum transiens, miserrima hætenus transiitæ vitæ finem imponebat.

Instituta dein anatomica eadaveris sectio edocuit nos, causam gravissimorum istorum morborum, dolorumque diversorum, & subsequente tandem mortis, unice in obstructione & induratione universalis, seu ingenti Scirrhi mesenterii exulcerato, indeque insigniter intato reliquorum abdominis viscerum statu naturali, positam fuisse. Summo enim cum supore deprehendimus, partem hanc, alius ex teneriis membranis cellulosis, pinguedine repleta, constantem, in fragrande, durum & ineguale corpus, undeviginti libras cum dimidia pondere æquans, degenerasse, quod in superficie non solum, sed & in interori firmitate subcinerei erat coloris, cum intermixto subrubro, sanguine d' sectione complures, tam majores, quam minores, monstrabat cavitates, quarum priores saniem putridam & fetidam, posteriores autem paulo crassiores purulentam continebant materiam. Iugens ergo hæc moles quam per totam sese extenderet abdominis cavitatem, reliqua omnia in eadem contenta viscera e naturali sua emoverat sede, insimulque ventriculi & intestinorum diametrum non solum arctissimum reddiderat, sed etiam cum iisdem & reliquis visceribus, itemque duobus ultimis costis sporis & tribus inferioribus lumborum vertebis, ope firmiorum quarundam tunicarum, adeo & firmiter coehærat, ut ægræque non nisi ab iisdem separari potuerit.

§. I.

Scirrus est tumor durus, tactui renitens, immobilis, indolens, in partibus mollioribus, vasculosis præcipue & glandulosis, ab humoribus viscidis & crassioribus ibidem coacervatis, incarcerationis & successive coagulatis & induratis, prognatus. Omnes ergo corporis nostri partes molles, exceptis tendinibus & cerebro, huic malo obnoxie sunt a). Cognoscitur autem ordinarie ex præternaturali talis partis extensione & elevatione, modo citius, modo tardius incrementa evidentiora capiente, ita ut tumor, magis magisque sese diffundens, majorem tandem & sæpius quasi lapideam induat duritiem. In primo sui initio Scirrus communiter naturalem retinet colorem partis affectæ, & sola saltem duritie præsentiam suam monstrat; quando autem vel ob alias causas & graviore morbos supervenientes major humorum versus eundem adfluxus concitatur, tunc color naturalis facile in spadiceum & durities in molliem abit, auctior in humoribus ibidem stagnantibus intestinalis motus concitatur, illique vel in purulentam materiam, vel, quod frequentius contingit, in foetam & acrem saniem degenerant, ulceraque pessima, plerumque cancrofa, formant.

§. II.

Sedem suam utplurimum habet Scirrus in iis partibus corporis, in quibus copiosa vasa minora, quæ in ulteriori suo progressu semper angustiora evadunt, variasque & innumeras complicationes formant, præsto sunt. Talis autem structura quum glandulosis partibus imprimis sit propria b), liquido inde adparet, quod idcirco vel ipsas glandulas, vel viscera alia, iisdem quoad structuram simillima, ut pulmones, hepar, lienem, renes, uterum, occupare solet.

§. III.

Solertissimi equidem Anatomici, MALPIGHIUS c), RUY-
SCHIUS d), & celeberrimus nostræ ævo LIBERKÜHNIIUS, jam
Titt 2 dudum

a) Conf. Diss. de Scirrho, Præfide illustr. b. m. HAMBURGEO JEUNE 1751. ventilata.

b) Vid. JEREM. LOSSII Disput. de Glandulis in genere. WITTM. 1683. & GUILLIELM. MYLII Disput. de Glandulis. Lugd. Bat 1658.

c) Vid. Ejusd. Opera posthuma p. 100. 199. & speciatim Epistola de Structura glandular. congestar. conformationque partium, it. HERM. BOERNHAAVE Epistola anatomicæ, ad FRID. RUYSCHIIUM, in ejus Opusculis, pag. 68. 199.

d) Vid. Ejusd. Epist. anatomicæ. & sponsonia ad HERMANN. BOERNHAAVE, in hujus Opusculis omnibus, Hag. Comit. 1738. editis, pag. 64. 199.

dudum beneficio artificiosarum injectionum & microscopiorum glandulosam fabricam ferme in omnibus tenerioribus corporis nostri partibus observant, dum ubique insignes minimorum vasculorum deprehenderunt complicationes, adeoque facile exinde concludi posset, generali significato glandulas undique in iisdem occurrere & dispersas esse. Ast in strictiori & proprio sensu glandulæ, juxta Illustr. HEISTERI descriptionem e), quam pace Tanti Viri meam hic facio, sunt *partes peculiari habitus, ex congerie minutissimarum arteriarum, venarum, nervorum, & plerumque etiam ductu excretorio, constatae, propria membrana cinctæ, variæ figurae, coloris & consistentiæ, usum diversis, ut plurimum tamen secretioni alicujus liquidi destinatae.*

§. IV.

Licet etiam porro quamplurimas olim glandularum differentias variis exogitaverint Auctores, distinguendo nempe easdem in carneas, vesiculares, coagulatas, vasculosas, molles, solidiores, perpetuas, adventitias, pluresque alias; sufficit tamen, si, ad mentem celeberrimorum nostri ævi Anatomicorum, in duo saltem summa genera, sub quibus omnes & singulæ comprehendere possunt species, dividuntur, nempe in *simplices*, seu *foliarias*, quas alii *conglobatas* vocant, ex unico corpculo sphaeroides, distincto, suaeque membranula incluso, constantes; & in *compuestas* seu *complexas*, vulgo *conglomeratas* dictas, quæ ex pluribus minoribus inter se conjunctis componuntur, certa membrana investuntur, unum communem ductum, in peculiarem quandam cavitatem, obtinent, communemque actionem edunt.

§. V.

Ex diversa hac glandularum structura functio illarum adjudicari potest, quam potissimum in sanguinem ad canales illorum advehum exferunt, argumentando nimirum ex structura detecta ad varias fluidi, per canales istos transeuntis, mutationes. Variant enim vascula, ex quibus hæc organa composita sunt, tam longitudine, copia & amplitudine, quam complicatione, densitate & fibrillarum nervorum intertextarum majori aut minori quantitate; adeoque majorem omnino mutationem sanguis subit in longius excurrentibus ejusmodi canaliculis, quales in conglobatis & conglomeratis imprimis deprehenduntur, quam si breviores illi fuerint, sicuti in folliculosi glandulis, quæ ob minorem dictorum vasculorum copiam non adeo insignem mutationem in sanguine ad illas adfuerit producere solent.

§. VI.

e) Vid. Compend anatom. p. 10. §. 21. Edit. Norimb. 1727. item Diss. Ejusd. de vera Glandulae appellatione, Cap. III. §. V. Helmstadii, 1718.

§. VI.

Paret igitur ex modo adductis, sanguinem in longa vasorum serie motum valde mutari, illumque lento admodum & debili motu per eadem progredi. Angustia enim illorum successive magis magisque aucta, & formata ab iis anguli varii, recti & obliqui, obtusi & acuti, obicem qualemcumque motui fluidorum ponunt, eaque aliquo vigoris gradu resistentia sua privant. Proinde etiam vires partium corporis nostri, tam solidarum, quam fluidarum, in naturali statu ordinarie in æquilibrio sunt, semperque ea solidorumprehenditur ratio, quæ fluidorum est, ita ut, ubi pauciores partes fluidæ moventur, ibi etiam tenuiora & angustiora sint vasa; cumque humores in minimos globulos divisi exiguan constituent massam si seorsim spectentur, hinc minorem etiam exerunt actionem in vasa minima, horumque pariter debilior erit reactio, ob laxiorem partium fibras constituentium cohesionem.

§. VII.

Vis fluidorum movens & in solida agens dependet in corpore nostro a motu illorum progressivo & intestino, indefinenter & æqualiter in illo succedentibus. Progressivus motus determinatur per vim systolicam solidorum mollium, intestinus vero sub ipso progressivo simul producitur, estque causa resolutionis eorum in minimas particulas. Quando igitur humores per priorem illum, nempe progressivum motum, ad minima deferuntur vascula, quorum diameter non nisi unicum semper admittit globulum, tunc parietes illorum æqualiter in globulos tales, ita successive se invicem excipientes, agunt *f*), qui dein sub continuato ulteriori progressu fluidi & perseverante vi solidarum partium, in minores dividuntur, eoque ipso aptiores redduntur, ut in angustiores subsequentes canales penetrare queant.

§. VIII.

Pro conditione ergo tam solidorum, quam fluidorum, varique illorum structura & horum mixtione ac fluiditate, varius semper erit effectus intuitu progressivi motus ejusque successus tam liberioris, quam impeditioris ac magis retardati. Hinc si crebrioribus spasticis & constrictoris motibus adficiuntur solida, insimulque etiam viscida & spissiora, quacunque ex causa, redduntur fluida, non solum motus horum in majoribus æque ac minimis vasculis admodum retardatur, ut tantum prorsus

T t t 3

f) Vid. Acta Med. Edinburg. Tom. II, pag. 82. ubi Experim. VII. hæc propositio fuit probatur.

fus in iisdem subsistunt & obstructions producant, sed solidorum etiam fibrillæ teneriores a stagnantibus illis fluidis moleste premuntur, distenduntur & irritantur, varique hinc symptomata & dolorifica pathemata concitantur.

§. IX.

Quoniam ex præmissis (§. VIII.) constat, quod obstructions ordinarie primum suum capiant initium in minimis vasculis, quorum diameter in ulteriori illorum progressu successive angustior evadit; hæc vero structura ultimis arteriis sanguiferis, seu rubris, primisque illis excipientibus serosis & lymphaticis proprie competit, quales maxime ad glandulas constituendas & formandas concurrunt: Hinc facile patet, cur partes hæc organicæ, variorum liquidorum secretioni imprimis destinatæ (§. IV.), obstructionibus facilius pariter ac frequentius obtusæ redantur.

§. X.

Obstructionis autem conditio variat, pro diversitate staseos humorum, in pluribus vel paucioribus canalibus tactæ, cuius indicium præbet varia inde eveniens magnitudo tumoris obstructionem concomitantis. Vasa enim obstructa, ob denegatum progressum fluidi ulterius propellendi, & collectionem ac stagnationem novi a tergo continuo affluentis, in majus subinde spatium extenduntur, eoque ipso, vicinas & proxime adjacentes partes itidem expandendo & elevando, superficiem illarum inæqualem reddunt, quam ita mutatam earum formam *tumorem* vocamus, qui dein, pro causarum & aliarum circumstantiarum diversitate, modo magnus, modo parvus, durus aut mollis, dolorosus aut indolens evadit, variasque peculiare denominationes inde obtnet.

§. XI.

Quo diutius durant obstructions in canaliculis quibusdam abortæ & productæ, eo magis ipso tali temporis successu invalescunt eoque latius sese plerumque diffundunt. Dum enim humores, a tergo ad locum usque obstructum progredientes, ab ulteriori libero ibidem excluduntur transitu, necessario ad alia vicina copiosius regurgitant vasa, & ob copiam magis auctam tardius per illa moventur, unde partes illarum, motu intestino debilius agitæ, subinde arctius inter se coherent, fluidum ipsum spissius evadit lentoremque acquirit, & tandem in his quoque canalibus subsistit, atque ita majus tumoris incrementum producit.

§. XII.

§. XII.

Quoniam etiam porro omnis nervorum tensio præternaturalis ingratam infert sensationem, seu dolorem, hicque tanto gravior est, si teneriores aut pauciores illorum ramificationes ita moleste addiuntur, expanduntur, vel etiam stimulantur & irritantur, facile hinc patet ratio, cur ut plurimum tumores, tam molliores, quam duriores, imprimis autem a causa sanguinea ducti & repente invalescentes, in initio præsertim & angustio, doloribus satis exquisitis, lancinantibus, præmentibus spasticisque stipati incedant. Dum enim stagnantes in vasculis minoribus humores, & reliqui a tergo affluentes magisque ob tardiorum progressum accumulati, membranas illorum & intertextas iisdem nervas fibrillas successivè vehementius distendunt, aut etiam aciores illis forte immixtæ particule irritando, arrodendo & stimulo has ipsas ad vehementiorem constrictionem sollicitant, necessario exinde dolorificæ ejusmodi sensationes, ab inflammatoriis tamen adhuc distinctæ, concitari possunt ac debent. Quod si autem diuturniori temporis mora ejusmodi fluida stagnantia magis inspissentur, aut, secedentibus & evaporantibus tenuioribus partibus aqueis plane exsiccentur, tunc vel ob nimiam debilitatem, sub continua expansione tandem ductam, vel ob rigiditatem fibrillarum sensibilem, ex humorum induratione prognatam, naturalis sentiendi facultas imminuitur aut plane tollitur, indeque est, quod scirrhi ordinarie fere indolentes sint, antequam ad exulcerationem tendant, tumores autem sanguinei fere omnes, non admodum inveterati, manifestiores communiter inferant dolores.

§. XIII.

Consensus ille satis liquidus, qui inter complures corporis nostri partes notatur, & tam vasorum, quam nervorum communicatione unica nititur, nullum nobis relinquit dubium, quin etiam obstructions & tumores, præcipue grandiores & graviore, specialem quandam partem aut viscus occupantes, in aliis remotioribus ex hoc fundamento varia satis interdum fontica concitare valeant symptomata. Dum enim & vasorum & nervorum omnium ramificationes ad minimum communem quandam, in truncis variis eminentioribus, agnoscunt originem, hujusque respectu quælibet mutationes insigniores & graviore, circa ramulorum extremitates contingentes, modo subito, modo etiam successivè ad reliquas partes, nervos & vasa sua ex uno eodemque trunco obtinentes, propagantur; facile utique exinde patet, quod & particulares in certo saltem loco obortæ obstructions, temporis successu, dum magis magisque invalescunt, & partim nervæ fibrillæ ad crebriores

briores & auctiores spasmodicas constrictiones sollicitantur, partium quoque progressivus humorum motus per vasa magis retardatur & turbatur, imo & ipsa viscera vicina, ob molem partis obstructæ magis auctam, pressionem molestant patiuntur, in remotioribus corporis regionibus non solum complura incommoda excitare, sed etiam variarum functionum turbationes inferre valent.

§. XIV.

Quum tandem etiam omnem vasorum obstructionem semper exipiat præternaturalis admodumque ingens sæpe illarum & partium ipsius adfectæ distensio & expansio, rupturam quandoque fere minitans, merito adhuc, antequam ad specialiora progrediamur, discipiendum nunc erit, qua ratione id ipsum, salva adhuc manente partium talium cohesione, contingere queat. Constat jam ex physiologicis, quod fibræ solidarum partium ex tenacioribus terreis elementis, succo aliquo viscido seu glutine animali arctius inter se connexis, compositæ sint, roborque illarum physicum seu naturale a firmiori & intimiori cohesione dictorum dependat elementorum, sub qua singulæ illæ tantam exeferunt vim resistentem seu reactionem, quamvis hæc earum conditio admittit. Quoniam autem hæc ipsæ fibræ insimul elasticæ sunt, & ideo vi extendenti fluidorum transeuntium cedunt; hinc quando ea vim illarum resistentem superat, necessario eidem cedere coguntur, sique diutius in tali statu detinentur, tunc ob imminutam elementorum suorum cohesionem & elongantur & debilitantur. Augetur ergo hac ratione non solum capacitas & diameter talium canaliculorum, sed humores etiam ibidem stagnantes magis accumuluntur, sique vis distendens subinde majora acquirit incrementa. Quum vero tam fibrillæ, quam membranæ vasorum ex iisdem contextæ, ex minimis constent particulis terreis, quæ plurimis gaudent punctis contactus, adeoque glutinis animalis ope firmiter inter se connexæ sint; hinc, si aliquo saltem modo debilitatæ sunt, ob imminutam vim resistendi & pluralitatem punctorum contactus, majorem semper admittere possunt distensionem, citra tamen plenariam cohesionis dissolutionem, indeque tumores tales, ex obstructione prognati, in ingentem & sæpe stupendam expandi possunt magnitudinem, absque ulla tamen subsequente violentia ruptura vasorum aut membranarum connexarum.

§. XV.

Transitus obstructionum, in glandulosis partibus facterum, ut scirrhum, raro subitaneus esse solet, sed longius plerumque temporis inter-

intervallum requirit. Non solum enim ad illum ingenerandum major copia humorum spissiorum, crassorum & viscidorum, in anfractibus & angustis complurium canalium subsistentium, adeoque perfecta & totalis horum, obstructio, requiritur, sed necesse etiam est, ut ab iisdem tenuiores aqueæ partes secedant & successiva evaporatione per extremos minimos tubulos removeantur, & terræ ac viscidæ partes ita quasi exsiccantur & in duriciem quandam convertantur, cumque id non nisi diuturniori temporis mora fieri possit, hinc patet, obstructions communiter citius & promptius generari posse, quam scirrhus. Occurrunt autem hi non tantum in partibus externis, visui patentibus, veluti collo, labiis, gingivis, lingua, mammis & testiculis, sed etiam in abditis corporis nostri visceribus, ubi difficilius cognoscuntur, atque ab aliis morbis internis non, nisi ex circumstantiis rite ponderatis, dijudicantur. Ex illorum autem viscerum classe frequentius iisdem obnoxia deprehenduntur digestoria & depuratoria in abdomine sita, glandulæ nempe mesenterii & pancreatis, hepar, lien, renes, uterusque, quæ textura vasculosa, obstructionibus maxime favente (§. II.), gaudent.

§. XVI.

Premissis ergo generalioribus hisce, ad obstructionum & inde oborientium scirrhorum indolem spectantibus, ordinis ratio merito postulat, ut ad speciem quandam horum singularem, *Scirrhus* nempe *mesenterii*, occasione Casus supra communicati enodandum, nunc progrediamur. Ex ipsa autem hac relatione historica evidenter primo statim patet intuitu, fundamentum ejusdem, in tenera jam positum fuisse ætate, quum nempe atrophia, lenta febre stipata, defunctus noster laboraret. Illa enim ordinarie modo ex lacte materno nimis crasso, viscido & terreis partibus copiosius referto; modo ex alimentis dyspeptis, mucidis, farinaceis, itemque acidis & austeris, similibusque, aut etiam vinosis vel spirituosius potulentis, intempestive & præmature tenellis puerulis ingurgitatis; modo ex nimia constrictione fibulariorum artiorum, corpora infantum moleste jamjam comprimendum (g); modo etiam ex prava diathesi sanguinis materni in utero communicati, primam suam capit originem, aliisque dein sub ulteriori progressu accedentibus causis altiores ponit radices, malumque sæpe prorsus immedicabile tandem sistit.

Disput. Medico-Pract. Tom. VII.

Uuuu

§. XVII.

(g) Vid. Gualteri HARRIS Tractatus de morbis acutis infantum. Edit. Genæv. 1727. pag. 1. 12.

§. XVII.

Singulæ hæc causæ non alia ratione noxiam suam in ejusmodi tenellis, aliisque etiam robustioribus, corporibus exerunt efficaciam, quam chylicationis negotium graviter turbando, multasque cruditates & impuritates, viscidas, mucosas, acidas, austeras aliasque in primis viis progengerando, unde dein necessario universa humorum massa temporis successu magis inquinatur, & ob partium hererogeneousarum & crassiorum copiosorem retentionem & accumulationem spissior redditur, hacque ratione, dum inprimis etiam lymphæ omnium facillime viscido depravatur lentore, tardus non solum & difficilis evadit fluidorum per canales præsertim angustiores progressus, sed frequentiores etiam subsequenter deinde stagnationibus illorum, vasorumque exinde evenientibus obstructionibus, suppeditantur occasiones, quæ in mesenterio promptius, quam in ulla alia parte, in actum deducuntur, faciliusque tandem in veros degenerant scirrhus, quoniam & structura & functio ejusdem naturalis noxiæ tali effectui accelerando singulariter favere videtur.

§. XVIII.

Est enim mesenterium pars membranacea, cum interjecta pinguedine, situm obtinens medium inter intestina, per quod transeunt varii generis vasa, arteriæ, venæ, vasa lactea & nervi, plurimisque glandulis hinc inde præditum ac intestinis undique annexum, ut vinculum quasi illorum constituat. Quoniam ergo intestinorum duplex ordinarie constituitur divisio, in tenuia nempe & crassa; hinc etiam totum mesenterium non inepte a compluribus Anatomicorum in duas dividitur partes, *mesaraeum* nempe, quod tenuia colligat intestina, & *mesocolon*, quod crassa connectit. Figura mesaræi fere circularis est, ita tamen ut in tota sua circumferentia, versus intestina, in plurimas & fluxuosas plicas corrugetur, circa centrum vero planum & nullatenus plicatum sit. Mesocoli autem figura semi-circularis & oblongior comprehenditur.

§. XIX.

Ratione structuræ suæ compositum est mesenterium ex *membranis*, quibus in homine sano magna pinguedinis copia interjecta est; ex *vasis* dein *chyloferis* sive *lacteis*, *nervis* satis copiosis, *glandulisque* plurimis, duabus tandem *arteriis*, totidem *venis*, innumeris ramificationibus per totam hujus partis substantiam sese diffundentibus. Generalis

ralis ejus usus in eo consistit, ut, quoniam firmiter lumborum vertebri & osli sacro annectitur, ejus ope omne periculum laxationis & descensus intestinorum, præcipue sub duris laboribus, saltu, alvi scioris cum magno conatu depositione, & difficili partus exitu, prohibeatur. Speciatim autem *membranæ* non solum eundem usum præstant, ut nempe pariter vinculum sint intestinorum, sed insuper quoque eo inserviunt, ut in spatio intermedio tum vasa copiosissima, tum etiam glandulæ hinc inde dispersæ, tuto inter easdem decurrant & contineantur, ne in validis motibus rumpantur, aut a circumjacentibus visceribus comprimantur, quem in finem etiam hæ membranæ copiosa perfunduntur pinguedine, cujus blando insuper calore hæ partes foventur, ut humores transeuntes, sanguis nempe, chylus & limpha, in debita fluiditate permaneant & conserventur.

§. XX.

Vasorum lacteorum usus est, ut chylum ex intestinis recipiant, qui per modum transcolationis seu filtrationis in illa transit, relictis in intestinis partibus crassioribus, feculentis & excrementitiis. Hiant vero illa inter ipsas membranas intestinorum, ut osculis suis chylum in se recipere possint, qui dein expeditissima via, valvulis recursum prohibentibus, & nova subinde a tergo urgente ejus portione, in proximis mesenterii glandulas promovetur, a quibus dein vasa lactea secundi generis omnem chylum recipiunt & in cisternam communem devehunt. *Glandularum* itaque verus usus in eo consistere videtur, ut partim fuleimentum sint vasorum lacteorum, dum rami quidam eorum illas supergrediuntur, partim vero chylus, per vasa lactea advectus, in iisdem transcoletur & magis attenuetur.

§. XXI.

Sanguineorum vasorum, seu *arteriarum & venarum mesenterii*, quæ inde ad intestina progrediuntur, tanta est copia, quantam vix ulli alii corporis parti, proportionem instituta, concessam deprehendimus. Sicuti autem *vena* sanguinem per arterias advectum recipiunt & revehunt, ut ad hepar deferatur; ita *arteriosa* vasa partim nutritioni partium membranacearum, partim calori vitali conservando, partim denique separationi & depositioni oleosarum partium, pinguedinem deinde constituentium, sanguinisque simul depurationi a partibus recrementitiis tam serosis, quam crassioribus feculentis, per alia enunctoria non æque facile eliminandis, inserviunt, utpote quæ per hos canales ad intestina eorumque glandulas devehunt, ut in iis separatæ tandem

U u u z

im

in cavitatem intestinorum, tanquam sentinam totius corporis, depouantur, & cum reliquis chylosois partibus excrementitiis exinde describantur. *Nervi* denique non tam ad sensum & motum, utpote quibus mesenterium destitutum est, & qui tanto exquisitius in intestinis præsto sunt, sed partim ad robur quaecunque huic parti conciliandum, partim ad liquidum illud subtile elasticum, quod ad alias partes etiam transferunt, glandulis mesenterii suppeditandum, destinati sunt, ut chylus eodem magis actuetur & ad sanguificationem dein subeundam aptior reddatur.

§. XXII.

Dum ergo ex compluribus & tam variae indolis partibus compositum est mesenterium, dum chylus, lympa ac sanguis per ejus vasa continuo vehuntur, horumque humorum progressus variis fonticis expositus est impedimentis, & perquam facile ab aliis accedentibus causis graviter turbari & retardari potest, non immerito hinc exinde adferre & concludere licebit, mineram multorum morborum gravium & chronicorum, imprimis autem febrium rebellium, in eodem latitare & radices suas longe frequentius agere, quam quidem vulgo reputatur. Quum enim ob loci conditionem & situm, aliorumque viscerum viciniam non facile cognoscatur pars hæc proprie adfecta, hinc obscuritas ista multis causa fuit ignorantiae, cur harum mesenterii partium affectus olim iupimis prætermitti & veterum scriptis minus celebrati fuerint.

§. XXIII.

Ex omnibus autem illis morbis, qui prima sua in mesenterio ponunt fundamenta, frequentissima solent esse *obstructiones* ejusdem, quæ dein secundam aliorum gravium & fonticorum causam constituunt. Quum enim vix in ullo alio abdominis viscere plures & majores contingere possint vitiosorum & impurorum humorum stagnationes & collectiones, quam in mesenterio, ubi minora præsto sunt vasa, eaque numerosissima, minor sanguinis impetus, glandulae copiosae, chylus sæpe crudior & viscidior, obstructionibus producendis aptissimus; merito hinc exinde concludere licebit, quod illi præcipue morbi, qui ex commissis in victu erroribus & diæta insalubri originem suam ducunt, & sub quibus postea intemperantiæ poenas luere coguntur agrotantes, vix alibi sedem, quam in mesenterio, figant. Manifestissimum autem *obstructionis mesenterii* exemplum præbet nobis illa *atrophie* infantum species, ubi, abdomine in tumorem densum & tactui renitentem elevato, reliquum totum corpus emarcescit & lenia tæbe consumitur.

tur, & prout singulæ ejus partes macie extenuantur, ut vix cutis tandem ossibus hæreat, ita tumor abdominis increfcit & invalefcit, cujus cauffa, omnium confenfu, eft ingreffus chylo denegatus, ob viarum obftructionem, dum vel in ipfo aditu chylus orificia vasorum lacteorum fubire non poteft, id quod ex diarrhoea chylofa tunc conjuncta, una cum continuo cibi non affumendi defiderio, hâriolari licet; vel chylo tranfitus per mefenterii glandulas præcluditur, quo in cafu finul evcnit, ut in molem ingentem adaugeantur hæ glandulæ, alias minimæ, indeque abdomen mirum in modum, cum inequali durtie, expandatur.

§. XXIV.

Præter hanc autem glandularum magnitudinem nimium auctant alii etiam tumores *grandiores fcirrbofi*, tam ex coalitu plurium glandularum jam obftructarum, quam ex tota mefenterii ftructura & fubftantia præternaturaliter imminuta, oriuntur & produciuntur, quos Veteres interdum fteatomatum, atheromatum, aut meliceridum nominibus infigniebant, prout nimirum fubftantia illorum diverfa adparebat, & vel febo craffiori indurato fimilis, vel interius in materiam pulmentarem, aut melli fpiſſiori conformem mutata erat. Non lubet hæc latius profequi & per complura exempla probare, cum ipfe ille Cafus, fundamenti loco in hac Diſſertatione poſitus, fufficienter triſtiſſimam hanc confirmet veritatem, cui idcirco faltem binas obſervationes, fimilis indolis tumores exhibentes, illuſtrationis æque ac confirmationis gratia ſubjungere licebit, quarum unam TULLIUS (b) communicat, qui in juvene quodam, cui abdomen intra biennium in eam excreverat molem, ut pro hydropico fuerit declaratus, ſub ſectione anatomica ingens invenit ſteatoma, quod ex mefenterii glandulis excreſcens, in eam devenerat magnitudinem, ut, bilanci impoſitum, ultra libras oſciodecim ponderaret; alteram PARÆUS (i) fiſtit, qui in fœmina quadam mefenterium tumore fere incredibili turgens, & compluribus abſceſſibus ſcædens, ſe inveniffe refert, qui ſinguli peculiariſſimis incluſi membranæ, aliqui eorum oleoſo, alii melleo, alii ſebaceo, alii albugineo, alii vero aquoſo humore reſerti erant.

§. XXV.

His ergo debite nunc perſpectis & generaliſſimo modo prælibatis, ad ipſam ſpecialiorem Cafus propoſiti enucleationem progrediendum

U u u u 3. erit.

(b) *Obſervation. medic. lit. II. cap. 12.*

(i) *Oper. chirurgic. lib. XXII. cap. 28.*

erit, ut demum pateat, qua ratione ingens ille scirrhus in defuncto abortus, tantamque in molem auctus fuerit, & quænam graviorum illorum eundem in progressu ulteriori comitantium morborum cum illo fuerit convenientia, qualisque demum medendi methodus durante hacce tragædia, irritò licet cum effectu, in auxilium fuerit vocata. Prima ergo sua fundamenta universa illa morborum caterva utique posuit statim in prima defuncti ætate, quum sub aere crasso, humido, vaporibusque putridis continuo fere inquinato, educatus, cibisque dyspeptis & crudioribus nutritus, in *atrophiam*, ex causis talibus infantili & puerili ætati præcipue familiarem (§. XVI.), incideret. Hanc autem ex obstructione quadam glandularum mesenterii non exigua, sed satis diffusâ abortam fuisse, tam ex *lenta febre* simul concurrente, quam ex *tumore duriori abdominis*, sublatis hisce morbis adluc superstitæ, talesque obstructiones ordinariæ concomitante & indicante (§. X.), liquido apparet. Nondum vero tunc temporis obstructionem illam in scirrholam inclinasse aut degenerasse indolem, exinde concludere licet, quoniam partim transitus talis vix unquam adeo subitaneus est, sed longius communiter temporis intervallum requirit (§. XV.), partim tumida illa abdominis expansio, licet in totum auferri non potuit, tamen aliquo modo diminuta fuit, quod de vero scirrholoso haud sperandum est tumore, utpote qui, ob stagnantes humores crassos & viscidos jamjam exsiccatos & quasi induratos (§. cit.), nullam plane sui admittit diminutionem, sed potius ob adfluxum similium fluidorum a tergo continuantem, progressum autem plane impeditum, majora semper capit incrementa (§. XI.).

§. XXVI.

Quæ in puerili ætate dein priori malo successit, *Colica biliosa, molestis vomendi conatibus & tenemis stipata*, procul dubio obstructioni prædictæ magis increbescenti ascribenda fuit. Dum enim partes quælibet obstructæ temporis progressu, ob inductam fibrarum debilitatem & imminutam illarum resistentiam, magis magisque expanduntur (§. XIV.), visceraque vicina, ob molem partis auctam, pressionem molestam patiuntur (§. XIII.), hæc ipsa circa duodecimum præcipue, a magis expanso tunc mesenterio, procul dubio contingit, bilisque ex ductu cholesterico in illud defluentis ulteriorem progressum retardavit, unde illa copiosius ibidem collecta & commixtione cum aliis liquoribus, huc confluentibus, moraque diuturniori acrior reddita, stimulando & gravius irritando tam hoc ipsum satis sensibile, quam etiam, ex consensu, reliqua connexa tenuia intestina, tormina illa spasmodica & colica concitavit, quæ tamen, rejecta per vomitum saburra bilioso-

bilioso-viscida, plane iterum conquieverunt, manifesto satis documento, quod causa hæc materialis unice illorum intuitu in culpa fuerit.

§. XXVII.

Febres illæ intermittentes, tam quotidiana, quam tertiana, modo regulares, modo anomalæ, cessantes æque ac redeunt, in adolescentili ætate occurrentes, & ad virilem usque continuantes, tandemque in quartanam degenerantes, primo regularem & simplicem, dein duplicatam, non solum notabile tunc factum obstructionis in mesenterio jam præsentis incrementum, sed insuper quoque reliquorum viscerum abdominalium infarctum aliqualem, & functionum iisdem competentium gravio rem turbationem, per consensum inter has partes vigentem (§. XIII.) potissimum inductam, satis evidenter indicant, confirmantibus hæc omnia eo magis tam tumoribus pedum adenatosis, quam dolore obtuso, ex dextra hypochondriaca regione ad lumbarem & umbilicalem usque sese diffundente, qui, quoniam tandem unicum illis tumoribus iterum evanescebat, hepar inprimis tunc gravius adfectum fuisse indicabat.

§. XXVIII.

Ab eo autem tempore gravis illa & magis magisque subinde aucta mesenterii obstructio successively in scirrholam indolem degenerasse videtur. Quæ enim adpropinquante quadragesimo ætatis anno defunctum infestabat dirisima Colica spasmodico convulsiva, a magis nunc impedito progressu sanguinis per singula non solum abdominis viscera, sed præcipue per vasa mesaraica ad intestina excurrentia, deducenda erit, dum complures hinc inde factæ sanguinis restagnationes, vasa pariter ac inprimis membranas intestinorum, itemque nerveas propagines per mesenterium excurrentes & in annexos holce canales ex parte abeunt, distendendo, premendo, vellicando & irritando, ad vehementiores crispaturas & constrictiones istas summe dolorificas, partes has admodum jam sensibiles sollicitarunt. Sub inæquali ergo tunc reddito & vehementer turbato, per ipsum autem induratum & ad scirrholam indolem nunc vergens mesenterium plane fere intercepto humorum progressu, fieri aliter haud potuit, quin internus tumor magis sese diffunderet, adeoque abdominis expansio, durities & inæqualitas evidētissima in dies fumeret incrementa.

§. XXIX.

Sub his ergo circumstantiis dum copiosius congesti & stagnantes intra

intra scirrhum hoc viscus humores ex parte adhuc fluiditate sua non prorsus destituti erant, ulterius autem propelli non poterant, motus tandem intestinus vim suam evidentius exerebat, mixtionem illorum & cohesionem partium suarum naturalem penitus dissolvendo & ulcerosam corruptionem in interiori scirrhii substantia inferendo. Contigit hoc procul dubio circa finem quadragesimi secundi anni, quoniam paucis abhinc elapsis mensibus *febris* superveniebat *lenta*, manifestum de clandestina hac ulceratione jam facta testimonium ferens, quæ, quoniam nulla hic locum habebat corruptarum partium absterio & mundificatio, saniesque putrida, ex purulenta materia tandem corrupta genita, pedetentim cum humorum massa commiscebatur, illamque non solum inquinabat, sed & ad similem resolutionem corruptoriam disponebat, ultimis denique temporibus in veram *hecticam febrem*, omnibus suis ordinariis ac fonticis symptomatibus comitatum, transibat, sub qua dein miserrime huc usque excruciatu ægrotus e vivis tandem tolebatur, quoniam stupenda illa moles scirrhii versus diaphragma magis ascendens, liberum ejus descensum summopere impediebat, ut idcirco gravissima *orthopnea*, in lethalem transiens *catarrhum suffocationum*, tristissimam hanc clauderet tragœdiam.

§. XXX.

Ex his ergo probe inter se collatis circumstantiis manifesto nunc adparet, quod omnino in statu hocce truculento defuncti nostri docta plus valuerit arte malum. Licet enim alias quælibet viscerum obstructions non plane sint immedicabiles, sed in statu recentiori, & quando humores subsistentes non omni prorsus destituti sunt motu, medelam non raro adhuc admittant; in hoc tamen subiecto a primo initio morborum istorum quasi concatenarorum spem talem concipere haud licuit, quoniam atrophia, in prima ætate oborta, febrem statim lentam comitem habuit, causæque tam multiplices intuitu regiminis incongrui & prave diætæ, necessario statim in dies pejorem reddiderunt, confirmantibus id ipsum morbis subinde gravioribus se invicem per singulas vitæ periodos excipientibus. Ut autem completa tandem evadat ipsa superius adducta historia, paucis adhuc ea, quæ sub medendi methodo adhibita fuere, coronidis loco subjungere licebit.

§. XXXI.

Quamprimum de obstructione mesenterii oborta fuit suspicio, sub atrophia in ætate infantili sese manifestante, non solum convenientibus, quantum quidem in subiectis talibus, medicamenta sæpius
nauseant.

nauseantibus, fieri potuit, statim eidem occurrebatur remediis, sed & sub ulceriorum malorum exinde pullulantium progressu efficacissima resolventia, incidentia, attenuantia, demulcentia & roborantia, pro circumstantiarum & symptomatum ratione in usum vocabantur, veluti gummata, ammoniacum, sagapenum, galbanum, juniperi, saponis artificiales, tincturae ascalinæ, extracta amara, tam vinosa, quam aquosa, sub forma tam pilularum, quam elixiriorum viscerum, cum alcalisato menstruo paratorum; succi expressi herbarum recentium, acetosæ, uasturtii, tam hortensis, quam aquaticæ, chærefolii, beceabungæ, cochleariæ, endiviæ, trifolii fibrini, &c. cum jusculo carniæ, aut sero lactis exhibitum; juscula itidem medicata, ex prædictis herbis & radicibus recentibus, cichorei, taraxaci, graminis, petroselini, pastinacæ, scorzonæræ, fœniculi, &c. parata; porro radices imperator. vincetox. pimpin. albæ. serpentar. Virginian. herbæ marrub. albi, fumar. saponar. arnicæ cum floribus, cortices Cascariæ, Culilaban, Winteranus, aurantior. in infusis tam theeformibus, quam vinosis, itemque electuariis: portiones diapnoicæ, pulveres temperantes, digestivi, incidentes & resolventes, non neglecto etiam, convenienti adhuc tempore, aquarum medicatarum, Pyramontanarum præcipue, Egranarum & Selteranarum usu.

§. XXXII.

Alterantibus his & corrigentibus subjungebantur & interponebantur convenienti tempore evacuantia, tam per alvum, veluti salia fontium medicatarum, Sedlicense, Epsamense, Egranum, de Seignette, Rhabarbarum & radix ac resina Jalappæ; quam per diaphoresin & diuresin moderate operantia, non neglectis, pro ratione circumstantiarum urgentium, antispasmodicis & securis anodynis. His omnibus etiam convenientia jungebantur externa resolventia, discutientia, demulcentia, paregorica & roborantia, in forma fuculorum, tam siccorum, quam vinosorum, fomentationum, linimentorum & clysterum; item emplastra camphorata, veluti saponar. Barbette, diachyl. simpl. & compos. de gummi ammoniaco, de cicuta, de galbano crocatum, &c. cum oleo tartari fetido, aliisque destillatis in virtute sua magis exaltata. Tanto vero medicamentorum apparatu gravia illa & adeo complicata mala minime ad votum eradicari & tolli potuerunt, sed in sola palliativa acquiescendum erat curatione, donec hæctica randem febris & assiduis Medicorum laboribus vigiliisque, & miserrimæ tam diu excruciatæ ægrotantis vitæ, exoptatum imponeret finem.

CCLXIV.

ABRAHAM VATER

ET

JO. FRID. SCHIMMER,

DE

CALCULI IN VESICULA FELLEA GENERATIONE.

Witteberg. 1722.

Concreta illa solidiora & duriora, præternaturaliter in corpore humano generata, quæ calculorum nomine veniunt, licet nullibi occurrant frequentius, quam in viis, urinæ secretioni dicatis, renibus, ureteribus atque vesica urinaria, tamen etiam in aliis ejusdem partibus subinde reperiri solent, adeo, ut vix ullum ex nostris visceribus, & organis sit, in quo talia non fuerint observata. Etenim calculi originem suam trahunt, excrementis alimentorum crassioribus, tartaricis, quæ in primis viis a succo chyloso separari, aut, si cum eo ad sanguinem penetrant, in renibus ab eodem cum sero superfluo fecerni, atque e corpore educi debebant. Quod si vero cruditates istæ, ob vitiosam alimentorum digestionem in ventriculo & intestinis, & labefactas secretiones in visceribus, in corpore retineantur, istæ necessario ejusmodi concretionibus, in locis aptis, occasionem & materiam præbent. Quoniam igitur ad renes, ob arterias imprimis, respectu horum viscerum, præ omnibus insigniores, ex trunco aortæ egredientes, impuritates istæ parum digestæ, cum sanguine largius confluant, & in iisdem ab ipso separari, & e corpore expurgari debent, hinc facile patet, quare in viis urinariis calculi frequentius observentur. Nihilominus tamen fecies sanguis, per universum corpus circulo vitali circumactus, scoriis talibus repletus, illas ubivis seponere potest, ubicunque in corpore nostro secretio quædam præagitur. Præcipue tamen concretionibus istis favent cavitates, atque canalium secretoriorum anfractus, in quibus succi, e sanguine secreti, moram trahunt, adeoque

adeoque partes illas crassiores seponunt, & concreta talia firmiora exhibent. Eaque de causa vesica fellea, quæ humorem bitiosum, partibus salinis terreis crassioribus abundantem, colligit & asservat, non raro calculos in sinu suo fovet, unde plurima magna mala oriuntur. Quamvis autem calculi hi, in cystide generati, eandem originem & materiam habeant, cum calculis aliarum partium, causæ tamen speciales hic concurrentes, calculorum ipsorum diversitas, ac distinctus eorum concrescendi modus, specialem sui considerationem merentur. Quamobrem in præsentî, calculorum in vesica fellea generationem, causas, diversitates, modumque generandi, examinare constituimus, adjuti observationibus quibusdam rarioribus, magisque curiosis, calculorum singularium, a nobis aliisque in corporibus defunctis reperi-
torum.

Faxit summum munus! ut institutum hoc vergat ad sui gloriam, & agrotantium salutem.

Thesis I.

Quemadmodum calculi aliarum partium, singulatim viarum urinariarum, ratione numeri, coloris, consistentiæ, aliarumque circumstantiarum, innumeris modis inter se variant, ita non minus illi, in cystide inventi, admodum diversi observantur. Factum non raro est, ut tota bilis in vesica contenta, coagulata, unum calculum, totam cystidem replentem constituerit, qualia exempla Bonetus ex Fernelio, Henen, Scheffero, aliisque collecta in anatom. Pract. L. III. S. XVII. p. 324. & 326. recenset. Imo nullum est dubium, bilem concretam, induratione atque exsiccatione findi, & in plura frustula, tot calculos constituentia diffringi posse, uti docet exemplum, a Boneto l. c. allatum, ubi in foemina, ictero defuncta, plures calculi cærulei, splendidi, angulosi, reperti fuerunt, superficiebus ita inter se conjuncti, ut unicum calculum, totam vesicam felleam opplentem exhibuerint. Eadem ratione triginta calculos, a nobis quondam ex foemina, apoplexia defuncta exsectos, generatos esse, judico, uti expositum est in Dissert. nostra de bilis diverticulo.

Thes. II.

Econtrario sæpius contingit, ut calculi modo plures, modo pauciores in ipsa bile, in vesica contenta, generentur, quorum numerus nimum quantum variat. Interdum enim tantum unius, interdum

X x x 2

vero

vero plures inventi fuerunt, uti docent exempla ab Autoribus enarrata. In Actis Medic. Berolin. Vol. V. p. 90. describuntur & delineantur triginta & septem, ex illustri Baronissa, a vigesimo quarto foetu gravida, post abortum mortua, desumpti, coloris albi, variegati splendentis, (*weiss-marbrirt*) & alii, ad numerum quinquagenarium accedentes, e cadavere matronæ, iliaco morbo defunctæ. *Beckerus* Misc. Cur. Ao. 1676. septuaginta duos, *Cnaseius* Misc. Cur. Ao. 1673. nonaginta novem, *Joach. Camerarius* centum & quadraginta tres, referente *Schneidero* Diss. de calculo, centum & octuaginta unum in serenissima Principissa Baruthina *Stein* in Lithographia curiosa, observarunt, ex quibus apparet, quanta sit calculorum horum differentia, ratione numeri.

Thes. III.

Non minor calculorum deprehenditur diversitas quoad magnitudinem, figuram, colorem, atque consistentiam. Uti enim alii minores, ita tales figuræ rotundæ, ovalis, triangularis, vel polygonæ, pisa, fabas, tribulos aquaticos referentes, observati sunt. In Gazophylazio Regis nostri Clementissimi, aservatur calculus vesicæ fellæ, per alvum excretus, corculum referens, insignis magnitudinis, cujus quinque socii minores, in feminæ paulo post ejus excretionem defunctæ, cadavere in vesica fellea reperti sunt, ita figurati, ut videri possit, quomodo majori isti adhæserint. In eodem pariter Gazophylazio habetur calculus, colore cum chocolata, magnitudine & figura cubica cum tessera conveniens. Color calculorum cysticorum communiter observatur nigricans, flavescens vel viridescens. Calculos vesicæ fellæ, viridescences & maculis nigris interperfos, in corpore *Ziegleri*, Clarissimi quondam hujus Academiæ Jcti. inventos recenset *celeberrimus Bergerus* de Nat. Hum. C. XIV. p. 229. Alium lapidi hæmatiti similem totamque vesicam replentem, ex *Jac. Camericensi* refert *Sennertus* L. III. P. VI. S. I. C. 9. Pr. Duos alios insignes, figura, colore & magnitudine cum nuce mochata convenientes, ex corpore Hydropici extraxit *celeberrimus Heuchenus*. Interdum tamen cærulei, quorum meminit *Bonettus* l. c. imo, quod rarius, albicantes inventi fuerunt.

Thes. IV.

Inter illos, quos inter curiosa servamus, cystidis calculos, triginta illi, a nobis ex foeminæ corpore exsecti, quorum supra mentio facta est, nigricantes & politi, ob bilem autem croceam hinc inde in superficie adhærentem, ex nigro & aureo colore sunt variegati. Alium, eumque

eumque unicum, ex foemina, ascitide defuncta, exsecuimus, obscure viridescentem, ac subrotundum, superficie admodum aspera, & quasi villosa, praeditum. Possidemus etiam calculum vesicae felleae, ab aliis penitus diversum, substantiae calciformis, albissimum, levissimumque, ex viro, hydropo defuncto, desumptum. Sed peculiarem plane, eumque rarissimum, invenimus nuper in apertione viri, a multis annis affectibus epilepticis & maniacis afflicti, ac apoplexia subitanea intercepti. In hujus corpore, praeter alia, notatu digna, inter quae tota bilis pericardii cum corde concretio numeranda, vesica fellea bile crassissima & nigricante repleta, continebat calculum candicantem, pellucidum, ac striatum concretum, in cujus superficie strie salinae tenuissimae, micantes apparebant. Calculi talis cystici pellucidi mentionem quoque facit *Blegny Zodiac. Gall. A. I. obs. B. p. 95.*

Ibes. V.

Generationem calculorum, adeo diverforum, bili ipsi, & principiis in ea latentibus, adscribendam esse, quilibet facile videt. Hujus quidem crassities, visciditas, atque mucositas, concretionibus istis admodum favet, uti ex antecedentibus constat, notabile tamen est, quod in bile crassa & nigricante calculus albicans, transparent, generari potuerit, id quod certe unice principio salino adscribendum videtur. Neque enim semper in bile, utut crassissima, calculi reperiuntur, sicut etiam in hac concreta alia generari possunt. Hujus rei exemplum notatu dignissimum habetur in transactionibus Philosoph. Illust. Societ. Reg. Angl. n. 333. p. 426. a *Tungio* relatum. Hic in foemina ascitica, e cujus corpore successive, a 9. Martii, ad 30. Octobris, per paracentesin CCXIV. mensurae aquaeeductae fuerunt, post ejus mortem vesicam felleam, propter obstructionem ductus excretorii, summo opere extensam, tantae invenit magnitudinis, ut vesicam urinariam maximam bovinam excederet. Ponderis hujus vesicae biliariae libras decem cum duodecim uncis comprehendit, liquor vero contentus septem mensuras confecit, isque nigricans, & crassus, instar decocti coffee saturatissimi. In hoc liquore reperti fuere quamplurimarum membrulae, frustula intestinorum vel vesicarum dissectarum referentes. Quamvis autem bilis crassior ad concretiones tales apta magis sit, calculi tamen interdum in bile tenuiori, aquosa, nullatenus colorata, inventi fuerunt. Ita liquidum biliosum, calculos triginta septem, in actis Medic. Berolin. loc. cit. delineatos, continens, mucum lentum album & transparentem, bilis nomen non merentem retulit. Liqueorem ejusmodi aquosum, nullo modo amarum & biliosum, in vesica fellea, cum calculo, in ductu cystico haerente observavit celeb. Ruyschius, ut refert obs. LXXXVI.

X x x x 3

Lb:

Thes. VI.

Ex hæcenus enarratis, calculorum tam diversorum exemplis, sufficienter apparet, fundamentum eorum non tantum in bile crassa, mucosa ac viscida, quoniam tales etiam in bile tenui & aquosa inventi sunt, sed principio potissimum salino ac tartareo, in ea hærente, quærendum esse. Vidimus quidem superius, bilem ipsam lentam atque tenacem concreescere, ac exsiccatione in unicum calculum abire, eoque disrupto, quoque plurima frustula calculosa constitutere posse. Ista tamen bilis coagulatio sine principio salino & tartareo peragi nequit. Tales impuritates salinæ, terrestres, uti ex alimentis cum chylo ad sanguinem accedunt, ita ex eodem cum succis corporis nostri secerni ubicunque locum, concretioni aptum, inveniunt, & in coagulum abire possunt. Id autem in vesica fellea facillime contingit, quoniam bilis ex sanguine venoso & sæculento, per venam portæ, ex mesenterio & intestinis ad hepar allato, ibidem per ductus secretorios transcolatur, ac postmodum in cystide collecta diuturniore sua stagnatione, calculorum generationi occasionem præbet.

Thes. VII.

Elementa calculorum, uti reliquorum, ita quoque cysticorum, ex alimentis inprimis dependere, nemini potest esse obscurum, causæ vero ad eorum generationem disponentes, ex reliquis rebus, uti Medicis audiunt, non naturalibus, derivantur. Actum agerem, si omnes illas causas remotiores, ad productionem calculorum conducentes, enumerare vellem, quia hoc ab Auctoribus, inprimis a B. *Brendelio*, in *Lapidicina microcosmica* sufficienter est pertractatum, potiores tamen summam indicandæ erunt. Alimenta quidem præ ceteris cruda, difficulter solubilia, ac crassum chylum generantia, nec non potus talis crassus, turbidus, & stypticus, præcipue huc faciunt, nullum tamen est dubium, optima etiam alimenta, per vitiosas digestiones, in primis viis, & visceribus reliquis, degenerare posse. Reliquæ vero causæ non naturales, motus & quies, somnus & vigilia, animi pathemata, excretiones & retentiones, uti alias ad morbos generandos plus valent, quam ipsa alimenta, quatenus digestionem confundunt, circulum sanguinis turbant, & secretiones vitiosas reddunt, ita etiam plurimum ad calculorum istorum productionem faciunt.

Thes. VIII.

Clarius hoc ipsum patebit, si consideremus, in quibus subjectis tales calculi biliarii reperi fuerint. Sæpissime certe in vesica fellea tales

tales observati sunt, in iis, qui calculo simul viarum urinariorum laborarunt, ex quo manifestum est, non tantum causas horum esse communes, sed etiam scorbuticos, quorum humores salibus abundant, imprimis his esse subiectos. Quoniam vero humores tales sulini, acres, scorbutici, ex primarum viarum impuritatibus dependent, hinc suo quoque modo affectus hypochondriacus ad calculum disponit. Quemadmodum autem vitium primæ digestionis non corrigitur in secunda, ita quoque chylus crassus atque viscidus, cum sanguine in circulum actus, hinc inde in visceribus subsistit, & obstructions in extremitatibus generat, ac secretionem vitiat. Quod ubi in hepate aliisque partibus, ad secretionem bilis facientibus, contingat. hac denegata, bilis in sanguine retinetur, & icterum efficit. Obstructionibus vero viscerum, imprimis hepatis, sanguinis depurationibus destinati, successu temporis auctis, & in scirrhum abeuntibus, & turbata eo ipsa lymphæ secretionem, serum sanguinis tandem extra limites tendit & hydropem inducit.

Thes. IX.

Non igitur obscurum esse potest, quamobrem calculi biliarii frequentissime in iis, qui ictero, eoque inveterato & diuturno decesserunt, aut eodem ante hac laborarunt, nec non in corpore hydropes defunctorum aperto, inveniantur. Propterea tamen nullatenus necessarium est, eos, in quibus vesica biliaria calculos monstrat, brevi ante obitum ictero aut hydropes laborasse, eodemque defunctos esse, sicuti etiam non in omnibus, his morbis extinctis, tales reperiuntur. Matrona ista, in cujus cystide triginta calculi, supra memorati, a nobis inventi sunt, in medio quidem ætatis cursu, anno circiter quadragesimo, ictero atque melancholia hypochondriaca graviter afflicta fuit, haud dubie, ob calculos, eo tempore jam ibidem latentes, postea tamen ab iis morbis liberata, ad sexagesimum ætatis annum integra valetudine usa est, ac præterquam quod phlogosis, anxietatibus, ac animi commotionibus fortioribus, obnoxia fuerit, nullo graviore morbo laboravit, & tandem anno ætatis sexagesimo tertio, apoplexia decessit. Ita pariter vir ille, in cujus apertione calculum albicanem, pellucidum, & quasi crystallinum invenimus, per duodecim annos insultibus epilepticis, & maniacis enormibus, per intervalla afflictus est, nunquam tamen ictero, aut hydropes laboravit, sed accedente apoplexia, sine dubio ob serum intra cranium extravasatum, ac in cerebri ventriculis & basi repertum, morte subitanea interemptus est. Notabile tamen est, in ejus corpore, præter calculum istum, in cystide hærentem, & pericardii totalem cum corde

concre-

concretionem, nullum vitium manifestum deprehensum fuisse, cui tot tantaque mala, in vita perpeffa, adscribi possent. Cordis autem cum pericardio concretioni, anxietates & opprissiones cordis, de quibus continuo conquestus est idem, attribui debent, ob motum cordis liberum, eo ipso valde impeditum.

Theor. X.

Accedendum autem nobis est, ad concretionis hujus præternaturalis causam primariam, & efficientem, in cujus expositione cardo totius rei versatur. Non pauci fuerunt, qui comparatione inter macrocosmum & microcosmum instituta, eandem calculorum in hoc, ac lapidum in illo, generationis causam, spiritum nimirum gorgonicum & lapidificum esse, voluerunt. Sententiæ huic favere videntur, non tantum corporum variorum, in terris & undis petrefactiones, sed integrorum quoque exercituum, atque gregum, aeris lapidifici perffatione, in saxa mutatorum exempla, ab auctoribus allata, ac viscerum & foetuum humanorum, & brutorum, in corpore indurationes. Reperiuntur certe fontes, injecta omnia in lapides mutantes, eruantur quoque e terris ligna, cornua & ossa animalium, saxea duritie prædita, imò, quod magis mirandum, in cryptis subterraneis, qualis in Germania est celebratissima illa Baumanniana, qualesque in Ungaria plures, & inter has Czernaviensis, Benikovens, Oknensis & Stanovens, reperiuntur, in quibus, præcipue in Cyernaviensi amplissima, antrum nigrum vocata, atque e saxo exsudantes, & destillantes induratae, varias figuras, lusu naturæ efformatas, generant. Ex his nuperrime varia singularia, & admodum curiosa concreta, & inter ea tubulos tenuissimos albißimosque, crystalli instar transparentes, magnitudine calamorum scriptoriorum, ex his aquis formatorum, benevolentia Doctissimi Buchholzii, Rectoris Nagypalugienßis meritissimè, obtinui. Aquæ istæ lapidificæ nihil aliud sunt, quam liquores minerales salini, qui, accedente aeris pressione coagulantur & indurantur, neque exinde spiritum quendam lapidificum in corpore nostro demonstrare licet, quoniam concrectiones in hoc, per succos salinos e sanguine secretos, peccari possunt.

Theor. XI.

Principium igitur salinum omnium firmarum concretionum, uti in Macrocosmo, ita in Microcosmo, causa merito reputatur. Cui vero ex summis salium generibus; acido, an alcali? negotium hoc in corpore nostro tribuendum, admodum difficile est determinare. Acidum certe omnium firmarum concretionum & crystallisationum funda-

fundamentum esse, experimenta chimica docent, quoniam tantum li-
quores salini, de acido participantes, evaporatione crystallos generant,
alcalici vero, non nisi totam humidi abstractione, exsiccantur. Attamen per
experimenta, cum succis animalium ipsisque calculis, in iisdem generatis,
a curiosis instituta, nullum hactenus acidum ex iisdem elici potuit, tantum
abest, ut illud in humoribus sensibus deprehendatur. Ipsi calculi hu-
mani urinarii, destillatione spiritum volatilem urinosum præbent, re-
licta in fundo substantia levi, calciformi & friabili, cui idem spiritus
abstractus, vel alius urinosus iterum affusus, lapideam duritiem red-
dit, uti constat experimento Takenii, quod in Hipp. Chym. c. IV. re-
censet. Plerique tamen Auctores, ob causas gravissimas, generatio-
nem solidiorum ejusmodi corporum, a solo sale volatili urinoso, sine
acidi accessu, peragi posse dubitant, ac propterea acidum peregrinum,
ex primis viis accedens, & ad coagulationes disponens accusant, licet
tale per chimiam demonstrari nequeat. In ea sententia tanto magis
confirmantur, quoniam, imprimis acida & acescencia alimenta calculis
occasionem præbere, observatur. Ipsi nos urinas scorbuticorum, ar-
thriticorum & calculosorum, luci oppositas inspicientes, sæpe atomos
micantes & splendentes copiosissimas conspeximus, quales lixivium tar-
tari vitriolati, aliorumque salium enixorum, in crystallisationis puncto
constituta, oculis nostris exhibent. Sunt autem atomi scintillantes ni-
hil aliud, quam crystalli, incipiente cohesione salium generatæ.
Plura eam in rem addere possemus, nisi alia negotia hoc impeditent.

Thes. XII.

Restat tandem, ut paucis de diagnosi, prognosi & cura, calculi-
orum vesicæ felleæ agamus. Calculi isti, uti difficillime, & non nisi
probabiliter cognoscuntur, nisi tales per alvum secernantur, ita eo-
rum neque, ac urinariorum resolutio vix sperari potest. Quoniam vero
omnes calculos, ex alimentorum scorii crassioribus, in primis viis,
uti pat erat, non rite digestis & separatis, dependere vidimus, quales
ad locos minimi motus deponuntur, ut scite loquitur *Piscarnius*
in *Elementis Physico-Mathematicis* L. II. cap. 24. ibique gravitate
sua ad concretionem tendunt, cura præservatoria, in remotione cau-
sæ occupata, locum invenit. Hæc in eo consistit, ut abusus ali-
mentorum, ad calculum disponentium, videatur, rerum, ita dictarum,
non naturæ usus prudenter dirigatur, tonus viscerum confortetur,
& digestionis in primis viis, & ipso sanguine promoveantur, ven-ri-
culus & intestina ab impuritatibus liberentur obstructions viscerum
secretiorum prævacantur, aut tollantur, ac depurationes sangui-
nis restantur. Hoc autem, quibus remediis peragi debeat, præ-
sentis medici est judicare.

Disput. Medico-Præf. Ton. VII.

Y y y y

CCLXV.

C C L X V.

ANTONII DE HAEN
HISTORIA ANATOMICO - MEDICA
MORBI MIRI INCURABILIS.

Hagæ 1744.

HAud ita pridem vocatus fui ad fœminam quinquagenariam, satis torofam, fcorbuto lentiore laborare incipientem, menſtruo fluore à 45 ætatis anno carentem: corripuerat eam aſſiduus, iſque copioſus, albus fluor aliquot abhinc annis: qui ſimul ceſſarat integre ex quo deſcribendus mox morbus oriretur. Quum porro me accerſiret, dolorem totius abdominis conquerebatur, vinculumque ceu toti ventri circumſtriſtum, ac proſtratum appetitum. Debile micabant arteriæ, alvusque ſupra modum ſtipſica erat. Nec ignotus mihi peſſimus fœminæ mos, potibus ſpirituofioribus abutendi; quum jam tribus abhinc annis per aliquot dies ipſi medicus adfuiffem; licet quo tunc malo decumberet penitus oblitus ſim. Jam vero & maritus, clam, me monuit, uxorem ſpiritus deſtillatos deſtillantem, ad vini rubri adſtringentis abuſum peſſime deſlexiſſe; quam rem & ipſa ulto faſſa eſt.

Occæpi ergo abdominalium obſtructionem viſcerum cogitare, licet qualenam iſtud foret nondum mihi liquido conſtaret. Colon ſaltem ex indicatu narratuque patientis ſuas agebat partes. Dubium etiam numne ſtringens vinum, ſpirituum fermentatione paratorum abuſui ſubeuns, album fluxum penitus cohibuiſſet? Hincque interiora pejus eſſent aſſecta?

Deoppilanda ergo dum indicarentur viſcera, lenia primo deobſtruentia, lento ſimul ſcorbuto proſutura, præſcripſi. Sciſicet paraſitulas ex ſapone Veneto, Rheo, ſale tartari, polychreſto, & ammoniaci gummi. Quibus lente inciſa & diſcuſſa materics purgante ex theo, & manna expellebatur.

His equidem tantum de violentiâ morbi dentum fuit, ut medio Novembri patiens cum marito per binos ſibi ſubſequentes dies publicis ac ſolemnibus epulis interfuerit; licet ſero vesp̄a pejus haberet.

Verum

Verum paucis post diebus lumborum, ac lateralium abdominis partium subortu dolores. Urina parcior, ac sæpe nulla; quæ reddebatur subalba fuit, cum albo, tenaci, ac glutinoso sedimine. Nauseæ continuæ vomitusque. Lenta febricula. Nulla alvus. Quare ad culicam nephriticam cum videretur morbus accedere, præscripti Petri Foresti decoctionem cum manna folisque Alexandrinis, injecto prius, at frustra, enemate uno alterove. Resolventia quoque emplastra dolenti utrinque laterali abdominis parti adhibita sunt. At ne vix quidquam opitulante decocto, mire polthoc enemata profuere. Unde largiori exinde fluxor alvi, lotiumque paulo copiosius, rem sensim in melius mutaverunt.

At hæc tantum paucorum induciæ dierum; siquidem deinceps etiam cum copiosissima alvo omnia exacerbarentur & urina integre fere subsisteret.

Hanc ob causam, quum viæ lubricandæ, ac simul pellendum lotium indicari mihi viderentur, misturam præscripti ex aq. petresel. fœnic. syr. V. rad. ol. amygd. tinct. succ.; enemate subinde injecto, ubi alvus deerat. Misturæ usui interpolandum suasi subinde vini Mosellani vel Rhenani levioris haustulum. Leviam equidem hæc, ac brevissima, dedere solatia.

Quum vero malum continuo recrudesceret, atque vomitus frequentior, laboriosiorque indices contingeret, socius mihi Vir in arte clarus adjunctus est. Eo autem prima vice rem mecum examinante, minor ad lumbos, ad hypogastrica loca major dolor adfuit; ingensque deprehensa supra pelvim protuberans eminentia. Unde nata ipsi suspicio ne forte urinaria vesica lotium intra sese detinens dysuriæ causa existeret. Quæ res cathetere explorata falsus in opinione medicos docuit; paucis vix guttulis ex vesica deciduis.

Porro cum emendanda dysuria, ac metuenda hinc putredo corrigenda viderentur, præscriptum fuit apozema ex tamarindis, lapathio acuto, & polythresto sale. Inde quotidie, (scil. per iv. subsequentes dies) urina ad vii. vel viii. uncias demissa, crassa, cum mucoso, subalbido, inæquali, flocculento, sedimento. Alvus interim vix ulla; vomitus assiduus; & percepta ad vii. Decembris sicca dolorifica, vexans continuo, tussicula. Neque ultra vel hilum ventriculus detinuit; at eiecit quævis alimenta, vina, medicamina, ipsaque etiam opiata. Epithemata ideo applicata ventriculi regioni, cui rubræ Rosæ ac cinamomum incoxerant: sed vix juverunt.

Interim alia apparuit morbi facies. Tumor namque jam haud ita supra ossa pubis, verum ad binorum digitorum latorum distantiam supra umbilicum conspectus, in principio quidem parvus, nec multum distinguendus: at sensim magis magisque prominens, ad usque cartilaginem ensiformem: ita ut quatuor circiter pollices altus, & quinque pollices latus conspiceretur.

Y y y 2

Atque

Atque hoc circiter tempore tertius Medicus, ægrotantis Cognatus, consultandi gratia adfuit, sæpiusque nobiscum, quo toto tempore deum morbus perduravit, supra miserandam ægritudinem contulit.

Itaque rem serio volutantibus animo jecinoris affecti nata suspicio; quum & locus quodammodo id indicaret, & pressis hinc ventriculo Pyloroque, vomitus continuus oriri videretur. At nullus interim icterus; ita ut minus probabilis, hæcce videretur sententia. Jam iterum in pingue illud, quod circa orificium ventriculi iuvania opplet loca, fovendoque ac lubricando egregiam eidem opem præstat, conversi oculi: quippe plurimum eminebat is locus, & tumor per mox descripta divagabatur spatia. Præsto & exempla aderant famosorum in hac urbe virorum, quos, (ubi eadem symptomatum lerna divexati diu multumque fuerant,) tumor ibidem loci foras apertus ita percuraverat, ut illibata sanitate deinceps fruerentur.

Conspieuo ergo tumore, duroque, ac foras magis arque magis eminente, constantibus interim patientis viribus, communi consilio sancitum fuit ad maturitatem tumorem esse perducendum: cui scopo cataplasma profuisset, ni respuisset illud ægra: unde galbanum viello ovi solum emplastri applicitum forma. Obstinatam alvum eclegma ex oleo amygd. cassia & manna subinde solvit Quum appositum galbanum per vi. dies vix quicquam mutasset, impositum fuit cataplasma adornatum ex lini & althææ farina, oleo raparum, & galtano pulv. Hoc porro per sex alios dies adhibitum, fluctuantis in tumore materiei incrementum videbatur docere. Tumor sensim plus circumscriptos intra terminos definiri visus; ita ut cysticum esse passim asfirmaremus omnes. Advocatus quoque dexterrimus Chiurgus nostro rogatu uno alteroque die nunc jacentem ægram, nunc sedentem sedulo examinans, revera cysticum asseruit tumorem; ac qualem intra sese gereret materiem fæ adhucdum ignorare.

Utrumque ergo collabescere viribus incipientibus, aperiendi tumoris unanime votum fuit, idque esse instrumento *Troëquar* dicto peragendum; ut post educum instrumentum manente cannula commode exiret materies; locum autem esse eum qui plusculum mollescebat & eminebat, & minus discriminis a vasis hypogastricis ad mammas tendentibus dabat: scil. ad duos digitos latos a linea alba, & paulo infra spurias costas in latere dextro.

Quinta Januarii instiuta operatio fuit, ac mox penetrante instrumento rubella aqua vi profluit, ultra decem pintas. Flaccidior tunc tumor apparuit, neque tamen disparuit omnino; educæque cannula, abdomen lata constrictum fascia fuit. Cur vero educeretur cannula, hæc ratio fuit, quod materies educita haud admodum prognosi faveret, metumque incuteret ne quid intus monstri aleretur. Quin & re id poscente,

cente, facile aperiri denuo poterat locus. Interim lætitia ingens ægram perfuderat, quod multum se levare sentiret.

Redux ego cum Chirurgo octo circiter horis ab instituta paracentesi, lætam salutavi ægram, narrantemque audiui se jura carniū, se vini pauxillum, fumisse, nec revomuisse quicquam. Reddiderat urinam ulla absque molestia ultra femipintam, colore citream, minime turbidam: vires multo quam antea majores. Nox quoque subsequens solito tranquillior fuit: Ut profecto nonnihil spei animo reconderem fore ut utcumque convalesceret; licet aqua fusca rubella metum penitus haud excluderet.

Præter sitim paulo intensiorem die Januarii sexto omnia æque favebant. Siti moderandæ commendabam vini Rhenani aqua diluti usum. Madescere quoque hac die cœpta lintea atque emplastrum, vulneri imposita; vulneris autem ne minima quidem inflammatio.

At vero septima Januarii alia, eaque tristissima rerum facies. Abdomen æque fere turgidum, quam ante paracentesin; at intro contenta materies magis instar aquæ fluctuans erat. Totus humescebat lectus effluente perforamen humore. Vires imbelles admodum, constipataque cum tenefmo alvus. Urina parcissima, crassa penitus subalbidaque. Enormes vomitiones, sitis ingens. Ejulanti præ dolore tenefmode enemaque roganti, illud facile concessimus. At jam facile cernebamus omnes effectum quidem mali sublatum a nobis esse, causam vero neutiquam; hincque fœminæ summopere metuendum esse. Nec viribus prospicere erat, quum vix deglutita guttula mox ore redderetur.

VIII. IX. & X. Januarii, idem rerum status, majoresque angustiae. Gelidam ad usque situlas miserabili voce cum flagitaret, ad minimam guttulam assumptam illico rejecit. Vulneris necdum ulla phlogosis. Ichor tam copiosus adeo hisce diebus perfluxit, ut vel stramen lecto suppositum madesceret. Tandem inter inexplicabiles angustias, mente præfens, nocte media qua 12. Januarii inchoaret, animam ærumnis defatigatam Creatori reddidit.

Postera die nudatum corpus intuitus sum. Turgidulum erat abdomen, spumaque ore assiduo projecta faciem totam conspurcabat.

XIV. Januarii cadaver dissecuimus: ichore copiosissimo per foramen infimo ventri inflictum, prius educto, ne in dissecando turbarentur. Hujus copiosissimi equidem ichoris capere pontus mensuramque nequivimus, quia festinatu opus fuit.

Torofitas, hydropem *anasarca* minimè referens, attamen solito flacidior, toto in corpore deprehenfa. Ad abdomen paniculus adiposus aliis in locis pollicem, digitum in aliis, crassus visus.

Ubi quadrifariam divilerat abdomen scēlio crucialis, primo equidem intuitu videbamur videre ventriculum ipsum medio in abdomine

Y y y 3

ad

ad pollicis fere distantiam supra umbilicum. Verum attentius introspectentibus, quod ventriculo us credebatur esse, ipsum esse omentum evidenter apparuit. Illud namque suo loco hærens in tam compactam vastamque molem abiverat, ut duos digitos latus crassum fere ubique existeret, nisi quod in unum paululum gracilescebat. Tactus deprehendit nihil, præter vastam hanc ac femiputridam massam. Monstruosi hujus corporis ope ventriculus, ac colon, duodenum quoque ac jejunum, in unum coaluerant corpus; ut non, nisi destruendo, divelli a se invicem possent. Contractus admodum parvusque ventriculus. Pancreas scirrhosum. Hepar parvum magnum, scirrhosumque, accretum peritonæo fibris mollibus, facile dilacerandis, cætera durum tactu; sin vero vix ruditer attingeres, facile dividendum. Vesicula fellea cum plena, tum magna; adeo, ut in fundo pollicem, in collo digitum lata, integrum vero digitum longitudine æquaret. Intestina tenuia cum ventriculo, colo, epiploo in unum fere corpus coalita, spatium quam minimum occupabant; dum interea tota quanta capacitas peritonæi (præterquam quod cæcum, & colon a liene descendens, contineret) inanis erat & vacua: in qua profecto ingens illa aquarum copia hæserat. Cæcum porro ac colon, haud leviter, ut sæpe fit, sed tam firmissime erant peritonæo accreta, ut nulla vi, nisi destruente, separari possent. Fuscoruber intestinorum color: eorundemque durities coriacea, ut vel rudissimo tactui resisterent. Illud interim mirum quod peritonæum parte anteriore, qua viscera spectat, parvis rotundulisque scirrhulis hirtum instar corii *Sagryn* dicti ubique conspiceretur id autem sub diaphragmate minime. Mephitis adeo teterrima nares affecerat, ut vix triduo posthac avolaret. Quæcumque viscera contrectabamur, mucos tenaci, lubrico, putrido, quasi perlita, deprehendebamus.

Exercitationis gratia queritur.

- 1^o Quænam fuerit morbi causa remota?
- 2^{do} " " " proxima?
- 3^{io} Quæ origo variorum in eodem observatorum phenomenorum, nempe,
 - A. Vomitus?
 - B. Urinæ suppressæ vel difficilis?
 - C. Alvi obstinæ?
 - D. Doloris?
 - a. In superiore abdomine?
 - b. Ad lumbos?
 - c. Ad ilia.
 - d. Ad medium infimum abdomen supra pelvim?

E. In-

- E. Insomnii ?
 F. Frigoris ?
 G. Tussiculæ ?
 H. Accretorum sibi invicem viscerum ?
 I. Hirti peritonei ?
 4^{ta}. Cur omnes decepti fuimus ?
 5^{ta}. Quænam ex his in praxi utilitas elicienda ?
 6^{ta}. An errore nostro citius perit ?

Quæ causa morbi prædisponens fuit ?

R. Menstruorum cessatio hic utique non consideranda erit, ea siquidem ad 45. ætatis annum perdurarunt, quo tempore in plurimis innoxie cessare consueverunt. At vero quod iisdem cessantibus nunquam sibi venam pertundi voluerit, ut ipsa mihi retulit, hoc forsitan citra culpam non tulit: sed de his nil certi scimus.

Abusus autem spirituum fermentatione paratorum inter primarias causas referendus: hi namque spiritus

- 1^o Motum humorum augendo liquidiora dissipant, sicut crassiora.
- 2^{do}. Quum vitæ viribus non superentur ipsos humores acres reddunt.
- 3^{to}. Insinuando se inter solidarum partium interstitia, has solidescere faciunt: quo autem sunt minora vasa, eo pejus malum; nam omnia rigida fiunt.

Ab omnibus hisce causis solida magis magisque rigescunt, & spissescunt fluida. Augetur hujus mali gradus, quo spirituosorum abusus diuturnior ac copiosior sit. Si simul hinc ingens acrimonia oritur, augebitur humorum motus, & tenerrima vasa facile franguntur. Tum & in vasis minoribus arteriosis obstructio fit à crasso fluido, tranare per vasis angustiam non potente. Liquida quoque denuo ingesta & vasis excepta, spissis & quasi solidis humoribus vix miscentur, sed per Regin, Diapedesin, &c. teneriorum vasorum in cava corporis depluunt. Obstructio porro magis apta nata est fieri sub diaphragmate, quam supra illud: quum juxta leges hydraulicas minus mobilia, adeoque vi cordi projectili magis resistentia, in aortam descendentem intrent.

Quæ causa morbi præcatartica ?

R. Vini robri adstringentis creber ac diuturnus abusus. Ubi enim primo spiritibus destillatis corpus adeo a sano degeneravit, vinum præterquam quod sit notabili alcoholis copia refertum idem sequitur faciat, quod

quod maturius efficiunt spiritus) vinum, inquam rubrum partibus suis terreis, adstringentibus dictis, increasando humores, obstruendo vasa, ipsaque vasa in sua substantia solidiora reddendo, forsan effecit ut, præter morbi ipsius incrementum, albus quoque fluor subtiliterit. Is enim cessavit ex quo morbus, prout a principio depingitur, abortus fuit.

Albus itaque fluor (ut in foeminis spirituosorum usus deditus observatur) in ejusmodi corporibus oritur, eo quod humores eum in modum crascescunt, ut cum iisdem intime misceri ultra nequeant alimenta aquosiora. Ergo vappida, inertia, minimeque globosa, vi cordis systolica ad superiora ferri inepta, per aortam descendentem, imo & per ejusdem rantes a centro motus remotiores amandantur, atque ita per uterina vasa, utpote fluxui humorum cedere apta nata, de corpore eliminantur.

Qui porro vappidorum humorum e corpore secessus sæpe hisce foeminis admodum fortunatusprehenditur: quum, eo cessante, vel insausto medicamine curato, diutius observetur contingere Hydrops; materie jam intra corporis depluente cavitatem, vel assusa visceribus. Hicque profecto nostræ fuit ægrotx status.

Olei autem a sanguine secretio interim hic videtur expedita fuisse: quum corpus externum adhuc satis torosum manserit, ut supra innuimus; & maxime constitit in Portentoso Omento, quod, ut sui muneris est, oleum a sanguine cæliaco continuo quidem exceperit; verum id obstruendo jecinori tradere impos, in tam immensam excreverit molem.

Unde vomitus ?

℞ A pressio, adeoque se ob enormem hepatis omentique, atque aquarum molem, explicare nequeunte ventriculo.

Cur suppressa Urina ?

℞ Ab ingenti pressione effusorum humorum ad renes, pelves, ureteres, imo & in ipsam vesicam.

Cur segnis adeo laboriosaque alvus ?

℞ 1^o Ab eadem causa.

2^{do} Ut locus pro locandis hydropicorum aquis sæpe varius observatur, ita hic aqua, maxime hærens ab umbilico ad usque pelvim, sursum truserat omnia fere intestina: quæ sic exiguo reclusa spatio in motu suo peristaltico admodum impedita fuere.

3^{io} Intestina diu hærentia in effusis intra abdomen humoribus, sæpius

sæpius observavi, nedum flaccida, sed plane coriacea esse; quia & transpiratione propria naturali, & incubante rore, qui in cavis corporis semper præsens est, caruerunt; quod plane hic contigit: itaque sic sensum imminutus fuit, quem peristalticum vocamus, motus.

Quenam doloris origo in epigastrio?

℞. Arcuissima hepatis, lienis, pancreatis, ventriculi, omenti, horizontalis partis coli, omniumque tenuium intestinorum, in sese mutuo appressio.

Unde ad lumbos dolor?

℞. A vi ingenti qua moles aquarum in musculos Psoas, quadratos lumborum; in nervos lumbares, renes, pelves, ureteres, ac diaphragmatis appendiculos, incubuit.

Cur idem ad ilia?

℞. 1°. Ab eadem causa.

2°. Cæcum intestinum hinc, illinc colon a liene descendens atque in rectum abiturum, lata basi adeo firmiter peritonæo cohererant, ut nulla inde vi avelli possent. Vis itaque aquarum peritonæum vehementer extendens, simul extendit accreta colon & cæcum: unde profecto ingens, ac fere dilacerans dolor nasceretur oportuit.

At cur jacens ægra, adeoque inferiore abdomine minus extenso, similis dolor?

℞. Eo in situ humores effusi intestina aliaque abdominis viscera, una cum diaphragmate, sursum trahere: unde colon & cæci sacculum puncto fixo accreta violente trahi, elongari, ac fere dilacerari, necesse fuit.

Quamobrem subinde acute doluerit in medio hypogastrio supra pelvim?

℞. 1°. A pondere incumbentis aquæ in hunc locum.

2°. Assumendum hic quidquam videtur, quo hunc nodum extricemus. Etenim spasmodica contractio videtur statuenda esse, quæ epigastrium hoc eodem tempore compresserit; nam ipso tactu epigastrium tunc minus turgens apparuit: sicuti in solutione argumentorum p. 15. fere ad finem patebit ejusmodi.

Disput. Medico-Pract. Tom. VII.

Z z z.

advisæ.

adfuiffe constrictiorem in hypogastrio, quæ aquam per vulnus determinavit: tunc enim temporis intuebamur abdomen inferiore parte parum admodum tumidum.

Quare vero tunc vix ullus ad ilia dolor?

R. Moles eadem hoc tempore sæpe tam fortiter compressit ilia, ut sensus eorumdem obscuratus fuerit.

Atqui cur eodem tempore in sola media parte prominulum hypogastrium?

R. Crassa intestina utrinque accreta & connata peritonæo rigida ita & coriacea fuere, ut impedimento essent, ne abdomen iis in partibus tam violenter extenderetur.

Cur fere omnia abdominalis viscera sibi invicem accreta firmissime?

R. Quia etiam ante hydropem natis ubique obstructionibus deficere debuit blandus ille ros, quo solo impediuntur vicina sibi viscera inter sese concrefcere. Id ubique observatur in corpore; maxime in pulmonibus: qui utcumque leviter obstructi, tamen cum membrana succingente costas passim concreti observantur. Vesum præterea ipsa viscera seu in ipsa sua substantia, seu ab acri allabente lymphæ ichoreve in sua superficie corrupta ac tabida, quam facillime cum vicinis similiter affectis coalescere potuerunt.

Unde perpetua insomnia?

- R. 1^o. Ab acris humoribus per metastasin ad superiora raptis, adeoque encephali partes tam teneras jugiter irritantibus.
2^{da}. A perpetua jactitatione corporis in alium atque alium situm, præ enormibus anxietatibus, vomitibus, &c. &c.

Cur frigus?

R. A lentore quo humores per vasa undique pressa circuierunt, nam a motu calor est.

Unde inanis molestique tussis?

R. 1^o. A compressis thoracis visceribus præ mole abdomine contentorum.

2^{do} A

2^{da}. 'A metastasi acris putridæque materiei in pulmones; unde & scirrulos ibidem nasci oportuit.

„ *Quare insinatis refertum scirrulis peritoneum?*

R. Ab eadem metastasi.

„ *Quibus ob causam omnes tantopere allucinati simus?*

R. Ob tumorem conspicuum, sub cartilagine xyphoide eminentem, ac tumorem cysticum plane referentem. Ut ut enim examinabamus semper deprehendebamur

1^o. Ipso adpectu magis eminens.

2^{da}. Ipso tactu distinctissimus.

3^{io}. Lenem semper materiæ fluctuationem exhibens.

Atqui tamen ipsum illum tumorem omentum fuisse, vero quam simillimum sit.

1^o. Namque majorem epigastrii protuberantiam intestina tenuia, sursum pressa, effecerunt.

2^o. Epiploon, binos crassum digitos, his in unum compactis intestinis incumbens, protuberantiam vehementer auxit.

3^{io}. Figura hujus crassissimi epiploei in cadavere prorsus eadem deprehensa est, atque tumor, qui falso credebatur saccatus esse, in vivente exhibuerat.

Obijcies: tunc nunquam fluctuatio constans percepta fuisset.

R. Quoad fluctuationem, sancte testor eam ita fuisse, ut si hodie ad similem calum vocarer, iterum illico fluctuationem definito coërcitam loco videri affirmarem: attamen imposuit nobis.

1^o. Protuberantis enormiter orienti figura.

2^{da}. Ejusdem lenis ad percutientem manum recessus versus latus: oppositum.

3^{io}. Crassities panniculi adiposi eo loci, distinctam rei perceptionem præpediens.

4^{to}. Aqua forsân peritonæum inter monstruosumque omentum, fluctuantis materiæ similitudinem augens.

Instabis. Si sic se habuisset res, utique aqua fusco-rubella minime tam violenter, tamque copiose effluxisset foramine superiori epigastrii loco intruso.

R. 1^o. Paracentesis facta est sedente in lecto ægra: atqui tunc inferior abdominis pars ad femora pressa impediabatur, ne multum prominere: ergo vis tota aquarum versus superiora determinabatur.

Zzzz 2

2do. Con-

2^{do}. Constrictio spasmodica, in his sæpe observanda ærumnis, & de qua pag. 12. sermo fuit, pro causa assignari potest, cur inferne parum, superne plurimum, abdomen prominuit. Eaque profecto per aperturam aquas determinare debuit.

Instabis secundo. Longe facilius exponeretur casus dicendo adfuisse omenti hydropa, atque tum paracentesi facta profiliisse aquas.

— R. 1^o. Vulnusculum nullum in omento observatum est, quo loco facta paracentesis fuerat; quod tamen apparuisset, si hinc dimanasset scaturigo.

2^{do}. Quum eo usque canula infixæ haud fuerit, aqua ex vulnerato omento in cavum peritonæi dilapsa fuisset; neutiquam vero mox ab inflicto vulnuscule ita profiliisset. Nullibi enim erat peritonæo accretum epiploon.

3^{io}. Longe angustior ex determinata figura erat omenti capacitas quam ut decem integras humorum pintas contineret.

4^{to}. Crassioris ac semicorruptæ pinguedinis ingens adeo massa fuit in omento, ut nullum pro locandis aquis spatium superesset.

Undenam profilienti aquæ rubedo ?

R. A sanguine ipso, qui postridie manifeste in urinis deprehensus est. Is enim neutiquam vulnere facto creatus; siquidem vulnus neutiquam ad vasa hypogastrica mox ad mammas abitura, pervenerit. Dein æqualis, intimeque permixtus aquæ sanguis apparuit, dum exiret. Ergo videntur vasa viscerum, præ lymphæ, cui innatabant, acrimonia, erosa ac semilacera sanguinem profudisse.

Cur post operationem perenne rubellæ lymphæ stillicidium ex loco paracenteseos ? imo Et breve ante mortem ingens fluor ? tum in cadavere operiundo tanta denovo ejusdem copia ?

R. Perpluere pergunt vasa lymphatica perrupta, erosaque sanguinea, ubi semel continuitatis eorundem solutio facta est: idque eo abundantius, quo aquarum moles, quæ viscera vasaque corrupta adhuc sustentat, magis sublata est: sublata enim ea, flaccescunt omnia & tabescunt. Fascia quoque lata abdomini circumstricta collectam materiem versus aperturam determinavit.

Quenam ex narratis utilitas elicienda pro praxi Medica ?

R. 1^o. Ingens improbumque assiduo studium operamque navandam esse, ne humi unquam corpora mandentur, quos insoliti vis morbi sustulerit, ni prius probe explorata sint.

2^{do} Mi-

- 24^o. Miros fallendi modos Naturæ esse, dum externa species hunc, internus autem conspectus omnino alium morbum exhibet.
- 31^o. Ridiculus, imo nefandas esse Practicorum dire inter sese belligerantium digladiationes: quæ sæpe tanto crebriores & odiosiores, quo difficilior, ac magis dubia res est. Hic etenim obtineat aurea oportet regula Angultini.

*In certis unitas,
In dubiis libertas,
In omnibus charitas.*

An vero patiens errore nostro citius perit.

32. Minime, saltem non multum. Siquidem nec alimenti, nec potulenti, nec medicamenti titulo assumere quicquam valens, nec somnum oculis unquam videns, corruptaque tot nobilia viscera habens, brevi, certo, misereque interierit, necesse fuit.

Non fingendum, aut excogitandum; sed inveniendum quid natura faciat, aut ferat. Baco Verulam.



CCLXVI.

HENRICI FRIDERICI DELII

ET AUCTORIS

J. GUIL. FRIDER. BOENNEKEN

HYDROPS ASCITES IMPRIMIS PARACENTESI
FELICITER CURATUS.

Erlang. 1755.

CASUS MEDICO-PRACTICUS.

Religiosus quidam canonicus regularis ordinis Augustini in Monasterio Heydenfeldensi, per aliquot annos dicto loco œconomiz præfectus, ætatis suæ annum agens quinquagesimum quartum, temperamenti chole-
rico sanguinei, sanitate, ab incunabulis fere fruens illibata, incidit tem-
pore vernali anni MDCCCLIII. in febrem remittentem, ex intermittente
& continua scilicet conpositam, quæ tunc temporis in civitate Suisfur-
tensi, & circumjacentibus agris, permultos interfecit homines. Adhi-
bitis, nonnullis, nescio quibus, variorum medicorum consiliis, & re-
mediis, hæc in quatuordecim, per aliquot menses durantem, est mutata,
quæ vero tandem profligabatur. Paulo vero post reverendus Dominus
canonicus pedes suos circa tarsum, metatarsum, malleolumque, vesperi
præsertim, intumescere, tumoremque de die in dies augeri, & ad ge-
nua, femora, imo abdomen denique, ascendere animadvertit, quo, mu-
nus jucundo, adspectu perterritus, meum adiit venerandum Parentem
D. JOANNEM WOLFGANGUM FRIDERICUM BOENNE-
KEN, Serenissimi Principis de Löwenstein Wertheim Consiliar. aul. & Ar-
chiatrium, nec non senatorem & Physicum ordinariam Civitatis Imperialis
Suisfurtensis, quem, ut omnem, ne conclamatum ac famosum medico-
rum scandalum, metuendus scilicet hydrops, inde oriretur, impenderet
operam, enixe rogavit. Hic, cum exploratu difficillimum ipsi esset opus,
utrum anceps hoc symptoma, a febris perversa medicatione, sive a
vitæ diætæ & regiminis post superatam febrem, plus justo citius com-
missis, suos ceperit nitales, aut ipsam revocare febrem, aut incipientem
glandularum mesenterii obstructions referre, medicamentis ægerienti-
bus,

bus, abstergentibus & resolventibus, interpositis alvum laxantibus, rite contendit, quam medendi methodum per aliquot menses, sed præ dolor in cassum, continebat. Tumor enim pedum oedematofus femorum ac abdominis quotidie gradatim accrescebat, tantusque subsequente mense Januario sequentis anni aderat, ut crepaturam inimi ventris Dominus ægrotus metueret. Superiores vero corporis partes, caput, thorax, humeri, brachia & manus successive emaciabantur, simulque præcordiorum angustia, spirandi difficultas, tussiculosa commotio, agrypnia & impotentia in lecto cubandi, pulsusque febrilis, ac æstus in volis manuum, genarumque rubor, præcipue post passum, hæcticæ febris accelerantis prænuntia, præsto erant signa. Rebus sic stantibus, & cum omnia hucusque exhibita medicamenta resolventia, & fortia satis diuretica v. g. ex rad. vinetoz. piup. alb. aron. squille gent. rubr. herb. absinth. fumar. trifol. fibr. summit. cent. min. bacc. junip. cineribus genijæ junip. stipit. fabar. tartaro vitriolato maceratis per aliquot horas in l. q. aqua bened. Angl. l. oſtracodermatum fervida, affuso, post ejus refrigerationem s. q. vini boni veteris, porro spiritus tartari, pulveresque ex antipafiu. arcan. dupl. & coccinell. compositi, interpositis simul laxantibus, speratum non efficerent effectum, hinc mortem certo certius brevi esse secuturam, quilibet etiam artis haud ignarus cognosceret, venerandus meus parens de paracentesi abdominis cogitabat, illamque ut ægrotus, priusquam venis penitus essent exanthæ, & visceris cujusdam interni labes irreparabilis otiretur, admitteret, auctor erat. Vitæ prolongandæ spes, licet dubia, & desiderium cunctis mortalibus innatum, nostrum Dominum ægrotum, adslipulante simul perquam gratioso & amplissimo collegii Heydesfeldensis Domino præposito, ceterisque religiosis confratribus suadentibus, dato consilio obtemperare coëgit. Preparato itaque per septimanam ad operationem futuram corpore, ipsa hac die X. Februarii anni MDCCCLIV. sub Numinis Divini auspicio, me ipso præsentem & adjuvante, dirigente vero patre, a Suinfurteni, in operationibus chirurgicis satis exercitato, Chirurgus quodam, in sinistri lateris eo loco, qui medius est inter umbilicum & spinam supremam ossis ilei, ope ferramenti, fistula argentea cincti, quæd Galli Troicar vocant, ita instituebatur, ut, prævio, moderata ambulatione facta, corporis motu, dein domino ægroti in lecti spondam, in situm fere horizontalem collocato, tumore a dextro versus sinistram latus manibus compresso, & fascia sursum elevato, instrumento in ventrem dimisso, acue extracto, prima vice octo mensuræ, die duodecimo Februarii autem, ex relicta in ventre fistula instrumenti argentea, & probe munita, iterum aperta, mensuræ quatuor cum dimidia, tandemque tertia & ultima vice tres quadrantes mensuræ, aquæ pellucidæ, citrei coloris, & saporis salis urinosi, detraherentur, cum subsequente singula vice abdominis tumidi detumescencia, ad quam juvandam, nimiumque hepatis & diaphragmatis in abdomen descensum, quo expiratio impediti, hinc

mors subitanea accelerari solet, præcavendam, totum Domini ægroti abdomen cingulo molli, sed satis forti, cingebatur, arctiusque de die in diem, pro re nata, constringebatur, cum euphoria Rever. ægroti. Hac ratione educatæ sunt libræ triginta & una aquæ, nec ullo symptomate sub vel post operationem ægrotus noster est vexatus. Hoc equidem notandum, quod post alteram aquæ emissionem aliquoties vomitum cum prægressis & concomitantibus solis incommodis expertus sit: materia autem quam evomit, erant reliquiæ ovorum duriorum allatorum, indigestorum, quæ vesperi ante primæ operationis diem, comederat, quibus excretis optime iterum se habuit. Interea præscribebantur Domino ægrotato a parente carissimo medicamenta refocillantia, analeptica, & resolventia v. g. potiuncula, ex aqua hordei citrat. verben. flor. cordial. cord. temp. tarax. c. vino. cinam. f. v. rinf. flor. bellid. mixt. simpl. & Syrup. rub. id. cet. compositæ, deinde diætâ tenuis, cibi molles euchymi, & eupepti, permissio pauxillo vini rubri. Post hæc per aliquot septimanas aqua taraxaci vinosa, rinf. antim. & solis tart. ad lymphæ viscidæ resolutionem & urinæ largioris effluxus promotionem, opumo cum effectu usus est ægrotus. Alvus etiam sui officii interdum pilulis balsamicis, & laxantibus admonebatur, & ad restituendum tonum cutis musculorumque abdominis, intumescencia prægressa nimis laxatorum, imponebantur sacculi, ex herbis resolventibus & tonicis, v. g. RAD. figill. solom. bryon. caryophyll. lupulater. ind. flor. HERBIS abrotani. aneth. calamith. lavendul. major. meliss. puleg. salv. absinth. vinc. pervine. SUMMIT. organ. flor. balauj. cheir. calendul. beton. anthos. sem. fœnic. petrosil. auc. siler. ment. irroratis cum spiritu lavend. anthos. lil. conv. mastichin. matricali. sambuc. scipilli comin. spir. vini camph. &c. compositi, & calefacti. Licet vero sacra operatione omnis abdominis tumor hydropicus evanuerit, tamen tumor pedum oedematofus per aliquot temporis spatium adhuc pertinax persistebat, usque dum adhibitis balneis vaporosis, spiritu vini accenso institutis, & imposito emplastro resolvente Rustingii, tandem plenarie quoque disenteretur, & hic Deo benedicente Rev. Canonicus Regularis pristinam suam sanitatem recuperaret, qui adhuc, dum hæc scribo, non solum pancreaticæ vivit, sed & officio suo, quod religiosum decet, nec non muneri œconomico, uti antea, viribus constantibus præest, & ne vestigium quidem tanti morbi in ejus corpore animadvertitur, sed potius jurares, nunquam ejusmodi morbo periculoso, mortis tam propinquo, itum laborasse. Cum vero ut testis ocularis, operationique & medicamentorum applicationi intersvens, a perquam gratiofo & amplissimo domino præposito Canonice Regularis Heydensfeldensis, nec non venerando Parente veniam impetraverim, hoc casu speciminis inauguralis edendi causâ decenter uti, ideo ipsum ex variis aliis elegi, quem jam pro virium meorum tenuitate succincte illustro.

CCLXVII.
FRIDR. GODOFR. BARBECK
ET
ERH. BRUNNER
DE CORDE OCCULTO,
INDEQUE HYDROPE ASCITE CONSEQUENTE.

Cultro Anatomico in subjecto quodam deprehenso.

Duisburg. 1701.

§. I.

QUONDAM inter Ethnicorum sacra, bruta animantia, consecrando offerebant, quibus tanquam donis Deos suos placare studebant, tum quoque ut eorum haruspices ea viscerum brutorum inspectione uti Prophete praelagirent, ac pro viscerum & extorum situ vario, defectu aut absentia, prospera aut infausa futura praedicarent, gratam aut ingratam fuisse oblationem judicarent, uti in eorum haruspiceina fieri solebat: Sic SÜETONIUS refert Lib. 1. ab haruspice cordis defectum in bruto inventum fuisse, cum inquit, eo arrogantie progressus est, ut haruspice tristitia sine corde exta sacro quodam nunciante, futura dicere latiora cum vellet, nec prius ostento ducendum si pecudi cor defuisset. Sic Avicenna pronunciat quandoque animal corde carens compertum, et testatur Coel. RHODIGINUS Lib. 4. Cap. 16. A. I. PLINIUS hist. nat. Lib. II. Cap. 37. recenset, quod, Caesari Dictatori, quo die primum cum veste purpurea processit atque in sella aurea sedit, sacrificanti bis in brutorum extis cor defuit, inde questio magna de divinatione argumentantibus suborta, potuerint sine ulla viscere hostia vivere an ad tempus amiserit. Sic refert Fabric. HILDANUS Centur. 4. Observ. 51. quod extenuatum & exsangue aliquando viderit cor. Quod in nonnullo diuturno morbo extincto, nulla prorsus portio cordis sed ejus tantum tunica reperta fuisset, testatur TRILESIUS rerum natural. Lib. 52. 28. Haec & similia &

Disput. Medico-Pract. Tom. VII.

A a a a a

inpri.

imprimis illa, quæ observata sunt inter Ethnicorum Sacra, dum bruta animantia offerrent num contigerint ex sacerdotum illorum & haruspicum, in secundo ignorantia? aut quod pinguedine tale viscus testum aut occultatum fuerit, aut potius quod adfuerit dolus, ego in medio relinquam: Saltem hic observationem quandam anatomico - practicam multis doctioribus testibus comprobata proponam, in qua *cor humanum, in pectore occultum ac plane absconditum fuit.* Sequens enim est ejus historia, prout diligenter quantum tunc explorare potui, eam verbis designavi.

§. II.

„ Viri cujusdam triginta & aliquot circiter annorum, corpus ex
 „ hydrepe mortuum, & antea variis conflictatum symptomatibus, cul-
 „ tello anatomico viscera visendi, & causam morbi explorandi gratia co-
 „ ram, nonnullis Doctissimis Viris & Medicinæ Cultoribus aperuimus.
 „ Et in pectore a nobis observata sunt sequentia: Pulmones rudes erant,
 „ conglobati ac conglutinati, non in partem dextram nec sinistram ne-
 „ que in lobos distincti, nec mediastini beneficio adhærebant sterno, sed
 „ ei sua substantiæ propria accreverant. Color pulmonum a naturali re-
 „ cedens, ad cinereum defluebat. Quocunque modo volveretur pul-
 „ mo, nullum apparebat cor, intra pulmones enim conglobatos, ita
 „ erat occultum & sepultum, ut sine sectione, nullo modo in conspe-
 „ ctum veniret, ideo quamprimum pulmones accretos a sterno solvi,
 „ nec pulmonum in partem dextram & sinistram divisionem, nec eo-
 „ rum lorum separationem, nec cordis vestigium reperire potui, do-
 „ nec cultero pulmones dissecando, in medio eorum, cor latitans mollius,
 „ tenuius, & flaccidius, nullo pericardio aut ejus humore præditum,
 „ inventum fuerit, sed connexum & annatum, tota sua substantia intus
 „ pulmonibus, uti recens nux juglans juncta est ubique cortici viridi am-
 „ bienti. Cum itaque pulmones æqualiter in duas partes divisissem, quo-
 „ que in qualibet ejus parte, mediam cordis dissecti partem, firmiter
 „ ubique adhaerentem conspeximus, ita enim annatum erat cor pulmo-
 „ num substantiæ, ut nullibi ab iis divulsus esset. In abdomine magna
 „ aque quantitas continebatur, quæ in cochleari super ignem efferve-
 „ sca, non ut ferum sanguinis, instar albuminis ovorum, concresebat;
 „ peritonæum crassius & durius apparebat & quasi ex tuberculis granulo-
 „ rum instar ibidem existentibus, asperum erat. Ipsa viscera abdominis
 „ uti lien & jecur membranam rugosam & quasi elixam nacta erant. „

§. III.

Ut autem concretionis hujus, cordis cum pulmonibus, & ipsorum conglotationis & conglutinationis, tum ipsius hydropis ascitis causam inve-
 vestige-

vestigemus, primo perpendenda sunt antecedentia prægressa in hoc nostro subjecto tum consequentia quæ exinde deducta, examinanda sunt: Dum denique considerandum est, num isti affectus tam ventris mediæ seu thoracis, quam infimi seu abdominis, tam diversi, a se invicem dependere potuissent? Hic vir antequam tali vel simili affectu fuit correptus, sanus extitit ac in tegendis ædibus, tegulis, scandalarium egit, ad quem laborem suscipiendum non nisi corpora sana apta sunt. Sed hic vir in urbis alicujus incendio, quæ propemodum tota conflagraverat, multis laboribus tum ignem exstinguendo, tum bona civium in locum tutiorem deportando & ex incendio liberando, multum defatigatus fuit, ac tum propter æris & incendii æstum insolitum, plurimum calefactus, dubio procul assatim potum frigidum ubinam nancisci potuit haurit. Post hoc incendium male habere semper cepit, an autem tunc decubuerit me latet, continuo autem conflictatus fuit postea variis symptomatibus, imprimis pectoris angustia.

§. IV.

Ex uno morbo alium nasci ac produci quandoque etiam deteriorem in confesso est apud omnes Medicos, morbus enim vel terminatur plane in sanitatem, dum ex malo penitus æger convalescit vel morbus ægrum ad vitæ finem & quandoque per plurimos annos comitatur, vel morbus in alium degenerat, uti cum aliquando in leviolem, aliquando in pejorem transeat, demum morbus prior alium affectum in socium sibi asciscit & in perniciem corporis humani cum eo conspirat, licet sæpe loco distent, uti hic factum fuit in hoc subjecto.

§. V.

Qualis autem hic prior morbus & malorum sequentium causa existerit, facile palam fieret, si omnia symptomata quæ in hujus morbi toto decursu, acciderunt, accurate observata fuissent, nam cum per octennium hic æger multis conflictatus sit malis, nec adeo prospera usus sit, post incendium, sanitate, adstantes de hujus valetudinis adversæ conditione, pauca accurate recensere potuerint. Ad eas tamen aliquantulum vires post illud incendium rediit, ut matrimonium iniverit, in quo tamen prospera sanitate non gavisus fuit. Si vero aliquid hic conjecturare, imo certo statuere liceat, judicaremus, præcipuum & primum hunc affectum pulmonum fuisse, dum imprimis circa mediastinum, pulmones in dextram & sinistram partem dividens, aut interiorem eorum faciem adfuerit excoriatio, ab humorum stagnatione ac erosione orta, is enim calefactus æstu & labore, potum frigidum large sumsit, unde sanguis alli-

A a a a a

que

que humores copiosiores, tum in vascula sanguifera, tum in lymphatica pulmonum superficiem, pericardium & mediastinum perreptantia, adducti, ob frigus a potu, vel etiam a pectoris denudatione productum, coagulati & stagnantes acriores relictii, cum vel sine inflammatione, pulmones, imprimis superficiem in media ejus parte, ipsamque mediastinum & in eo formatum pericardium ac tandem ipsam cordis superficiem anteriorem corroserunt. Quæ tandem excoriatio, vi naturæ siliubris & ad consolidationem proclivis, dum aliarum partium, tunc temporis, temperet bona existente, concreveret, ut partes hæ consolidarentur, ac inter se invicem conglutinaurentur, dum erosum pericardium, cor & loborum pulmonum interna seu intermedia superficies, unirentur, & pulmones quoque non mediastino ut naturaliter, sed sua substantia, præternaturaliter sterno adhæserint.

§. VI.

Tales enim pulmonum cum pleura & costis, in uno pectoris latere, aliquando in ambobus & toto pectore, accretiones non raro præternaturales, animadvertimus; de naturali & in robustis sæpe subiectis repperito, pulmonum per fortissimas fibras tanquam totidem ligamenta, cum costis connexu, hic nobis sermo non est: Verum advertimus quandoque in sectione humanorum mortuorum corporum, pulmones totos, sua externa superficie adhæsisse pleuræ & costis, ut hic adhærebant sterno. Sic in corpore alicujus juvenis, qui dudum ante in pectore fauciatu erat, vulnere tantum ad costas usque penetrante, ex alia læsione longe post mortuo, pulmonem isti lateri antea fauciato firmiter annexum reperi, quamvis hic juvenis ex primo isto vulnere non decubuerit graviter, nihilominus superficies istius pulmonis & pleura concreverunt; juvenis enim is robusti temperamenti fuit. In alio subiecto, pulmones solidiores ita adhæsisse ubivis pectori ut in avibus, nec solubiles nec mobiles animadverti, sed saltem ad pectoris motum in ex- & inspiratione inflari potuisse.

§. VII.

Hoc observatione dignissimum erit in pectoris vulneribus examinandis, num in pectoris cavitatem & pulmones usque penetrent? Solent enim tunc flammulam candelæ cereæ vulnere soluto adhibere, ut pulmonum effusum & aëris in- & egressum experiantur, seu quod & respiratio paululum difficilior fiat, vulnere in pectus penetrante, aperto & dissoluto, quoniam tunc aër in cavitatem pectoris per vulnus & non ita in pulmones per asperam arteriam ingreditur. Verum vero fallax illud est.

est in his sæpe signum, in quibus pulmonum substantia vel saltem eo in loco ubi vulnus inflictum sit, costis adhzreat, tunc enim aer per vulnus factum, neque in cavitatem pectoris in- & egreditur, neque ex pulmonibus solidioribus aer tam copiosus expellitur.

§. VIII.

Uti pulmonum superficies externa, pleuræ accrescere, ut quod quotidiana experientia docet, possit, sic nonnunquam licet tamen rarius & cum majori periculo, pulmonum partes seu lobi dexter & sinister in superficiebus interioribus, quibus sese contingunt, excoriati concrescere queunt ac conglutinari. Quamvis in uno saltem lobo seu pulmonum parte, initio fuisset illa labes, & excoriatio, nihilominus propter contiguitatem, ut in putrida accidit materia, contagium vicinæ parti, tum pericardio & corâ communicari & aspergi poterat, dum postea, naturæ vi, & in partibus his, existente ac permanente adhuc vi balsamica, consolidatio & conglutinatio facta fuerit, quod quamvis rarissime contingat, hic tamen accidisse, testis a fuit ipsa autopsia oculata, & impostum ulterius probatur fumus. Attamen ex harum partium nobilissimarum & principalium præternaturali concretionem, nonnisi mala conformatio, perversarum actionum tanquam causa certa orta fuit, ut inde nihil nisi misera vita exoriri poterit. Cor enim cum pulmonibus fons est caloris innati ac laticis omnis nec non sanguineæ massæ receptaculum, officina nutrimenti purpurei pro toto corpore necessarii, hinc si in tali aliqua parte mala sit conformatio, mirum quaque non erit, ut illa labes toti afficeretur corpori, & quidem multo facilius, circulationis ope.

§. IX.

Verum, opinabitur quis, pericardium & cor ipsum, vita adhuc persistente ac durante, non potuisse ita arrodi ac excoriari, quin statim mors fuisset infecuta, hinc GALENUS in Comment. 2. Lib. 6. Epid. cap. 14. statuit quidem cor inflammari posse, sed non nisi morte insequente, quando inquit, *Cor si phlegmone corripitur lethale*, & ex Aphor. Hipp. 18. Sect. 6. Cordis vulnus absolute lethale indicatur. Respondetur, hanc pulmonum & cordis læsionem non tam certo, inflammationem seu phlegmonem fuisse declaramus, sed potius, quod acris materia ex quacunque causa orta, vel catharrus acer, aut talis lymphæ, harum partium superficieria, externe alas, membranas huncclans, ex diætæ viio, nimioque labore ac calore cum insequente subitaneo & extraordinario frigore stignans, siue vera inflammatione internam pulmonum seu loborum & cordis superficiem & pericardium & mediastinum arroserit, uti

A a a a 3

sæpe

sæpe advertimus ab acri materia, in paribus externis, sine inflammatione corrosionem evenire. Sic experimur quoque, pulmones ex catharro acri, continuo, ruente, paulatim sine inflammatione exulcerari, & phthisi oriri.

§. X.

Ut enim fiat inflammatio, id est calor cum rarefactione & putrefactione in sanguine stagnante, debet sanguis ille solvi in sua principia ac putrefieri, ut denuo ejus sal volatile oleosum, cum acido resoluto congregiens, calorem excitet & inflammationem producat. Si vero propter austerum aut acidum copiosum, sanguis non sit tam facile resolvables, sed fixior, non tam facile inflammatur ac putrescit, hinc in scirrhis humoribus & ex melancholia oriundis, stagnat quidem sanguis sed absque inflammatione. Ideo HIPPOCRATES Aphor. 36. Sect. 6. asserit, quod *Acidum eructantes non admodum pleuritici fiant*, quandoquidem ob hanc sanguinis constitutionem; is, licet in pleura & pulmonum superficie stagnaret, non tamen adeo inflammaretur.

§. XI.

Porro dubium nonnullis apparebit, qui potuisset cor, quod continuo in motu est, cum pulmonibus, qui itidem continuo agitantur, crescere, ut hinc quoque cordis & pulmonum vulnera lethalia, curatu difficilia judicentur. Verum experientia testatur, pulmones, licet in inspiratione continuo commoveantur, costis posse sæpe tanien accrescere, ut modo antea demonstratum fuit, & eo facilius hoc fiet, si vis naturæ, & temperamentum reliquarum partium bonum adsit, ac caro ad consolidationem valde sit proclivis, idcirco rarius hoc esse exemplum, aethopsia inventum, statimus. Absque dubio, non aliunde illa peregrina & mala, talium principium parium, constitutio & conformatio evenire potuit, quam ab illa excoarctatione & accretione explicata: Non enim congenitum illud malum fuit, tunc non ad tantum robur, ut se ad tale opus peragendum, applicasset, pervenisset, quin diu ante valetudinarius aut æger fuisset, quid enim, mala figura aut constitutio organica in paribus principalioribus mali efficiat, satis in capite seu cerebro patet, ejus figura ut plurimum, in desipientibus male conformata est.

§. XII.

Quod autem pulmones inflammari vel etiam saltem excoarctari queant, extra dubium positum est, & docet quotidiana experientia; Quod etiam in intermediis lobis inflammatio illa accidere possit, seu saltem humo-

humoris acris stagnatio & membranæ exterioris excoriatio, quoque experientia optima rerum magistra confirmat, cum dolor in peripneumonia jam modo magis internus sit, jam magis versus sternum appareat, jam magis versus partem inferiorem sentiat, quod periculosus, quoniam tunc malum, contactu ope, ad diaphragma serpit, & ex hoc, propter ligamenta ad ipsum hepar tendit, pluresque partes ita graviter afficit.

§. XIII.

Sæpenumero, imprimis ex potu frigidissimo largiter hausto, in calescente corpore, interiores pulmonum partes & superficies affici & infici possunt, dum ibidem vascula ob calorem externum & laborem, materia copiosiori, eo versus agitata, turgent, quæ ob potum frigidorem, per oesophagum transeuntem, ob viciniam coagulatur ac in motu suo sistitur atque obstruitur, unde stagnatione acrior reddita materia rodit, ac excoriat sæpe, cum vel sine inflammatione, pulmones, nam non raro, ob potum frigidissimum assumptum, nonnulli absque inflammatione rauci fiunt, difficultate respirandi ac quodam pulmonum dolore afficiuntur. Oesophagus enim, cum transeat per pectus, prope spinam dorsii, ex necessitatis usu coactus, jam paululum dextrorsum sinistrorsumque flectitur, ac per medios pulmones incumbentes transit, adeoque facile frigus potus, propter vicinitatem, dum per oesophagum transit, pulmonibus communicatur, ut materia lymphatica aliaque, in membranarum superficie existens, frigore insolito affecta, stagnans, pulmonum, pericardii & cordis arrosionem & excoriationem efficere possit. Sic experimur sæpe, si gelidorem hauriamus potum, frigus insolitum per totum pectus spargi, ipsumque cor quoque occupari, cum alteratione corporis summa.

§. XIV.

Pulmones & cor sic affici & inflammari posse, nonnulli veteres scriptores, inter quos est Princeps Medicorum antiquissimus, HIPPOCRATES, asserunt, sic in *coacis prænotionibus* scilicet. 2. art. 4. hic ait frequenti modo: *Quibus autem una cum corde pulmo totus inflammatur, ita ut in latum incubat, ii toto corpore nervorum resolutionem sentiunt, & sine sensu jacent æger frigidus: secundo autem, aut tertio die interit: Pergit porro; quod si contingat, ut cor nihil tale quicquam, aut etiam minus patiat, diutius vivunt, nonnulli etiam servantur.* Sic Columbo Cremenensi, anatomico Romano innocuit, ex anatome abscissus, cor ferè præterseus undique circumplectens, uti in Lib. XV. anatomi rarior. refert. Quando vero HIPPOCRATES & GALENUS aliique veteres medici, pulmonum phlegmonem, judicant lethalem, non absolute mortem præsa-

præfagiunt, lethalitytis enim dantur gradus, ut primo affectus absolute lethalis est, a quo nullus servatur, secundo a quo multi moriuntur, nonnulli tamen servantur, tertio, inter morbus lethales quoque annumerantur ii, ex quibus promiscue servantur multi, multi etiam moriuntur, & tunc lethale periculosum esse significat.

§. XV.

Quæstio hic duplex formari posset, de aqueo humore in corde existente. Primo: Quod ille liquor cordis gratia, ad ejus fervorem seu potius ariditatem temperandam, & fibrarum flexibilitatem conciliandam, summe necessarius sit, nihilominus hic defecerit? Resp. autem, quod is humor abfuerit, vita etiam non integra manente, nam continuo adversa valetudine variisque symptomatibus afflicti fuit, ita Columbus, citatus Italus anatomicus. *In mortui studiosi anatomia Romæ advertit, pericardium defuisse, qui antea in vita, subinde mortuo similis, in syncope incidere, quo genere morbi quoque examinatus fuerit.* Sic humor hic pericardii, ad sanam vitam ducendum, absolute necessarius est, quamvis misera quandoque sine eo protrahi possit vita. Porro, pulmonum involucro ac connectione, ariditas & siccitas cordis paululum in nostro subjecto, temperata fuit, nam alias cor, cum fons caloris sit, plurimumque caleat, in externa superficie aridissimum fieret, nisi humore illo pericardii continuo humectaretur & inningeretur, uti experimur, quod cor animalis alicujus liberatum a pericardio expositumque aëri calidiori, subito arefcat ac rufum fiat.

§. XVI.

Quæri posset deinde, ubinam manserit humor ille pericardii, corrosio pericardio, cur non fluxerit in pectoris cavitatem, ac ibidem continuo exstillans ac roris instar manans, hydropem pectoris effecisset? Resp. Quod quidem pericardii humor peculiaris aliqua lymphæ sit, continuo in- & egrediens per vascula advehentia & reforbentia, quod constat ex humorum aliorum conditione ac similitudine, nullus enim liquor in corpore humano otiosus seu quiescens existit, quin motu gaudeat progressivo & circulari, si enim talis humor qualiscunque sit diu stagnaret, a temperie sua solita recedendo, corrumpetur, hoc enim in humoribus cunctis patet, dum nonnulli acidiores acerbioresque fiunt aut acriores, alii nunc subtilis, dum motu vario particule multe sese invicem poliunt ac comminunt, ista stagnatione, redduntur, in aliis humoribus flagrantibus ob figuram particularum ad motum ineptam, & crassitiem, & ob motum progressivum intermissum, fit concretio & viscositas, quam aliquando in-

sequi-

sequitur nova resolutio, ac putredinis initium, tum ob poros quosdam angustiores solum relictos aut factos, materia ignea, universalis rerum corporearum aërix seu mundi anima, copiosior accedens, resolutionem novam, fermentationis aut putredinis adminiculo inducit. Sic videmus aquam fluviatilem ob motum progressivum non putrescere, sed stagnans viscida sæpe numero fit, ac postea, æstate imprimis, putrida reddita, multorum sæpe morborum causa existit, dum aër ita inficitur, hinc oppida & urbes circa magnas paludes sitæ, insalubres sunt, & multis morbis ac febribus putridis, aëstu summo existente, vexantur. Sic si hæc aqua ex cordis superficie & ejus basi glandulisque minutissimis exstillans, in pectoris cavitatem depluisset, illa tamen denuo ab aliis poris, meatibus, seu vasculis in pectore existentibus, resorberi potuisset.

§. XVII.

Nam in ipsa pectoris cavitate pori seu vascula sunt resorbentia; pulmones enim & diaphragma & pleura ut moveri, explicari, complicari-que queant, continuo, quoque humore quodam inungi ac humectari debent, qui cum semper novus accedat, uti antea probavimus, humores omnes circulare, & tamen humor talis non continuo augeatur, nec prior in nihilum abeat, ergo quantum accedit novi liquoris, tantundem, ut per alia vascula regrediatur necesse est. Nisi hæc fieret pulmonum humectatio atque inunctio externa & interna, ob insignem pectoris internum calorem, subito exarescerent, ut amplius in ex- & inspiratione tam commode explicari & complicari nequirent, quod tamen ad vitam sustentandam humanam summe necessarium est. Pulmonum enim substantia, præter vasa & membranas, vesicularum minutissimarum congregatio & conglomeratio est, quæ in respiratione, aëris in- & egressu expanduntur & contrahuntur, unde non infrequenter *Dyspnææ* causa oritur, dum viæ illæ seu meatus exigui, per quos aër in vesiculas has penetrat, sunt obstructi, compressi aut constricti. Sic ad hunc morbum proclives aërem crassiores aut atomis tanquam flosculis aut pluvialis refertum, ferre non possunt, quoniam tunc particule hæc crassiores per angustos illos meatus transire non possunt. Quæ etiam *Dyspnææ* causæ, ortum suum ex vesiculis his non satis benigne humectatis & inunctis, & non facile explicabilibus, ducit, qualis *Dyspnæa*, in valde senibus sæpe accidit. Per hos meatus reducentes & humores in pectore superfluos resorbentes, hic humor si quis exstillasset, potuisset quoque resorberi, alias si talis humor pectoralis, pulmones, cæterasque partes, alias modice inungens atque humectans, majori copia affluat, quam refluendo consumatur, tunc paulatim accrescit, & cavitatem illam aqua replet, hydropemque pectoris producit, qui tamen quoque contingere posset, si vascula illa resorbentia sint obstructa,

aut si alia advehentia aut lymphatica, aquam transferentia, exesa ac diarrhesi affecta sint, ut humorem præternaturaliter in cavitatem exstillent.

§. XVIII.

Deinde in ista cordis cum pulmonibus concretionem, vascula illa lymphatica, per quæ in pericardium humor destillabat, consolidata sunt, ac usu suo privata, hinc cor in statu suo naturali non existens, continuo quoque molestiam experiebatur summam, ut & respiratio ob convolutos, concretos & densatos pulmones minusque explicabiles, *Dyspnoea* causa existeret. Sanguis quoque cum pulmonum officio, pro toto alteretur, & in naturali statu hominum extra uterum existentium, omnis sanguis transeat per pulmones; sic procul dubio etiam sanguificatio in hoc ægro vitata fuit, cum illa pulmonum operatio adeo necessaria, non rite perfecta fuerit. Quemadmodum enim communis fert sententia, quod primæ concoctionis vitium, non facile emendetur in secunda, & hujus labes neque in tertia coctione ita dicta corrigi possit; sic vice versa, vitium tertiæ concoctionis (liceat ita vocare) facillime communicatur secundæ & primæ concoctioni, hinc vitata illa in corde & pulmonibus sanguificatione, & motu sanguinis læso, procul dubio cæteri humores mali producti sunt. Quid enim agitatio & motus valeat in rebus & liquoribus multis separandis & mutandis, multæ chymicæ & pharmaceuticæ operationes docent; hic vulgare saltem exemplum, butyri ex lætis cremore conqussatione confectionem proferam, quæ si impetuosior plus justo aut lenior sit, butyrum non bonum, aut non colligitur.

§. XIX.

Quoniam itaque in pulmonibus & præcipue in corde ita sanguis movetur, commiscetur, alteratur ac preparatur, ut postea aliis in visceribus facilius secreta & excrementa sua deponat, procul dubio, ex tali vitio organico, tam cordis quam pulmonum, sanguificatio adeo vitata fuit, ut postea bilis in hepate, non rite, & lege naturali conveniente modo segregaretur, unde duplex fuit natum vitium; primo enim cum bilis tanquam condimentum aromaticum & calidum, per ductum choleodochum chylo, in intestino duodeno, affundatur, ut naturalis ejus viscositas attenuetur atque tollatur, aciditas nimia infringatur, illud ob bilem non rite preparatam & segregatam, quoque non contigit, unde & chyli & humorum reliquorum viscositas & acerbitas aucta fuerit. Deinde cum in hepate non legitime, sanguis, sale volatili biliifero antea ibidem volatilifato ac dulcificato imbueretur, sanguis quoque viscidior & tenacior redditus est, nam hujus salis volatilis oleosi blan-

diffimi,

diffini, qui tanquam spiritus sanguini inhæret & hujus respectu bilis amara in intestina excernenda, excrementum est, sed corpori humano imprimis chylo magnam utilitatem afferat.

§. XX.

Quandoquidem pituita tenax crassaque materia, in varias corporis partes deducta est, etiam varice obstructions, imprimis in hepate exortæ sunt, quoniam saburram sanguineam ex ventris inferioris partibus seu visceribus pluribus redeuntem recipit. Nihil enim frequentius est, quam quod *hydrops* ex hepatis obstructione ortum ducat, vel ut eam comitem habeat, sunt enim in hepate, circa venæ portæ ingressum, plurima vasa lymphatica, ligatura circa portam injecta, in brutorum vivorum sectionibus manifesta, quæ si obstructa sint ut turgeant & rumpantur, aut ab acrimonia acri stagnante erodantur, aqua contenta in ventrem paulatim extillat, unde tum incipit in *ascite* tumere. Uti enim hydropicorum membra externa fissuras aliquando agentia, aquam fundunt, sicuti vidimus aliquando scrotum in hydrope & hydrocele guttatim magnam aquæ copiam sine ulla aliqua solutione continui visibili, reddidisse, ut æger præ madore continuo, decumbere vix ausus fuisset, sic etiam cum viscera ventris ita aquam fundunt, *ascites* oritur, seu ventris inferioris hydrops.

§. XXI.

Num hepar ex vasis lymphaticis hic dictis, ex ipso hepate prodeuntibus, tum ex lymphaticis vasis, hepatis superficiem subtiliter perreptantibus, obstructis, tantus tumor aquosus fieri possit, ut hepar particulariter. Sicut in hydrocephalia cerebrum tumescat, quæri possit? ad hanc sententiam inclinare videtur Hipp. Aph. 55. Sect. 7. quando ait: *Quibus jecur aqua plenum in omentum eruperit, his venter aqua repletur & moriuntur.* Resp. Turgere posset hepar non saltem aqua, sed sæpe, hidatides seu vesiculæ plurimæ, aqua plenæ, in hepatis superficie exoriri possunt, dum nonnulla vascula lymphatica ita obstructa, ut turgeant, ac continuo, nova aqua succedens, in tantam molem & capacitatem vasorum lymphaticorum membranas extendat, ut vesicas repræsentent, & hæc vasa sic obstructa, seu tales vesiculæ, si rumpantur ad omenti locum, seu ejus viciniam, aqua in ventre colligitur ac tumor inde oritur, & tali in casu ut plurimum moriuntur: Quoniam talis hydrops ex nobili viscere notabiliter laeso ortus, lethalis est, hinc ut plurimum hydrops cum hepatis scirrho seu obstructione incurabilis judicatur.

B b b b b 2

XXII.

§. XXII.

Non opinamur tamen, sola ex hac causa seu vasis his obstructis & ruptis oriri hydropem ascitem; verum, in abdomine cum vasa lymphatica frequentissima sint, ut & in eo, circa vasa spermatica copiosissima, uti ligatura eorum in vivis animalibus clarissime demonstrat, reperiuntur, talia quoque in aliis abdominis locis, & utero muliebri vasa, lympham vehentia, frequenter sunt conspicua. Nam hic est confluxus plerorumque rivulorum lymphaticorum, tum copiosi tales rivuli aqua splendidissima gaudentes, ascendentesque ex partibus corporis inferioribus & lateralibus, receptaculum commune chyli & lymphæ paululum infra diaphragma situm, ingrediuntur. Hæc vasa quocunque in loco cum obstruantur, aquam in abdominis cavitate detillando, ascitem & ventris tumorem producant. Mesenterium, plenum est vasorum lymphaticorum, & dubio procul, ejus venæ lactææ, vasa sunt lymphatica, quæ aliquando chylum, semper autem lympham vehunt chylum diluentem, ut etiam de ductu chyliifero certo asseritur; is enim non saltem lympham ex receptaculo chyli haurit, verum quoque rivuli lymphatici a latere continuo in eum intrant, unde quam facile quoque hydrops pectoris, ex horum vasorum lateralium in pectore existentium obstructione & ruptura explicari potest.

§. XXIII.

Quod de humectatione & inunctione pectoris benigna diximus, simile de ventris cavitate asserendum est, quod scilicet intestina ceteraque abdominis viscera & omentum & diaphragma in parte concava, qua abdomen respicit, & peritonæum, humore aliquo benigno iungi debeant, ne calore crescant; in estina enim & ceteræ partes, calore tunc intergo quam externo aridæ fierent, nisi contingerit talis perpetua blandaque humectatio. Et ut dictum fuit, quod vix humor in corpore humano stagnet, quin corruptioni sit obnoxius, & cum non in nihilum redigatur, tantundem semper humoris a vasculis resorbetur, aut in auras evanescit, quantum de novo accedit. Si vero plus aquæ in Ventris cavitate ingredatur, quam regrediatur, aut si tenacior sit, aut pori, aut vascula obstructa, ut penetrare ac regredi nequeat, tunc aqua hæc paulatim accrescit, stagnatione corrumpitur, ac hydropem *ascitem* producit. Sic ex plurimis causis, propter partium in ventre existentium copiam, *ascites* ortum suum ducere potest.

§. XXIV.

Causæ tamen omnis ascitis efficientes sunt, lymphatica vasa turgida & lymphæ effusio: quando enim vasa lymphatica, vel ex glandulis

culis conglobatis ortum ducentia, vel tanquam peculiaria vascula excernentia, ex glandulis conglomeratis orta, vel propter obstructionem rumpuntur, aut ab acri materia eroduntur, aqua destillat, aut quocunque modo in cavitate illa prieternaturaliter cumulatur, eritque hydrops. Adeoque pituita, aliaque crassa viscosa materia, vasa lymphatica, seu talia quæ aquam vehunt, facile obstruuntur, ut lymphæ turgescat, seu per poros penetrare non possit, unde ob sanguificationis læsæ vitium sæpe oritur hydrops, hinc *Galenus* in Comm. 31. Aph. 12. Sect. 6. Statuit *hydropem fieri, cum sanguinis generatio vitietur, ac bona intermittatur preparatio*. Mirum itaque non fuit, in hoc ægro, propter vitium in principalissimis partibus organicis exortum, sanguificationem ita læsam fuisse, ut cæteri humores omnes, imprimis lymphatici, viscosi ac vitiosi redditæ fuerint, qui facile vasorum imprimis lymphaticorum obstructionem efficerent; præsertim, cum sæpe, ob malam dietam, tum ob aeris injuriam, aliasque causas procatacticas, tanquam occasionales, præsumere, seu causa antecedens, & mala partium dispositio in actum deducatur: apud hunc enim ægrum, absque dubio, cum propter valetudinem adversam non continuo laborare ac aliquid ad sustentationem luctare potuerit, res angusta domi fuit, unde tum mala dieta, tanquam tenacissimæ materiæ causa secuta est, unde obstructiones in vasculis minutissimis, & hydrops ortus fuit.

§. XXV.

Durior erat peritonæi membrana, sicut contingit, ut plurimum in hydropse, ob continuum aque crassioris & sæculentæ contactum, idem testantur Authores multi, de pleura, quod durior solet esse in thoracis hydropse, tam provida videtur esse natura, ut partes affectas, adversus malum intentum muniat. Viscera abdominis, cum præternaturaliter in aqua stagnante & acriori fluctuarent, mutata multum sunt ac vitata, præcipue tamen secundum suam superficiem externam. Sic præter diaphragmatis superficiem abdomen respicientem, *peritonæum, hepatis, lienis, vesicæ, pancreas, receptaculum chyli, mesenterium, intestina* & quoque in sceminiis *uterus & vasa sanguifera* in abdomine contenta inficiuntur, ut nemo non videat, quantum mali ex tali copiosa aqua in ventre stagnante & putrescente, vitæ intentetur. Hinc est quod paracentesis, id est abdominis per tubulum aculeatum sinistro in latere, una palma ab umbilico, & infra eundem apertio, parum profit, licet aqua per vices tantum, secundum *Hipp. mandatum Aphor. XXVII. Sect. 6.* notatum, educatur quoniam ut plurimum, priusquam ad talem operationem accedatur, omnia alia remedia fru-

B b b b b 3

stra

stra tentata, ac ita modo temporis diuturnitate ac immodica illa aquarum flagnatione, viscera corrupta sint; si hæc paracentesis, quamvis rarissime feliciter aliquando succedat, dum aqua in illa secundum artem paulatim depromatur, malum tamen plerumque postea redit, dum istius salientis aquæ fons præternaturalis non oppressus ac obturatus sit. *Ma paracentesis* plus utilitatis afferet, si aqua illa inter abdominis musculos, aut inter musculos illos & peritonæum saltem hæreret, sic enim salva manerent abdominis viscera reliqua, verum tum potius ad anasaræ speciem pertineret hic hydrops, quia prudenti medico facile, alijs signis adhibitis & quoque tactu dignosci potest, atque tunc sæpe in umbilico protuberantia est, ac ibi exitum querit aqua, quæ tunc aliquando feliciter, si caute fiat apertio, sic educitur.

§. XXVI.

Hæc hydropicorum aqua non est serum sanguinis exstillans, uti in aliquibus accidit tumoribus, quoniam illa aqua in cochleari cocta, instar albuminis ovi non concrevit, quod experimentum satis probat, quam hanc hydropicorum in ascite, ex valis lymphaticis, aut lacteis ruptis manare. Quondam vir quidam doctus, pertinacissimo scirrho inter musculos glutæos diu fuit vexatus, ex quo scirrho postmodum tumor mollis digitis cedens ortus fuit, cum alias durus ubique maneret, ex quo aperto, reliquo remanente, aquæ aliqua quantitas effluxit, quæ a nobis in cochleari effervescentia, albuminis instar coagulabatur, ut sit quoque in sero sanguinis, nam ex interna ruptura & fissura carnis & venularum in scirrho ita indurato, stillaverat serum a sanguine coagulato secretum. Num autem sic talis species hydropis, ex scirrho hepatis & quorundam aliorum viscerum fissura, ut veteres aliqui statuerunt, oriri possit, alijs dijudicandum relinquam, ego saltem hic frequentissimam hydropis ascitis causam statuerem, esse continuo manalia vasa lymphatica, rupta aut exesa, unde quoque ob lymphæ ita emanantis defectum in sanguine, ut plurimum immodica siti tentantur ascitici, & quamvis tunc plus aqua, sed extravasate in ventre contineatur, nihilominus, sic sanguis siccioris temperamenti est, ac suo naturaliter diluente humore caret, unde quoque reliqua lymphæ, cæteras cavitates, imprimis os humectans, deficit, ac sal non satis diluitur. Ideo etiam urina multorum hydropicorum rubicundissima est, quoniam sal tunc respectu lymphæ in sanguine abundat, nec non effluente & deficiente lymphæ non satis irrigatur atque enervatur.

§. XXVII.

§. XXVII.

Hic quæstio aliqua enodanda venit de tympania, seu hydropes sicco, an talis sine ulla aqua in ventre extravasata, accidere queat? Ad hanc quæstionem enucleandam notandum, quod in tympanitide, venter, flatibus extravasatis, immodice turgat, quos oriri putant, cum in vapores resolvitur aqua, ac flatus constituitur, unde *hydrops* ille, uti ventus in macrocosmo *siccus* vocatur; sed hic quoque operæ pretium erit, hujus hydropis ortum & naturam investigare. Flatuum locus naturalis est imprimis, ipsa intestinalis fistula, in qua, naturaliter flatus nonnulli ad juvandum motum peristalticum & excrementa propellenda continentur, hi flatus, si extravasati in cavitatem ipsam ventris penetrarent, tympaniam producerent, seu abdominis tumorem tympani instar expansum; sed non nollem hic judicare, intestina in hoc morbo exesa aut vulnerata esse, ut flatus in ventrem penetrarent; quoniam tunc non tamdiu morbus ille protraheretur, & non solum flatus, sed chylus & alia liquida in ventris cavitatem intrarent. Tamen videtur causa minus esse gravis, quoniam materia peccans resoluta est, quod quidem in cura hydropis intenditur, experientia tamen contrarium docet, quod hic hydrops curatu difficillimus sit, verum cum locum naturalem & ortum flatuum præcipuum, intestina flatuamus, sic inde etiam ut plurimum flatus præternaturaliter constitutos & extra locum suum naturalem, præcipue in abdominis cavitate existentes, deducemus.

§. XXVIII.

Non enim asserimus in tympanitide intestinale fistulam flatibus saltem nimium turgere, tunc enim cura ejus esset facilior, cum flatus illi vel per enemata applicata, facile expellerentur, sed in tympanitide flatus illi in cavitare ventris continentur extravasati, quod accidit, cum isti quidem in intestinis copiosi generentur, ac simul per venas lacteas ruptas seu excelsus lente lenteque in ventris cavitatem ingradientur, adeoque sæpe eandem cum ascite causam, tympanites agnosceret, materiaque tantum differret; nihilominus cum præternaturaliter variis in locis flatus aliqui generari queant, sic per alia vasa rupta & aperta, flatus, non tamen tanta copia, quam ex intestinis per venas lacteas ruptas, prorumpere queunt, ac ita rarissime tali modo produceretur ingens tympanites. Verum notandum hic, quod raro vel nunquam sola existat tantum a flatibus orta tympania, quin simul adsit aqua, cum per eadem vasa lactea per quæ flatus penetrant, simul quoque aqua transire possit, præsertim si vasa lactea rupta,

ruptæ, causa hujus hydropis sint, per quas continuo copia lymphæ tendit: hoc docer quoque ut plurimum experientia, & in hoc quidem ægro status aliqui aderant cum aqua, ita ut ascites raro detur sine aliquibus flatibus, & tympanites rarius sine aqua, sed a potiori denominatio desumenda.

§. XXIX.

Flatus præcipue in intestinis generantur, imprimis in intestino duodeno, cum ibidem materia viscida & tenax, seu aliquando etiam aquosa, a bile affluente quidem resolvatur, sed non satis, quin adhuc status conficere queat. Sic æstate calidissima, aqua quidem dissipatur in vapores, qui tamen ventum non constituunt, verum in vere & autumnno venti copiosiores & robustiores ex vaporibus aqueis non sufficienter resolutis, sed progressivo motu plus quam vario agitatis, oriuntur. Hinc etiam est, ut tympanites periculosior & curatu difficilior sit, nam duplicem materialem causam agnoscit, *aquam* sc. & *flatus extravasatos*, deinde status illi crudi & tenaces non facile propter expansionem suam in vascula regredi, adeoque secundum Hippocratem ex venis in ventrem confluere queunt. In tympanitide duplex illa causa quoque vitiata est, unde illa hydropis species quoque curatu difficilior existit, bilis enim & pituita præternaturaliter sunt constituta, & secundum nonnullos una succus melancholicus, adeoque multiplex causa summopere vitiata, multiplex malum constituit.

§. XXX.

Ut ad clariorem ascitis & hydropis causam veniamus, hydrops distingui posset in particularem & universalem: Particularis est, quando in aliqua parte saltem, vasa aquam vehentia, vel saltem sint obstructa ut immodice turgeant, aut exesa vel rupta sint ut aqua extravasetur, uti in capite si hoc fiat *hydrocephalia* vocatur, quæ vel extra cranium est, atque tunc tumor se satis manifestat vel intra cranium & tunc difficilior nisi ex aliis signis cognoscitur, sic in scroto vocatur *hydrocele*, in utero, *hydrops uteri*, in pectore, *hydrops thoracis*, in alia quacunque parte si existat, tumor aquosus vocatur, si ibidem saltem aqua ita stagnet aut extravasetur ut tantus fiat confluxus cum partis tumore, adeoque hi humores aquosi loco saltem differunt, tum utrobique vasa lymphatica, propter obstructionem aut compressionem ita turgeant aqua, ut valde tumeant, rumpantur vel exedantur, ut in locum affectum, aquam quam vehunt effundant.

§. XXXI.

§. XXXI.

Universalis vero dicitur *hydrops*, quando totius corporis habitus, viscida aqua, ut in *leucophlegmatia*, vel fluidiori, ut in *hydrofarca*, vel aqua *intercute* immodice turget, tum enim vasa lymphatica cutanea, & alia quæ musculorum fibras perreptant, ita tument pituita aut aqua, ut inde intumescencia oriatur, vel etiam quando loco pituguedinis in cellulis membranaceis, imprimis membranæ adiposæ, colligitur viscosa aqua aut pituita loco adipis, unde quandoque initio pituguedinem mentitur *leucophlegmatia*.

§. XXXII.

Secunda species hydropis illius est, cum venter targeat aqua, præternaturaliter extravasata, uti in præcedentibus explicuimus, & quamvis putaret quis, referri debere hanc hydropis speciem ad particularem, cum saltem in ventre sit, multas tamen ob rationes ad universalem spectat, primo, quoniam in ventre inferiore plurima continentur viscera, quæ simul ab hac extravasata aqua pessime mutantur, deinde quoniam in abdomine, tanquam in officina communi & universalis pro toto corpore sit nutrimenti præparatio. Denique, rarius solus venter ita aqua turget quin simul pedes tumeant, uti recenset *Galen. Secund. Prognost. Cap. 1.* Et scrotum in viris tunc frequentior vexatur & tumet, quoniam aqua non solum descendit gravitate deorsum ex ventre, sed nonnunquam etiam per processum peritonæi tendit, ac occultas vias in scrotum usque quærit nec non in pedes translabitur.

§. XXXIII.

Sicuti videmus catharros, inter cutim & musculos hærentes, ab unaque parte in aliam transgredi, & quemadmodum in praxi sæpe numero expetitur, quod humores in capite ex contusione, aliaque causa exorti, postea sæpe ad genas, collum, & pectus externum delapsi sint, uti tumor ac color facis demonstraverunt; tum materia extravasata vias & meatus quærit, inter musculorum fibras & interstitia, sicuti in catharro, cujus natura in lymphæ acri extravasata ita ruente existit, contingit; idcirco quoque, in hydropicis pedes circa vespertam plus tument, quam cum æger decubuerit in lecto, quoniam tunc gravitate, materia pressa, magis deorsum tendit: Porro in ascite partes inferiores ut plurimum quoque intumescunt, quoniam omnis lymphæ hoc in affectu tenacior ac inertior in motu est, idcirco gravior, per vasa lymphatica ex partibus inferioribus, non tam facili negotio

Disput. Medico-Pract. Tom. VII.

C c c c

ascendit,

ascendit, sed cumlata, tumores in his partibus producit, hinc hydropem, pedum sæpe insolita & diutina gravitas & lassitudo spontanea, imprimis cum tumore juncta, prænuñciat. Hoc quoque illi mirum non videtur, qui considerat quanta vasa lymphatica ex seroto per processum peritonæi cum vasis spermaticis ingradientur, ac continuo lympham in chyli & lymphæ commune receptaculum reportent, ut in vivi animalis sectione, horum vasorum ligatura demonstratur. In feminis quoque ex vasis lymphaticis ita male affectis ac turgidis, oritur hydrops uteri, qui ascitem mentitur, seu auget.

§. XXXIV.

Quæstio hic non levis explicationem meretur, quomodo aqua illa in ascite extravasata, tanta copia naturæ vi & tanquam crisi, seu naturæ peccantis subitanea alia excretionem per alvum vel vesicam exoneretur? atque ita secundum Hipp. Aphor. 14. S.E. 6. *e renis in ventrem confusus*, vel quomodo vi sudoriferorum, purgantium fortiorum & diureticorum, aqua illa vel per sudorem, alvum vel urinam evacuetur? licet tum tumor sæpe redeat. Nam ex solo succo iros nostrat, crudo non cocto ad unc. sem. vel drach. VI. cum mele rosar. aliquoties assumpto & repetito, præmissis quibusdam alterantibus, evacuatum vidimus hydropicorum ventrem, imo curatum, si viscera non fuerint plane antea corrupta: sed post evacuationem aliquoties repetitam, denuo medicamentis aptis ac idoneis corroborandæ sunt partes & vires, de hoc medicamento adeo gloriatur Gordonius in suo libro medicina, Part. 6. Cap. 5. quando inquit: *de iride nostrat*. Proculdubio omnem curat hydropisem, quæ manu humana sit curabilis, dum tamen continuetur, educit enim quotidie, tres vel quatuor scutellas aquæ citrinæ. Similem ferme effectum præstat succus corticis mediani sambuci, ebuli, & alia quam plurima medicamenta; quasi saltem hic possit, per quas vias aqua hæc redeat, vel in fistulam intestinale, vel vesicam, cum extravasata fuerit, atque secundum Hippocratem *e renis in ventrem confusus*, uti ait citato aphorismo.

§. XXXV.

Quamvis non semper talis effluxus aquæ, magnus & subitaneus in hydropicis salutaris sit, sum enim expertus in viro hydropico, cujus venter immodice intumuerat, diabeterem, seu hydropem ad matulam ortum fuisse; adstantes enim, ex rei raritate consternati, me accessiverunt, ut cum quid spei superesset, judicarem, vidi inique ab immodica urinae excretionem, paucorum horarum spacio ventrem detumuisse, hunc

hinc parum spei, multum periculi subesse prædixi, quoniam *omnis mutatio subitanea periculosa est*: In hydropicis enim cum extravasata sic aqua, procul dubio aliquid quamvis non tantundem quantum accedit, per vascula resorbetur. Quæ materia cum sanguinem ita ingreditur, quamvis malam constituat temperiem, tali tamen imbuunt conditione, ut si subito, hoc temperamento privetur, vitalem quamvis labefactam in corde effervescentiam excitare nequeat; quemadmodum quoque videmus in hominibus spiritu vini abutentibus, usu evenire, quod ii subito desuescere nequeant, quin ægre ferant, quandoquidem sanguinis temperamentum vitiatum est, si vero hæc mutatio lente per vires fiat, ut in excretionem per paracentesin instituenda suadet Hipp. tunc plus adferret utilitatis.

§. XXXVI.

Hic tamen queri possit, qui fiat, quod aqua hæc in locum suum naturalem redeat? Notandum est primo, quod si in tali hydropice aqua adhuc in venis seu in vasis obstructis & expansis contineatur, neque extravasata sit, uti in hydatidibus multis, in abdomine sæpe excitatis, contineatur, quod tunc facile, transitus aquæ illius secundum venas seu vasa, in ventrem tanquam humorum metathesis & crisis fiat. Sic forsitan intelligendus erit Aphoris 14. Sect. 6. quando ab Hippocrate asseritur. *Quod ab hydropice detento, si aqua secundum venas in atrium fluxerit, solutio fiat*, seu ille morbus desinat; quo autem modo, in dubio relinquitur. Gravior autem questio de aqua oritur extravasata, & in ventris cavitate fluctuante, quomodo tunc vi purgantium, vel naturæ, vel morbi, talem metathesin seu transpositionem admittat? quam confirmare videntur purgantia fortiora in hydropice tali, adhibita, si enim ullibi convenirent purgantia, prodescent, præmissis alterantibus, omnino in hydropice, fortiora; quoniam materia turget, ut Hipp. Aphoris. 22. Sect. 2. & hinc est, si hydropici tales, dicta conditione purgentur, *facile ferant*, secundum Aphoris. 25. Sect. 2. *Si qualia purgare oportet, purgentur, confert & facie ferunt*. Sc in hydropice seu ascite vehemente, cum tumore scroti amplissimo, proculdubio ab aqua extravasata orto, præmissis attenuantibus & diureticis aliquoties repetitis, per repetita purgantia, venter evacuatus est ac decrevit, & scrotum plane detumuit. Statuendus itaque est transitus, & quidem ille facilius concedi potest, si secundum §. 16. *& sepp.* putemus, in singulis corporis humani vascula, affluentem, non solum humorem humectantem, per peculiaris vascula, affluentem, verum quoque meatus in his dari resorbentes humorem, si functus fuerit suo officio, ni stagnaret, asserimus, unde quoque, si hi meatus

C c c c c 2

obstruendi

obstruēti sint, & plus aqua affluat quam refluat, uti antea quoque in fine §. 23. ascertum efficere possumus.

§. XXXVII

Quamvis ad sensum difficulter viæ demonstrari possint, ratio tamen sæpe a nobis allata tales persuadet, uti enim in intestinis venæ lacteæ non hinc videntur, quum ipsa inflata, seu alio quovis modo tractata, non foras mulentur, sed integra appareant, nihilominus, magna copia liquorum ex intestinis in venas lacteas transit, imprimis in illis, qui ingentem copiam potus diuretici hauriunt: Talis enim vasorum multorum conditio, & huiusmodi transitus, in corpore necessarius, quando enim per medicamenta, tum alterantia, tum imprimis purgantia acriora, potus illi seu meatus aperiuntur ac sollicitantur, ut motu quasi peristaltico potentiori, illa vascula agitata, non solum in intestinorum fistulam per peculiaris vascula huiusmodi emanant, sed quoque alia sunt, quæ iterum plus liquoris extravasati ex ventre exhauriant, aut absorbeant. Ita enim corporis habitus externus in cutaneis vitiis, per alvum evacuatur, uti ex gr. in scabie scorda, aut psoa & cæteris his vitiis externis, a melancholico succo crasso oriundis, per purgantia fortiora, dum materia vitiosa stagnans & quasi extravasata revocatur & per intestina evacuat: Sic enim vel crisi, vel arte, vel alio modo, materia illa in ascite, per hæc vascula seu meatus in venas reversa, atque hinc ex sanguine, peculiaris fermentationis, vel effervescentiæ, vel criseos ope, tanquam fax, per loca excretoria maxime sollicitata excernitur, quæ prout sunt purgantia vel diuretica, vel sudorifera, vel per alvum ducentia, sic pro qualitate sua, materiam peccantem simul alterant & vasa excretoria, certis & singulis excretionibus dicata irritant. Simile videmus in naribus, per quas non tantum materia excernitur, verum quoque ut in odoriferis & balsamis aliisque errhinis subtilioribus & bene olentibus apparet, vires sed vacillantes, sæpe subito restaurantur, quod non aliter fieri posset, quam quod aliquid ex balsamis in narium vascula peculiaris peneiret ac nullæ balsamorum odoriferorum gratorum particule immediate ingredantur sanguinem.

Respondentis Exercitatio Anatomica, de Villis Intestinalium.

§. I.

Quam plurimi licet eruditorum in vasto anatomæ relago accurata indagine microcosmi partes inter cæteras eminentiores non tantum, verum

verum & exiliores explorari velificaverint; imo hujus scientiæ portum jam tenuisse sibi imaginati fuerint; nullum tamen, teste SENECA, vel post mille annos natum, occasio discendi & novi quid adjuvendi deperisset.

§. II.

Villi intestinorum tunicam internam; sicuti animantium nonnullorum pellem unde nomen traxisse videntur) obtegentes, pars pauci oïum nullisque apud anatomicos usus, projecta alga virescens habitus, si intus inspiciantur, structuram contineri plane admirandam; unde magni quid in recessu habere, & indagine nostra & admiratione vel omnium dignissimos esse, cuius æquo operum DEI contemplatori tubolet, eoque magis, quia exiguis machinis natura, quæ delectatur minimis, magna plerumque molitur opera

§. III.

Tunica villosa Lindano crudior tantum est & limosa chyli pars, ut sit veluti lorica contra offensas: Rugosum aut spongiosum mollissimæ substantiæ æ peritonæa (forsan περιτοναία) vocat PECQUESTUS, ut alimenterum asperitas innoxie transeat, & qui subtilior succus est, ex fecibus in venas lacteas transcolatur: BILSIUS muscum villosum vocat, per quem vaporis specie transeat chylus: Joh. van HORNE in tenuibus crustam similem esse quoad usum, filtro pharmacopolarum luno asserit; quoad substantiam velamentum bombycinum: WILLISIO intestina ejusmodi crusta villosa, qua ventriculus obducitur, incrustari videntur, & propter eosdem usus, videlicet ut vasorum ora obtegat & chyli aliorumque contentorum appulsus sustineat: PECHLINUS curiosus in tubulos serum in intestina stillantes inquirens, non minimam purgationis partem ex intestinorum villis fluere persuasum habet: nos suo quemvis finimus abundare genio; quid autem circa hæc occupati: accurato scrutinio observaverimus, ne lateant diutius, hic exponere opportunum duximus.

§. IV.

In canis anatome in contemplatione tunica interna seu bombycina incidimus (calentibus adhuc intestinis) in capillamenta albicantia, inter cæteros intestinorum villus prominentia, hinc inde fluctuantia, vasis lacteis, quæ transperbeant per tunicam intestinorum extimam, continua & annexa.

§. V.

Quod ut iterato tentamine nobis certius constaret; canem bene pastum, quinque abhinc horis vivum cultello subjicientes anatomico, curiosius in *vascula* prædicti inquisivimus; eade n specie *capillamenta albicantia* nobis obtigerunt, ceu productiones vasorum lacteorum, fluctuantes inter cæteros intestinorum *villos*, quas quidem productiones *radices* & origines vasorum lacteorum esse non dubitavimus.

§. VI.

Nec specie veri carere videbatur hocce inventum: Etenim cum chylus oscillis vasorum lacteorum ex fœcibus alvinis elicitus (non secus ac terræ succus ab arborum radicibus) vel semel receptus, uniformis sit & simplex humor, nec ulteriori secretione aut segregatione opus habeat, quin, ad massam sanguinis ut feratur, scopus unicus sit & intentio naturæ, non opus esse videtur structura glandulosa, qua humores commixti, diversa qui a se invicem institunt itinera, commode segregantur, & per diversa vasa derivantur facilius: nempe poris & vasorum osculis vel semel susceptus, recta & plana via ad sanguinis massam pergeret, quam per glandularum mæandros traduceretur, non circa obstructionis periculum. Quæ in itinere occurrunt glandulæ mesenterij globosæ, tantum abest, ut chylus sint impedimento, ut vel potius motum ejus & progressum, laticem diu affundunt, promoveant, & ad commune chyli receptaculum accederent.

§. VII.

Nec sane forte persuasum habuimus, radículas memoratas motu esse præditas, quo mechanice ad occursum particularum & amicarum nutritiarum hient (*nam & hic Dui sunt*) & oscilla pandant, horreantque & oblerent eadem ad minus acceptarum occursum. Etenim cum fluctuare viderentur, vi atque constrictione fibrarum intestinorum circularium coarctarentur prædicta capillamenta, relaxatione potius, dum hiant osculaque pandunt, chylum abligurire, & quasi pisando transmittere verisimile videbatur; motum autem intestinorum peristalticum id facere, ut abligurientibus apte offerantur devolutæ hinc inde particulæ chylosæ.

§. VIII.

Et hæc ratio videbatur, quod ex demortuorum intestinis humor nullus nec flarus in vasa lactea propelli possit, quem tamen toto die sponte sua persnare videre est in vivis.

§. IX.

§. IX.

Lustravimus alio tempore percolationis chyli organa; tunc autem non tantum excidimus epiploion n-stra; usque adeo verum est, nisi vel aliter expe. in ento fidendum non esse; observavimus enim in alio cane dicta *capillamenta albicantia* tunicae intimae, seu crustae intestino um adhærescere quidem & fluctuare, sicut in prioribus canibus; facta autem lotion., constitit eorum nonnulla dilui & abscedere; unde tantum non in eam devenimus sententiam, non esse nisi filamenta chyli mucro permixti.

§. X.

In a'io cane calentibus adhuc intestinis contemplati ope microscopii tunicam intestinorum int-riam, in confiniis jejuni. observavimus eam ref-ire *textum quoddam turbatum*, ex innumeris corpusculis coagmentatum, quorum in apicibus apparuerunt *foraminula concava*, quæ frigescens abhinc intestinis sensim obli-vata fuerunt; tandem ex accuratiore indagine ipsos intestinorum villos esse constitit.

§. XI.

Nec in his tantum experimentis acquievimus, verum rei hujus veritatem penitus indagare conati fuimus, in anserem sicutum per ramum venæ porae in cavum intestini penetrare a'is jam certiores facti, per eundem ductum aramentum siphone injecimus; id quod vascula vel minima, citra valvulae ullius remoram pervasit, & in ipsum quoque intestini cavum penetravit; Inciso hinc intestinulo, innumera in tunica intima conspicati fuimus *puncta nigricantia*, quæ in aqua limpida fluctuarunt & in *filamenta nigra* explicata fuerunt. Rei novitate allesti in crol opium, egregium an-tomorum adminiculum, adhibuimus: Tunc demum elegantissimæ speciei apparuerunt; non tantum capillamenta humore nigro distincta, sed & in unoquoque eorum vasculorum exilissimorum ramificationes palmiformes, elegantissimæ; adeo, ut ex uno flamine plures prodierint furculi, villis intestinalibus seu vaginulis reconditi, nec ullus mihi visus fuit villosus, quem ad extremas usque oras similia non perreperant vascula exilissima, tanto evidentiora, quanto penitius humor injectus penetraverat, qui in ipsum quoque intestini cavum alicubi excidit.

§. XII.

Similes in caninis intestinis liquorum *injectiones* tentavimus, quibus totus intestinalis ambitus nigricans evasit: Eodem inciso contentisque scalpello remotis, guttulas injecti atramenti hinc inde observavimus: abhinc poruo-

portionem ejus microscopio subjecimus, & similia, uti in anseris intestinis, *capillamenta nigra*ntia deprehendimus, quæ similia perreperarunt *vascula tenerrima*, in summitate præsertim conspicua, in nonnullis *bifida*, ad instar lingue serpentis, alibi *orbicularia* instar coronæ, evidentiora tamen in anseris, quam caninis villis fuerunt.

§. XIII.

Ex his observationibus & experimentis anatomicis, imprimis ex subtili & elegantissima villorum intestinalium structura, elucescit actio & usus illorum, quis autem æquus naturæ contemplator, perspecta subtili hac villorum fabrica, tunicam villosam cum LINDANO, crudiorẽ tantum & limosam chyli partem statuatur? Quis cum PECQUETO *перекрестки*? Quis cum HORNIO filtrilanei pharmacopolarum usum attribuat? aut cum WILLISIO, qui intestina, crusta ejusmodi villosa, qua ventriculum obducit, persuasum habet (cum tamen facilius nodos in serpo, quam in illo villos, quæviseris) id usus assignet, ut vasorum ora obtegat, & chyli aliorumque contentorum impulsus sustineat? PECHLIUS eximium quidem usum villis attribuit, at, quod fieri amat, plus nimis suæ sententiæ addictus, dum fontes colluviei a purgantibus perquirat, perperam forte villos ad horum numerum revocat: Etenim organa excretoria innumera eaque speciosissima tanto glandularum, partiumque hydraulicarum apparatus per totum intestinorum tractum occurrunt, ut frustra futurus sit, qui post vastum hepar, pancreas eximium, glandulasque ventriculi & intestinorum numerosissimas alia organa excretoria in his locis quæviserit.

§. XIV.

Aliud restat, si non æquale, certe majus naturæ opus, quod in his locis peragitur, quodque sine peculiaribus organis perfici naturæ ordini adversatur; *Percolatio* scilicet *chyli*. Cum vasorum excretoriorum tantum videamus numerum & apparatus, incerniculorum certo haud minor erit pro tanto naturæ opere necessitas, id quod natura vel digito nobis monstrare videtur: Etenim in nullo non animantium genere inveniuntur *villi*, & ita disponuntur, ut in ventriculo, nulli, neque vasa lactea, ab hinc autem infinita series villorum, præsertim per jejuni tractum, ubi lacteorum magna occurrit frequentia, inveniuntur; adeo ut *hinfutum hoc*, non autem magis *glabrum* conspiciatur: In crassis canis cujusdam intestinis nullos observavimus villos, adeo ut *vasa lactea* & *villi* intestinorum undique sese comitari videantur; quod quidem luculentum est *experimentum*, villos chylum ex alvinis fecibus absorbere, continuisque ac *locis lacteis* committere absorptum, id quod structura, quam supra ob oculos posuimus, plane persuadere videtur.

§. XV.

§. XV.

Neque enim tantum propagines mesaraicarum unumquemque villorum eleganti ramificatione subeunt, sed & oscula earum versus intestina hiant, ita ut non tantum flatus per rami mesaraicum penetraverit in intestinum illudque inflaveit, quin ipse humor atratus per eundem canalem injectus in intestinum guttatum exciderit, per nulla alia, quam quæ in villorum cacuminibus conspici sumus ope microscopii orificia; sed & vice versa intestini parte inferi re ligato, flatus superius immixtus per eorundem canales mesaraicos penetraverit, id quod commeatus viarum larvis super que monstrat experimentum: Tum vel illud quoque inuere videtur, quod vascula tenerrima recondantur villis. (cu the uis pulposis, ut citra offensam prætereuntium vim sustinere possint, & villis cu totidem *fronculis* obvoluta in-biherent chylum, inter densam eorum congeriem stagnantem, quibus absorptus facile vasculis contentis traderetur, & ab-hinc ulterius ad sanguinis massam derivaretur.

§. XVI.

Cæterum non est dubium, quin ea animalia, quibus *lacteorum apparatus* largitus est summus rerum conditor (quæ in volatilibus, quantum quidem nobis constat, desiderantur) chylum hauriant, & a facibus alvini delibent per lacteorum extrema, villis intestinorum forte simili modo implantata, quo in volatilibus sanguifera solere experimentis constat: Pateret autem clarius, si experimentum, quo valvulas lacteorum superare posset *mercurius*, in antlia pneumatica, *methodo Nuckiana*, prospere succederet.

§. XVII.

Exinde quoque colligere licet, legibus naturæ atque organi colatorii structuræ non repugnare, siquidem chylus per venas quoque mesaraicas dicatur ad sanguinis massam vehi. Id quod vel illa *observatio anatomica* indigitare videtur, quod propagines *mesaraicarum* majori numero & specie appareant in villis volatilium, quam illorum animalium, quæ lacteis natura instruit. *Quædam* his vid B O N N. Dissertat. Physiolog. §. §. 18. & 22. Diversitas nempe animalium, quam instruit summus rerum conditor, diversa sibi voluit organa, ita fabricata, ut cuivis illorum congrua forent in suo genere & convenientia.

Sic tentasse vadum, satû; isibic, dum datur ultra.

CCLXVIII.

JOH. DE BUCHWALD,
DE DIABETIS CURATIONE

Cum primis per Rhabarbarum

RESPONDENTE NICOLAO RYBERG.

Hafnia 1733.

§. I.

DIABETES, quam henteriam seu diarrhæam quoque nephriticam vocant, sive hydropem ad matulam, Aur. Cornel. Celfo dicitur urinæ nimia profusio, pag. 234. editionis Almelveeanae. Morbus autem rarissimus est; id quod & antiquissimi, & remotioris pariter, ac nostri temporis Practici Medici, ad unum omnes testantur. Siquidem Viris etiam, amplissimæ praxis claris, per longam annorum seriem haud obvenire solet. Galenus, se duos tantum vidisse, qui diabete laborarint, suis scriptis testatur. Guilielmus vero Fabricius Hildanus Centuria V. observat. 53. scribit: se modo in unum incidisse, hoc morbo afflictum. Is puer fuit septem annorum, qui postea facta jam sanatione, iterum decumbens, vitam posuit. Nec plures Hildano obtulit vassa diuturnaque praxis Medico-Chirurgica.

§. II.

Raro itaque diabetes obvia, sed acutus est morbus, ac periculosissimus, qui mortem affert nisi primo statim principio remediis optimis, multoque usu probatis, levetur. Ejus tamen curationem plane omiserunt medicinae quidam scriptores, alias haud parum celebres: quod in Stahlî quoque praxi, tam in priori editione 1728, quam in posteriori

posteriori 1732. à Pelargo edita, factum est. Et idem præterea multis aliis, tum veteribus, tum recentioribus, contigit, quorum medica scripta extant. Imo vero hinc inde medici longe experientissimi sunt, qui per multos quidem annos felicissimo successu, medicinam exercuerunt, sed diabetes curationem nunquam susceperunt.

§. III.

Est autem diabetes, frequens, velox, cruda atque copiosa urinæ excretio, cum doloribus hinc inde in ægrotantis corpore vagis, (quales in febris hæctica dolores jugiter fere observantur) sitique inexplebili, neque minus universi corporis tabitudine. Tanta lotii copia reddi solet, ut assumptorum fluidorum omnium proportionem valde superet. Atque hæc ad veram pertinent diabetem; quæ multum a spuria, ut vocant, seu notha differt. Etenim hæc interdum simul eos affligit, qui variolis, morbillis, aliisque febribus exanthematicis ægrotant. Tum vero vix aliud quam symptoma esse deprehenditur; & una cum primario, quem tantum comitatur, morbo, tolli solet. Itaque paucis, aut interdum nullis potius medicaminibus, sed temperata victus ratione atque genuina diætâ, sæpius efficitur.

§. IV.

Per genuinam vero diætâ id intelligo; ut præter alia aër sit temperatus, nullisque exhalationibus fætidis &c. infectus. Nimius enim calor, tum cubilium, tum lectorum, in febribus exanthematicis, aliisque acutis, non minus nocet, quam vis major frigoris.

Præterea huc potus pertinet sufficiens, at aquosus, cum frustulo panis primarii, vel alio modo leniter coctus, & iteratis quidem sed levissimis haustibus tepide propinatus. Utilissimum etiam serum lactis est, quod vim temperandi atque abstergendi habet; ac, præter alias virtutes, alvum quoque apertum cum euphoria servat. Id quod veteres scientiæ medendi principes, non celebrarunt tantum, sed in febribus etiam calidioribus, cumprimis in biliosa, frequenter commendarunt. Nec omnino utilitatis expertus iste potus hodie adhuc foret, si modo frequentius ægris, inprimis biliosa febris laborantibus daretur: quod meam docuit experientia, cum & antea haud raro, & nuperrime, paucas ante hebdomades, in epidemica febris catharrhali, cum ingenti siti, haud sine emolumento, illum adhibuerim. Facili autem negotio æstivo tempore parari & haberi potest, cum lac tum sponte acescat, quod serum lactis naturale vocatur, artificiale contra fit omni tempore; si lacti dulci ebullienti paululum succi citri, aliave subacida, pro

D d d d d 2

morbo.

morborum, ætatis, sexus, temperamentorum &c. discrimine, admisceantur, quo factò, particule butyri & casei coeunt, & serum percolari queat, ac bibi.

§. V.

Sed de spuria diabete, cujus acta medicorum Berolinensium Decade 1ma vol. V. pag. 34. exemplum habent, non est in præsentì agendum, quare eam silius persequi supersedco.

Ex allata verè diabetis descriptione, ea illucescunt signa, quæ hoc mali genus indicant. Lotium quippe, quod abundanter effunditur, tenue, crudumque, ac sedimento nullo permixtum, subdulci autem sapore præditum est. Ad colorem quod attinet, eundem sæpe urina refert, quo infecti fuerunt liquores hausti: lac enim dulce & emulsiones amygdalar: dulcium &c: à diabeticis haud raro albidì coloris (id quod *Hildanus*, *Tulpius*, *Dolæus*, alique mecum observarunt) iterum eminguntur, facta aut nulla, aut exigua tantum mutatione.

VI.

In causis hujus morbi præcipue commemoranda est laxitas partium, ventriculi, intestinorum, maxime autem renum. Ea enim efficit, ut ingurgiant fluida retineri nequeant, sed viam mox inveniant, qua illico transmittantur. Atque hoc imprimis accidit, si renes nimium debilitati fuerint ac remissi, ut effusionem illam retardare non valeant: cujus rei exemplum videre licet, in *Friderici Hoffmanni* Medicin. consultatoriæ partis 1mæ decuria V. pag. 219. sub titulo: diabetes ex hæsiōne calculi, in urgere dextro, præta.

Si quoque largius, quam par est, diuretica adhibeantur medicinalia, hæc non parum interdum ad excitandam diabetem asserre possunt. Neque minus ad hujus causas accedit immodicus usus alimentorum, quæ urinam pellunt. Sed alia tamen, ut puto, ratio subest, cur molles nostri corporis partes cunctæ, in hoc morbo, dissolvantur; ideoque etiam pinguedo omnis, membrana adiposa (quæ pro secundo universali integumento haud immerito hodie habetur) omentum, adeps quæ circa mesenterium, renes, aliasque partes, invenitur, velut colliquefiant: quanquam ad causas hujus mali etiam referri possit febris hectica, cum doloribus istis vagis juncta, quam huic malo adesse, non à me tantum, sed & multis aliis medicis prædictis observatum est. Illa enim febris pinguedinem, mollesque nostri corporis partes ceteras liquefaciendo, in lympham serumque convertit.

Nec licet tamen temere hac de re statuere aut conjecturis audacter nimium indulgere. Si quid certi asserendum, decet ea circumspecte sequi

sequi vestigia, quæ ipsa rerum magistra experientia demonstrat. Rarius autem ille morbus incidit, eoque minus mirandum, non certo satis usu constare de omnibus quæ ad diabetem spectant. Ego enim ingenue confiteor, me non penitus exploratam habere causam proximam quæ molles nostri corporis partes in lotium convertat. Ideoque illius indagacionem, curiosius instituendam, ingeniosioribus physicis relinquam.

§. VII.

Job. Doleus in encyclopædia sua medica, pag. mihi 327. peculiariter diabem causam quoque nobis tradidit. 'Tubulos, inquit, isto per omentum ex fundo stomachi prodeuntes nimis laxatos culpo: per hos enim patentes ductus, sine mora pergit ad renes vel vesicam, quicquid est potulenti. Huc spectant etiam pori vesicæ nimis aperti; hinc nobis placet causa de hoc affectu, Cartesianis adscripta: ad cor enim potus in diabete non potest deferri. Huc usque *Doleus*.

Sed ea opinio non levibus premittitur difficultatibus: eum de tubulis istis, sive ductibus, non satis constat. Impervii enim ad hunc usque diem celeberrimis fuerunt anatomieis, de quorum eura in illis perferutandis dubitare non licet. Appello tantum præclarissimum, nunc beatum *Reyschium*; *Winkovium*, *Heisterum*, *Morgagnum*, aliosque, qui hodie adhuc superstites, summa nominis claritate florent, hi nulli pepererunt labori, ut eos reperirent tubulos; at conatu irritato, minime illis contigit in eos incidere. Ex quo vero quam simillimum est, penitus non existere tubulos, qui tantorum anatomieorum industria indagari non potuerunt.

§. VIII.

Ad hæc magis confirmanda ex *Gothofredi Bergeri* Physiologia medica pag. 197. subsequencia tradam. Ut minus, inquit, adeo sit necessarium, id quod a quibusdam inter urinam potus & cruoris discriminem assertur, quando illam ex primis statim viis, per vias hæcenus incognitas, & per peculiare ductus excretorios, ad renes vel vesicam, de rehi opiantur, eamque sententiam ex aquosa urinæ facie, & rapido, propereque exitu approbare student, sed falso, pergit *Bergerus* suppositi & commenticii sunt ductus illi aquosi, atque a nemine unquam, post tot in scholis totius Europæ facta repetitaque pericula, cogniti, aut oculo certe vacillante visi, quando nonnulli vasa lymphatica pro tubulis frustra habuerunt &c.

Atque iteo *Doleus* hypothesein (quæ olim *Lutetie* Parisiorum anno 1687. me plectente, jam apud quosdam celebrata fuit) tantum tradi-

D d d d 3

diſſe.

disse videtur, cui tamen fundamentum experientia haud subternit. Hinc ista etiam causa diabetis sponte ruat, necesse est. Sed ejusdem alia per sepe causa est, juxta quotidianam in medica praxi experientiam, aut medicaminum, aut alimenterum diureticorum abusus: ut videre licet in *Hildani* observatione 53. pagina 442. de diabete ex nimio acidularum Griesbachensium usu orta, qua valde diureticæ sunt. Item in *Epistola* Gualteri Harris ad *Baglivum*, vid. ejusdem opera pag. 717. ubi excitata fuit diabetes tam ab internis, quam externis medicamentis diureticis. Id quod etiam meæ tres de diabete observationes, mox adducendæ, confirmant ac demonstrant. Quia enim non ita frequens id morbi genus esse solet, nec christiano convenit, abscondere ea, quæ aliis possint esse salutaria, ac *Æsculapii* scientiæ forte incremento: in tyronum, juniorumque medicorum gratiam, tres observationes de diabete, memoratu dignas, in medium afferam.

§. IX.

Anno 1695. mense Augusto juvenem studiosum, qui oleo succini abusus erat, diabete vera laborantem nactus, quintoque morbi die vocatus, præscripsi:

℞. Pulver. subtil. rhabarbari optimi scrupul. I.
Folior. sennæ elect.
Tartari solubilis a.a. semisrup.
Nuc. moschata grana. IV.
Aque rosarum semiuunciam.
Syrupi de rosis ficcis drachmas duas.

Mixta sig. pro una dosi, mane tepide sumenda. Hæc itaque potinacula usus, septies alvum deposuit: & quidem cum diabetis allevatione. Pro potu ordinario, ad sitim, quæ admodum erat ingens, temperandam, subsequens illi propinabam lene decoctum.

℞. Foliorum millefolii, calaminthæ.
Florum millefolii.
Radicum glycyrrhica decori. atque ras. a.a. drachm. II.
Nitri purissimi seique drachmam.
Aque fontana libras IX. ponderis civilis.

Coquantur per quadrantis horæ spatium, colentur, & sic hauriantur.

Jusculis carnis virtulinæ, aguinæ, pullastrorum &c. cum nitro,
loco

loco salis communis, coctis, & cum vitellis ovorum conditis, ter quovis die; nec non lacte dulci, in quo ferrum candens ter extinctum fuit, cum pane biscocto vescebatur. Notandum autem, me propter morbi pertinaciam obstrictum fuisse, ad rhabarbarinam potiunculam illi adhuc bis propinandam. Et his paucis medicamentis, alimentis, atque bono regimine, convaleuit quidem æger, sed paulo post, me inscio, lares suos in Jutia, repetiit, ubi sedecim post dies, diabete recidiva denuo afflictus, mortem appetiit.

§. X.

Secundus, qui meæ se curæ tradidit, diabete laborans, hauniensis civis fuit, zythepfa seu cerevisarius, quadraginta sex annorum. Hic namque mense Septemb. 1690. levi dysuria tentatus, balsamum sulphuris terebinthinatum ad guttulas 12. per aliquot dies, singulis octo horis, suafore circumforaneo quodam, inauspicato sumserat. Sed per istud calidum diureticum, urinæ nimia profusio, comitantibus omnibus veræ diabets symptomatibus, cum inopinato supervenisset, meum auxilium implorabat. Itaque hanc illi infusionem commendavi :

℞. Rhabarbari optima nota crasse contus. Drach. 1.
 Pulver. nascis semi scrupulum.
 Tartari tartarificati semidrachm.
 Sacchari alb. drachm. 11. semis.
 Aqua cocta ferventisque unc. 1. Sem.

Mista, stent loco calido, in digestionem, per noctem; colentur per expressionem, dividantur in æquales partes duas, quarum altera mane, altera vero subsequente die, vel etiam, pro re nata, tardius hauriatur.

Potum etiā, loco cerevisiæ bibendum, hunc in modum præscripsi :

℞. Rasura Cornu C. unc. 1.
 Aqu. font. libr. X. p. c.

Coquantur per horam integram, tunc addantur :

Radicum malva, glycyrrizæ rasæ.
 Herbar. malva, millefolii, aa. drachm. 11.
 Menihe arvensis drachm. 1.
 Nitri puri Drachm. 1, & sem.

Coquantur.

Coquantur adhuc per quadrantis horæ spatium, atque percolata usui dantur.

Pute ex lacte dulci, amylo, interdum vero ex oriza recenti parata, singulis diebus bis, vel ter utatur. Sed cum ægotans de nimia urinx profusione graviter conquereretur, de novo confutum duxi, illi lene rhabarbarinum, ut hoc in malo specificum, & revulsivis gratia, iterum suppeditare, ut a renibus ad intestina & serum & lymphæ derivaretur.

℞ Pulv. subt. rhei optimi scrup. 1.
 Cremoris tartari scrup. sem.
 Aqua florum tilie unc. sem.
 Syrupi de spina cervina drachm. 1. sem.
 Miscantur.

A cujus usu semper se melius habuit ægrotus: & per hæc pauca, tribus hebdomadibus, sanitatem penitus recepit: ita ut ultra viginti, & quod excurrit, annos post, secunda valetudine perfrui ei contingerit.

§. XL

Tertius, qui disbetis remedia a me petiit, est Dominus Krolau, Regius Belli Fiscalis, vir integerrimus & doctus, qui anno ætatis suæ octogesimo tertio, anno 1727. die 13. Martii me arcessi ad se curavi. Debilem ego inveni, ac sæpe lotium reddentem, & febris, sitique ardentissima afflictum. Medicaminibus vero non uti solet, nisi maxima cogat necessitas. Quæ igitur alimenta reperit, cum inquirerem: se proxima die, 12. quippe martii, respondit, & meritis, & vespere comeditisse jusculum, chærefolho largiter conditum, adhibito viro mosellano novo, & aquæ viæ anisatæ per exigua quantitate. Cum hæc mane, audita sexta & dimidia hora, agerentur citra cunctationem ullam remedia suasi.

℞. Aquæ ciborei unc. sem.
 Syrupi de ciboreo cum rhabarbato drach. 12.
 Pulveris subt. rhabarbati electi scr. 1.
 Cremor. tartari scr. sem.
 Mista indantur viro.
 Sig. pro una dosi tepide sumenda.

Illo die pro potu ordinario zythogalam commentari, hinc est læ vaccinum dulcè cum tenui cerevisia, lege artis, coctione coagulatum; indeque

indeque modice bibere jussi. A laxante rhabbarina potione sexies leniter ac cum euphoria alvum deposuit. Febrim cumque leviori in gradu animadvertēbam, ac vesp̄i ejusdem diei urinæ profluvium non tam celeriter, sed remissius ruebat, colore lotii non nihil etiam mutato.

§. XII.

Hæc vero observare & ægrotanti & mihi admodum fuit jucundum: tum etiam placuit rhei virtutes sane optimas, atque polychrestas, specificasque in diabete, ulterius experiri. Ideoque iterum præscripsi:

- ℞. *Decocti C. cervi, cum passulis minoribus parati, unc. VIII.*
Vini Hispanici optimæ notæ. Unc. VI.
Pulveris subit. rhabbarari optimi unc. seml.
Santali rubri drachm. III.
Nucum moschatæ drachm. II.
Nitri regenerati drachm. I.

Mista reponantur loco tepido per sex horarum spatium. Hacce de mixtura, singulis trium horarum intervallis, ægro danda fuerunt cochlearia duo. Inde in dies melius se habuit; ut quarta & vicesima martii, quæ dies morbi erat undecima, aliquo modo restitutus videretur. Adeoque paucos post dies, recuperata secunda valetudine sanus in publicum prodiit. Durante adversa valetudine potu ordinario utebatur decocto cornu c. cum modica passularum corinthiacarum copia. Interdum etiam emulsionem amygdalarum dulcium, eodem decocto c. cervi paratam, bibit. Pulte, vaccino lacte recenti, oriza, dulcibusque amygdalis cocta, ut libitum erat, vescebatur; nec non interdum jusculis carnis vitulinæ, cum vitellis ovorum paratis.

§. XIII.

Postea vero accidit post dies fere quindecim, ut vir eruditissimus, neglecta victus ratione, in eundem morbum denuo incideret. Multo tamen remissior fuit diabetis gravitas, ut propemodum ipse posset sibi medicari. Me namque inscio, iterum adhibuit primam formulam laxantem & portionis secundæ quartam partem; atque hoc jam facto, postero die me advocati curavit. Cum vero utroque remedio, quod ipsi in prima præscripseram diabete, opportune jam esset usus, parum mihi reliquum fuit; scilicet prospiciendum modo, pro rerum circumstantiarum diversitate, quam victus rationem decumbens servaret. Sic altera quoque vice paucis diebus ea diabete, feliciter pulsa, prorsus convaleuit idem

Disput. Medico-Pract. Tom. VII.

E e e e

vene-

venerandus Senex. Id quod contra effitum magni Hippocratis Cui contigit. Is enim aphorismo sexto sectionis VI. renum, inquit, affectiones, & quæ circa vesicam consistunt, operose sanantur in senibus.

§. XIV.

Hoc igitur modo simplicissimo, undecim tantum diebus) si recidivi morbi molestant excipias) medicamina pauca quædam, inprimis rhubarbarina exquisita; diabete veram, Dei beneficio, profligarunt. Eadem malo alii, & alias exercitissimi medici & adstringentia & opiata solent obvertere. At ab hisce potius abstinendum duxi. Namque si adstringentia, ad cohibendum diabete fluxum, adhuc beantur, vasa, viscera, partesque corporis nostri cæteras, constringunt vehementius. Id quod machinæ humanæ viventi maxime nocet, ac graviter sanjati est adversum. Et idem fere statuendum est de opiatorum abusu, qui etiam longe periculosissimus est.

§. XV.

Methodum medendi Anglorum Esculapii, Thomæ Sydenhamii, hic subnectam; ut differentia inter ejus curationem diabete ac meam, inprimis per rhubarbarum, observetur. In praxi itaque sua experimentalis pag. 388. ita scribit: nonnunquam accidit, etsi perquam raro, ut qui febribus intermittentibus antea laborarunt, ac interea venæ sectionibus, & catharticis imperite fuerunt multati, in diabete incidant, etiam febre jam perfecte fugata. Etenim cum sanguis eorum abhinc debilitatus assimilandis succis, ei allatis, prorsus impar reddatur, iidem per vias urinarias crudi adhuc & inconcocti exitum sibi querunt: proindeque præ ingenti urinæ copia, quoties eam reddunt, excreta, sensim vires labefactantur, & quasi substantia corporis per hanc cloacam exinanitur. In hoc affectu, uti in omni diabete, ex quacunque causa originem ducat, curativæ indicationes, ad sanguinem corroborandum, & pariter ad fluxum urinæ præternaturalem restringendum, omnino dirigenda sunt:

Ut: R. Theriacæ Andromachi Unc. I. ℞ sem.

Conserve flavæ, aurantium Unc. I.

Diæscorbi Unc. sem.

Zinziberis conditi ℞ nuc. moschatæ aa. drach. III.

Pulver. c. chelis canceror. compos. dr. ℞ sem.

Corr. exterior: granat.

Rad. angelicæ hispan.

Corallior. rubror. præparat.

Et

Et Trochisc. de terra lemnia ad drachm. I.

Boli arm. scrup. II.

Gum. arab. drachm, sem.

Cum q. s. syr. de rosis siccis.

Fiat electuarium, de quo sumat ad magnitud. nucis moschat. maj. mane hora quinta, pomeridiana, & nocte, per mensem integrum: superbibendo sequentis infusionis cochlearia VI.

R. Rad. Emil campan. Imperator, angelicæ gentian: aa. unc. sem.

Fol. absinthii Rom.

Manub. alb.

Cent. minor.

Calaminthæ aa. m. f.

Baccar. juniperi unc. I.

Incidentur minutim, infundantur in vini Canarin. lib. V. stent simul in infusione frigida. Coletur tantummodo tempore usus. Vescatur cibis facilioris digestionis: videlicet carne vitulina, vervecina &c. abstineat ab esu olerum, & fructuum qualiumcunque, & singulis pastibus bibat vinum hispanicum.

§. XVI.

Placuit ea hanc potissimum ob causam in medium quoque afferre, quia tanta inter medicos auctoritas est Sydenhamii, cujus rei gravem, habemus testem, *Georgium Baglivum*. Is operum suorum libro I. capit. 12. §. 3. pag. 129. Febris inquit, adhuc ardet; adhuc, inquam, & in scholis, & in egrotantium laribus: ejusque incendia latius propagata ingemisset orbis, nisi inter tot scriptores unus hoc ævo præluxisset *Thomas Sydenhamius*, artis nostræ ornator & ornamentum; qui, sepositis opinionum commentis, ad observationes prorsus se dedit, & a prima ætate ad extremum usque senium cum natura cohabitavit. Qua ratione demum probabilior de febrium indole hypothesis, curationemque patefecit; tantaque ingenii & doctrinæ laude istdem curandis excelluit, ut a conterraneis suis medicus febrium vulgo esset nuncupatus: prout ab Anglis peregrinantibus p'uries per Italiam audivi. Porro idem *Baglivus* libro II. cap. X. §. V. p. 222. Praxis igitur, dicit, curandorum morborum per praxin ipsam promovenda est; cujus rei testis est nobis diligentissimus, post Hippocratem, observator, *Thomas Sydenhamius*; qui sect. I. c. II. pag. mihi 43. & 44. de occultis febrium causis discurrens, ait: hoc pro comperto habeo ex multiplici accuratissimarum observationum fide, prædictas morborum spe-

E e e e e 2

cies,

cies, præfertim continuas, ita toto crelo differre, ut, qua methodo currente anno ægrotos liberaveris, eadem ipsa, anno jam vertente, ipsos forsan e medio tollas. Hucusque *Baglivus*.

§. XVII.

Nec facile quisquam, nisi historię medicę rudis, est, quem lateat, quanta sint merita *Sydenhamii*, quanta fuerit scientia, quamque insignis medendi usus. Incomparabilem, constat, indagatorem fuisse morborum, qui ea in re multos post se reliquit, paucos habuit pares. Sed mirum tamen, eundem virum celeberrimum tam parum tribuisse scrutationi adversę valetudinis causarum, cujus potius indolem, & incommoda observasse ipsi sufficiebat. Siquidem illam philosophię, nescio cui, propriam putabat; quam effecisse, scribit, ut quę medica appellatur, revera confabulandi, garrulique potius ars sit, quam medendi. Præterea negari nequit, *Sydenhamium* frequentius forte, quam par fuit, opiat, uti consuevisse. Hoc tamen viro experientissimo consultius potuit videri, & felicius quoque cedere, in ea cœli temperie & climate Anglicano. Quare non ideo tuto satis eadem medicamina in aliis terris æque copiose adhiberi possunt. Verum tamen accidere interdum solet, ut opiata, pro sua virtute, aut impellant naturę effectus aut saltem non parum mutant. Ideoque dubium haud leve nascitur, utrum observationes *Sydenhamii* ubique tantum ea exhibeant, quę ad naturam pertinent; an vero, quę tradidit, ex opiatorum efficacia interdum fuerint perfecta. Certe in unico hocce ætuario, quod diabete opposuit, rheriæ unc. j sem. & discordii semiunc. ergo juxta calculum meum quindecim opii grana, reperiuntur: quod quidem remedii genus, tam abundanter ægro oblatum, nocuum potius, quam salutare puto. Eoque minus suffragari possum *Sydenhamio*, existimanti, unicum illud ætvarium diabete posse obverti.

§. XVIII.

Ita tulit propositi nostri ratio, ut in præsentī ea potissimum præferrentur, quę experientia nostra nos de diabete edocuit. Siquidem medicina pene tota constat experientia, ut bene statuit *Leibnitius*: haud secus ac medicorum *Cicero*, verum est, inquit, ad ipsam curandī rationem nihil plus conferre, quam experientiam. Usu vero rhubarbarum suam nobis virtutem probavit in diabete præfiganda. Id quod ipsis, quę allata sunt, exemplis demonstrare, satius visum fuit, quam longa ratiocinationum serie evincere, aut colligere conjecturis. Neque tamen desunt rationes, cur isti morbo rheum maxime videatur obvertendum,

tendum; si indoles ejus rite percipiatur. Rhabarbarum quippe verum ex principiis constat salino-sulphureis, quibus admixtæ sunt linosæ, terrexque & austeræ particulæ. Hinc non solum abstergendi pollet facultate, sed involvens quoque est; & ventrem elicit. Si verò rhabarbarum vetustate fuerit particulis subtilioribus orbatum, vel igne testum; lenius alvum mover, eandemque magis sifit. Namque cum aere calidiore, tum igne, sulphureæ & volatiliores partes abiguntur; ut remaneant tantum crassiores.

§. XIX.

Atque sic rheum non ea secum conjuncta habet incommoda, quæ aliorum medicaminum usum dissuadent. Ita ad nimiam urinæ profusionem cohibendam adstringentia minus commode adhibentur, quamvis utilia possint alias putari. Namque, dum vim naturæ inferunt, viræ ejus lacerant vehementius, ac penitus prosterunt. Nec præsidium, arbitror, in opiatis ponendum; quia brevi tantum tempore medelam afferunt; morbum vero non tollunt prorsus, sed naturæ potius motus perturbant. Præterea quædam remedia alvum quidem, haud secus ac rhabarbarum, solvunt; sed ob alias diabetes molestias tuto non admittenda sunt. Sic utilitatem pariunt haud contemnendam senna, syrpus rhamni cathartici, mercurius dulcis, manna &c. atque in morbis infantum ventrem quidem molliunt, si febris absint commotiones. At febris cum diabete comitetur, tutius est uti rhabarbarinis, & quidem in forma potionis, vel tincturæ; præcipue si hæc cum liquore nitri antimoniatum paratur, quale fere quotidie utor. Et ejus quoque tincturæ cum liquore nitri antimoniatum virtutes eximias sæpe sum expertus in dysenteria tum benigna, quam vocant, tum etiam maligna. Tam enim abstergit, quam relinquit nonnihil, quod sit adstringens: ac præterea dysenteriam imperite, antequam decebat, suppressam, revocat.

Iis, qui vehementiore impetu & affectu iræ abripi solent, ut noceant sanitati, rhabarbarum apprimè convenit; ad corpus præmuniendum, si in potionibus, & forma tincturæ vel alio modo capiatur. Pereximie quoque sublevat, alvumque ducit, ubi turgentium hæmorrhoidum molestiis æger excrucietur. Quæ quidem omnia virtutes rhei, vimque medendi saluberrimam, ipsa experientia frequentissima confirmatam, luculenter comprobant. Nec mihi perspectum est de alio medicamine, quod tam promptè feliciterque opem ferat, ad valetudinem ex diabete recipiendam. Myrobalanis quidem uti haud omnino abs re foret; nisi forte alia intercederet ratio, quæ, tuto minus id fieri, arguit. Ob rariorem enim usum hodiernum rarius quandoque incidere licet in myrobalanos recentes, ac virtute sua nondum exhaustas. Quare

E e e e 3

certiora

certiora videntur commoda ex rhabarbaro speranda, quod nullus dubito, quin specificum habeam in diabete curatione.

§. XX.

Sufficiant hæc ad expedienda ea, quæ de diabete maxime per rheum sananda differere nobis constitutum fuit. Eo brevius rem licuit perstringere; quod nec fuscæ morbi indolem persequi sumus adgressi, nec omnia examinanda fuerunt aut attingenda ejus remedia. Id scopi exegit ratio, ut potissimum exponeretur, quantum utilitatis rhabarbaro inesse experientia doceat, si ad coercendum urinæ largius effluentis impetum adhibeatur. Neque incipiamus, ut in multis aliis, sic etiam in diabete, tam taro morbo, ea esse obvia, quæ penitus perspicere non medicis fuit concessum. Hinc probabile quoque, providam naturam plura adhuc remedia, quam quæ nota sunt, eidem morbo opposuisse. Interea vero, de quibus constat, cum nullius præstantia se tantam nobis probaverit, quantam rhabarbari virtutem sumus experti; hoc, ubi inciderit diabetes, maxime commendamus.



CCLXIX
 GEORG. CHRIST. DETHARDING
 ET
 FRANC. PHILIPPI KNAUDT

DE

HÆMORRHOIDIBUS VESICÆ MUCOSIS.

Reſſoch 1754

PROOEMIUM.

Quando Collegium Londinense, in perpetuam gloriam, & memoriam
 immortalē, Guilielmo HARVÆO, Anglo, statum erexit, quod
 eoque vel omnino incognitam, vel in puteo Democriti latentem de circulo
 sanguinis in animalibus doctrinam, cum magno artū medica incremento, in
 salutem tot aegrotantium, in lucem produxerit; non omnino minor debetur
 gloria STAHLIO, Germano, quod plethoræ negotium trutinando, in-
 simul incidit in pathologiam hæmorrhoides concernentem, & in lucem pro-
 tulit ætiologiam & explicationem morborum absconditorum, ex hoc fonte
 ortum trahentium, huiusque medendi methodum tot scriptis commendaverit.
 Non majus meriti inde fluentis allegare possum testimonium, ac quod dedit
 ejus Collega HOFFMANNUS, itidem magni nominis Medicus. Hic ete-
 nim, licet quoad theoriam medicam admodum ab eo dissentiat, nibilo tamen
 secius in Commentario de differentia inter utriusque doctrinam p. 33. hæc
 in laudem ejus profert verba: „ Nemo ex recentioribus fuit, qui veterum
 „ sententiam de noxa plethoræ, de hæmorrhoidum fluxu suppresso, quantas
 „ molestias & incommoda procreet, penitus fere extinctam & neglectam, in
 „ usum & lucem revocaverit, præter Illustrē Stahlium. .. Hujus ergo
 industria, & arti medica inserviendi studio dandum est, quod hodie omnes
 Medici rationales, nec allegato HOFFMANNO excepto, adtentā mente,
 se - & excretionis hæmorrhoidalium fata, siue dextra, siue sinistra respexer-
 unt, & indicationes formaverint, tam conservationem sanitatis hæmor-
 rhoidariorum, quam restitutionem ab anomalis hæmorrhoidalibus lesa valetu-
 dinis.

diminui, respicientes. Quantum vero semitam memoratam calcantium numerum, quanta inde in morbum, præsertim diuturnum, lux affusa, quot hinc inde exsistent monita saluberrima, tantum tamen abest, ut negotium hoc tam proficuum penitus fuerit exhaustum, ut varia adhuc restent, ulteriorem, eandemque dilucidiorem expositionem desiderantia. Huc, me quidem iudice, pertinet pathologia hæmorrhoidum, sub forma muci & vesica urinaria produntium, cuius descriptionem & explicationem specialem in monumentis Medicorum invenire nondum licuit. Opera proinde pretium futurum esse iudicavi, illam speciminis inauguralis loco, enodatum paulo, quousque experientia progredi permisit, commemorare. & alia occasionem subministrare, ulteriores, tam in cognoscendo, quam debellando huic morbo, qui sane Medicis clinicis multum negotii facessit, faciendi progressum. Faxit summum Numen, ut hic labor feliciter succedat!

§. I.

Hæmorrhoidum fluxum legitimum variis individuis salutarem esse, & refractarios quandoque morbos, nullis remediis, cedentes, vel avertuncare, vel tollere posse, experientia dudum confirmavit. Ex quo est, quod Medici omni studio inculcare soleant, illum non tantum patienter ferendum, sed & eo allaborandum, ut nullo artificio, vel incongrua dicta turbetur, imminuatur vel sufflaminetur.

S C H O L I O N.

Non nimio in hæmorrhoides amore capti, plus hisce tribuimus, quam ab illis jure meritoque expectari potest. Ad statum siquidem pertinent præternaturalem, hinc hæmorrhoidarios, adcurate loquendo, sanis adscendere nequaquam possumus. Sed prout e duobus malis minus est eligendum, ita & fluxus hic præferendus est molestius aliis gravioribus, quæ ab arte medica non vincuntur, hæmorrhoidibus autem surgentibus haud raro obsecundant. Quorum referendi adfectus arthritici, malum ischiadicum, affectio hypochondriaca, melancholia, mania &c. Vel sicubi in sanis contigerint hæmorrhoides, tolerandæ sunt, ut prophylaxeos loco morbos fortassis futuros præcaveant, neque intempestive suppressæ, variis, iidemque mirificis subinde ægredituribus ansam præbeant. Confer. HOFFMANNI Disputat. de Salubritate fluxum hæmorrhoidalis. ALBERTI de hæmorrhoidibus longevitatis causa; de PRE, de hæmorrhoidali fluxu, magno ad vitam sanam & longam remedio.

§. II.

§. II.

Quanta etenim commeda, ex legitimo hocce fluxu, in œconomiam animale[m] redundant, tantæ certe sunt ægritudines atque molestiæ, quæ vel molinina saltem hæmorrhoidalia, vel imperfectam, vel nimiam hæmorrhoidum exclusionem comitari, aut pressio pede sequi, atque sub vario quandoque schemate incedere solent, ita ut nisi rite examinentur, Medicos in devia deducere valeant.

S C H O L I O N.

Anomalix & metaschematisui, negotium mensium illegitimum stipantes, tot vicissitudinibus vix deprehenduntur obnoxii, quot hæmorrhoidum motus irregulares Clinicis subinde offerunt. Enodatum singulorum phænomenorum recensitionem & instituti ratio, & pagellarum angustia prohibet. Sufficiat proinde eandem in breve coëgisse. Quando nunquam sinceri sanguinis ex vasīs hæmorrhoidalibus exclusio contingit, Æla versus eadem congestio causatur dolores plus minus vehementes, os sacrum atque lumbos occupantes, tenesinum, borborygmōs, dolores colicos, & catervam symptomatum malum hypochondriacum comitantium. Si quando fluxus hæmorrhoidalis olim cum euphoria successit, ast ex malo regimine, vel incongrua medicatione fuit imminutus aut plane suppressus, molestiæ modo recensitæ non parum exacerbantur; adcedunt spastici motus vehementiores, colica hæmorrhoidalis, adflectus inflammatorii; nonnunquam sanguis in visceribus venæ portæ adnexis stagnans, horundem infarctuum & scirrhorum existit author, hi cachexiam, œdemata & hydropem post se trahere potis sunt. In aliis sanguis versus superiores corporis partes retropellitur, unde asthmatici insultus, tussis sicca, palpitationes cordis, & ex ruptura quandoque vasorum, vomitus cruentus, hæmoptysis, apoplexia & hæmiplexia: In nimia quantitate si hæmorrhoides profundantur, hæc tantum non semper præternaturalem visceris cujusdam nobilioris in abdomine innunt conditionem, vires depauperant, habitum corporis cachecticum inducunt, tandemque, irrita si fuerit medela, febri hecticæ lethali viam pædunt. Haud ita raro, loco sanguinis sinceri, mucosa excernuntur, quæ parum solatii, potius haud leves molestias adferre solent, cum supra recensitis coincident, & si diutius persisterint, tabem dorsalem, atque imprimis in senibus marasimum inducunt. Anomaliis porro hæmorrhoidalibus jure adfensæ hæmorrhoides externæ, ex rara ab illis proveniente sanguinis profusione, cæcæ dictæ, utpote quæ suppressas quandoque veras hæmorrhoides excipiunt, furenti dolore & inflammatione ægrotos excruciant, & ex mala imprimis medicatione, adflectus arthriticos, nephriticos,

Disput. Medico-Pract. Tom. VII.

F f f f

cos,

cos, pruritus ani serpiginosos, imo fistulas ani conciliare valent. In feminis si obtigerint motus hæmorrhoidales, mensuum negotium ut plurimum turbatur, vel si alternis temporibus se exerunt, ex continua fere sanguinis profusione vivida olim indoles destruitur, vires adteruntur, & leucophlegmatizæ atque cachexiæ aperiuntur fores. Hæmorrhoidalium tandem motuum cum aliis morbis complicatorum symptomata proteiformia quod concernit, hæc incantos facile fallere possunt, ut, nisi ab invicem probe distinguantur, & indicantium atque contraindicantium iusta habeatur ratio, non sine insigni ægrorum detrimento, hallucinari queant. Plura quidem momenta huc spectantia in medium proferre possem, at brevitas; ergo saltem provoco ad scripta Medicorum v. g. HOFFMANNI, STAHLII, JUNCKERI, BERGERI, EYSELII aliorumque; in specie consulendæ *Dissertationes academice* Dn. Michaelis ALBERTI de hæmorrhoidibus, quippe qui, in explicando negotii hæmorrhoidalis toto ambitu, singularem operam posuit.

§. III.

Inter insolitas vias, quas hæmorrhoides suppressæ vel anomalæ quandoque petere solent, vesica urinaria itidem referenda, ex cujus vasis, a sanguine illuc congesto nimium repletis, tandem dehiscens, vel ruptis, sanguis vel sincerus, vel grumosus, vel muco commixtus, haud raro insigni cum cruciatu, in cavitatem vesicæ defluit, & cum urina, sub forma micæ cruenti evacuatur.

S C H O L I O N.

Possibilitatem hujus fluxus neminem crediderim negaturum fore cui ex anatomicis notum, vesicæ vasa sanguifera, præsertim circa collum ejusdem reperibilia, cum hæmorrhoidalibus externis, hæc cum internis, interventu minutissimorum furculorum connecti. (a) Quando ergo sanguinis per vasa sedalia egressus sufflaminatur, sub impulsu continuo, & denegato liberiori per venas regressu, vasa vicina connexa insimul distendantur necesse est, distensio hæc excitat sensationem dolorificam, spasmos, & interdum ruptis, vel ampliatis vasorum extremitatibus, sinceri sanguinis profusionem. Ex hac innuediata vesicæ urinarie cum intestino

(a) In Annalibus Vratidaviensibus Anni 1720. Mense Majo p. 416. refertur, mediante injectione materizæ ceracæ in venam portæ, detectum fuisse, ramum hæmorrhoidalem Internum, circa collum vesicæ, ubi ureteres se inserunt, abisse, cui adtipulari videntur VERNER in *Anatom. Trail.* II. c. 10. HOGHSTETERUS *Dec. I. Schol. ad cas. 2. 2^o Cass.* BAUHINUS *Anat. L. I. c. 20.*

siuo recto in viris connexione, ratio insimul petenda, cur vix unquam hæmorrhoides vesicæ in feminis deprehendantur, quippe quarum vagina uteri locum inter bina hæc viscera occupat. Ab hæmorrhagiis, hisce autem, haud tamen immunes existunt, quæ autem caramenis magis, quam hæmorrhoidibus supressis tribuendæ. Quandoquidem vero status hicce præternaturalis inter rariores collocandus, (b) Medici passim seducti sunt, ut haud accurate observatis phenomenonis, vesicæ hæmorrhoides vel antecessentibus vel comitantibus, has pro vero mictu cruento venditaverint; operæ pretium proinde futurum arbitror, si, qualis sit differentia utriusque fluxus, sigillatim exposuerim, ne error in medendo, cum præjudicio ægrotantis committatur.

(1.) Mictus cruentus simplex & verus, e renibus ortum trahens, ob minorem renum sensibilitatem, ut plurimum nulla singulari, vel ad summum, leni quadam spastica sensatione stipatus deprehenditur, ita, ut eo correpti præsentiam hujus hæmorrhagiæ prius non intelligant, quam in matula urinam sanguine commixtam observent; Hæmorrhoides autem vesicæ tantum non semper comitem habent continuum fere ad mingendum stimulum, & dolorem spasticum evidentem circa regionem pubis, versus hypogastrium, perinæum, & intestinum rectum se extendentem; substantia eientum vesicæ, ejusque colli membranaceo musculosa, multisque nervis referta irritabilitati & sensibili spasticæ stricturæ magis existit obnoxia.

(2.) Mictus cruentus haud tam facile ex suppressis hæmorrhoidibus præsertim internis ortum trahit, sed ut plurimum pro causa agnoscat diu-retica fortiora, ab usum veneris, diætam spirituosam & aromaticam, motum corporis succussatorium, calculum, externas læsiones violentas &c. Hæmorrhoides vesicæ e contra, prævias semper agnoscunt vel veras, vel cæcas hæmorrhoides, vel ad minimum, molimina hæmorrhoidalia, sin-ceri sanguinis evacuationem non obtinentia.

(3.) Mictus cruentus magnam ut plurimum sanguinis puri quantita-tem involvit, ut urinam commixtam interdum superet, & quando in matula, ob gravitatem specificam, subidet, ab hac facile discerni possit. Hæmorrhoides autem vesicæ plerumque minorem copiam sanguinis fun-
dunt,

F f f f f 2

(b) Observationes hæmorrhoidum per vesicam exclusarum deprehenduntur in *Heraculis Saxonica Pantheo Medicina select. Libr. III. C. 40. Ephrem A. N. C. Decur. I. A. VIII. Obs. 23. p. 42. & Dec. III. A. IX. & X. Obs. 119. p. 212. ROLFINGII Dissert. Anat. L. V. c. 25. Ad. Evolutum, Dec. II. Vol. VI. p. 47. BARTHOLEN Hist. Anat. Cent. V. obs. 64. HOECHSTETTER Dec. I. Schol. in cas. II. *НОТЪМАНИИ мед. ив. system. Tom. IV. P. II. Scd. I. C. VI. obs. 5.**

cos, pruritus ani serpiginosus, imo fistulas ani conciliare valent. In feminis si obtigerint motus hemorrhoidales, mensum negotium ut plurimum turbatur, vel si alternis temporibus se exerunt, ex continua fere sanguinis profusione vivida olim indoles destruitur, vires adteruntur, & leucophlegmatizæ atque cachexiæ aperiuntur fœres. Hemorrhoidalium tandem motuum cum aliis morbis complicatorum symptomata proteiformia quod concernit, hæc incantos facile fallere possunt, ut, nisi ab invicem probe distinguantur, & indicantium atque contraindicantium iusta habeatur ratio, non sine insigni ægrorum detrimento, hallucinari queant. Plura quidem momenta huc spectantia in medium proferre possem, ast brevitas; ergo saltem provoco ad scripta Medicorum v. g. HOFFMANNI, STABLIJ, JUNCKERI, BERGERI, EYSELII aliorumque; in specie consulendæ *Dissertationes academice* Dn. Michaelis ALBERTI de *hemorrhoidibus*, quippe qui, in explicando negotii hemorrhoidalis toto ambitu, singularem operam posuit.

§. III.

Inter insolitas vias, quas hemorrhoides suppressæ vel anomalæ quandoque petere solent, vesica urinaria itidem referenda, ex cujus vasis, a sanguine illuc congesto nimium repletis, tandem dehiscensibus, vel ruptis, sanguis vel sincerus, vel grumosus, vel muco commixtus, haud raro insigni cum cruciatus, in cavitatem vesicæ defluit, & cum urina, sub forma mictus cruenti evacuat.

S C H O L I O N.

Possibilitatem hujus fluxus neminem crediderim negaturum fore cui ex anatomicis notum, vesicæ vasa sanguifera, præsertim circa colulum ejusdem reperibilia, cum hemorrhoidalibus externis, hæc cum internis, interventu minutissimorum furculorum connecti. (a) Quando ergo sanguinis per vasa sedalia egressus sufflaminatur, sub impulsu continuo, & denegato liberiori per venas regressu, vasa vicina connexa insimul distendantur necesse est, distensio hæc excitat sensationem dolorificam, spasmos, & interdum ruptis, vel ampliatis vasorum extremitatibus, sinceri sanguinis profusionem. Ex hac immediata vesicæ urinarie cum intestino

(a) In Annalibus Vratislaviensibus Anni 1720. Mense Majo p. 516. refertur, mediante injectione materizæ ceracæ in venam posticæ, detectum fuisse, rarium hemorrhoidalem iterum, circa colulum vesicæ, ubi ureteres se inserunt, abesse, cui adscriptari videntur VERBEY in *Anatom. Tract. II. c. 10.* HOFCHSTETERUS *Dec. I. Schol. ad cas. 2. & Cass. BAUHNUS Anat. L. I. c. 20.*

si no recto in viris connexionē, ratio insimul petenda, cur vix unquam hæmorrhoides vesicæ in feminis deprehendantur, quippe quarum vagina uteri locum inter bina hæc viscera occupat. Ab hæmorrhagiis, hisce analogis, haud tamen immunes existunt, quæ autem caramenis magis, quam hæmorrhoidibus suppressis tribuendæ. Quandoquidem vero status hicce præternaturalis inter rariores collocandus, (b) Medici passim seducti sunt, ut haud accurate observatis phœnomenis, vesicæ hæmorrhoides vel antecedentibus vel comitantibus, has pro vero mictu cruento venditaverint; operæ pretium proinde futurum arbitror, si, qualis sit differentia utriusque fluxus, sigillatim exposuerim, ne error in medendo, cum præjudicio ægrotantis committatur.

(1.) Mictus cruentus simplex & verus, e renibus ortum trahens, ob minorem rerum sensibilitatem, ut plurimum nulla singulari, vel ad summum, leni quadam spastica sensatione stipatus deprehenditur, ita, ut eo correpti præsentiam hujus hæmorrhagiæ prius non intelligant, quam in matula urinam sanguine commixtam observent; Hæmorrhoides autem vesicæ tantum non semper comitem habent continuum fere ad mingendum stimulum, & dolorem spasticum evidentem circa regionem pubis, versus hypogastrium, perinæum, & intestinum rectum se extendentem; substantia etenim vesicæ, ejusque colli membranaceo musculoſa, multisque nervis reſerta irritabilitati & sensibili spasticæ stricturæ magis existit obnoxia.

(2.) Mictus cruentus haud tam facile ex suppressis hæmorrhoidibus præsertim internis ortum trahit, sed ut plurimum pro causa agnoscit diu-retica fortiora, abusus veneris, dietam spirituosam & aromaticam, motum corporis succussatorium, calculum, externas læsiones violentas &c. Hæmorrhoides vesicæ econtra, prævias semper agnoscunt vel veras, vel cæcas hæmorrhoides, vel ad minimum, molimina hæmorrhoidalia, sin-ceri sanguinis evacuationem non obinentia.

(3.) Mictus cruentus magnam ut plurimum sanguinis puri quantita-tem involvit, ut urinam commixtam interdum superet, & quando in matula, ob gravitatem specificam, subsidet, ab hac facile discerni possit. Hæmorrhoides autem vesicæ plerumque minorem copiam sanguinis fun-dunt,

F f f f 2

(b) Observationes hæmorrhoidum per vesicam exclusarum deprehenduntur in *Herculis SAXONIA Paucis Medicina select. Libr. III. C. 40. Ephem. A. N. C. Decur. I. A. VIII. Observ. 23. p. 42. & Dec. III. A. IX. & X. Obs. 119. p. 212. ROLFINKII Dissert. Anat. L. V. c. 25. Ad. Broliensis, Dec. II. Vol. VI. p. 47. BARTHOLIN Hiji. Anat. Cent. V. obs. 64. HOECHSTETTER Dec. 1. Schol. in cas. II. HOFFMANNI med. rus. System. Tom. IV. P. II. Sect. I. C. VI. observ. 5.*

dunt, nunc urinam loturæ carniū similem reddunt, nunc filamenta rubicunda mucida exhibent, nunc in grumos compactæ, diametrum urethræ superantes, ingenti cum cruciatu quandoque excernuntur.

(4.) Mictus cruentus vix unquam periculo vacat, & præsertim in senibus tabem & hecticam post se trahit; Hæmorrhoides autem vesicæ plus molestiarum, quam periculi secum ferunt, nisi intempestive datis medicamentis vel mala diætâ pervertantur.

(5.) Hæmorrhoides vesicæ, porro, distinguendæ facile sunt ab hæmorrhagia ureterum, quam calculorum transeuntium asperitas, vascula sanguinea dilacerando, contrahere solet; dolores etenim exquisitissimi inde oriundi locum facile detegunt, & sanguis, e venulis dilaceratis profluens, raro alicujus momenti deprehenditur. Quod

(6.) Hæmorrhagia penis ab hæmorrhoidibus vesicæ differat, non est ut multis exponam. Illa enim ex urethræ & prostaticæ læsione oriunda, spontaneo sanguinis, absque urina, ex urethra stillit, cido dignoscitur; licet non negandum, & suppressas hæmorrhoides, ob nexum cum urethra, beneficio vasorum hypogastricorum, hæmorrhagiæ penis fontem esse posse.

§. IV.

Prouti vero hæmorrhoides, si quando in fluxu turbantur, nonnunquam loco sanguinis sinceri, mucum saltem fundunt, nomine hæmorrhoidum albarum vel mucosarum venientem, ita non tantum verosimile est, verum & observationibus certis evictum, hæmorrhoidibus vesicæ simile quid contingere posse, ut in mucosas convertantur.

SCHOLIUM.

Hæmorrhoides vesicæ mucosas jam ab omni ævo existisse, extra omnem dubitationis aleam positum esse videtur, ad anomalias enim excretionis pertinent, quibus olim æque, ac hodiernis temporibus obnoxii fuerunt hæmorrhoidarii. Nec desunt observationes præcorum Medicorum, qui eas scriptis suis concedidere, licet mucositatem talem cum urina excretam, vel pro pure, vel pro chylo non rite elaborato venditaverint. Jam tum magnus HIPPOCRATES mictum sanguinis & puram mentionem fecit Sect. IV. aphorism. 75. sed causam ejusdem in exulceratione remitti & vesicæ collocavit. Penes TIMÆUM in cas. medicin. lib. III. p. 182. & sq. refertur morbus viri cujusdam illustis, qui ultra biennium urinas minxit turbulentas, & quidem lacteas, quæ ubi aliquandiu in matula steterant, materia quadam alba, pulvis instar, fundum perit, tanta

tanta copia, ut dimidium urinalis repleverit. Pariter SENNERTUS in praxi Lib. III. part. VIII. p. 331. sepe etiam inquit, materia alba & lactea quasi, cum urina copiose emittitur; & quidem sepe tanta copia, ut ubi subsidet, dondus pars matula repleatur, & talis urina mictio sepe satis diu continuatur. Imo HOFFMANNUS in med. rat. systemat. Tom. IV. P. II. Sec. I. C. VI. p. 142. mentionem injicit mucosi & glutinosi, quod in urina suberuenta subinde conspicitur, sedimenti, cujus sepe tanta sit copia, ut si a renum exulceratione esset, jam centies absumpti isti fuissent. Hoc viscidum itaque non pro pure habet, sed pro mucositate, qua ex nimis relaxata glandulosa vesicæ & urethræ tunica, aut ex prostaticis levis exsillat & urinae permiscetur. Facillimo negotio plura exempla istiusmodi fluxus mucosi ex monumentis Medicorum, & ex propria praxi proferre possem, nisi de certitudine ejusdem modo adlata testimonia sufficerent. (c) Quæstio saltem foret, unde tanta quantitas mucosi hujus crassatis derivanda? A renibus, & ab exulceratione eorumdem desfluere illud non posse, jam modo laudatus HOFFMANNUS l. c. evictum dedit, multo minus ureteres, & me quidem iudice, prostaticæ hanc copiam suppeditare valent, dum inter exiguam harum partium molem, & ingentem secreti muci vim nulla intercedit proportio; necessario proinde originem in ipsa vesicæ, ejusque collo collocandam esse censeo. Nec structura vesicæ urinariæ huic evacuationi deprehenditur inepta; tunica siquidem ejus interior, quæ nervea audit, tomentosam possidet superficiem, in qua nonnulli anatomici, præsertim circa ejus collum, glandulas detectisse perhibent, hæc in statu naturali mucum secernit, pro defensione vesicæ contra acrimoniam urinæ, quæ alias sensibiles vesicæ parietes, haud absque perceptione molesta vellicare posset. Quanto itaque ex stagnante in vasis vesicæ sanguine, tonus horundem debilitatur, substantia

F f f f f 3

tia

(c) Non dubito fore nonnullos, qui pulsem illam, cum urina in tanta quantitate exclusam, non pro hæmorrhoidibus vesicæ mucosis, sed pro heterogenitatibus, cacochylis, scorbuto, aliisque morbis adscensibus, & per metastasim e renibus & vesicæ proscriptis sint habituri. Verum, si perpendamus, istis temporibus, symptomata singula, exclusionem hanc vel antecedentia vel stipantia, ex præjudicio præconceptæ opinionis, & ignorantia negotii hæmorrhoidalis, eo, quo decussit Italio, non examinata, potius causis quibusdam remotis adscripta, hinc in debito uexu non recensita fuisse, ambiguitas denominationis hujus morbi fortassis cessabit. Cui addebat, quod ægroti tales de nulla alia molestia fuerint conquesti, sed valetudine ceteroquin integra gavisi, quod contingere non potuisset, si dyscrasia tanta humorum laborassent. Nec obstat quantitas muci rejecti dum unicuique notum, ferum sub forma mucida non minimam partem sanguinis constituere, & per varia corporis emunctoria proscindi, hoc proinde cum lymphæ quadam portione, aliisque impuritatibus commixtum, haud exiguam molem viscidum suppeditare, valet, cui hæmorrhoides per vesicam viam patefecere.

tia sanguinis gelatinosa ex mora lentescens, per orificia, ex quibus mucus ordinarie exsudat, exitum sibi majori quantitate parat, parili fere modo, prouti observamus, fluorem album benignum ex vagina uteri, & hæmorrhoides albas, vel mucosas ex intestino recto prorumpere.

§. V.

Hæmorrhoidum proinde vesicæ mucosarum nomine venit lenta illa & gelatinosa quasi mucilago, quæ, præviis tantum non semper motibus hæmorrhoidalibus, ex vesica, una cum urina excluditur, nunc albicans coloris, nunc sanguine quodammodo reusita, omnis ut plurimum odoris expers, & quantitatis diversæ.

SCHOLIUM.

Facies hæmorrhoidum vesicæ mucosarum in scholio antecedenti, adlatis quibusdam exemplis, quodammodo fuit delineata. Juvabit tamen, melioris intellectus ergo, si qualitates earundam specificas & symptomata comitantia adumbraverim: Vix unquam se exferere solent, nisi motus hæmorrhoidales præcesserint, sive sanguinis sinceri, sive muci saltem exclusio contigerit, sive in solis, sed irritis naturæ conaminibus huc respicientibus subsisterint. Sæpius tamen ab hæmorrhoidibus externis cæcis, quam internis suppressis, hanc evacuationem subortam esse, fuit deprehensum, cujus ætiologia in immediata valorum colli vesicæ cum hæmorrhoidalibus externis connexionem est reposita. Mucilago hæc, quando cum urina evacuatur, huic est intermixta, simulac autem in matula refluxerit, particulæ ejus gelatinosæ sibi magis coherentes, & specificæ graviore redditæ, pedetentim fundum petunt, ut ab urina facile dignosci possint. Interdum tamen tantam ejus tenacitatem deprehendere licuit, ut miscellam cum lotio calido inimiorem recusaverit, & post hujus exclusionem nonnisi moleste per urethram exprimi potuerit.

Quantitas muci hujus excreti, ratione individuorum admodum differt, sunt, licet raro, qui ingentem ejus vim reddere solent, ut molem urinæ superet, in aliis unciam vix superat. Color itidem variat, ut plurimum mucilagini seminis cydoniorum vel psillii non absumilis, interdum magis obscurus, imo brunneus, & quando exclusio multis molestiis stipata, sanguinolentus existit, nonnunquam striz sanguinæ mucus intermixtæ deprehenduntur. Odorem ut plurimum nullum exhibet, & qui naribus objicitur, urinæ magis tribuendus. At in cacochymicis & scorbuticis, imprimis ætate provectis, nonnunquam specificæ acris & saluginosus quasi deprehenditur, quem nostrates *einen strengen Geruch* appellati.

pe'litare solent, ut, nisi matulæ sæpius repurgentur, vel mutantur, totum conclave ægroti cum fastidio adstantium repleat; ad putridum tamen vel purulentum nunquam adcedit. Aetas huic adfectui obnoxia semper fere est senilis, ut ante annum quinquagesimum vix unquam observaverim.

Status raro servat periodos, sed irregulari typo incedere solet, in quibusdam sine intermissione continuat, plurimam tamen partem suam admittit temporum intervalla. Haud itidem sub unaquaque urinæ exclusionis observatur, quin hæc quandoque limpida exiit, tempore tumen matutino, somno nocturno exantato, præsertim visui sese exhibere solet.

Symptomata hanc evacuationem stipantia variant admodum, pro modulo diætæ, temperamenti, constitutionis individualis, & medendi methodi. In nonnullis veræ vesicæ hæmorrhoides præcessere, in mucosis tandem se mutantes, in aliis absque prævio sanguinis proventu oritur. Aliquando clandestine procedit, nullas molestias secum ferens, raro autem contingit hoc morbo correptis felicitas ista, quin varia experiantur symptomata plus minus acuta.

Hæc inter præcipuum esse solet, spasmodica, collum imprimis vesicæ, & sphincterem tangens constrictio, ingentibus subinde doloribus conjuncta, & non raro per urethram se diffundens. Sub his circumstantiis parva satis muci quantitas profluere solet, dum orificia vasorum coarctantur, & crispaturam quasi induunt.

Spasmi hi ad intestinum rectum sæpe se diffundunt, ut vel alvi obstipatio satis pertinax, & vix ab enemate solvenda, vel molestissimus subsequatur tenesmus. Halcyonia interim admittit hic affectus, nunc breviora, nunc diutius protracta, imprimis si justa medicatio & diætâ conveniens adceperit. Sicubi vero vitium circa res non naturales obreperit, imprimis æger animo commoveatur, tarditatem gravitate compensare consuevit.

§. VI.

Distinguantur ergo, necesse est, hæmorrhoides vesicæ mucosæ ab urina lactea, purulenta, exulceratione renum & vesicæ, mucus a calculo vesicæ oriundo, spasmio vesicæ, gonorrhœa benigna & maligna.

SCHOLIUM.

Signis pathognomicis hæmorrhoidum vesicæ mucosarum potioribus expostitis, ordi postulat, ut affectus huiusce quodammodo analogos recenseam,

scam, quo collatis singulorum phenomenonis, eo magis clucescat differentia unius cujusque ægritudinis specificæ.

- I. Urinas albas, quorsum referenda nives, lactea, glauca, charopa, subjugalis, jam veteres medici inter signa cruditatis & cacochylia, non sine fundamento collocarunt. Experientia siquidem docuit, chylum non rite elaboratum multas secum in sanguinem vehere impuritates, œconomiam animalem quovis modo turbantes, quarum haud exigua portio cum urina eliminatur, sub specie lactis intermixti, vel putaceæ materiæ adparens. Hocce crama autem præternaturale ab hæmorrhoidibus vesicæ mucosæ dignosci poterit, si modo attendatur

(a) urinas tales lacteas & putaceas sæpe claras emitti, sed temporis tractu, quando refrigere, habitum istum spissiorum induere: mucum e contra hæmorrhoidalem statim sub sua exelusione visui sese filtrere

(b) urinas istas albas conjunctas esse cum vermibus, ventriculi, & ejus contentorum perversa conditione, ex signis pathognomicis facile detegenda, cachexia, leucophlegmatia, aliisque, morbos chronicos parturientibus heterogeneitatibus; Hæmorrhoides e contra vesicæ mucosæ in ceteroquin sanis oriri posse, in quibus nullum notabile vitium jam in partibus corporis solidis, quam fluidis deprehenditur, quale exemplum affert RAYGER *Eph. G. Ann. III. Obs. 284.* de Paradago, qui per decem menses urinam albam, crassam & viscidam, sine intermissione, absque corporis extenuatione, aut alia molestia, præter dolorem inter mingendum exclusit, quodque malum nullis remediis ulceri renum opponi solitis, non vino malvatico, stomachicis vel antiscorbuticis fuit debellandum.

(c) urinas albas tenerioris ut plurimum indolis esse, mucosæ vero hæmorrhoides viscositatis & ténacitate magis se prodere, ut levis agitatio urinæ haud sufficiat ad eandem elevandam, & sub quiete statim iterum fundum occupet.

(d) Urinas albas, vel sine aliquali sensatione dolorifica, vel saltem absque molestiis cum negotio hæmorrhoidali combinatis excludi, hæmorrhoides autem mucosæ raro omnis doloris & perceptionis alicujus sensibilis expertes esse.

- II. Urinam pure commixtam quod concernit, qualem excernere solent, qui inflammatione visceris cujusdam nobilioris, abscessibus internis, inprimis exulceratione vel vulnere renum, ureterum & vesicæ laborarunt,

rarunt, hæc odore, consistentia, & symptomatibus individuâ ab hæmorrhoidibus vesicæ differt.

(a) Pus cum urina commixtum, specificum emitit odorem putridum, plus minus nares fœtientem; mucus hæmorrhoidalis e contrario tali odore destituitur.

(b) Purulenta materia sub agitatione matule, levi opera, cum urina iterum commiscetur; mucus hæmorrhoidalis fortiozem requirit motum, nec ab hoc ex tenacitate tam prompte resolvitur.

(c) Exclusio puris vix unquam absque præviis motibus febrilibus, & doloribus fontem ejusdem indignantibus contingit, & si continua-verit, febris lenta se sociare solet, tanquam testis notabilis visceris interni læsionis; ex renibus exulceratis si defluerit, haud ita raro ca culi, caruncule, filamenta pilorum ad instar, immo moleculæ parvæ pingues, tanquam partes a parenchymate renium avulsæ, puri vel urinx internixtæ deprehenduntur. Hæmorrhoides vesicæ mucosæ ab istis heterogeneitatibus sunt liberæ, symptomatice sensibilem febrem non habent comitem, vel si hæc adfuerit, conditioni vesicæ extraordinariæ, aut causæ cuidam remotæ ascribenda est; dolores ab illis quando perlentiscunt ægri, hi vesicam & loca vicina saltem tangunt.

III. Nonnunquam mucus cum urina excluditur, non hæmorrhoidibus sed calculo imprimis vesicæ tribuendus, quippe qui ex molestia, & continua pressione vel vellicatione, majorem humorum, vesicam versus, excitat congestionem; ex præsentia horumdeni copiosiori, fecernitur per interiorē vesicæ tunicam major mucii quantitas, quæ abhinc cum lotio excluditur. Alii enim vero, præter quod præsentia calculi cathetere detegenda, originem hujus mali facile indiget, non parvum inter hæmorrhoides vesicæ mucosæ, & viscidum a calculo vesicæ derivandum, intercedit discrimen. Hoc etenim non ita cohæret, sed argilloso, vel furfuraceo quasi est indolis, aliquando sabulo intermixtum; mucus vero hæmorrhoidalis consistentiam exhibet contiguam viscidiorē, nec divulsas ita particulas in se continet.

IV. Hæmorrhoides vesicæ mucosæ cum spasmō vesicæ haud raro conjunctas esse, adeoque mucum per tunicam ejus villosam exprimi, ex antecedentibus jam patet. Haud tamen omnis mucus cum spastico vesicæ motu rejectus, hæmorrhoidibus tribuendus, cum experientia doceat, a catamenis suppressis, retropulsâ arthritide, dyscrasia scorbutica,

Disput. Medico-Pract. Tom. VII.

G g g g g

butica,

butica, exulceratione vesicæ &c. simile quid contingere posse, cujus causas remotas signa anamnætica & diagnostica rite pensitata facile suppeditant. Confer. HOFFM. *med. rat. system.* Tom. IV. P. II. Sect. II. C. VII.

V. Discrimen, quod gonorrhœam tam benignam, quam virulentam inter, & mucum vesicæ hæmorrhoidalem intercedit, non est ut multis recenscam, adeo etenim manifesta sunt indicia gonorrhœæ propria, & levi opera, a quavis alia muci ex urethra exelusione discernibilia. Sub gonorrhœa benigna, ex laxitate organorum spermaticorum oriunda, materia quædam seminalis, absque ulla sensatione molesta, sine miscela cum urina effluit, vel, quando cum urina exclusa in transitu commiscetur, filamentis saltem exiguis albicantibus urinæ innatantibus, visui sese offert; mucus autem hæmorrhoidalis semper cum urina propellitur, molesta ut plurimum cum sensatione, quantitate majori, & consistentia spissiori. Eadem valent circa gonorrhœam virulentam, utpote quæ contagium venereum agnoscit, materia purulenta ex urethra, sine lotio desillante facile se prodit, & satellitibus molestissimis circumsepta quandoque deprehenditur, a quibus mucus hæmorrhoidalis plane immunis existit.

§. VII.

Refractariis morbis adfectus hicce adnumerandus. Si recens adhuc fuerit, remediis convenientibus, & surgentibus imprimis hæmorrhoidibus veris, aliquantulo obsecundat; habitualis vero redditus, omnem fere spem perfectæ restitutionis præcidit. Quando absque singulari molestia mucus iste evacuatur, tantum periculi non involvit, febriles autem motus si adcefferint, doloribus atrocibus & spasmis circa vesicam stipati, hi inflammationi vesicæ, exulcerationi, & necrosi ansum suppeditare valent.

SCHOLIUM.

Adumbrata facie hæmorrhoidum vesicæ mucosarum, addenda adhuc, quæ prognosin earundem concernunt. Quod de hæmorrhoidibus alb's, & fluore albo mulierum, tanquam adfectibus analogis, experientia docet, hos subinde exquisitissima illudere adminicula, idem de mucu hæmorrhoidali per vesicam egrediente adferendum. Haud desunt tamen exempla restitutorum, in quibus fluxus iste præternaturalis ad exiguum saltem tempus duravit, quorum vires adhuc suppeditant, & ætas nondum existit præcepta. Illis enim suppositis, imprimis,

mis, quando nunquam sinceri sanguinis hæmorrhoidales olim cum pertinacia continuarunt, sed sola versus confinia vesicæ congestio mucaginem hanc extorsit, debitis in subsidium vocatis remediis, ita profligari ægritudo hæcce potest, ut absque metu alicujus metasthenatisimi plane conquiescat. Quinimo diu continuare potest hæc exclusio muci, absque singulari sanitatis detrimento, modo molestiæ alioquin familiares abstulerint. Talem ægrotum octogenario majorem sistit BONETUS in *Sepulchret. Lib. III. Sect. 28. Obs. 18. p. 1286.* qui *urinas semper profudit copiosas, pituita viscidissima immixtas ad libram circiter, tenaciter adeo adhaerentes fundo utulæ, ut & ea inversa, effusa urina, ab illius fundo penderet: cum tamen nulla unquam fuerunt de calculo quærelæ, toto decem annorum, & quod excedit spatio.*

Optimum quidem præsidium in hæmorrhoidibus rite fluentibus esset collocandum, modo eventus remediis, hunc in finem adhibitis, semper subscriberet; uotum etenim, quantis difficultatibus sit obstructum hocce negotium, ut autoperariæ magis naturæ, quam arti competeret. Etiam si fluxus hæmorrhoidalis hanc muci exclusionem excipiat, attamen interpellari quandoque ab eadem potest, sicuti ex mora invaluit, & hæmorrhoides per breve tempus continuaverint, „ Sic re-
 „ latum mihi a Dn. Præside, eidem obtigisse casum, in ægrotò sexa-
 „ genario, qui olim hæmorrhoides cum euphoria expertus, abhinc ex
 „ vita sedentaria & morore gravi, ultra annum, nil harum, præter
 „ molestam pressionem quandam circa os sacrum, & vesicam, cum
 „ leni stranguria senserat. Hic, prævio dolore obtuso circa confinia
 „ vesicæ urinarie, tandem cum lotio emittebat mucum gelatinosum
 „ urina albidiorum, & post quietem fundum potentem, quod vero
 „ ab hac exclusionem se aliquomodo levatum percipiebat, illam sibi
 „ salutarem ratus, monita & remedia a Dn. Præside ipsi proposita
 „ aspernabatur strenue, donec gliscente pedetentim malo adcedente
 „ vesicæ spasmò, stranguria, & intercutantibus motibus febrilibus,
 „ opem medicam efflagitaret. Nec irrita eadem videbatur, debitis
 „ etenim adhibitis auxiliis e fonte chirurgico, pharmaceutico & dietetico petitis, hæmorrhoides denuo adparebant, cum sensibili muci
 „ ex vesica profluentis, & symptomatum eundem comitantium immi-
 „ natione, huc vero negotium redigi non poterat, ut plane cessa-
 „ verit, ut potius, silentibus per intervalla hæmorrhoidibus, mani-
 „ festo recruderit proventus mucositatis. Tandem æger diuturnitatis
 „ morbi perterritus, amplectendo curationes empiricas, ischuria & caro
 „ succubuit. „ Hæc enim sæpe vix non semper subire tenentur, per
 „ aliquot jamdum annos hunc fluxum percelli, imprimis ætate graves
 „ omni spe restitutionis carere deprehenduntur, ut satis habeant, quando

G g g g 2

scrocia

ferocia morbi palliatis quodammodo mitigetur remediis; & hæc temporis tractu decipiunt expectationem morientis, ut omnem operam se contrivisse observet. „ Se novissè quondam virum illustrem, mihi „ narravit Dn. Præses, hæmorrhoidibus cæcis quondam obnoxium, „ his vero deficientibus, spasmodum vesicæ cum exclusione muci ex- „ pertum, sub principio per vices insultantem, demum habitualem „ ita redditum, ut continuus ad mingendum stinulus ingenti dolore „ circa collum vesicæ stipatus, omnem consuetudinem cum amicis in- „ terlitterit; hunc celeberrimos Germaniæ Medicos, non sine magnis „ sumptibus, in consilium vocatos curasse, & quantumvis a non- „ nullis arcana, aliaque non contemnenda, cum voto & promissione „ felicitis successus, obtinuerit remedia, tantum tamen abfuisse, ut „ allevamentum cruciatuum, nedum perfectam restitutionem senserit, „ ut potius, indies fere ingravescenti malo, tandem in febrim hec- „ ticam inciderit, & improvise, celsantibus omnibus doloribus, „ juncto rigore, per totum corpus se diffundente, sphaceli teste, ex- „ tremum vitæ spiritum eliderit. „ Ratio difficilis, & irritæ quan- „ doque medelæ, in atonia potissimum, & relaxatione partium affecta- „ rum videtur esse collocanda, Major siquidem, & tantum non con- „ tinua sanguinis copiosioris ad vesicam congestio, vasa ejusdem & fi- „ bras ultra debitum tonum distendit, ex distentione diutius durante „ inducitur pedetentim impotentia debite repellendi humores inibi cu- „ mulatos. Sicubi ob sensibilitatem vesicæ adcesserint spasticæ tunica- „ rum ejusdem, & spinæ stricturæ medianibus hisce parum expel- „ luntur humores conservati, potius progressus eorundem sufflaminatur, „ & licet propellerentur, tamen remittente spasmò, libertas conceditur „ sanguini, fortius irruendi in debilitatas a spasmis fibras, ex quo est, „ quod post mortem hocce morbo peremptorum, vesica urinaria admo- „ dum crassa, & non raro circa collum varicosa deprehendatur. Pertinaciam invincibilem hujus mali augeat adhuc consuetudo habitum in- „ ducens, quippe quæ sola, morbos in herba facile suffocandos, de- „ mum rebelles admodum reddere solet, licet causa atque fomes eorun- „ dem dudum fuerit sublatus, quale quid in epilepsia habituali, cepha- „ lica, spasticis motibus, febri quartana, fluore albo, hæmorrhagia „ uteri &c. toto die, non sine tædio observare licet.

Inter signa mala referendi motus febriles ex hoc fonte oriundi, qui, si fuerint leviores, sub primis insultibus domari quandoque poterunt, sin autem per longas invalere moras, dysuriæ, inflammationi vesicæ profundiori, exulcerationi, & re infelicitè gesta, necrosi funestæ ansam suppeditare valent. Qualia exempla suppeditant *Eph. Acad. N. C. Dec. II. A. VIII. Observ. 143. p. 282. HOFMANN.*

Med.

*Med. Rat. System. Tom. IV. P. II. Sect. VI. Cap. 7. p. 416. BONETTI
Serpulæbret. Lib. III. Sect. 28. Observ. 15. p. 1284.*

S. VIII.

Curationis hæmorrhoidum vesicæ mucosarum fundamentum collocandum, in removendis earundem causis, demulcendis symptomatibus, roborando tono vesicæ, & præcavendis recidiivis.

SCHOLIUM.

Staturiginem fontici hujus mali in sanguinis a vasis hæmorrhoidalibus in vasa vesicæ propulsione fortiori quærendam esse, præmissa historia medico-clinica docuit. Curationem proinde aggressurus, ante omnia respiciat, ut urgentem sanguinem a vesica urinaria derivet, id quod ventillatione per venæsectionem optime perficitur. Si quando nunquam veræ hæmorrhoides adparuerint, sed in solis saltem subsisterint motibus eo tendentibus, vel hæmorrhoidibus cæcis fuerint infestatus æger, juvabit venam in brachio tundendam curare, habito saltem respectu virium & constitutionis individualis, alvo existente obstipata, hæc ante phlebotomiam, vel enemate, vel leni ecoprotico referenda. Sin autem veræ hæmorrhoides cum successu olim contigerint, vena pedis eligenda, atque eo adlaborandum, ut illæ recusitentur, modo ætas & vires ægroti, aliæque causæ procacitæ hæc hauri obstiterint. Huic scopo præsertim inserviunt hirudines vasis fœdalibus applicandæ, quæ operatio repeti poterit, quando abhinc imminutus mucositis fluxus, & symptomatum observatur mitigatio. Presentancam efficaciam subductione hac sanguinis particulari, prævia venæsectione in brachio, se aliquando vidiſſe retulit Dn. Præses, in ægrotis a suppressis hæmorrhoidibus cæcis, mucosis vesicæ correpto, utpote qui ab iterata, post mensis spatium, hîrudinum admotione, junctis remediis internis, perfecte convaleuit. Si maxime contigerit hæmorrhoidario, non esse tam felici, ut post sanguifugarum admotionem, hæmorrhoides in ordinem reducantur: atamen hoc remedium tentasse, nunquam quicquam nocebit, potius dep'etis, a suctione harundem, vasis sanguiferis, interposita medicamina citius ferent suppetias. Hæc inter eminent per epicrasin laxantia, quibus mediantibus humores a vesica blande deducuntur, imprimis multiplici experientia, pillule sic dictæ balsamicæ, ex extractis amaræ, & aloë gummosæ paratæ, ita se commendaverunt, ut in quibuscunque fere anomaliis hæmorrhoidalibus, non sine fructu adhiberi soleant. Non tantum enim gaudent virtute alvum movendi, verum & tonum roborant,

G g g g g 3

& vasis

& vasis fibrisque relaxatis robur debitum conciliant. Sicubi pillulæ non arriperint, hæc solvi possunt liquore terræ foliatæ tartari, eoque ipso virtus aperitiva magis acuatur. In quibus spissitudo humorum liberiori progressui sanguinis in vasis hypogastricis & hæmorrhoidalibus injicit remoram, his conveniunt diluentia & resolventia mitiora, sub forma infusi theiformis propinanda, a quibus calide haultis, æqualis insimul promovetur sanguinis per totum corpus distributio. Seligi hunc in finem poterunt radices Sarsaparillæ, Chinæ, Bardanæ, Taraxaci, Scorzonæræ, herba Betonice, Capill. ♀. Veronicæ, Melissæ, Bellidis c. tot. Stoechas arabic. &c. Magno itidem usui esse solent aque Selteranæ, sive puræ, sive lacte asinino, si ejus copia haberi potest, aut in ejus defectu, vaccino commixtæ, quæ combinatio istis imprimis conducit, quorum sanguis scorbutico vel acris particulis est inquinatus.

His remediis, si auscultaverit morbus, symptomata obvia sponte sua cessabunt; sin minus, & ægæ, durante adhuc methodo recensita, eisdem divexetur, horum itidem ratio habenda. Spasmodum fevitiam demulcent ☉ ata cum ☉ digestivo & absorbente citrato, debita proportionem conjuncta, vel sub forma pulveris, vel, quod præstat, emulsionem exhibita, quibus, pro gradu vehementiæ crocus, tanquam mitissimum anodynum, in refracta dosi addere licebit. In magis succulentis conveniunt Essentia Cascarillæ, addito Vitellum ovi ☉ dulci, ex Vitello ovi fumante parato. Nec minus egregiam opem ferent enemata ex semine lini præparata, & tantillo ☉, & Saccharo Thomæo acuata. Cui formulæ magis artificiosæ perplacuerint, adjungat semen Fœnugræci, radicem Althææ, Verbascum & Oleum lini s. Δ recentem expressum. Regioni pectinis imponi poterit vesica bubula, lacte, cum Hyssopo, Chamomilla, Meliloto, & radice Ireos Florentinæ decocto, repleta, modo caveatur, ne nimis calida existat.

Febriles motus debellantur iisdem remediis ☉ is & absorbentibus, ut & tincturis acidiusculis, cum phlegmate vitrioli paratis, abstinento a carnibus, earumque jusculis, & horum loco, concedendo potulenta aqua, liberaliori manu propinanda.

Sub metu inflammationis vesicæ, imo hac vere existente, interdum repetenda sanguinis ventilatio, ☉ in largiori dosi portigendum, tantillo camphoræ mixtatum. Salutaris quoque efficaciæ esse solet Album græcum cum Radice Scorzonæræ & C. C. raspatodecoctum, quod remedium, licet videatur esse sordidum, attamen in quibusvis inflammationibus internis, tanquam specificum deprehendit Dn. Præses. Superato

Superato morbo, tonum vesicæ, hujusdemque vasorum sanguiferorum relaxatum roborare valent Tincturæ alkaline cum vitello ovi C. G. rectificatissimo, vel vitello ovi bezoardico Bulli compositæ, ut & Tinctura vitrioli & Tartari fata Ludovici, si nihil contraindicaverit. Non minorem laudem hic merentur pillulæ supra recensitæ balsamicæ, cum limatura & conjunctæ, segnitie alvi laborantibus imprimis conducibiles.

Recidivæ arceri possunt tempestivis venæsectionibus, imo & scarificationibus, si adfuerint illis fuerint ægroti. Maximo tamen præsidio erit diætâ rite observata. Caveant proinde hoc morbo infestati ab aère frigido & humido, atque quovis modo transpirationem insensibilem conservent illibaram. Cibos eligant molles, & facile concoquendos, evitent legumina, & quæ status excitare valent, carnes muraticas, suillas, fumo induratas, aromatibus, aceto, vel cepis conditas, placentas pingues butyro, vel adipe fixas &c. Pro potu eligatur aqua simplex & pura, vel cum hordeo decorticato, crusta panis, passulis minoribus, rasura C. C. radice Scorzonæræ &c. decocta, cui succus citri ad gratam aciditatem addi poterit. Vel si a cerevisia abstinere non possit ægrotus, hæc sit tenuis, probe defæcata, nec fortiter lupulata. Vinum sit mcracum, oligophorum, quale est rhenanum, mosellanum, & gallicum, cui parum ætatis adcessit, & parce sulphuratum. Si hæmorrhoidibus mucosis se sociaverit spasmus vesicæ, & hæc vina vitanda, horumque loco, mulvaticum avara manu porrigendum. Corpus cum moderamine moveatur, abstinendo ab omni equitatione, & succussionibus vehementioribus. Exulent vigilatæ noctes, alvus singulis diebus respondeat, si fuerit immorigera, enematis blandis, ecoproticis, & diætâ humectante, officii sui admonenda. Venus cane & angue pejus fugiatur. Nil tamen recidivas excitare magis potis est, quam excessus circa animi pathemata, quæ inter mœror diuturnus, terror, & ira, præsertim non satiata, principatum obtinent, his siquidem præter opinionem facile diruuntur, quæ Medicus multo studio & cautione in ordinem reduxit.

§. IX.

Si his remediis morbus cedere recusat, hicque habitualis redditus, altissimas egit radices, vel ætas ægroti grandis, viresque attritæ energie artis medicæ suppetias ferre non valent, curæ tantummodo palliativæ locus relictus, quæ in temperanda mucositatis secretionē, & molliendis symptomatibus est reposita.

SCHOLIUM.

Stranguriam senum jam veteres medici malum nuncuparunt immedicabile, experientia edocti, vitia organorum, se. et excretionis urinae

urinæ dicatorum, imprimis vesicæ, in senibus vix ac ne vix quidem aliquam admittere medelam. Ad curam proinde aduersus Medicus sub his circumstantiis, prognosi se muniat, nec vanis pollicitationibus brevi subsecuturæ relictionis, se suamque artem comremui exponat. Sub moderata mucæ secretionē, vires non ita consumente, spectatorem magis agat, inculcando saltem convenientem dietam, suadendo tempestivas sanguinis ventilationes, si illis sit aduersus æger, & curando, ut alvus singulis diebus respondeat. Si vero modum excedens, languorem & atrophiam post se traxerit, derivatio horum humorum laxantibus tentanda, quibus tonica vel interponi vel jungi poterunt. Ad hunc finem conducunt pilulæ balsamicæ martialibus combinatæ, nec infructuosus erit usus corticis peruviani selecti, cum pauxillo rhabbarbari acutus, quod remedium, laxante, & insimul tonica virtute multiplici experientia dudum se commendavit. Absente ebullitione febrili, tinctura tonico nervina Stahlī, quæ æqualem sanguinis per totum corpus circulum promovet, usum haud contemnendum adferre solet.

Quod adinet ad symptomata, nullum truculentum magis deprehenditur spasmus vesicæ, cum stranguria & ischuria copulato, quibus somnus arceretur, appetitus destruitur & vires adteruntur insigniter. Optandum esset, ut domitorem hujus mali habitualis redditī, præsertim in senibus, nosset ars salutaris, alī, quod dolendum, vix palliativa subministrare valet remedia. Aliquam opem spondent venæsectiones & scarificationes extra paroxysmum institutæ, modo ætas decrepita, & vires penitus amissæ non contraindicent, item enemata ex emollientibus & oleosis parata. Externe imponi poterunt vesicæ bubulæ supra laudatæ, nec non sp. vini camphoratus, vel camphora sacculis interpassata aliquando lenimentum conciliare potis sunt. Interne cum absorbentibus & antispasmodicis emulsionibus addendum, quas inter, ex oleo amigdalorum dulcium cum vitello ovi commixto paratæ, sedativa vi eminent. Haud proletariam aliquando opem ab infuso quinque herbarum emollientium Theiformi observavit Dn. Præses, quippe quæ insimul paregoricam & eccoproticam virtutem possident. Tentandæ itidem injectiones in vesicam, ex decocto seminis lini & papaveris albi, addito tantillo croci paratæ; nec infructuosa penitus erunt semicupia tepida, cum herbis emollientibus & fursure triticeo concinanda, si tantummodo vires & ætas ægroti id remedii genus permiserint.

§. X.

Cautio denique sit Medico circa curationem hæmorrhoidum vesicæ

sicæ mucosarum, ne promiscue fontes medicatos commendet, purgantia præscribat, ad opiata confugiat, & medicamenta, sine necessitate, tam crebro variet.

SCHOLIUM.

Hactenus historiam hæmorrhoidum vesicæ mucosarum medicam, & methodum iisdem medendi exposui, tandem cautelas quasdam subjungere licebit:

- I. Aquas Selteranas vel puras, vel cum lacte commiscendas pro scopo sanguinem attenuandi, cacochymiam scorbuticam corrigendi, & circulum humorum promovendi, experientia duce, commendavi quidem, hac tamen mente, ut prius indicantia & contraindiantia provide examinentur, quam in usum trahi possint, ne ægrotus, loco speratæ salutis, in majora damna præcipitetur. Licet enim aquæ hæ, omnes inter fontes medicatos, tutissimæ, & mitissimæ deprehendantur, ut & phthisicis existant solatio, haud tamen suavor & auctor forem, ut scirrhus hepatis & lienis aliorumque viscerum laborantes, item atonia ventriculi, tympanite, ascite, & oedematosis tumoribus correpti easdem usurpent. Major adhuc circumspectio adhibenda, circa fontes Selteranis validiores, quales sunt aquæ Carolinæ, Aquisgranenses, Egranæ, Pyrmontanæ &c. Priores quidem laudavit ETMULLERUS in Disput. de *Spasmo vesicæ* §. XXIV. p. 34. noxium tamen earundem effectum deprehendit HOFFMANNUS l. c. sub copioso viscidæ materiæ sedimento, & existente jamjam febre, vires & carnem depascente. Posteriores admittendæ in ætate media, quando viribus & visceribus adhuc salvis, hæmorrhoides suppressæ mucosis vesicæ anam suppeditarunt.
- II. Purgantia validiora, præsertim resinosa, evidentes adferre noxas, vel me tacente, constabit; parietibus etenim intestinorum adherendo, inducunt spasmos, per consensum ad vesicam se extendentes, cogunt humores ad partes, a quibus derivandi, & motibus vesificantur febrilibus, ex quo est, quod aloes resinosa pilulis balsamicis non sit admiscenda, nec famosum Elixir proprietatis Paracelsi, multo minus pillulæ Francosurtenses, alique cum aloe non depurata paratæ, ægrotis conduant. Imò Sculicenses, vel Anglicum spasmo infimul vesicæ, vel stranguria correptis subinde nocuisse observavit Dn. Præses. Eligenda igitur pro scopo laxandi, mannata, rhabbarbarina, & sennata debite correctæ.

III. Si quid est, quod circumspectum usum sub curatione hujus mali exposcit, sane sic dicta anodyna, vel potius opiata huc referri merentur; latet etenim anguis in herba, & licet imminutis exinde doloribus ægri magnopere gaudeant, atque remedium propinatum mirificis efferant laudibus, nuncium tamen hunc exoptatum, acerbus, brevi tempore, excipit, & recrudescentes cruciatus, confopitos fixiticia repensabunt. Si Medicus perseveraverit in electa hac methodo, augendo pro modulo dolorum, opiatorum dosin, tandem paralyticos adfectus, ischuriam, lethargum vel carum, tanquam inconsideratissimæ temeritatis suæ testes excitabit certissime. Imprimis senibus effectis, & hectica febris laborantibus mortem narcoticis hisce accelerari, constans docuit experientia. Non quidem negaverim, urgente summa necessitate, sub exquisitissimis scilicet doloribus, ægroti animum frangentibus, & irritum cum successu adhibitis aliis remediis, ad opiata demum confugiendum esse Medico, sint tamen hæc correctæ, & laxantibus vel maritata, vel interposita, quæ methodus deleteriam eorundem vim averruncare optime potest; nec non seponantur, simulac aliqualis fuerit subsecuta paroxysmi mitigatio.

IV. Prouti morbi chronici exposcunt chronica remedia, ita & in curatione hæmorrhoidum vesicæ mucosarum, methodo, prævia deliberatione, electæ insitendum, nec hæc absque necessitate, tam facile mutanda, licet vis morbi non statim remiserit. Crebræ siquidem remediorum mutationes naturam perturbant, & pluribus anomaliis occasionem offerre potis sunt.

Supereffent adhuc varia huc pertinentia v. g. usum suffumigiorum, & fonticulorum concurentia, ast temporis penuria atque angustia pagellarum expositionem illorumdem prohibent; sufficiat proinde brevibus indiguisse, a binis his remediis parum vel nihil levaminis expectari; in specie a suffumigiis suppressionem hæmorrhoidum mucosarum intemptivam metuendam esse.

T A N T U M.

C C L X X

JAC HENR. CHRISTIANI ADAMI,

DE MATERIA CALCARIA

Post diuturnam arthritidem per vias urinarias educta

OBSERVATIO SINGULARIS.

Luben 1740.

§. I.

Quando nunc de materia calcaria post diuturnam arthritidem per vias urinarias educta, exponere ingredior, eo ordine procedam, ut primo morbi historiam accurate diligenterque, quoad instituti mei ratio exigit, enarrem, deinde vero, quæ cum ad explicandam eam, tum ad veritares quasdam medicas inde illustrandas confirmandasque pertinent, strictim breviterque expromam. Materiam istam cum urina superiori anno reddidit vir tunc sexaginta, unumque annum natus, carne graciliori, habituque corporis magis adstricto præditus; atque ut de victu vivendique genere hoc unum attingam, rebus dulcibus saccharoelulifque ex eo paratis, neque minus lacte & cibis ex illo confectis mirum quantum ab ineunte ætate delectatus. Ante hos viginti & quod excurrit, annos, contigit, ut arthriticis doloribus mox in pede mox in manu identidem & per intervalla tentaretur, qui tamen radices deinde egerunt alius, & inprimis postquam is saltatione continenti per aliquot dies pedes vehementer exercuerat, confirmati fuerunt, ut ab eo tempore articularis ille morbus & crebrius inciderit, & plures semper pluresque articulationes, imo & tandem, ut mox dicitur, interiores partes pervaserit, longiusque non modo perduraverit, verum aliquot etiam annis ad paucas tantum hebdomades subinde recesserit, atque adeo nunc, podagræ, quam vocant, irregularis genus duodecim prope annos præ se ferre videatur. Novem jam intercesserunt anni, quod is postquam ad melcendos dolores emplastrum ex iheriaca confectum iterum iterumque admoverat, materia arthritica intus conver-

H h h h 2 fa,

fa, graviter periculoseque ægrotavit, donec excitato insigni tensionis ardorisque sensu in sinistra parte dorsi & lumborum, multæ vesiculæ sero limpidiori turgidæ eleventur, pluresque earum in unam non mediocris magnitudinis coalescerent, quæ pariter ac reliquæ minores cultello discissæ, tanquam a cantharidibus factæ essent, serum acre copiosiusque profuderunt. Sæpius posthæc materia ista arthritica paries usu insigniores petiit, & nunc in capite, nunc pectore, nunc abdomine, non sine graviorum malorum, ut facile existimare licet, confluxu sedem suam posuit, præcipue, quod vires vitæ minui pedetentim, nec infesto humori extus propellendo, pares esse amplius videbantur. Et si vero medii & annularis in sinistra manu digiti ossa, eaque secundæ phalangis ita distortæ vis morbi, ut, ubi cum ossibus primæ phalangis connectuntur, e loco suo motæ, atque interiorius versus volam manus protrusæ fuerint, nullæ tamen concrectiones topiæce ullo in loco in conspectum prodierunt. Quinque abhinc annis acutissimo vesicæ dolori primum fuit obnoxius, ita, ut præter qualemcunque in vesicæ pressionem, urinam sæpius quidem, at parcissime nec sine incommodo redderet, & mox ab ea reddita, in regione pubis dolore per urethram ad glandem eiam eunte, atque hinc ad vesicam redeunte, simulque perinæum ad anum usque se extendente cum gravissimis distortionibus, distensionibusque, ad quas perpetuo flatuum incommoda cum alvo adstrictiori accedere solebant, vehementer exerceretur. Dolores hi progressu temporis iterum iterumque eodem modo se exacerbarent, & quando arthriticus morbus desit, illico, quasi ita lege sancitum esset, exoriri, multoque atrocius, quam ipsa podagra furere consueverunt. Subinde etiam chirurgus, quando pro re nata clysteribus alvum subduxit, in exitu intestini recti hæmorrhoides cæcas animadvertit. Anno MDCCXXXVIII. mense Julio ex improvviso, & præter omnem spem opinionemque cum salvus incolumisque in horto deambulet, violentissimo in pubis regione dolore correptus, una cum urina reddita, sibi quidquam corporis durioris egredi ex urethra persensit, neque tamen id humi, quoniam hand dubie terra obvolutum statim tectumque fuit, reperit, paulo tamen post, & deinceps procedente tempore, per intervalla complures concrectiones calculosas, quæ tamen tantum grandioris fragmenta esse videntur, albi maximam partem interdum & flavi coloris, magnitudinis & crassitiei variæ, ex quibus maximæ post diuturnam exsiccationem sex grana, omnes autem simul ad libram expensæ tres circiter drachmas pondere exæquant. Fragmenta hæc superficiem satis æqualem, extus convexam, & intus concavam corticique duriori nucis juglandis aut amygdalæ in partes diffractio similem, circumcirca vero & in ora minus planam, sed manifestis fracturæ notis insignitam ostentant, præter duos minores lapillos, quorum unus figuram accurate ovalem, alter autem granum tritici refert. Tandem

& hic calculorum partus exquisitusque cruciatus cessaverunt, & conspectus posthæc superiori anno ab ægroto nostro fuit in fundo matulæ massæ quædam mucosa & tenax, albi coloris, argillæ adhuc tenuiori, aut calci recens extinctæ similis, quæ an ante se inscio jam prodierit, ipse quidem ignorat, deinceps autem rei admiratione permotus diligentius semper & curiosus observavit, viditque, per plures menses, in urina, quæ clara initio excernitur, illico sabulum tenuius subsedisse, non ita multo post autem, quando illa refrixit, materiam jam commemoratam fundo inhæsisse, quam profuso lotio ex matula ope instrumenti sollicitè exemptam; in minora frusta variegata, divulsam, in aere exsiccata, calculosisque illis concretionibus omni ex parte, vel etiam argillæ exsiccatae similem perduramque in fractu difficillimam sicut & ipsa calculorum fragmenta asservavit, majorem ejus copiam pedetentim collecturus, si initio ea experimentis chemicis tentare, & singulari commentatione persequi mihi animus fuisset. Quando interdum ex incuria guttæ quædam lotii liquidiori ejus materiæ portione adhuc aliquantulum infecti in terram delapsæ fuerunt, maculam sub exsiccatione reliquerant, quasi a calce profusa. Quo loco nec hoc silentio prætereundum esse arbitror, quod tria vasa ex vitro eoque solidiori confecta, quibus urinam diu exceperit, nec tamen a fordibus adjectis unquam penitus repurgavit, longo usu a lotii acrimonia sine ulla caloris aut alia externa vi, quod certissime compertum habet ægrotus, rimas in fundo atque lateribus perpeffa, adeoque continendo humori fordido minus imposturum idonea, quin imo levissimo tandem tactu fractæ fuerint. Sanguis alias e vena eductus, in crustam admodum tenacem, flavo siccius aut viridi colore imbutam, paucissimumque in fundo cruorem atrioris complexam, concrevit, aut in aquam missus in sola propemodum concreta mucosa abiit. Quorum tamen neutrum superiorum anno, quo materia ista cum urina secessit, amplius observatum fuit. Quamvis vero interdum salvus videatur & incolumis, quarta tamen post sumtum in prandio cibum, levissimo velut horrore percelli, & languere aliquantum per horam solet. Præter hæc, quando valetudine non adeo adversa utitur, pustulæ etiam exiguæ & velut miliares, aliquando tamen etiam minores, sero liquidiori repletæ in scapulis prodierunt, quarum tamen sub ingressu podagræ nec vola nec vestigia supervest. Instante nuper solstitio hiberno, denuo recrudit podagra, & sub finem ejus, materia illa tenaci non amplius cum lotio exterminata, dolor vesicæ atrox, a quo diu jam immunis fuerat, rediit, isque graviori fere, quam antea unquam incessens vehementia, & licet posthæc per aliquot hebdomades fluerit iterum, ante paucos tamen dies renovavit insultus, & quanquam expulsis maximis inter cruciatibus quinque fragmentis calculosis, illis, quæ superius enarravi, omni ex parte similibus, quorum unum novem grana, alterum octo, tertium septem,

H h h h 3

quartum

quantum quinque, & quintum tria pondere exæquat, aliquot tamen dies defævit, hoc ipso tamen die, quo hæc præscribo, penitus remisit.

§. II.

Quamvis vero multa essent in hac morbi historia, de quibus data opera disquirere non inutile nec inæcundum foret : mihi tamen materia illa per vias urinarias eliminata, digna præ reliquis accuratori examine videtur. Quod si enim multi doctissimi viri observationes de materia quadam solidiori, & facile in coagulum abeunte, quas infra in medium adducam, curiosissimas & ad explicandam præcipue calculi generationem maxime accommodatas appellarint : sane & ego opere me facturum esse potius arbitror, si de materia illa calcarea quædam exponam. Ut igitur, ex quibus velut constaret elementis, eo clarius cognosceretur, eam variis experimentis sollicitandam putavi. Quo quidem labore perspexi, fustum ejus integrum aquæ forti injectum, post 12. horas emollitum, & in minores partes mucidas cum bullulis ad latera vasculi vitrei in superficiem liquoris elevatis, divisum, nondum vero tunc, neque post 24. horas solutum fuisse ; massam vero in pulverem resactam cum eadem aqua forti vehementer nondum circumacta dimidiæ horæ spiritio ebullivisse, ut a scrupulo uno pulveris & drachmis duabus aquæ fortis inter se commixtis, in lagenula vitrea longiori, unciam unam cum semisse capiente massa cum larga spuma ad ejus osculum elata, in alio autem minori vitro, cum experimentum iterarem, plane in mensam maxima ex parte effusa fuerit, posthæc autem iterum post qualemcunque potissimum agitationem subsedisse omnia, totumque pulverem a liquore fuisse dissolutum. Solutioni huic turbidæ & subflavæ quum oleum tartari per deliquium instillatur, ea illico & vehementer in fervorem agebatur, ut spuma quædam viscosa diuque durans osculum lagenule duarum unciarum attingeret, & saturatione demum peracta, mixtura magis magisque flava, & tandem rubicunda instar tincturæ tartari evadibat, manumque colore sed magis diluto inquinabat. Sapor ejus erat acris, salus & velut lixiviosus, & post horæ circiter intervallum materiem solidiorem ad fundum dimittebat, quæ per leniorem exsiccationem in pulverem rubicundum convertebatur. Pulvis hic tritura flavum magis colorem nactus, sapore acri & irritante præditus, nec cum aqua forti congredebatur, nec in aqua simplici totus dissolvebatur, sed maximam partem in fundo remanebat. Liquor autem ille rubicundus in lagenula servatus atque in tinctra positus nocte inter diem Februarii 18. & 19. media a frigore satis quidem vehementi, non tamen acutissimo, in conclavi, quod caleberi quotidie solet, congelabat, leni tamen manus calore post breve tempus rursus dissolvebatur. A spiritu natri, spiritu vitrioli, & spiritu fa-

R

lis materiæ calcaris, de qua hic ago, effusus, neque fervorem nec solutionem fieri, post duodecim horas bullulas quasdam in superficiem liquoris circumscita ad latera vasculi vitrei quidem exsurrexissè, neque vero postea solutionem factam esse observavi. Syrupi violarum colorem eadem materia non permutabat. Frustra integra prunis candentibus statique æniperis injecta, sine notabili denfiori fumo odorem perquam volatilem urinosum exhalabant, restantibus demum reliquiis quibusdam nigri coloris, sicut & idem cum concretionem illa calcisosa contigit. Quando autem in pulverem materia comminuebatur, non solum exinde statim odor urinosus ad nares ferebatur, verum ipse eo magis pulvis carbonibus ignitis adpersus, odorem maxime volatilem urinosum simulque ad extremum cornubus animalium concrematis similem per totam domum exspirabat, relicta itidem pauca materia, velut concremata. A decoctione ejusdem materiæ ad scrupulum unum cum aquæ puræ uncia una, aqua hæc turbida & subalba evadebat, in fundo vasis autem massæ quædam albicans relinquebatur, cui cum iterum unciam unam aquæ adfusilem, coctione instituta, & aqua, quæ eundem colorem adsciverat, profusa, aliqua in fundo materiæ portio adhuc remanebat. Utraque aqua inter se commixta, atque leni calore inspissata, materiam paucam albam & teneram fundo vasculi adfixam fugasse cernebatur, quæ tamen carbonibus injecta, eundem adhuc odorem urinosum exhalabat, atque cum aqua forti etiam ad effervescentiam commovebatur, id vero, quod ab altera coctione residuum erat, & foetum odorem urinosum emittebat, & cum aqua forti itidem pugnam inibat. Quum igne chemico exploraretur materia, ex drachmis, tribus, & quod excedebat, per destillationem ex retorta minima productus fuit initio spiritus volatilis urinosus ad grana 7. odoris admodum fortis, qui tamen paucis adhuc phlegmate dilutus videbatur, ceterum syrupi violarum in viridem commutabat & cum spiritu nitri, vitrioli, salis & aqua forti, premte effervescebat; posthæc ejusmodi spiritus ad grana 5. odoris penetrantissimi, acerrimique saporis, qui itidem syrupi violarum colorem in viridem convertibat, & longe promptius quam prior spiritus cum modo dictis spiritibus acidis conflatum aggredebatur; neque minus sal volatile siccum ad grana viginti novem, penetrantissimi pariter odoris, a quo in pauca aqua soluto itidem syrupi violarum coloris mutatio in viridem, atque ebullitio cum spiritibus istis acidis accidebat; tandemque igne ad summum gradum a lauto paucissimum oleum foetidum, crassum, fuscumque ab oleo tartari, neo colore, nec odore, nec consistentia adeo divisum, quod paucis guttibus purum, tum cum sale volatili per retortam atque cucurbitam adhuc disperso, lateribus vasorum adhæsit; in fundo autem retortæ drachma una capitis mortui, aterimo colore, instar carbonum in pulverem redactorum, sed aliquo adhuc odore foetido præditi remansit. Residua hæc

hæc massa per tres horas & amplius igne fortiori continuo in crucibulo minori calcinata, colorem non mutavit, ponderis autem dimidiam partem haud dubie particulis salinis, oleosisque, quæ adhuc restabant, in auram abactis, amisit, cum affusis autem spiritibus acidis mox aliquem confictum obortis bullulis copiosis iniit, perfecta etiam solutione in aquam fortem se recepit, ut liquor atramenti colorem æmuleretur, ab intillato denique oleo tartari per deliquium, post aliquod tempus pars lateribus adhæsit, pars in fundum secessit, reliquo liquore ejusdem frigoris, quod superius jam argui, injuria, in glaciem prorsus condensato. Quæ omnia experimenta hucusque a me enumerata si inter se comparantur, satis quidem elucet, atque a rerum chemicarum peritis sine longa illorum explanatione, hic brevitate causa, ne libellus ultra modum augeatur, omittenda, facile intelligitur, inesse materiæ huic paucissimum & vix distinguendum phlegma, partesque mucosas & glutinosas, quæ igne conbultæ cum odore salis volatilil avolant, sal alcalinum ignis vi exsolvendum, paucum oleum, & denique terram alcalinam calcariam, quæ diversa proportionem inter se commiscantur, meque nunc eo deducunt; ut ante omnia primas illius origines perquirere contendam.

§. III.

Et mihi quidem veri admodum videtur simile, ortum ejus a materia ista, quæ in articulis hominum diuturna arthritide divexatorum calcis instar extruditur, tophosque constituit, esse arcessendam, quæ in hoc viro copiose ad renes delata, atque cum urinæ recrementis mixta primum in calculosas concreciones abiit, deinceps vero magis soluta per vias urinarias sibi exitum paravit. Quum vero quod in articulis subinde conerscit, calcis nomine appellatur, hanc potissimum ob causam, non vero, ob aliquam, quam admixtam habet, terram alcalinam, multo minus ob creditam quandam cum calce viva convenientiam materiam istam per vias urinarias exterminatam, calcariam cognominavi. Ut vero ejus origines ad calcem articulorum referam, non una me causa adducit. Utramque enim externo habitu sibi non admodum esse dissimilem video; nec elementa, ex quibus constant, igne in conspectum producta multum a se invicem discrepant; præterea dolores vesicæ a materiæ hujus colluvie & decubitu excitatæ, podagra demum ad finem contendente, se prodere inciperunt; denique vero facile admodum fieri solet, ut materies ejusmodi arthritica ad internas partes propellatur, atque in durum etiam corpus variis in locis pedetentim mutetur; de quibus nunc paulo fufius disceptabo.

§. IV.

§. IV.

Id satis opinor, constat in iis, qui arthritide diu jam laborarunt, sæpius vel ex morbi diuurnitate, vel ex incuria, vel ex abusu remedium externorum ad sopiendos do'ores admotorum, frigidorum scilicet, exsiccantium, constringentium, coagulantium, ex mercurio confectorum, aliorumque, vel aliis etiam ex causis, concretiones quasdam nunc molles adhuc, nunc vero & quidem utplurimum adeo duras, ut externo attractu duriciem calci vel lapidi similem referant, vel in ipsa articularum cavitate, vel eorum ligamentis, ossium quoque processibus, reliquisque partibus vicinis (a) nasci, quas per vulgato vocabulo tophos appellant. Materia hæc initio semper fuisse videtur mollis, qualem adhuc glutinosam ac velut gelatinosam massam in nodis circa hominis arthritici articulos natis & post mortem apertis, literatissimus quondam medicus Brendelius (b) reperit; quemadmodum acta etiam medicorum Berolinensium (c) referunt, ex nodis ad manuum pedumque digitos, non tantum in articulis sed etiam ossium apicibus obortis, & initio rubentibus, mox vero albescentem colorem nactis, quando diffumpebantur, vel aperiebantur, molle & album mucidum terreumque coagulum, quod ad ignem obrigescebat, deinceps vero in tophum vertebatur, exiisse. Plerumque autem procedente tempore, dum ea materies induratur, in massam nunc friabilem, nunc calcariam & gypseam, nunc plane calculosam concrescit. Ita Blegnus (d) in articulis cujusdam arthritici hominis massæ albæ crassæ, atque terrestris insignem copiam Schenckius (e) & Brassavola (f) calcem vel gypseam massam, quæ etiam ad unciam unam cum aqua subacta, parietique cum lapide aliquo illita, lapidem tenacissime sustinuit, & mox ipsa in lapideam duriciem abiit, prætautissimus ille Britannorum medicus, isque accuratissime de podagra, qua ipse affectus fuit, commentatus, Sydenhamius (g) massam instar oculorum cancerorum, vel cretæ, Schenckius (h) vero lapillos durissimos, colore cinereo nigriores, grano piperis majores, Schneiderus (i) aliosque (k) calcuos veros annotarunt. Magnitudo

liiii. etiam

Disput. Medico-Pract. Tom. VII.

(a) In rhacitide, quam nonnulli pro specie arthritidis habent, interdum tophos sub perostio nasi observat. cfr. Hahnsmann vid. ejus Sebada Cyrtosoffi.

(b) Observ. Anat. Dec III. obs. 11. p. 9.

(c) Dec. II. vol. 1.

(d) Zool. Med. Gall. Ann. I. m. Nov. p. 174.

(e) Obs. Med. Lib. V. de arthritid. p. 691.

(f) Vid. Ephem. Nat. Cur. Dec. I. ann. II. p. 395.

(g) Tr. de Podagra p. 13. & 98. edit. Lond.

(h) l. c. p. 118.

(i) De catarrhis p. 608.

(k) Eph. N. C. Dec. I. An. II. p. 111.

etiam atque multitudo tophorum admodum variat, illique commemorabiles maximo videntur, quos *Seuerinus* (1) ad ovi magnitudinem accedentes extraxit, & quos etiam plures quam bis mille in durissimos lapides illico concrefcentes, in arthrico quodam animadvertisse *P. Sanchinus* commemoratur (m). Etsi vero calx ea in omnibus articulis, atque ipsis etiam vertebriis (n) oritur, imo & in dentium alveolis genita ejusmodi gypsea pituita dentes extrudit: (o) maxime tamen manus pedesque infestat. Ita penillultris quidam vir diu arthritide excruciat, ut manibus pedibusque contractus evaserit, aperto cadavere, omnes earum partium juncturas calce repletas habuit, & tanta quidem copia, ut ipsis ossiculis loco suo naturali cedere necesse fuerit (p). Et mulier quædam Helvetica e nodoso pollice pedis sinistri pugni magnitudinem excedente, calculos tophaceos, quorum minimus piso major erat, pluresque quam viginti, suppuratione facta, cum maximo dolore pedetentim reddidit (q). Et *Bohemus* quidam aliquot per annos, singulis mensibus ex utriusque manus articulis, interdum unius digiti, interdum plurium, scalpello lapillos eruit, nonnullos minores, aliquos fabæ magnitudinem exequantes, eosque valde duros, sed in principio poriosiores (r). Quemadmodum vero aliquando contingit, ut post luxationem ossium copiosa glandularum mucilago variis ex causis separetur, eaque per moram in callosam duritiem, imo tophaceam materiam convertatur: (s) ita non minus ejusmodi topi antea jam geniti ad luxationes a causa interna, tum in aliis, tum præcipue in arthriticis multum tribuunt, ut ossibus e naturali sua sede emotis, pars penitus distorqueatur, vel alio modo ad motum inepta evadat. Quod præter alia exempla notabilis quædam radii circa utriusque manus carpum, & digitorum ex osse metacarpi luxatio a *cel. Schæpero* (t) recensitatis confirmat. Tophaceam ejusmodi materiam ex aperto pedis calcaneo expressam, sub examen microscopii sui vocavit *Leuwenboeck* (u) reperitque, fæcissimam & albissimam constare ex parvis irregularibus partibus, quasi multe arenulæ essent congestæ; quamlibet harum partium constare ex magno.

(1) *Chirurg. effc.* P. II. p. 132.

(m) *Vid. Ebnwengeri Cent. I. obs. Med. 31. p. 371.*

(n) *Illystrij. Boerhaav. Prax. S. Comment. in Aphorism. suos P. V. p. 197. ult. Londin.*

(o) *Schenck. l. c. lib. I. p. 200.*

(p) *Eph. N. C. Dec. I. An. I. obs. 65.*

(q) *Platerus observ. Lib. II. p. 498.*

(r) *Kozack de suis, C. VI. sect. VI. p. 242.*

(s) *Doleus Encyclop. ch. r. p. 1503.*

(t) *In Progr. singulari Rostochii p. 1698. edito.*

(u) *Vid. ejus Anatomi & contemplatio nonnullorum natura mirabilium secretorum Epist. II. qua Epistola nunc ejam extat in quas. detella.*

magno numero oblongarum & pellucidarum figuratarum; quæ cum nulla re melius comparari queant, quam cum pilis equinis in frustula concisis, quorum utraque extremitas in acumen terminetur, & quidem tam admirabili cum tenuitate, ut plura eorum millia ne quidem pilum capitis nostri efficiant. Quod vero ad interiorem ejus mixtionem attinet, ut plurimum illa ex particulis aqueis, quæ tamen postea sub induratione dissipantur, item mucidis & glutinosis, salinis, paucis forte oleosis, potissimum vero terrestribus componi videntur. Celeb. *Brendelius* (x) materiam illam glutinosam, quam superius jam commemoravi, ab affusa aqua dilutam, & in locum repositam frigidum, per filtrumque trajecit, multum materię gryscę vel tophacę in eo reliquisse, ipsam autem aquam ad dimidium exhalatione absumtam, & in locum frigidum repositam, particulas salinas cum multis terrestribus ad fundum demississe, nonnullas autem earum ad latera vasis elatas illis adhæsisse, & sub forma spiculorum sabulorum conspectas esse animadvertit. Alcalinæ indolis esse materiam ex nodis extractam contendit ingeniosissimus *Britannorum* medicus *Colbaich* (y) adeo, ut syrupi quoque violarum colorem in viridem mutet. Neque tamen semper hanc mutationem esse factam, candide fatetur, idemque sibi ipsi hoc experimentum repetenti, aliquoties accidisse refert celeb. *Schacherus*, (z) cujus manes pio in præceptorem affectu adhuc veneror. *Kerkringius* (a) denique igne chemico ejusmodi tophos exploravit, & facta destillatione spiritum quandam inter spir. tartari, & salis armoniaci quodammodo medium, hoc scilicet magis acidum, illo autem mitiorem, & oleum oleo tartari fortido, colore, odore & consistentia prorsus simile, itemque sul, quod ex capite mortuo extraxit, ab eodem sale tartari non adeo diversum, & solo sapore peregrino, ingratoque & nauseo infectum, prodiisse cognovit.

§. V.

Tophos hos materię arthriticę, a qua & reliqua morbi symptomata proficisci solent, deberi, per se quidem patet. Quænam vero ea sit materia, id explicatu videtur perarduum atque difficile, ut hinc in diversissimas sententias medici discedant, & alius humorem acidum, alius alcalinum, alius acrem & austerum, alius bilem, alius sanguinem præcipue hæmorrhoidalem, alius materiam seminalem, alius pituitam tartaream, alius

liiii 2

colluviem

(x) *L. c.*(y) *In libro: A Treatise of the Gout. itemque in alio. A Physico-Medical Essay concerning acaly & acid.*(z) *Diss. de Therm. Carol. usu in arthritide.*(a) *Spicil. anatom. obs. 28.*

celluvium serosam, alius mucilaginem juncturas irrigantem, alius materiam flavulentam, alius succum fermentantem non facile miscibilem, alius humorem specificum podagricum ex varia misceâ natum, & quis omnes opiniones enumeret, in jus vocet & criminis arguat? Quin imo Alruzius quidam de humanæ mentis viribus desperans, superos adit, exoptavitque, ut sublimia Angelorum iugenia mali podagrici causas pervestigare, hominibusque harum rerum cupidis detegere non detrectarent (b). Ego quidem quoniam precibus his datum fuisse locum nondum comperi, li libus vero decessimorum virorum percensendis componendisque, me nec parem, nec pro instituti ratione obstrictum esse arbitror, satis jam habeo, paucis monere, materiam istam in omnibus non semper esse eandem, sed pro varia corporis conditione & habitudine victus vivendique ratione, aliis quoque causis, & omnibus, quæ circumstant rebus diversam, ut alia atque alia morbi indoles in diversis hominibus satis testatur, ut plurimum tamen ex particulis viscidis, glutinosis, salinis, sulphureis, biliosis, terrestribusque constare, quarum aliæ plures, aliæ pauciores lympham inquinant. Quod ad viscidas particulas attinet, medici pragmatici sæpius observarunt, ægrotique etiam, de quo jam ago, exemplo constitit, in sanguine arthriticorum per venam educto ejusque superficie crustam chylosam satis crassam & tenacem coaluisse, quæ instar tunicæ solidæ reliquum cruorem obscuriorem obtexit. De salis vero genere atque genio non omnes inter se auctores conveniunt. Quandoquidem vero sal acinum purum sibi que relictum in corporis nostri succis non existere plures jamdudum evicerunt: probabilis admodum videtur eorum sententia, qui materiam a thriticani salis tartarei plenam esse existimant, ita tamen, ut & hic acidum, quemadmodum in tartaro ipso reliquis partibus antecellat. Id quod ex cognatione morbi articulis cum calculo renum & vesicæ, affectu quippe tartareo, de qua affinitate infra pluribus disputabo, ex erosione ligamentorum circa articules, quam testibus observationibus anæmiciis in consummata podagra vel ischiade sabulum tartareum ibi subsistens efficit; porro e sale tophaceæ materiæ in articulis genitæ, quod ad naturam tartarei salis proxime accedit, ut ex superiori tractatione jam liquet, neque minus e materia candescente, & in tartari consistentiam concresecere: quæ a variis podagricorum humoribus post evaporationem relinquuntur; ex vinis etiam tartareis, quæ ejusmodi succo abundant, & podagram facile pariunt; e nimia denique ciborum appetentia & voracitate, maxime ante tempus invasionis, quæ sine dubio a lymphæ acidâ copiosa in salivâ & gastrico liquore fit, satis confirmatur: (c) Verum & interdum

(b) In specimenne factorum med. cina. ratione p. Aug. a. Hafn. a. 1710.

(c) V. deantur hæc systus ædenda in *Thystr. Hæstmanni med. syst. n. t. n. IV. P. II. p. 306. sq.*

dum humores arthriticorum hominum alcalinam naturam adfiscere omnino videtur. Certe BORRICHIIUS sudorem Podagrici cujusdam cum spiritu niti effervescentem vidit. (d) Atque CL. COLBATCH (e) per analysin chemicam reperit, sal alcalinum, quod in sanguine Podagricorum invenitur, sæpius se habere ad alcalinum sal ex hominum perfecte sanorum sanguine prolestum, ut 6. ad 4. aut quoque ut 5. cum dimidio ad 4. Idem a sero arthriticorum colorem syrupi violarum in viridem mutari, non secus, quam a calce articularum observavit, hincque præcipuam doloris podagrici causam sal alcalino adscribit. Quam sententiam suam variis postea libellis ornavit, atque ab objectionibus etiam TUTILLII medici itidem apud Britannos vindicavit. (f) Eadem de causa podagrica alcalina doctrinam nuper admodum aucto Italos CL. PINELLI in crustavit, multumque se salis alcalini-volatilil fixique sanguine hominis eo morbo affecti, consecutum esse retulit. (g) Sulphurearum biliosarum que particularum præsentiam præter alia inflammatio ardioresque interdum declarant. De terrestribus autem eo planius clariusque constabit, quando inferius a me suo loco erit demonstratum, eam in arthriticis totum sæpe corpus circumire, atque nunc varios exitus querere, nunc in sedibus commodis coherere atque indorari. Verum enim vero quæ radiu vitiosa hæc materia æquali semper flumine ac reliquis succis permixta circumagitur, & libero ita redituque per tubulos patulos, & nativo robore instructos, procedit, vel e corpore prorsus eliminatur, non adeo grave detrimentum in corpus redundabit. Quapropter & causis sociis opus habet, illis nimirum, quæ nativum articularum robur admodum frangere, tonumque naturalem diminvere valent, ut adeo sine illorum renisu decumbere ibidem, & vim suam exercere queant. Quæcunque igitur efficiunt, ut læsa ciborum concoctione cruditates acidæ, viscidae aliæque in primis viis cumulentur, ut chylus ob vitia bilis, & succi pancreatici non rite elaboretur, ut in suo per venas lacteas itinere contraminetur, ut in visceribus nativi sui roboris jam expertibus, chylus in sanguinem non rite mutetur, sed ejus crudiores partes justo diutius in eo remaneant, & neque in sanguinem convertantur, neque a sanguine separentur, ut denique articuli naturalem suum tonum amittant, ea merito numero causarum, quæ sensum sensumque & sine sensu arthritidem excludunt, adscribuntur. Neque tamen ea prius incescit, & artus pervagatur, quam materia illa, cujuscumque tandem naturæ fuerit, subtiliori atque profundiori corruptione inquinata per intervalloꝝ periodos, vel sua sponte sine culpa ægro-

Iiiii 3

tantis,

(d) *Art. medic. Hafnienf. Vol. IV. p. 155.*(e) *In Eph. Journ. allegat.*(f) *Proliantur id præter jam indicatos An. 1696. & 1698.*(g) *Vid. ejus novum systema de ill. origine & principia della pulagran.*

tanis, vel sub variarum externarum causarum, commotionumque accessione, indolem magis elasticiam, quod optime *scapitator* nostrae aetatis medicus WERLHOFFIUS, (b) monuit, calidioremque & graviorem adfescat, atque sic per arterias etiam minimas cum lymphâ in vascula illa exigua, quæ nullum amplius globulum admittunt, atque ex his per interjectas haud dubie sibi quæ sub r. rinatas vasorum pedetentim gradatimque exiliorum & angustiorum series (i) tandem in omnium subtilissimâ atque arctissimis tubulos nerveos, qui pariter atque illa jam dicata vascula, ob tenuitatem liquidique sui pelluciditatem oculis nostris penitus subducuntur, ceterum vero periochia, perichondria, ligamenta, tendines, aponeuroses, glandulas mucilaginosas, aliasque partes exquisitissimo sensu, & albo, si a paucis d. feceris, sereque niveo colore prædiatas, arthritidis autem furori præ ceteris obnoxias, maximam partem constituunt, propulsetur. Quando igitur materia illa, a qua arthritidis oritur, cum lymphâ mixta, magisque adhuc in itinere inquinata, ad minima ejusmodi vascula nervosa, in quibus cum illustri BOERHAAVIO (k) atque Cliftono WINTRINGHAMIO (l) propriam arthritidis sedem colloco, vehitur, eorumque oscula ob laxitatem, & diametrum ampliorem ingreditur, propter vim autem illorum elasticam imminutam, debilitatemque propelli amplius nequit, atque hinc concessa quiete subsistit; vel quando lentore suo tenaci & spissitudine transire nequit, & viam sibi obstruit; vel quando acres acutæque particule mole & figura sua lateribus vasculorum adhærent, & cumulantur; vel quando denique vasculum aut ex hac irritante aut alia etiam causa rigidius evadit, magisque coarctatur (quam rigiditatem circa articulos factu faciliorem esse, vasculis hisce ibidem maxime compressis, sine ullo negotio intelligitur) adeoque materiam progressu suo magis intercludit; vel si hæc omnia conjunctim agunt, ceterum vero eadem jam inclusæ particule accessu atque impetu liquidi a tergo venientis urgentur, compeliunturque, profecto ab illarum intestina commotione, mutuoque attritu, tandem vehemens ille spasmus, in fibrillis, vasculis membranisque nerveis dictarum partium, quo vehementer lancinantur, divellantur, distrahuntur, aliove modo infestantur, uno verbo omne dolorum genus, & reliqua symptomata concitari solent. De quibus tamen copiosius dicere brevitas & instituti ratio vetat. Neque enim hæc attuli, ut abstrusam morbi indolem penitus explanarem, sed quod

(b) *Cention. medic.* p. 25.

(i) De quibus *servicibus* videtur Barbaque Instit. med. §. 132. & Burggraf Lexic. medic. univers. Tom. I. (cui reliquos nondum successisse merito dolemus) p. 1017.

(k) *Vid. prax. P. V.* p. 198.

(l) *Vid. ejusdem tractatus de Podagra Eboraci editus, ubi de hoc argumento pluribus disputatur.*

quod sine iis antea qualitercunque explicatis vix ortum calcis arthriticae commodè exponi intelligique posse videretur.

§. VI.

Quando igitur ad rationem, qua topi generantur, propius enucleandam progredior, duplici via eos fieri obſervo, ita, ut vel liquor mucoſus glandularum mucilaginoſarum a materia arthritica coaguletur, & in ſpiſſum hoc concrementum abeat, vel particulae ejusdem materiae ſalinæ & terreſtres viſcidis permixtæ, diſrupto minimo quodam vaſculo cõhareſcant, & temporis progreſſu in durum corpus coagmententur. Quippe in oſſium articulis, membranisque horum muſculorum interſitiis, & circa tendines glandulæ extant mucilaginoſas quædam, eæque teneræ admodum & molles, ex genere conglomeratarum, ſingulari ſtructura præditæ, tum membranæ tenues & pellucidæ, ex quibus conſtruntur, in ſubrotundas cellulas complicantur, adeoque veſiculas referunt, earundemque aliæ majores, vel in magnis articuloſorum cavitatibus, ut acetabulo coxendicis, in cavitare genu, circa patellam, ſeparatim ſpectandæ, & rubicundæ uſplurimum colore diſtinctæ, vel in pinguedine inibi abſconditæ, aliæ autem minores, & vix armato oculo detegendæ, per tunica mere glanduloſam & veſiculofam, ſub membranolo quo articuli continentur, confirmanturque, ligamento ſitam, & ad oſſa conjungenda propter laxitatem ſuam minime idoneam, per tendinum quoque ſuperficies, aliasque ſedes hinc inde diſperſæ, quarum omnium glandularum ſitum, ſtructuram & genera Clopton Havers, (m) Anglus, ſi non primus invenit, præ omnibus tamen diligentiffimo, vel Cel. MORGAGNI (n) teſte, eoque harum rerum ſcientiffimo, perluſtravit, & literarum monumentis prodidit. In his glandulis copioſiſſima vaſcula ſanguinea naſtis, liquor quidam mucilaginoſus, quem ſynoviam vulgo vocant, inſtar ovi albuminis viſcidus pellucidusque, quanquam non in omnibus adeo clarus & limpidus ſecernitur, qui tanquam linimentum oſſium articulos & cartilagineſ perpetim irrigat, arque lubricat, ne frequentiori ſuo & vehementiori motu penitus exareſcant, aque ſic illorum actiones varie turbentur, ſed potius, ut omnes motus libere ſtque expedire ſine attritu & fervore earum partium fieri queant. Quemadmodum vero albumen ovi ab acido minerali ſigillatim aluminolo vel vitriolico illico condenſari & velut ad calcis formam ſolidefcere conſuevit: (o) ita & Clopton

H A-

(m) *Tr. de oſſibus Sen. IV. c. I. p. 209. ſq. conf. & ſummi anatomici Winſlowe Expiſition Anatomique de la ſtructure du corps humain. Tom. I. p. 276. & alios cit. Amſtd.*

(n) *Adverſ anat. III. anim. 23.*

(o) *Tiſſeius i diſſ. de calculo veſicae exacerata adbarente p. 21.*

HAYERS experimentis varie institutis, animadvertit, mucilaginem hanc a f. le acido magis minusque pro conditione liquoris adfusi coagulari, idque eo magis, si illa adhuc calet; ut proinde in massam sapius spissiana atque albam ad modum casei recens formati cogatur, quæ a leni exsiccatione in unum frustum exarescit, sed admodum friabile, facileque in pulverem tenuissimum, & calci similem convertendum. (p) Multo tamen promptius copiosiusque ab acido simul austero, atque adstringente, & tartarei suis non experie, ut aceto vini, vino albo, magis autem rubro, item decocti. Fl. Balauft. cort. granat. rosar. rubr. &c. una cum acido, coagulum hoc albi coloris generari, idque longe spissius, nec in aqua pura dissolvendum, ut acidum fortissimum, e. g. ol. Vitriol. non ita mutet condenserque mucilaginem, quam vini acetum. Neque minus & Celeb. TRICHMEIERUS (q) experimenta hæc repetens, cognovit, mucilaginem illam ab affusis acidis album colorem adsciscere, coagulari, in spissam massam mutari, & tandem notabilem soliditatem fere cum calculorum forma convenientem nascisci. Enimvero non solum ab acidis, verum alcalinis quoque salibus fieri ejusmodi coagulationem, experimentorum usu inidem observavit *Cajetanus* TACCONUS (r) medicus Ialvus, de qua cogendi vi in alcalino sale eo minus dubitandum esse arbitror, quando cogito, serum sanguinis, quod summus ille BOYLEUS (s) refert, ab oeo tartari per deliquium instillato, non secus ac a spiritu nitri condensati, & liquorem volatilem atque urinosum ex calculo humano destillatum, hujusque capiti mortuo seu frustis friabilibus denuo quantum satis fuit, affusum, eidem si TACHANIO (t) fides est habenda, pristinam soliditatem reddidisse. Videamus nunc, annon in corpore humano ejusmodi coagulatio ab iis salibus fieri queat. Et glandulas quidem ipsas identidem adiectas esse, observatione aliorum jam constitit. Ita SCHAFERUS (u) glandulam in femoris luxati acetabulo fere totam tophaceam reperit. Atque BRUNDELIUS (x) in viro illo arthritico, tophis obfisso, glandulas eas mucosas admodum tomentes vidit, & sigillatim in genibus, ex quibus leni digitorum vi pressis materiam mucosam atque minimis moleculis sabulosis remixtam expressit, quasdam vero duras siccasque invenit, ut nil plane humidi pressione extrudere valuerit. Neque vero

(p) *Hayers l. c. c. 11. p. 111.*

(q) *Diss. de arthritide p. 10, 12.*

(r) *Vid. commentar. Bourouienfis, scientiar. & artium instituti & Academ. Tom. I. in classe Medica. obs. 2. de arthritide. Comparatur & ea, quæ cl. Gmelinus mortuus in comment. iter. Norimb. Anni M. DCC. XXXIII. p. 68.*

(s) *In bilioria sanguinis cumani P. III. Exp. 5. p. 59.*

(t) *In Hippocr. chemico c. 14. Comparatur & de siccum alcalinorum coagulandi vi Barbaque Tom. I. chem. p. 613.*

(u) *In progr. supra allegato.*

(x) *l. c.*

vero a vitiosa arthritidis materia, sal sive tartareum, multoque acido imbutum, sive alcalinum abesse ex superioribus liquet. Quando igitur progressu temporis frequenti materiae ejus appulsu, pori vasculorum, quæ mucilaginosum humorem in glandulis separant, magis magisque relaxantur, ut particulas quoque salinas & terrestres admittant, ex harum commixtione mucilago coagulatur, quæ nec resolvi se & attenuari facili sitit, sed potius magis magisque spissa evadit, donec tandem in corpus calci vel cretæ aut gypso simile, quod ratione albi etiam coloris, cum cragulo mucilaginis extra corpus genito, non parum congruit, convertatur. Sed alia etiam via patet, per quam materia topho conglutinando inidonea & in ipso sanguine jam præparata advehatur. Quemadmodum enim per se sanguis etiam sanus particulis terrestribus abundat: ita multo magis eorum ramentorum crudorum inutiliumque moles in corpore arthritico a vitia ventriculi reliquorumque viscerum digestionem, intestino cruris attritu, aliisque ex causis augetur. Quæ in sanguine jam inesse & contineri, antequam ad articulos pervenerunt, neque in his demum generari, vel exinde planum sit manifestumque, quod in corporibus arthriticorum tophacea materia extra articulos variis locis se prodere, & sui vestigia relinquere soleat, quam nemo prudens, & corporis nostri gnarus dixerit ex iis tophis, qui ex coagulato glandularum mucus coaluerunt, abrasam, atque ex articulis ad majora vasa reductam, sanguinique intimius redditam fuisse. Ita vero comperimus, materiam ejusmodi cum sanguine & reliquis humoribus, sæpenumero per totum corpus circumagi, ut pro vario cruoris & laborantis naturæ vigore & impetu, vel per capillares arteriolarum tubulos fusa & disjecta, substantiam viscerum fubeat, & obstructions, scirrhus, vel sicut alias in articulis, tophos calculosque efficiat, vel etiam aliqua parte eliminetur, & cum sputo, trinis, sudo-e, excrementis, aliisque liquoribus exeat, & confestim ab exsiccatione in calcis formam commutetur. Ne multa hic præter necessitatem exempla accersam, KERKRINGIUS (y) podagrico alicui materiam calci similem, undique e cornore effluxisse, atque sputa etiam in calcis consistentiam redacta esse, HORSTIUS (z) autem se arenulas in ejusdem generis hominibus in vola manuum, & aliis partibus observasse, atque elegantissime doctus PEGELIUS (a) puerum quandam 14. annorum, & a teneris arthriticum, post toleratos aliquot annorum dolores, ex immenso, qui in sinistri cubiti articulo natus erat, tumore aperto, liquorem fuscum, itumque ex auræ accessu in albam calcem concrecentem profudisse; SCHNEIDERUS (b) in corde MAXIMILIANI II. Imperatoris

Disput. Medico-Pract. Tom. VII.

K k k k k

toris

(y) *Spicil. anatomi. obs. 28.*

(z) *Manud. ad medic. P. I. p. 191.*

(a) *Lib. II. obs. 25.*

(b) *l. c.*

toris cum podagra graviter conficiatari, calculos post mortem esse repertos testatur. Quum itaque in arthritide tonum articularum admodum infringi ex superioribus jam liquear, crebro & perenni materię vitiosę adfluxu vascula minima magis magisque relaxantur, ut hinc etiam eorum oscula amplius, & ultra naturalem diametrum dilatentur. Quod vel P L A T E R I (c) fides confirmat, qui in sectionibus arthriticorum membr̃a diuturnitate morbi adeo ductilibus sinibusque oblongis & angustis intrinsecus perforari perspexit, ac si tineis vel xylocampis exela essent. Quando igitur ab arthritide inveterata, in qua potissimum topi conascuntur, ita se habent oscula exilissimorum vasculorum, ut cum materia arthritica partes quęvis cruiores salinę atque terrestres, ipsorum diametrum libeant, ibi subsistentes disruptis vasculis nodos constituunt, dissipatisque liquidioribus particulis propius sibi accedunt, mutuoque contactu & quiete, cohęrescunt, arctiusque, fortassis etiam aliqua aëris externi membro laeso proxime incumbentis vi, aut medicatione intempestiva concrescunt, & tandem in ejusmodi materiam, quam calcem vel topus vocant, convertuntur; quęvis aliquando & osseam materiam accedere L I S T E R O (d) facile concedam; Habeo autem, quod ad hunc toporum ortum, ex appulsu materię salinę atque terrestris attingit, consentientes Medicos plerosque, ut partes etiam chyli nondum cum sanguine mixti, in loco effuso residui, a quibus Medicus quidam Gallicus, (e) nodos derivat, nihil omnino aliud esse videamur, atque sæpius memoratus COLBATCHE (f) quando nodos ori i sibi persuadet, si spiritus vinosus cum volatili alcalino sanguinis sale congressus in ossem coagulemur, eam tamen non nisi accedentibus particulis terreis in cretaceam substantiam indurari putet, W I L H E L M U S etiam ten Rhyne (g) licet omnium fere morborum causam a flatu deducat, atque arthritidem quoque ex flatu sicco atque maligno quasi afflari opinetur, tumorem tamen externum, atque inmedicabile nodorum tophorumque malum ab humorum atque particularum ejusmodi affluxu derivet. Neque hanc corporis durioris generationem quis mirabitur, qui meminerit, eodem particularum terrestrium interdum & salinarum contactu ac quiete, quando non amplius moventur & subsident, ex fluidis materiam perquam solidam, duramque coagmentari. Aquę puteanę, maxime pigrę, & quę crebro haultu non exercentur, itemque etiam ex fluvio, qui non adeo veloci flumine fertur, deductę, crebra ad usus domesticos decoctione, vasa crassiori materia in-

(c) *Obs. lib. II. p. 110.*

(d) *Exercit. de morbis quibusdam chronicis p. m. 101.*

(e) *Vid. ejus dissertation sur la goute tout la chaude, que la froide Euris*
1689.

(f) *In libro supra allegato: Aphysico-medic. Essay &c.*

(g) *Dissert. de arthritide Lond. 1683.*

star tartari incrustant, vel etiam materiam densam compactamque in alveo suo depositam relinquunt, ut *LISTERUS* (b) rursus, fistulas, quibus Parisius aqua Sequana erigitur, & per urbem tribuitur, ejusmodi crusta obduci, ut eam sapius refrigerare opus habeant. In Thermis Carolinis materies flava & fixa parietibus canalium, per quos perflunt hæ aquæ, celeriter copioseque se adfigit, ita, ut etiam ligna vel argillacea vasa hæc aquis injecta flava calcaria crusta brevi tempore obvolvantur. Tephum ex aliquibus aquis circa Jenam generari *SCHÜTZIUS* (c) refert. Quid? quod omnes partes corporis nostri solidæ fluidis debeant suum ortum atque incrementum, atque inter alia, quæ reliquis firmat te antecedunt, ossa, iidem ex gelatinosis salinis atque terrestribus particulis conflata, mollia admodum initio fuerint, sensimque in fibras membranaceas, & dehinc cartilagineas abeant, & denum ossilem duritiem consequantur, (k) sicut & alie partes teneræ & molles progressu temporis præfistero naturæ ordine in ossilem substantiam obrigescent. Quidni igitur si iidem succi, ex quibus hoc naturaliter fit, suis canalibus non amplius continentur, sed profusi extra eisdem, alienis sedibus coherescunt, ibique commorantur, particulis aqueis per calorem dissipatis, solidae eaque viscosæ salinæ & terrestres coeant, conglutinentur, & indurescant? Quando itaque materia illa, quæ alias in articulis in tophos concrevit, totumque antea per corpus oberrat, ad renes vesicam que amandatur, facile fit, ut ibi secreta & cum reliquis fecibus lotii commixta vel in calculum condensescentur, vel bono omni liquidiore exterminetur. Quod in viro illo arthritico, cujus historiam adhuc illustravi, factum esse denuo nunc asserere, idque etiam propterea, quod postquam jam aliquoties ea converso itinere ad interiores partes recesserat, tandem etiam eo ipso tempore, quo podagræ paroxysmus, ut plurimum maturius desit, nec vis vitæ imminuta residuo adhuc humori noxi tam longe in articulos propellendo par fuit, in vesicam recubuit, ibidemque renovata velut tragedia, atroces dolores excitavit, retentaque per aliquod tempus in corpus durum calculosum abiit, tandem vero hoc expulso, & via commoda semel aperta, sine cruciatu cum urina, neque sine omni incurtionum podagricorum levamento, eliminata fuit.

§. VII.

Urinarias verò vias suscipiendis ejusmodi recitmentis peropportunas, atque frequentius forte, quam plerique hominum arthriticorum ex incuria
K k k k k 2 animad-

(b) *Itinerary thro Paris in the year MDCXCVI. p. 131.*

(c) *In Opusculis Jeneris, p. 51.*

(k) *Vid. Ciope Haveris libellus de ossibus supra allegatus, item Hæne Tentamen chirurgico-medicum, de præcipuis ossium morbis; & præ abit Cæ. Sægmici Albini recentissimi Icones ossium factus humani cum ossigenia brevi historia*

nus Musa Brassavolanus (r) & Joannes Bradeus (s) satis refutarunt. Neque etiam urina alba cum sedimento instar cretæ albo, huc pertinet, quæ chylo debetur. (t) Omnes vero illæ observationes commodè in tres classes dividuntur. Primo enim urina ex ipso corpore mucidæ viscidæque ejusmodi massæ permixta, & urpurinum quidem difficulter admodum exiit. Senex quidam octogenario major, apud Silvaticum (u) isque nunquam de calculi doloribus questus urinas semper reddidit copiosæ pituitæ viscidissimæ immixtas, easque adeo pertinaciter inhærentes fundo matulæ, ut ea inversa atque urina effusa, ab eo fundo tamen non recesserit. In femina quadam nobili, ut Sachsius (x) refert, doloribus nephriticis per plures annos agitata, urina sub ipsa emissionē & stillicidio sæpius adeo spissa fuit, ut facile in fila deduceretur. Ingruit subinde figus nephriticis consuetum, ur lumbos fere nudos admovere fornaci coacta fuerit, sine tamen frigoris levamento notabili, tandemque cum miseris hisce satis collectata, diem suum obiit, causa tanti mali in renibus, qui utrique in alabastrinam duritiem obriguerant, reperta. In historia famosi illius morbi vesicalis, quo i παύ πικρογες Casaubonus miserrime aliquamdiu laboravit, tandemque morti occubuit, commemoratur, simul mucum admodum crassum, qui dimidiam lotii partem constituerit, aliquando autem nihil nisi mucum tenacissime coherentem redditum fuisse, qui vix vi quadam divellendus, ex matula in pavementum lubrico & continuo contextu profudit. Magna ejus materiæ copia ejecta, per duos vel tres dies inrercesserunt quasi induciæ, tumque nova accumulatione facta, denuo nucus se protrusit. Inciso cadavere vesicam mirifice constructam, contractam scilicet & spissam, eique perforatæ additam ἐκδυον & velut cellam quandam ipsa vesica majorem in eaque ingentem saburram, putris & olidi muci invenerunt (y) Porro Drelincurtius (z) maxima cum admiratione morbum cujusdam edidit, qui urinas omphacium colore referentes, vel instar albuminis ovi viscidas, reddidit, in cujus cadavere nullum puris vestigium, sed præter carunculas callosque, & qui vivo jam eximtus erat, calculum, insignes cumulos materiæ cujusdam albæ grumulis referre, solidæ, & more tartari albi

K k k k k 3.

fria-

(r) Lib. X. de Natur. Simpl.

(s) Lib. III. Miscell. C. X. in Gruteri P. I. Thesaur. Critic. p. 494.

(t) Vid. Ephem. N. C. Dec. I. Ann. I. p. 206.

(u) Cent. III. Conf. 66.

(x) Ephem. N. C. Dec. I. Ann. I. p. 98.

(y) Vede copiosissimum morbi & Anatomi hujus plane singularis descriptionem, a Thoma de Meyerne excavatam, in Boneti Anatom. Praël. Tom. II. Lib. III. Sed. XXII. p. 644. Extat etiam hac vesica morboſæ historia in Morgagni Bibliothec. Anat. Tom. I. p. 337. seqq. Vid. & Morgagni Advers. Anatom. III. Animadu. 136.

(z) Epistola ejus extat in Morgagni Biblioth. anat. T. I. p. 352.

fiabilis repererunt, quæ instar tartari scirrhosæ vesicæ substantiæ non modo aggregata, sed etiam cum ea velut ferruminata fuït, ut verus tartarus cum dolii veteris asseribus non arctius cohereret, quam mucilago ea in lapidem conversa cum vesicæ callis, ut eam sine multa dexteritate & violentia divellere non licuerit. Tota vesica specum seu fodinam, & qua lapides aut mineralia eruantur, representavit. Ex revera fecunda fuit fodina, quæ novos lapides perpetuo produxit, & quod recens in hærda illa rupe cæsum fuit, illico reddidit atque indices auxit. Hunc wolffius (a) urinam sanæ cujusdam aleo viscidam enarrat, ut Urinæ ex uno canone angustio in alterum, resticulæ instar sine labore trahere perscile fuerit. Alius post usum pilularum ex terebinthina confectarum materiam albam mucilaginosam cum urina emisit, quæ subito ab aëre externo, in sublavum calculum obriguit. (b) Brechtfeldius (c) commemorat, Nicopie in Faltria filiolam bimulam civis & coriarii cujusdam, quum post aliquot dies pessime se habuisset, doloremque ejulando prodidisset, cum urina eminxisset materiam albam mucilaginosam, quæ ita im ab aëre externo in oblongum concrevit calculum. Klauigius (d) cum lotio prodidit materiam albicantem & mucilaginosam in quodam satis copiose produxisse, quam glutinis instar ex matula longe protraxerunt; sanguinem e vena missum instar ceræ flavæ fuisse, & urinam postea non multum dissimilem huic sanguini, eamque parciorem & maximo cum cruciatu secutam esse. Viro cuidam in Anglia, in quo post mortem renes sanos, vesicam vero triplicem repererunt, mucus cum urina permixtus secessit, qui vehementes circa vesicæ collum dolores inter meicadum concitavit. (e) Similem fere Brechtfeldiano exemplo historiam Cel. Behrensius (f) ex schedis avi sui exposuit, de viro militaris ordinis, cum calculo per multos annos confictato, qui quum aliquando solitis suis doloribus per totum diem fuisset afflictus, tandem cum urina in fine mictionis albicantem & viscidam materiam excrevit, quæ ab externo aere riguit in calculum album & oblongum. Deinde vero etiam urina clara interdum atque tenuis prodit, post aliquam vero moram sedimentum admodum tenax, crassum, & facile indurefcens reliquit. Generatim in iis, qui a nephritide male se habent, nunc citius nunc tardius sæpe

(a) *Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. p. 173.*

(b) *Ibid. Ann. X. p. 207.*

(c) *Alb. Acad. Medic. Hafniens. Vol. III. Obs. 70. p. 116.*

(d) *In conspectu ebortatus* p. 84.

(e) *Vid. Epistol. Buschii ad Editorem Transact. Angli. scripta de triplici vesica, qua tota citius lotore versa, cum Icone triplicis vesicæ extat in Alb. Eruditor. An. 1701. pag. 27.*

(f) *Breslavitische Natur-Medicin- und Kunst-Geschichte XXIII Versuch p. 16.*

sæpe copiosum, imo interdum pultaceum fere, cumque vel solum urinae largius admixtum, atque instar sedimenti delabens, vel cum arenulis unitum, excerni, interdum sub paroxismo præcipue ac sub impetu dolorum, ex urina tenui, limpida & aquosa sedimentum mucilaginoso farinaceum, aut sabulosum, vel tartareum, nunc album magis, nunc flavescens, nunc lateritium coagulari, doctissimus Camerarius (g) annotavit. Idem confirmat Illust. Stahlus, (h) quando ex hominibus calculo vexatis, sæpius materiam viscosam instar visci avium, atque tenuissimam in fundo matulae conspici contendit. Neque minus Cel. Meibomius (i) ejusmodi viscidum humorem illico interdum in materiam squamosam obdurescere, odoremque lixivii, & consistentiam ejus ad spissitudinem evaporati adsciscere, cujus scilicet liquor crassior factus & frigori expositus, protinus etiam in duritiem salinam obrigescat; atque Cel. item Waldschmidtus (k) materiam ejusmodi lentam & tenacem calculeosorum interdum luteo exceptam in lapidem concrecere observat. Ut vero singularia etiam exempla recitem, femina quædam Harveio (l) teste ex mucilaginosâ materia, quæ in sua urina copiose subsedit, pilulas concinnare propriis manibus consuevit, easque in scedula asservatas, sua sponte in calculos abiisse ostendit. Prævotius (m) in cujusdam presbyteri ischuriam gravissimam cum lotii ardore experti urina, sedimentum mucosum vidit, adeo tenax, ut effusum a fenestris cubiculi in alto siti, ad terram continuo pertingeret, quod ad tres libras quotidie secessit. Neque tamen præter ejusmodi mucum in renibus, uretheribus atque vesica post mortem quicquam vitii detectum fuit. In hypochondriaco, quum urina ante suppressâ paulatim redisset, post noctis unius intervallum in sal lixiviale, idque cultro non discindendum concrevit. (n) Aliquando tinnam ita incrassatam observavit Cnæfeliu (o) ut manibus eam instar filamentorum extrahere opus esset, & massi in fundo coagulata, nisi aqua infusa, non profunderetur. Acoluthus (p) refert urinam inter mille gemitus & panurientium similes conatus a quodam excretam fuisse, adeo lentam & viscidam, ut quam primum in urinali reflexisset, inundo bano instar alicujus nuci per magna spatia fuerit deductus. Quidam sacri orantis vir difficillime, & non nisi sub emul-

gendo,

(g) In Diff. de vitii urinae vias & vicinas illarum affigentibus p. 14.

(h) L. C. p. 4. § 4.

(i) Diff. de suppressione urinae.

(k) Diff. de causis renum p. 20. ex Cap. 2. Audavit Socrus Physica addit.

(l) In Epistol. ad B. v. vici tona. in hujus Spirit. de calculo p. 123.

(m) Vide Boetii Anat. Proth. l. c.

(n) Eph. N. C. Dec. I. Ann. I. p. 152.

(o) L. C. in 4. § 4. p. 45.

(p) L. C. Dec. II. Ann. 9. p. 173.

gendo, urinam reddidit, quæ missa in matulam crusta tartarea obdudam, itidem mox viscida, crassa & ductilis, non vero etiam in puro vase talis evasit. (g) Cardanus (r) toto decenni intervallo ex urina sua multum albæ arenæ adhærere matulæ parietibus conspexit, adeo concrefcentis, ut matula intra 15. dies non eluta tota intus lapidescere videretur. In urina etiam jam emissâ veros lapides concrevisse Schulzius (s) refert. Tertix denique clâssi reservavi urinas hominum arthriticorum, quibus ejusmodi mutatio atque coagulum obigit, adeoque propinquior adhuc cum historia morbi, quam hucusque enarravi, affinitas intercedit. Quam in rem Benedictus Silvaticus (t) valetudinem nobilis Veneti exponit, qui postquam dolor cessaverat articulis, in stranguriam incidit, cujus in urina materia crassa, viscida & tartarea ad fundum deposita fuit. Et præstantissimus ille Romanorum medicus Baglivus (u) animadvertit, ab arthritico missam esse urinam crassam & copiosam, eamque paulo post in consistentiam gelatinæ coagulatam, æque ita illum ab arthritide liberum evasisse. Simillimum meo exemplum Cel. Teichmeyero (x) debeo, juvenis nimirum literarum studiis debiti, qui superata arthritide, in redibilem copiam materiæ cretaceæ, & post exsiccationem cum creta porosa exacte convenientis, ut etiam ad literas figurasque tabulæ inscribendas esset idonea, reddidit, quæ vitrum etiam urinale unius hebdomadis intervallo, crusta insigni ad crassitiem digiti minoris obduxit.

§. 1X.

Unum adhuc restat, quod de materia ista calcaria nunc etiam persequar, ut scilicet rationem arctissimæ, quæ inter arthritidem atque calculosos dolores intercedit, cognationis declarem. Testatissima enim medicorum ex omnibus sæculis experientia notius fere est, quam ut multis exponi debeat, morbum arthriticum atque podagricum facillime mutari in calculum adfectum, atque hunc vicissim frequentius in arthriticum converti, adeo, ut qui diu ab arthritide fuerunt liberi, calculi tandem doloribus divexentur, & qui se omnem tandem emovisse calculum, hisque laboribus feliciter se defunctos esse, credunt, tandem eas dolorum faces articulis esse admotas, persentiant. Imo nonnulli ab utroque morbo vel simul vel per vices torqueri adsignique

(g) L. C. Dec. II. Ann. 10. p. 207.

(r) Comment. in Aphor. Hipp. p. 459.

(s) Eps. N. C. Dec. I. Ann. 4. p. 236.

(t) In Epist. ad Beverovicium in duplo Exere. de Calculo.

(u) Oper. p. 117. edit. Antwerp.

(x) Diss. de arthritide p. 15.

que confueverunt. (a) Ut proinde ille apud Beverovicium (a) literatus vir calculoso morbo laborans, ad amicum scribens podagra tentari solitum, hunc non illepide cognatum suum cognominet, ob connubium duabus fororibus podagra atque calculo inixum, simul tamen interdum fieri jocetur, ut uxor unius ad alterum, sine adulterii suspitione accedat. Sydenhamius, quem superius jam dilaudavi, causam illius nexus; & quare in arthriticis adeo facile calculus genere ur, vix definire audeat, & culpam vel in ægotantis decubitus lupinum, vel in organa fecernendis repurgandisque humoribus dest-nata, quæ otio velut concessio, functiones suas rite non peragant, vel in materiam morbiferam, cujus forsitan portio quædam esset calculus, conferendam arbitrat. (b) Mihi quidem in postrema causa magnum omnino momentum esse positum videtur, quando materiam arthriticam tam facile ad vias urinarias amandari, atque pro indole atque mixtione suorum elementorum, prompte atmodum in corpus durum atque calculum coagulari, ex iis, quæ superius jam disputavi, recorder. Longum foret, atque ab instituti ratione prorsus alienum, varias Auctorum de calculorum ortu sententias percerere, aut disceptare. Quamobrem pauca tantum, quoad ea necessitas postulat, de eorum originibus adferam. Ad eruenda calculi elementa Illustris Hoffmannus (c) varia experimenta instituit, permulti vero alii destillationes ejus susceperunt, inter quos novissime Cel. Hilscherus (d) ex calculo spiritum urinosum volatilem, cum spiritu cornu cervi ratione odoris saporisque congruentem, & initio cum phlegmate commixtum, sal volatile multo oleo crasso inquinatum, multas miculas oleosas crassas & fuscas in collo. Retortæ superstitites, caput mortuum coloris ex fusco nigri, odoris quodammodo adhuc fœtidi, saporis oleofo-empyreumatici, cujus maxima fuit copia, se impetrasse asseverat. Ex quibus experimentis compertum habemus exploratumque, calculum, diversa tamen proportionem, quæ etiam in singulis fere variare videtur, constari ex particulis salinis oleosis, atque præcipue etiam terrestribus, quas vel solas in calculo feminæ octogenariæ fuisse, per chemica experimenta Chomelius (e) cognovit, fortassis interdum etiam

Disput. Medico-Pract. Tom. VII.

L1111

metalli.

(a) De hac cognitione utriusque morbi imprimis agunt *Maugrave de arthritide anomala c. 9. item Cel. Ramazzini de principum viciitudine tuenda opp. pag. 448.*

(a) *Exerc. de calc. ren. & vesic.*

(b) *L. C. pag. 22.*

(c) *In Diss. de Causonibus præstis in curatione calculi p. 5. quæ experimenta etiam in Observ. Physico-Chymicis extant. lib. II. obs. 25. pag. 229.*

(d) *Diss. de Calculo renum. pag. 2.*

(e) *Vid. Histoire de l'Académie Roy. des Sciences, A. MDCCX.*

metallicis ferreis, quas Listerus (f) præter sal & lapidem calcarium ex calculis ustis coram societate Regia Londinensi, ope magnetis a se extractas demonstratasque esse contendit, denique tenacibus, & mucosis, quæ glutinis vices sustinent, ut reliquæ particulæ arctius inter se conjunctæ in firmum corpus coalescant & coagmententur. Quamvis enim partes salinæ post solutionem poros particularum terrearum penitus subire, partes autem oleosæ seu sulphureæ firmiorem cohesionem inter reliquas jam præstare videantur: sine viscido tamen & glutinoso succo nunquam in tam tenacem, atque ægerime solubilem massam, multo minus in lapidem concreverunt. Contra ea domesticis præcipue eorum, qui chemicas operas tractant, experimentis satis constat, ex glutinosis animalium partibus, ut caseo, albumine ovi cum calce viva mixtis, optima atque firmissima luta, ad scissuras fissurasque vasorum occludendas præparari. Quandoquidem vero particulæ salinæ oleosæ, terrestres atque gelatinosæ in omni infunt sanguine, atque magna eorum ramentorum pars ad renes vesicamque vehitur, ut per eas vias e corpore proscribatur, quilibet certe homo etiam sanissimus, quamcunque viæ vivendique rationem consuecit, materiam componendis calculis idoneam alit in venis suis, camque ipsæmet inficius, fecum circumfert. Quod vel crusta illa calculosa satis ostendit, quæ brevi tempore induci, atque novis indies incrementis augeri sub forma crystallorum subrubrarum solet, quando urina sanissimi etiam hominis, inprimis ultima ea, quæ post duodecim horas a sumto cibo redditur, etiam si per spissum admodum linteum trajecta & ab omnibus fordibus purgata fuerit, in matula aliquamdiu relinquitur, novæque non eloto vase iterum iterumque immittitur, præcipue si lotium ab accessu aeris maxime calidi, diuturno, computrescat. (g) Concretionem hanc inde a Paracelsi temporibus ob elementorum fere convenientiam, (h) & singularem ad latera vasorum concresecendi nifum, cum vini tartaro comparant, eodemque etiam nomine appellant. Neque tamen hunc tartarum esse existimemus licet, ex quo solo & per se calculus coalescat (i) sed ut plurimum humores digestionem ventriculi viscerumque, & nervorum virtute magis minusve destructa, mutantur, (k) & vitium capiunt, ut hinc feculentæ illæ portiones, quæ alias per urinam sece-

(f) In *Diff. de calculo humano conchyliorum bivalvium utrinque aqua Exerc. III. adject. conf. ejusd. Exerc. med. de morb. chron. p. 129.*

(g) *Comp. Boerhaave chem. Tom. II. pag. 281.*

(h) *Utrumque enim ex sale, multo tenuiori oleo, & terra aliqua parte constat, vid. de virgini tartari elementis Cel. Neumannii Lession. Pub. Von gemeinem Salze, Weinsteins, Salmiac send der Ameise p. 99.*

(i) *Diff. Alleg. pag. 10.*

(k) *Compar. hic Blackmore dissertation: on a Dropsy, a Tympany, the Jaundice, the Stone, and a Diabetes.*

secedere solent, vel augeantur, vel ad concretionem in loco commo-
 apiores evadant. Verum ne sic quidem fit calculus, nisi vel renum
 vel vesicæ morbosa conditio permittat, ut partes illæ limosæ cum san-
 guine advectæ, ibi conquiescere, & mora sua in densum durumque
 corpus coagmentari queant. Etenim ex eo potuum genere, quod
 tophacea materia manifeste abundat, non facile oritur calculus, quam-
 diu urina prompte celeriterque procedit, ut exemplo hominum, qui
 ejusmodi potu quotidie utuntur, facile elucescit. Non una autem
 læsio renum, ut ab his ordiatur, contingit. Aliquando enim si a ni-
 mis vehementi sanguinis ad renes appulsu, ejusque per venas reditu
 impeditiori vascula sanguinea nimium distenduntur, facile fit, ut tu-
 buli uriniferi Belliniani corrodamur exedanturque, atque sic ex dila-
 ceratis fibrillis continuo exsillet, atque exsudet humor glutinosus atque
 ichorosus, qui cum arenosis & tartareis urinæ moleculis facile in
 calculosam materiam conglutinetur, & quoniam illæ ex allapsu humo-
 ris salis & acris consolidationem difficulter admodum admittunt, pro-
 inde calculi non modo prompte enascantur, sed malum quoque diutius
 trahatur, & ægre admodum perfanetur. Neque minus etiam aliquando
 ab ejusmodi difficiliore sanguinis per vascula renum progressu accidit,
 ut aperto disruptoque exiguo quodam canaliculo, ab humore extra
 sua vasa profuso, & consistente, nunc in tubulis minimis, nunc in
 papillis parvi abscessus atque ulcuscula oriantur, & pedetentim latius
 proserpant, cum quibus urinæ crassiores gravioreque partes tanquam
 cum glutine commiscantur, atque sensim in materiam primo rudiorum
 & sabulosam, deinde etiam grana solidiora concrecant, quæ si in fi-
 nibus papillarum non procul a pelvi continentur, sæpius beneficio
 urinæ copiosius secretæ eluuntur, & cum eadem, neque tamen sine
 dolore exterminantur; ubi vero acini hi calculosi ulcerosæ renum sub-
 stantiæ arctius inhaerescunt, sensim sensimque incrementa capiunt, & in-
 durantur, ut deinceps haud sine exquisitissimo cruciatu gravioribus-
 que symptomatibus per ureteres tenerrimo sensu præditos iter suum
 versus vesicam proficere, & cum hac demum ex corpore proscire que-
 ant. Aliquando autem profundius in vasculosa renum substantia, &
 procul a pelvi ejusmodi abscessus generantur, & suppuratio, indies
 cum ipsius calculi incremento augetur, quum calculo jam inchoato
 via ad pelvim & ureterem non ita pateat, neque is deinceps ob mo-
 lem suam per ureteres amplius deduci queat, sed in renibus pelvique
 remanens tum ipsa suppurationis progressum adjuvet, tum vero etiam
 ab hoc magis magisque increseat. Porro etiam ab inflammatione in
 renum vasculis vehementiori, apostema grandius vel ulcus fit, quo
 renes pedetentim exeduntur, & ita consumuntur, permixtisque urinæ
 inquinamentis, toti non raro in duros solidosque ramos obrige-
 scunt.

cunt. (1) Quamquam vero hic calculorum ortus vel Cel. Anatomici Rivii experimento satis illustratur, quo is filamenta ex linteo carpo pure inuncta, matulæque injecta, ab urinis aliquamdiu in hanc redditis, post aliquod tempus calcuosa materia circumdata, atque incrustata fuisse annotavit: (m) observationes ramen anatomicæ satis testantur, multos repertos esse calculos sine ejusmodi exulcerationis vel prægressæ vel conjunctæ vestigiis, prout multi etiam nunc calculi sine ejusmodi signorum præsentia excluduntur. Ut proinde pro unica calculorum causa exulceratio minus accurate habita a nonnullis videatur. Quid? quod a calculo majori exulceratio demum aliquando proficiatur, quando is tubulos & vascula renum hinc inde comprimit, facileque ita aliquam humorum in his locis, atque ita exulcerationem efficere valet, quemadmodum & calculo jam adulto diuque insistente, signa demum qualiscunque renum exulcerationis accedere observantur. Idcirco sine ejusmodi læsione interdum a sola tubulorum Bellinianorum & pelvis laxitate atque atonia nimia ortum habet calculus, quando nimirum sanguis quibuscunque ex causis copiosius in vasculosa renum substantia accumulatus, sub difficiliore progressu vasa nimium distendit, eorum tonum naturalem & rebus ad propellendos humores necessarium infirmat, ipsosque adeo tubulos relaxat & resolvit. Quo facto per poros eorum præter naturam extensos dilatatosque crassissimæ quævis & glutinosæ particule ingrediuntur, simul vero, quum sub retardato sanguinis per renes motu, nec urina tam prompte fecernatur, nec tam celeriter, imminuta tubulorum vi, per pelvini & ureteres procedat, ex lotio in ductibus suis tubulisque membranaceis, consistente, partes illæ, quæ calculum componunt, a fluidis exsolutæ, gravitate sua facile delabuntur, in hærescunt, coagulantur, atque eadem ratione, quam superius in explicanda topiorum generatione attigi, tandem concrefcit, & magis magisque augetur. Licet tamen & quartum modum his addere, eumque, reliquis non minus probabilem, quamvis adhuc parum distincte explicatum, qui in nimia minimorum tubulorum angustia, per quam crassiorum urinx particularum colluvies commode vehi nequit, positus esse videtur. Ea vero nunc in ipsis tubulis Bellinianis fit, tonum nimis arctum adstrictumque vel a natura nactis, vel demum ob quascunque rationes, sicut & in aliis partibus evenire solet, spasmo nimium contractis, contractisque. Nunc vero culpa magis in urina fecernenda est, quæ paucissimis particulis aqueis & liquidis diluta, compluribus oleosis viscosis &

gluti-

(1) Hanc ex ulceroſa & ichoroſa renum materia calculorum generationem præ aliis maxime tuetur Ill. Stahlian in Theoria Med. p. 560. & in diſſ. de nova clementia pathologia.

(m) Vid. Denys Obſ. Chirurg. de calculo renum p. 17.

glutinosi salinis atque terrestribus abundat, ut proinde eodem ob molelem suam vix ac ne vix quidem per naturales tubulorum vias transire queant, sed obstructis iis, se exitu ipsæ intercludunt. Ex qua causa etiam homines hypochondriaci atque scorbutici crebrius calculo tentari videntur. Atque ad ejusmodi crassiores urinam fortassis Hippocrates respexit, quando calculum *ὡς τὴν ὕψυ ὑγρὰν*, ab urina adusta oriri contendit. (u) A quacunque autem causa illè infarctus proficiscatur, dum in iis tubulis, ubi contingit, serum urinosum tardius movetur, & particulae tenues tantum, valdeque fluxiles transitum inveniunt, id vero, quod crassum est & turbidum, magna ex parte remanet, sub lento progressu promptius confidit, sibi adheret, & cum aliis concrevit. Quod si etiam ab obstructione horum tubulorum fieret, ut humor ille, quo pelvis interne ad concretiones prohibendas irrigatur, non ubique exfillaret, adeoque interna pelvis superficies variis locis siccior evaderet, istis sedibus, utpote minus humidis atque lubricis ramenta ad quietem & conglutinationem perquam idonea facile adherescunt, arctiusque coeunt non minus, quam aliarum sibi similium accessione augentur. Ita enim in omnibus, a quacunque causa ortum habeant, calculis usu venit, ut simul atque illorum posita fuerunt rudimenta, neque hæc, dum laxius adhuc coherent, ab urina copiosius adfluente dissolvuntur, eluunturque, aut medicinis etiam expelluntur, mora sua alias quotidie particulas ob similem habitudinem facile adherentes in sui societatem trahant, & propter gluten admixtum promte cum iis conjungantur, humidies per calorem abactis magis exsiccantur, & coalescant, hocque modo incrementa capiant indies, atque magis magisque indurcentur. Quam accrescendirationem Cel. Nyckius (o) eleganti experimento comprobavit, quando is globulum ligneum in vesicam vivi canis caute immisum, ibidemque glutinato vulnere relictum aliquamdiu, inciso post aliquot hebdomades cane undiquaque exiguis calculis s. crystallis obfessum extraxit. Neque minus id casu aliquando observatum fuit, quando nonnulli varias & peregrinas res, per naturales urinæ vias, vel alia ratione ad vesicam delatas, ibidemque per aliquod tempus commoratas, e.g. cerum minorem, frustulum rad. Petroselinii, turundam, acum &c. calciculosa crusta obductas, seu calculum adnatum observarunt. (p) Magnitudo autem calculorum, figura, color & durities, alique variant, pro diversitate materię, ex qua coalescunt, vitæ etiam vivendique rationis, qua ægrotans utitur, moræ, conceptaculi, in quo formantur,

L1111 3;

tur,

(u) *Libr. de aere, aquis & locis* §. 21.(o) *Atenograph. C VII p 78.*(p) *Pleraqueque selectissima exempla ejusmodi observationum collegit Cel. Pluvinet: Praeceptor quondam & alius Patruus pie observandas Diss. de calculo ad vesicam adherente* §. X. pag. 172.

tur, caloris, aliarumque rerum, ut alii majores, alii minores; alii pallidi, alii cinerei, alii rubicundi, vel alio colore infecti, alii admodum angulosi & asperi, alii friabiles & male compacti, alii perduri & prorsus faxei, nulla prorsus ratione, nec iis etiam liquoribus, qui metalla alias dissolvere valent, subigendi, (q) atque mallei etiam idibus plane resistentes, (r) nascantur. Quando nunc ad origines calculorum vesicæ paucis indicandas progredior, mihi quidem eo magis brevi esse licebit, quod illi ex renum calculis crescere utplurimum consueverunt. Id enim duriores illi nucleï, qui in medio ejusmodi calculorum vesicæ exteriorum reperiuntur, satis declarant. Acini enim subulosi vel lapilli ex renibus per ureteres in vesicam deducti quando cum urina non exeunt, sed retinentur, a mucositate vesicæ sub jugi & libera volutione magis magisque involvuntur, & cum novo solidarum urinae particularum comœatu incrementum accipiunt, atque indurantur, vel si ad vesicam quocunque modo adherescant quoque, atque adeo libero motu non utantur, perpetua tamen secum urinolarum accessione magis augmentur, cum iisdem conglutinantur, crustisque super crustas inductis, in grandem sæpius molem coagmentantur. Neque enim solum hæc incrementorum ratio experimento Nuckii, rebusque peregrinis calculosa crusta obductis, paullo ante jam in medium adductis, abunde liquet, verum lamellis etiam colore & diversitate variis, quæ in fractis vesicæ calculis notantur, & ceparum instar sibi incumbunt, eo magis comprobatur. At non omnes vesicæ calculi ex renibus primam habent originem, sed in ipso etiam vesicæ cavo adolefcunt, quando interdum peregrinæ res eo delatæ, ut jam nunc attingi, calculosa materia in crustam, & progressu temporis alio atque alio cortice augmentur; interdum vero etiam sine ejusmodi nucleis, calculosa materia, quæ urinæ adhuc bene permixta per renes atque ureteres ad vesicam pervenit, diuturniori forsan lotii commoratione, vel alia ex causa gravitate sua delabatur, coherescit, & deinde in ejusmodi durum corpus conglutinatur. (r) Quot enim vesicæ calculis addiguntur,

qui

(q) Hanc duritiem calculorum var'is experimentis confirmant Sturges in *The Philosophical Transactions* abridg. Vol. III. p. 178. atque Halesius in *The Statical Essays*, impressis Vol. II. containing, *Hæmorrhoids in the Account of some Experiments on Stones in the Kidneys and Bladders*. Ut proinde merito, præcipue quod ad vires in ejusmodi calculis ostendit, omnes eorum rerum curiosos expeditione suspensos teneat novissimum illud maximeque deantatum Virgini Anglicana remedium, quod Cel. Schulzins delecta dissertatione nuper etiam Germanice versa, illustravit.

(r) Vid. Steinii *Leibographia curiosa* p. 1. Jeay

(s) Modum, quo excrementorum glutinis crassius per rimam carunculas vel sub filamentorum, est globulorum etiam intus concatenatorum & ad firmam igitur calorem concompactum firmum, transloietur, atque in vesica cum varia amica in populeas crustas e vasis ductu, deprehendisse sibi visum est, variisque signis opinionem suam illustravit Jo. Baptista Contoli in libro *Italice* ea de re descripto, ex quo repetita signa in *Actis* etiam *Erud. extant Ann. MDCXCVIII. p. 137.*

qui nec dolores a renum calculo interdum minimo, genitos, persenscunt unquam, nec post mortem aliquod eorum vestigium in renibus ostendunt? Quæ cum ita se habeant, atque materia illa calcaria post diuturnam arthritidem per vias urinariaseducta, ut ad hanc redeam, cum ipsi calculis admodum conveniat, & sub destillatione, eadem fere elementa, quam illi, suggerat, tum aliis sub experimentis, non longe diversas mutationes fubeat, ut ex utrorumque instituta comparatione facile liquet; eadem vero etiam materia ad urinarias vias facile admodum amandetur, ibidemque cum lotii quicquillis arctius simul connubium ineat; calculi præterea arthriticorum ex iisdem, ex quibus non arthriticorum calculi constant, componantur; (†) renes denique & reliquæ viæ urinariæ a plerisque causis, ut in medicorum scholis vocantur, antecedentibus, quæ arthritidem generant, male ut plurimum affecti infirmatique, eo facilius quacunque ratione locum eidem relinquunt, ut sub quiete conglutinetur, & concreascit: ex his quidem momentis facile cogitatione assequi licet, quare arthritis & dolor ex calculo tam arcto inter se nexu & cognatione continentur.

§. X.

Id vero ipsum in vero arthritico, cujus morbum qualicunque hæc commentatione potissimum persequor, experientia comprobavit, utpote qui complures concreciones ex eadem materia genitas, sensim sensimque excrevit. Vix illæ mihi in renibus coaluisse videntur, quoniam nec lumborum dolor, nec alia, ex quibus renum calculus movens sese, distinguitur, signa præsto unquam fuerunt. Equidem non ignoro, in rene sæpius & vesica situm esse calculum, nec tamen eidem ullum incommodum adferre, quoad ille in sede sua adhuc immotus continetur, nec exitum molitur, ut adeo plures ingrati hujus hospitii præsentiam ad vitæ usque terminum non resciscant. Ut alia exempla sileam Cel. Vaterus (u) a viro quodam calculi dolores nunquam experto, & alias perfecte sano, usu aquarum pyramontanarum ultra quadraginta calculos præter alios minores, quatuor vel quinque dierum spatio inter mingendum fuisse ejectos, refert, atque Alghisius (x) magnatem quendam alias arthriticum commemorat, qui quamvis nullas unquam calculi molestias percipisset, in ejus tamen vesica calculus fuit repertus. At vero in ejusmodi hominibus calculus nun-

(†) Vid. Musgrave de arthritide anomala C. 9. p. 75.

(u) Vid. Philosophical Transactions Vol. XXXIII. No. 377.

(x) Vid. ejus Trattato di Litotomia p. 16.

nunquam e sede sua emotus fuit. Quis vero crederet unquam, a viro arthritico, de quo in præfenti ago, calculos vel minores, sine renum & ureterum molesto sensu in vesicam delapsos esse, vel inter tot dolorum tormenta, quibus vesica identidem excruciat fuit, renes salvos immunesque ab omnibus malis permanisse, si non a calculorum proventu liberi hucusque fuissent? Itaque potius materia ea adhuc liquidior commodè per renes & ureteres iter suum emensa, ubi in vesicam venit, inter dolorosos conatus exitum quidem quæsit, sed non invenit, hincque tandem eo modo, ut supra indicavi, firmius cohesit. Quia autem forma & quo loco id factum fuerit, determinatu mihi per arduum & perdifficile videtur. Forſan in unum calculum, cumque prægrandem coaluit, quod tamen ut credam, vix mutua convexæ fragmentorum figuræ inter se proportio permittit. Forſan vero etiam ex eadem plures pedetentim calculi, iidemque non procul ab ureterum ingreſſu in vesicam, intra tunicam concreverunt. Ita enim Deus immortalis, ureteres, qui lotium ex renibus in vesicam devehunt, ad prohibendum huius regressum, sapientissime fabricavit, ut non recta in vesicæ cavum ferantur, sed oblique procedant, & aliqua eorum pars sub tunicis vesicæ musculoſa & nervosa, protendatur. Hic sæpe calculi nascuntur, (y) dum desidentes ex urina particulæ solidiores intra illas tunicas obhærescunt, & novo ex lotii adfluxu incremento augentur, tandemque membranas diducunt, atque exitum moliantur. Quidni igitur credibile eſſet, etiam hoc in loco materiam istam in varios calculos tunica inclusos, coisse, præcipue, quum admodum probabilis videatur Celeberrimi, quem sæpius jam honoris causa appellavi, Platneri (z) conjectura, qui quando interdum repente & brevi tempore magna calculorum vis sine magnis doloribus excernitur, tales calculos vix in vesica sine noxa & dolore tamdiu contineri potuisse, sed eos intra membranam conclusos, dehinc vero rupta illa diductaque tunica, exsolutos, & in vesicam prolapsos, tandemque urina eos promovente, excidiſſe contendit. Hac ratione etiam facilius intelligitur, quare iidem calculi in lamellas & minora frustra soluti cum urina se protruserunt. Quum enim non durissimi & prorsus saxeï fuerint, & præterea urinæ perpetim affluentis appulsi patuerint, ea forſan si non ubique, tamen uno loco laxiores calculi poros subit, & alluendo humectavit, emollivitque, quin imo forſitan particulis acrioribus, quæ tantam vim in vitra exercuerunt, etiam corroſit, ut lamellæ huius sensim sensimque laxiores reddidit, varia fragmenta tandem seceſſiſſe videantur. Quæ tamen calculorum

reſo-

(y) Vid. Ctl. Platneri diff. cit. p. 23.

(z) In eadem elegantissima Dissertatione p. 27.

resolutio eodem modo locum habuit, si vel in ipso vesicæ cavo siti, & non procul ab ureterum ingressu, atque urinæ stillicidio remoti fuerunt. Ceterum exemplo non prorsus novo atque inaudito contigit, calcule vesicæ contractos cum urina secessisse. Olim jam Borrichius (a) puerum quandam in medium produxit, qui post diurnum remedium d'ureticorum usum calculum prope silicium magnitudine nucis juglandis minoris, in frusta fabis æqualia, contractum, certasque fracturæ notas secum adferentem exclusit. Nostis vero temporibus Cel. Dethardingius (b) exemplum viri septuagenarii proponit, qui plures laminas calculeosas varix magnitudinis, coloris externe albicantis, interne flavescantis non sine doloribus excrevit, quarum etiam alias, pluribus licet post aliquot dies ejusdem conditionis iterum subsecutis, superesse tum in vesica persensit. Neque minus Cl. Goërizius (c) tanquam rem singularem & sibi incognitam memorat, a viro quodam Aulico Ratisbonæ tunc commorante, quinquaginta annorum, qui aliquot annos renum calculo laboraverat, variosque lapillos rubros sub lumborum doloribus, vomituque vehementiori reddiderat, tunc vero atroces a vesicæ calculo dolores cum urinæ suppressione & ardore expertus erat, post usum idoneorum remediorum, imprimisque etiam opobalsami veri, cum oleo amygdalarum dulcium, linimento-rum quoque & cataplasmatum, indeque revocatum urinæ profluxum, intra tres hebdomades sine singulari dolore, & cum pristina potius redeunte valetudine, plures quam centum albas lamellas calculeosas ejectas fuisse, quarum permultæ magnitudinem seminis cucurbitæ, crassitiem vero corticis avellanæ adæquarint, concava autem interna figura alium adhuc inclusum fuisse calculum, integramque adeo molem ad magnitudinem nucis moschatæ accessisse prodiderit, lamellæ autem eminentiis acutis instructæ non aliter in oculos inciderint, quam si valido mallei ictu percussæ & in fragmenta disjectæ fuissent. Denique, qui primo loco appellandus mihi fuisset, Cel. Heisterus (d) Patronus meus pie observandus, itidem ut rem rarissimam de viro quodam sexagenario, cœnobio Mariævallis præfecto, procero, robusto, & quadrato, duroque vitæ generi adueto, refert, illum, postquam plures annos cum calculo renum & vesicæ misere conflictatus, magnam lapillorum copiam emiserat, aliquando, quum negotiorum causa multum in horto cœnobii istius obambulasset, subito ingentibus calculi vesicæ doloribus, interque eos vehementissima vesicæ constrictione,

Disput. Medico-Præf. Tom. VII.

M m m m m

five

(a) *Art. Med. Hafnien. Vol. I. Obs. 77. p. 147.*

(b) *Diss. de calculo vesicæ triabii.*

(c) *Besj. auf die Natur-Kunst- und Medicin-Geschichte XXIII. Versuch p. 35.*

(d) *In Dissert. Observationes Medicas miscellaneæ complexæ p. 36.*

sive spasmo correptum, & brevi post singulari quodam sensu percussum, quo calculus in vesica eodem modo frangi percepit, ac si nuxes a manu robusti ejusdam viri, forti compressione, confringerentur, incertumque, cui causæ hunc effectum adscribat, paullo post quinquaginta circiter frustra ejusmodi calculi, ex iisque nonnulla ad magnitudinem avellanæ minoris, per urethram sensim & sine enormi dolore excrevisse, quæ fragmenta ante aliquot annos in museo Heisteriano meis me usurpare oculis memini. Quibus exemplis admodum notabilibus meum hoc adjungi omnino meretur, quum præter perditam aut alio modo adempta calculorum fragmenta, eorum plura, quam centum adhuc & triginta numerentur, quorum multa magnitudinem phaseoli, crassitiem vero seminis cucurbitæ, putaminibus suis adhuc inclusi, si non superant, saltem exæquant. Verum fortasse in hoc ipso viro nullus plane fuit calculus in globosam vel aliam figuram coactus, sed crusta tantum calculosa, quæ intus aliqua parte, vesicæ cavo, ad hujus figuram effecta adhæsit, atque eodem modo, ut superius tradidi, ab urinis emollita & cotrosa secassit. Quamvis enim nonnulli (e) de ejusmodi crusta adhuc dubitent, quod vesicæ tanquam musculi excavati motus systalticus atque diastalticus constanter perennet, & detrusor urinæ musculus nunquam conquiescat, atque vix eam permittat; satis tamen illam experientia comprobavit. Atque si rationes etiam requiras, facile fieri posse videtur, si abraso remotoque, qui vesicæ latera irrigat, muco; materia ad concrendum apta nudis membranis adhærescit, vel ex alio & jam vesicæ vitio, in latera ejus, velut in matulam confidit, idque multo magis, si muco rursus obducto, firmius deinceps conglutinetur. Quod ad experientiam attinet, sune quemadmodum renes interdum in pelvi a materia quadam calculosa & velut gypsea circum circa incrustantur, (f) atque aliquando a calculis atque cretacea materia tanquam cellulæ efformatæ videntur, (g) ureteres etiam lenta gypseaque materia obducuntur: (h) ita in vesicæ cavo etiam nonnunquam crusta adhærescit. Exemplum a Drelincurtio enarratum superius jam adduxi. Vidit præter hunc aliquando Cel. Scheidius (i) cavitatem lapideam infantis vesicæ accrevisse in qua commode calculus vivo infanti extractus locabatur. Neque minus ab immortalium meritorum Anatômico Ruyschio (k) ejus-

(e) *Diff. de calculo* p. 9.

(f) *Ephem. N. C. Dec. I. Ann. IV. Obs. 64.*

(g) *Vid. ejusmodi figuram in libro: Some observations on the several methods of Lithotomy.*

(h) *Zac. Instans Lib. II. c. 16. Obs. 5.*

(i) *Rosa, Diff. de calculo vesicæ* pag. 14.

(k) *Vid. Tab. Anatom. IV. Tab. II. Conf. p. 23. No. 51. & p. 30. No. 78.*

ejusmodi vesicam calculosa materia intus incrustatam, in qua & ipsi calculi fuerunt, ex vacca delineatam habemus. Verum causam hanc, & utrum unus aut plures calculi, vel crusta potius calculosa vesicæ in ægrotante isto, fuerint, nunc ego quidem non amplius discepto, ut potius cuivis libere ea de re sentiendi facultatem libens meritoque relinquam. Illud vero externo loco addendum adhuc arbitror, denuo ab eodem Viro frustum calculosum, idque ingens admodum & crassum fuisse excretum, neque minus etiam aliquem materię calcaris cum urina profluxum his ipsis diebus rediisse, quibus in ista explicanda hanc qualemcunque operam collocavi.



A D T O M U M V.

DE FEBRIBUS.

C C L X X I.

PHILIPPI GOBBI,

D I S S E R T A T I O

AMPECTENS HISTORIAM ET CURAM
EPIDEMICÆ FEBRIS,

quæ, finire anno 1752, & incipiente 1753.

TERGESTES INCOLAS VEXAVIT.

Vienn. 1754

N Il unquam ad artem medicam promovendam, ac illustrandam ap-
tius visum fuit, quam fidelis observationum historia, hæc eto-
nim principium medicinæ fecit, hæc ipsa incrementum addidit; scimus
enim antiquis illis temporibus ægros in foris, plateisque expositos ad
petenda ea transeuntibus, quæ præcipua ad morbos debellandos re-
media reperta essent, tum eosmetipsos columnis publicisque fanis sa-
lutaria hæc præsidia inscripsisse, ut edocemur ab Herodoto, & Stra-
bone, nil ergo rationis physico indagabant sola naturæ, morborum,
variorumque a remediis assumptis phænomenon observatione contenti,
hæc vero observata omnia compilans, & digerens divinus Hippocrates per
tot sæcula constantem exhibuit nobis ideam veræ medicinæ, ejus ni-
mirum, quæ haudquaquam a jocosis quæstionibus & inutilibus com-
mentis, sed natura ipsa lucem præferente emanat.

Sapientissimi proinde hujusce viri vestigia calcare utilissimum cen-
setur

M m m m 3

setur iis, qui se in medicina faciendâ præsuturos reipublicæ putant, quod nobis clarissimus Boerhaavius indicat in peculiari oratione de commendando studio Hippocratico.

Tale studii genus annis sum ab adolescentia inchoare, singula etenim, quæ in praxi sub celeberrimo Macope Professore Patavino, vel mihi ipsi in medicina faciendâ particulariora evenerant, indies annotavi, & unoquoque mense notata compilavi, ut congruum exinde ratiocinium, mihiq; aptam, stabilemque medendi methodum efformarem Cornelii Celsi monitis adherens, qui in sua præfatione inquit: non post rationem inventa est medicina, sed post medicinam ratio est quæsitâ.

Luculentum autem observationum campum suppeditavit mihi febris epidemica, quæ in fine anni 1752, & principio 1753. Tergelti incolas vexavit, quâ sufficiens materia, & dissertationi huic sat idonea eruitur.

Sed cum muneris mei ratio postulet, ut citissime me expediam, ea quæ fufius collegi ad duo potissimum instantis morbi tempora redegi, ea nimirum, quæ per mensem 7bris 8bris 9bris observatu digniora evenere, tum ea quæ Xbris Januar. & Februar. sequentis anni succinctè, fideliterque exponendo.

Mense itaque 7bris & 8bris anno 1752 cœperunt ægritudines multæ in civitate exurgere, quæ febrium, remittentium, & intermittentium specie, absque frigore tamen invadebant, siquæ cauta, prudentique manu tractabantur, absque ulla malignitatis nota non discedebant; æstas calidissima, & pluviosa præcesserat, annus erat sterilissimus, summa vexavit plebem inopia, unde pessimo nutriebatur alimento, præcipue ex fructibus horreis maturis, & immaturis deprompto; calidissimæ æstatis autumnus pluviosus, & australis successit; bonarumque aquarum egestas in usus publicos, (antequam Augustissimæ Imperatricis nostræ munificentia aquæ in urbem traducerentur) quæ omnia epidemiæ orienti suum addiderunt symbolum.

Quamvis autem nulla malignitatis nota appareret in eorundem morborum initio, accidit tamen, quod dum imprudenter, & negligenter tractati fuerant ægri, in febres continuas & continentes præcipiti passu irruerent, hinc funesto in pluribus ægrotis edoctus eventu, statim ubi illos accedebam, emeticum ex apta dosi hypecucanæ, vel tartari emetici exhibebam, vel alium subducebam laxativè aliquo pharmaco, prout vires, & ægri conditio postulabat, inde ad corticem Peruvianum tanquam ad sacram anchoram confugi, quâ methodo debellatas, suffocatasque, ut ajunt, in ovo febres illas conspexi.

Sed cum in regione illa nescio an aliquorum medicorum ignorantia, an malicia factum sit, ut saluberrimus hic cortex veluti venenum respuitur, quod contingere videtur eo, quod recidivæ frequentissime post

post assumptum corticem emergant, (in qua quidem re medici ipsi inculpani veniunt promiscuo usu Peruvianum corticem præcipientes) evenit exinde, ut ægri in morbis illis, quamvis præsentanea urgeret indicatio, salutare hoc præsidium a cauto etiam probatoque medico præscriptum rejicerent.

Contigit hinc ut plurimum funesta intermittentium, & remittentium febrium in continuas continentes transmigratio, in quo morbi stadio inutilis, quandoque damnosus corticis usus fuit, nil pejus hinc hoc tempore medicorum politica indulgentia visum; medici erga ipsi faginatæ cæmeteriis conspectis in erroris poenam propria redarguebantur conscientia.

Phlebotomia in morbi principio instituta post stomachi, alvique depletionem pluribus profuit, aliquibus obfuit, profuit iis, qui plethoricum sortiti erant temperamentum, obfuit aliis, qui virium vitæ inertia, & fluidorum visciditate, cum lentore donabantur.

Dum febris a remittente ad continentis gradum evehebatur, utilia visa sunt diluentia, nitrosa, antiphlogistica, emulsiones ex seminibus frigidis cum additione nitri stibiatæ, pistanæ avenacæ, & hordeacæ, juscula ex pullis, vitulorum parata, quæ diluentem, & temperantem habere vim, summum attulerunt ægrotis levamen.

Diffusior methodus, quæ mihi usu venit in his morbis tractandis, apparebit, dum tractatum de aere, aquis, & Tergellini cæli indole typis edam, quod nunc, si mihi tempus voluntati par relinqueretur, libenter facerem) ad cujus operis calcem descripta est hujus morbi, & progressus historia, cum observationibus e cadaveribus dissectis erutis.

Ne vero magis immorer pretiosum tempus insumendo, ad ea, quæ in progressu febris epidemicæ contigerunt, transeo, quæ cum lucu digna essent, non desuerunt ii, qui pravam aeris coelique qualitatem inculparent, alique, qui featurigines aquæ noviter advectas in salubres declamarent, quos id proclamasse maligno potius, & contumelioso inspirante spiritu, quam veritate manifestum faciam in adducto meo tractatu non adhuc typis edito.

Febris Epidemicæ progressus per 9^{mos} X^{bris} & Januarium anni 1753. ad Martium usque perdurans.

Febris, quæ elapsis mensibus larvata facie medentes fallebat, dissecto jam velo Tergesti incolis insensa fuit nec tertianæ simplicis modo, aut duplicis intermittentia aut remissione ægros aggrediebatur, sed atrocissima violentiorum symptomatum turba languentes, medentes, & affidentes terrebat; uno enim alterove a decubitu ægri die peitæchie, vel maculæ purpureæ in corporis peripheria emergere, delirio,

ac

ac plurimorum funestorum symptomatum caterva stipatæ, hinc oculatior medicus esse debebat, nisi expectatam mortem perhorrescere maluerit.

Causæ prædisponentes superius adductæ perenni durantes constantia, putrida de languentium corporibus exhalantia miasmata, cimetaria haud bene Tergestinatorum incuria munita, platearum immunditiæ indes increbrescentes inchoatam labem perfecere, eousque etenim aërem inquinaverunt, ut in homines horrore necis perterritos adactus, eorum corpora ita valuerit immutare, ut ad vehementiores morbos priora evaserint.

Statim enim ac æger decumbebat aggressus febris de artuum quasi defatigatorum, & contusotum sensu conquerebatur, de prostrato appetitu, de nausea, ac vomendi proclivitate, idcirco febrem illam de malignarum indole pronunciare haud ambigebam, statimque vomitum ciere moderata dosi radicis hipeucacænæ cum refracta portione tartari emetici remixtæ, vel si vomendi cupiditas deerat alvum subducere leni aliquo cathartico opportunum censebam, quod ut plurimum ex sena, & rhabarbaro conficiebatur, & in delicatioribus sola emulsione laxativa Minsicht usus sum, finito autem seu emetici seu cathartici opere accurate corporis superficiem perlustravi, sique petechiis, vel rubicundis maculis conspexissem respersam, cucurbitulas scarificatas cervici & dorso applicandas suasi, & in fluidorum violento ad superiora raptu femoribus quoque easdem commisi optimo cum successu.

Non comparentibus autem adhuc in cute maculis phlebotomia tam in brachio, quam in pede instituta optimum promisit ægro subsidium, hanc tamen jussi institui circumspecte, tempus, ægrorumque temperamentum introspeciendo, nec non naturæ & morbi tendentias; liberrime interim fateor venæ sectione in aliquibus fatalem periodum arcessisse, nec me pudet hoc fateri, si in methodi curativæ selectu immortalis famæ virum Sidenhamum in quadam constitutione epidemica Londinensi verba hæc proferre haud puduit, *vix ac nec vix quidem potui efficere, ne unus, aut alter meorum ægrorum, qui primi se mea cura commiserunt de medio tollerentur, donec perspecta mihi fieret morbi indoles* &c. in nostra quod attinet constitutione paucis phlebotomia obfuit, pluribus profuit imo præsentaneum auxilium suppeditavit.

Evenit tamen aliquando quamvis adducta salutaria præsidia & naturæ norma, & artis lege debitoque tempore præposita fuerint, quod morbus diei unius alteriusque spatio eousque increverit ut linguæ ariditatem cum viscerum æstu summo, pulsus citatiorem, & inexplabilem sitim præ se ferret, quo in casu vix remedia aptiora judicavi aqua Nucerie largis haustibus cum nitro sibiato in eadem soluto, sumpta aqua eadem syrupo limoniorum, vel ribium condita, hisque solis gratissimis remediis

remediis, & simplicissimis contigit id videre, quod medici nostri cordialibus, & alexipharmacis ad cœlum usque elatis puta ex iis qui lapide Bezoar, de Goa, & perlis parantur haud affecti sunt, sique sato contigit, me ægros accessisse, quos alii medici tractabant, cardiacis, & alexipharmacis fortioribus languentium satum delevi, ignoscaturque mihi DEUS, si aliqua ex his remediis, quæ minus nocentia cenlebam, ab aliis medicis proposita probavi, ne semper contradicторie loqui viderer, ne magis magisque semper scopus odii, & invidiæ fierem medicis nostratibus, qui sat superque sinceritatem meam, liberumque dicendi modum respuunt.

Verum quidem est in hujuscemodi casibus dum neque linguæ ariditas, nec æstus vehementior, nec hypochondriorum fortes tensiones adsunt, languidiorque fibrarum motricum characteris comitatur, cardiacis volatilibus, & spirituosus debellari posse, & debere, inter quæ familiariora sunt aqua theriacalis, cordialis Saxonice, radix contrajervæ, serpentariæ Virginianæ, cortex cascarillæ, cortex Winteranus, Theriaca Veneta, Diascordium Fracastorii, liquor cornu cervi succinatus, & salia volatilia nonnunquam ex cornu cervi, succino, & sale armoniaco deprompta, præcipue dum phantasie turbatio adfuerit a fluidorum inertia, & torpore oriunda, quæ tamen accuratissima cum cautela usuveniunt non nisi refractis, repetitisque potius dosibus exhibenda.

His ipsis in circumstantiis laudanda quoque veniunt emplastra vesicatoria cantharidibus parata, quæ ad fluidorum lentorem, & inertiam tollendam erigendamque solidorum ætoniam mirifice conducunt.

Id quod funestius, & majori dignum attentione in nostris languentibus erat, quod tribus, vel quatuor ante mortem diebus convulsionibus corripiebantur, & hoc quandoque febre mitescere contingebat, quodque nobis præcipue indicabat malignæ febris putredine nervorum lympham coinquinatam, unde novo, & irregulari tubulis nervis superaddito stimulo, vi antecedentis morbi confecti ægri penitus opprimebantur; prognosis exinde securi lethi eliciebatur, quæ in quadraginta, & ultra ægrotis una, alterave vice me fefellit, sique contigit aliquos in adducto statu neci vicinæ eripere, id cinnabari nativæ, pulveri absorbenti Wedellii cum opio, opii ipsius morigerato usui me debere putabam.

Plena versa vice in morbo securitas pollicebatur, dum circa septimum morbi diem mitescere febris, cum cutis madore, somnoque solamen viribus afferente, cum hypostatica urina, mentisque serenitate, appetitus etenim sensim redibat, & indies magis vigeat, pulsus æqualior fiebat, & maculæ cuticulares dissipabantur, stabilissima hinc sanitas emergebat, quem ut attingeremus scopum accuratissimam dictam, & alimentorum selectum rerumque (quis appellant) non naturalium apiam moderationem morbus exegit.

Disput. Medico-Pract. Tom. VII.

N u n n n

Parti-

Particulariter veto tradere quantitatem, qualitatem, stabilemque exhibendi alimenti normam in hujuscemodi morbis arduum foret, & longum, attamen hæc perspicaciter nosse maxime necessarium est, sic nos admonente Hippocrate Lib. VI. Epid. Cap. VIII. *Victus rationes in acutis quantum fieri potest cognoscende, nam non nosse multarum calamitatum res est.* Fateor interim hoc potius sedulte praxi, exactoque ratiocinio quam lectioni modentes debere, cum ad quaslibet, & morbi, & temperamenti, & ætatis differentias victus quoque ratio immutari debeat, eodem ipso sapientissimo Hippocrate docente Lect. I. aph. 17. *Et quibus semel aut bis, & plura, vel pauciora, & per partes offerri conducat, videndum, concedendum autem aliquid, & consuetudini, & tempestati, & regioni, & ætati, hæc de victus quantitate, & exhibendi norma, quæ autem de qualitate, & selectu, legatur liber ejusdem de victus ratione in acutis, vereor enim, ne prolixior sim, quam meum exigit institutum.*

Quæ itaque ego ipse in constitutione hac Epidemica generaliori usu, & plausu probatiora (ad victum quod attinet) inveni, breviter perstringam, victus ægrotantibus erat me suadente tenuissimus, quantus scilicet ad vires sustinendas necessarius foret, & semel aut bis per diem exhibebatur, dum nimirum febrilia symptomata remittebant, aut remittere videbantur, laudabiliora præ ceteris erat jussula avenacea, & hordeacea pulli, aut vituli lenissimo jussulo parata, sale, aliore condimento nullatenus respersa, item idipsum vituli, aut pulli jussulum cum cicorii, borraginis, & cardui benedicti foliis ebullitum, quandoque cum radicibus aperitivis languentibus exhiberi jussi, qui tenuissimus victus ad fomitem febrilem compescendum idoneus judicabatur, indulgi quoque ad gratiam cibo conciliandam ægrotis si maturis piris, aut pomis igne subactis vescerentur, hocque in principio, augmento & statu morbi statutum erat, valde parum immutata ratione, eodem vero mitesciente sensim sine sensu alimenti dosis aucta fuit, ad pristinam autem vivendi normam perventum non est, nisi morbo, malignique vestigiis integre deletis, quod circa decimam quartam morbi diem contingebat, & aliquando sed raro ad vigesimam primam, & vigesimam septimam potrahebatur.

Regimen vero ulterius, quod circa exteriora versatur, sic institutum volui, languentes in lecto assiduo detineri suasi, capiti suppositis pulvinariis altioribus quantum poterat, & consuetudo permiserat, elevato, ut non tam facilis per amplas arterias carotides, & cervicales ascensus, pronior vero per jugulares venas descensus aptetur circumcuncti cruori, neque stragulis opprimi ægrotum cupio, quamvis plurimi hoc fatagant infano nisu ad sudores, & petechias eliciendos, verum ne quid assidue consilio fiat, quod ægro molestum sit seculum cavi.

Ambientem ærem temperatum quæsi, hinc suffumigia myrrha, benzo-

benzoïno, & storace concinnata aliquando, præscripsi in frigida nimirum, & humida aeris constitutione, & ubi mihi frigidiora; & laxiora corpora tractanda erant, at quando calida, & sicca aeris diathesis aderat, & cum temperamentis æstuantibus, nimisque elasticis agendum erat, malebam cubiculum aqua, & aceto conspergi, & fenestras quandoque aperiri, ut liber aeri circumfluenti fieret accessus, studiose quoque cavi, ne amici, & consanguinei assiduâ visitationibus, & molesto, diuturnoque discursu ægrotantibus infensi essent, non tamen visitationes eousque interdixi, ut æger in fatalem exinde delabi posset melancholiam, aninus enim in hilaritate, si fieri poterat, detinendus erat, sic etenim spiritus animales excitati, distracti neutiquam, muniis suis exequendis, viribus erigendis, materięque morbiſicę excludendę idonei reddebantur.

COROLLARIUM I.

QUAMVIS medicus optime noscat secundum meliores medicinę leges febres intermittentes protrahi aliquando debere, quod quidem a clarissimis auctoribus confirmatum est, nihilominus tamen dum videt, præcipiti cursu eas delabi in continuas, & continentes, ad corticem Peruvianum recurrere necesse ei est.

COROLLARIUM II.

Cortex Peruvianus optimum remedium est inter omnia quę ex triplici desumuntur regno, in febribus etiam non intermittentibus, dummodo inflammatorię non sint convenientissimum.

COROLLARIUM III.

Phlebotomia in principio morborum acutorum amplectenda est; in progressu damnosa censetur, præcipue dum petechiarum vel purpurę eruptio sit, vel facta est, hinc thesis hæc cum Cornelii Celsi opinione convenit, qui de his febribus differens, inquit, ventę sectio post quartam morbi diem imbecillum reddere corpus potest, non potest integrum.

COROLLARIUM IV.

Victus ratio in acutis primus esse debet medicinę cardo.

COROLLARIUM V.

Ex fonte pharmaceutico in acutis paucissima sumenda sunt, & ex iis ea solummodo quę a natura præmonstrante indicantur; ideo me-

N n n n 2

dicus

CCLXXII.
BURC. DAV. MAUCHART

DE
LUE VACCARUM TUBINGENSI

DISPUTATIO PRIOR.

Tubing. 1745.

§. I.

Sapientioribus crucem hucusque fixit non tam quaestio an, sed potius quomodo licent Medici curam brutorum agere medicam? Talpa sane caeciores oportet esse, qui non clare perspiciat itrages integrorum armentorum, unde tot incommoda, quin & pericula vitae redundant in universum genus humanum, ad eos quoque cives spectare, imo ceu specialius obiectum artis restringi, quibus alias vitae ac sanitatis curam demandavit Respublica.

Quid, quod infinita etiam medicinae commoda, a primis inde huius incunabulis, attulerunt observationes & morborum in variis brutorum speciebus, & remediorum tam noxiorum, quam utilium, & experimentorum anatomicorum, physiologicorum, therapeuticorum et pharmaciae atque chirurgiae ministratorum? Haec enim impune & legitime per mortes experimenta facere licet, intra suos tamen limites!

Sed quomodo Medicus, quibus mediis atque remediis, mediate an immediate, in morbis externis & internis brutorum, consilia suppeditare, remedia applicare, manus admove, operationes administrare chirurgicas, vel citra ignominiam possit, vel sine opprobrio non debeat? id quidem in utramque partem satis disputatum est a plurimis. De auxilio mediato, de consiliis largiendis in confesso res est, vel ex supra allatis. De opera immediate praestanda, nobis videtur, justum debere pecoris misereri hac etiam occasione, neque necessitatem hic quoque legem habere.

Nnnnn 3

§. II.

§. II.

Nemo itaque vitio nobis vertat, quod veterinariæ artis objectum a potiori, pro themate præsentis dissertatiunculæ admittamus, atque calamitatem publicam, quæ civitas nostra gravissime cepit quatuor abhinc mensibus prælii, curæ cordique habeamus. *Lues* autem hujus *vaccarum* primo *historiam* dabimus per phænomena antecedentia. Consequentia atque consequentia. Deinde *pathologiam* atque *therapiam* subnectemus, divisuri hanc opellam in duas Disputationes, quarum posterior primam hancce brevi excipiet, ut scil. Dominorum Candidatorum sumptibus parcamus.

PHÆNOMENA ANTECEDANEA.

§. III.

E rebus, quas Medici vocant, naturalibus, non naturalibus atque præternaturalibus. *Ætas* hujus speciei brutorum promiscue omnis perinde se habuit ad luis susceptionem. Vituli quorum quidem pauci tum in urbe fuerunt, pariter illi, qui hac marium ægrarum adhuc fugebant, ac qui jam erant ablactati, lue sunt correpti. *Sexus* femininus, *vaccarum* scil. a potiori subfuit, imo subesse debuit lue, quod paucissimos nostra civitas alit boves castratos, eosque saginationi potius & macello destinatos, quam labori: in vicinis tamen nostris pagis non solum ipsissima hæc lues perinde grassata est in boves mares, ac feminas, sed in ipsa etiam urbe nostra *tres admissarios* corripuit *tauros*, horum quidem duos, singulari stabulo a vaccis remotos, nullumque cum his, nisi subinde ad imprægnandum adductis, commercium habentes, tertium vero cum grege vaccarum Nicarino, in monte nostro anatolico dies noctesque pascentem & conversatum.

§. IV.

Nuper elapsis hyeme ac vere, antequam cepisset lues, vaccarum multæ, tauro semel iterumque admissæ, judicabantur, e signis constrictis, imprægnatæ, diuque *pro gravidis habebantur*, quales tamen non fuisse docuit eventus. At non paucæ, revera gravidæ, abortiverunt, *sic haben vertragen*, tam in principio graviditatis, quam in progressu, imo paucis ante legitimam pariendi tempus hebdomadibus. *Vaccas* quasdam cæstro percitas venereo, *taurique appetentes*, sed non admissas reputarunt aliqui sub initium conceptæ jam veræ luis alio laborare morbo, vel saltem ob illam causam lue citius graviusque adfectas fuisse. Perinde vero se res habuit cum vaccis, brevi ante luis susceptionem tauro junctis, quæ pari lue, parique gradu & eventu funesto fuerunt exceptæ. Status *graviditatis*,

tū, puerperii, lactationis nullam ab invasione præstiterunt vaccis immunitatem, quin imo sive partus præmatura, sive legitima periodo acciderit, ipsæ tales vaccæ puerperæ, lue correptæ, gravius decubuerunt, & maximam partem succubuerunt.

§. V.

Avis atque tempestas antecedentium hæc fuit conditio : Præterito anno versus autumnum terribili exundatione Nicer atque Steinlachia, ille radices nostrorum murorum versus australem plagam alluens, hæc, rivulus alias mediocris, ab austro versus borealem plagam urbi appropinquans atque in Nicrum, prope urbem, derivatus, totam vallem, quæqua patet, amplissimam repleverunt, ac post tardiores diffuxum ac subidentiam, hic ibi paludes stagnantesque reliquerunt aquas, atque sic ipsa pascua, in quæ grex vaccarum Nicarinus quotidie solet educi, limoso turbidoque suo diluvio, sabulo, silicibusque descædaverunt.

Hiems nobis obtigit satis & gelida & longa. *Aprili* hoc anno motum servavit suum, tempestate mox pluviola, mox gelida ac nivosa, mox serena temperiore varium. *Circa finem Aprilis* autem lues prius aggreßa est vaccæ civis cujusdam Tubingensis, in foro habitantis.

Mensibus tribus vernalibus subinde spissiores atque fatentes nebule, ad nonam usque, decimanque, aliquando longius mane durantes, vespereque subinde repetentes cito, non modo Tubingensem nostram obtenebrarunt atmosphæram, sed longe etiam lateque se diffuderunt. Sub finem vero Maji ros quidam animatus copiosis quasi telis araneorum inquinavit sepes, agros, arbores atque pascua, unde insecta araneorum suboles propullulavit & frondescentes atque florentes ceraforum, pomorum, pyrorum prunorumque arbores corripit, omnemque horum fructuum messem in universo Tubingensi agro pessundedit. A Scarabæis majalibus quidem, frigore pluviaque præclusis, frondes parum sunt passæ, sed numerosa cochlearum turba, nec paucæ hic ibi cruce tanto minus illis percere.

§. VI.

Peni suppellex vertente vere curta coepit esse, ob equitatum in vicinia nostra hiemantium militum; Tantum vero non deficit, ut eo penitus nostræ privatæ fuerint vaccæ. *Pascua* publica videbantur per nivem, pluvias folisque radices abunde repurgata ab omni, si quod autem contraxerint, inquinamento: alias etiam ratione situs, primi quidem in valle Nicarina, alterius in Anamerana, tertii in monte versus boream, quin & respe-

respectu plantarum, quas alunt, sic comparata, ut nulla hinc luis causa sit derivanda.

Quamvis enim passim in illis vallibus haud infrequens sit *ranunculus acris*, a rubefaciente ac vesicante vi sic dictus, ipsaque venenata *cicuta* illa *aquatica* ad ripam Nicri, qui passim alloit pascua, crebro proveniat satis; tamen observantur vaccæ ab utraque sibi ordinariæ temperate hac planta, ita certe a cicuta propter virosam odoris gravitatem, a ranunculo autem per experientiam, adustæ olim hinc linguæ, cautius abstinere.

Quæ *prophylactica* solent alias toto anni decursu subinde pecudibus exhiberi remedia, ea taptum abest ut ante luis ingressum neglecta fuerint, ut potius & diligentius, & determinate magis contra metuendam luem a plerisque sint adhibita; immo sæviente janijam intra moenia nostra lue ad varia præservativa ruerunt cives nostri, apta æque ac inepta, eo cum eventu, ut nullum sit certius atque præstantius inventum *separatione* ocyssima sanarum ab omni reliquarum consortio, & detentione vel in remotis longe stabulis, vel in hortis extra urbem.

§. VII.

Inter ipsas hæc pecudes non minus ac alias brutorum species de nullo plane quidquam audiri us *precedente* luem morbo *epidemico*, & ne quidem alia dispositione morifica. Inter homines vero quæ grassatæ sunt per integrum fere annum *variola epidemica* in nostra urbe, satis malignæ & passim funestæ, ipso vere nupero, quo lues vaccarum incepit, deserbuerunt, & omnino desierunt. Exceperunt variolas Majo Junioque *tusser sicca*, *rheumatico-catarrales*, quæ in amœnissimam incuntes ætatis protrahantur tempestatem, atque sine remediis utplurimum, patientia, sunt superatæ.

§. VIII.

Tubingensem nostram vaccarum luem præcessit similissima lues non modo in longe diffitis atque vicinis regionibus, *Italia*, *Hollandia*, hic ibi in *Germania*, sed jam a triennio fere passim in ipso *Ducatu Wirtembergico*, remotius primum a nobis, dein & propius in Præfectura *Bochlingensi*, & *Herrenbergensi*, quarum & urbes & plurimos pagos maxima boom strage multavit. Præterita hieme inprimis acutissime & epidemice grassata est *Wilhelmii* in sylva *Fagina*, in urbe Imperiali *Reutlinga* &, viciniore nobis adhuc, pago *Kirchheim*, vulgo *Kirchentellinsfurth*. Aliquibus horum pagorum prima tristis morbi flamina manifeste, extra dubium, omnibusque consentibus illata sunt per boves *extraneos*, quos *Austriaci*

striaci alique milites vel recta via ex Hungaria, vel ex hyemalibus e Bavaria traduxerunt, aut hic ibi nostratibus venditos distribuerunt. Hoc modo irrepfit lues e. g. in pagum *Rutheshemium*, Præfecturæ Boëblingensis, empto e castris, in vicinia positis, militum Austriacorum *bove Dalmatico*, jam male habente: is enim in pagum, stabulumque deductus brevi manifestiora luis indicia præbuit, omnesque boves vaccasque constabulantes infecti, mox vicina alia stabula, denique universum pagum. Vicini nostri cives Kirchenfes persuasissimi pariter sunt, luem stragemque suorum boum, uti statim a facta cohortis Gallicæ ibi, per nycthemerum, statione orsam, ita *contagio* ex illis bobus infectis esse adscribendam.

Equidem non constat liquido, tale quid vel in urbe nostra, vel in pascuis nostris Nicarinis accidisse: illi tamen ipsi milites Galli, vicino Rothemburgo profecti, & Kirchhemium iter facientes, una cum bobus, quos secum habebant, non potuerunt non in via hac pascua attingere nostra, imo tot alii e superiore Suevia descendente iter profecti sunt, ad muros & portas tamen magis, quam per mœnia & plateas urbis.

§. IX.

Igitur hinc quoque satis fundata nascitur *suspicio contagii*. Nolumus perstringere vel possibiles alios, vel in actum deductos hic ibi varios inficiendi modos. Haud abs re accusarunt alii pascuorum inquinamenta a transeuntibus bobus infectis, alii fontes publicos, e quibus biberant, alii corrupta præsepia, alii sputo morbido contaminatum scænum, alii coriorum, pellium, quæ infectis detraxerunt, vel & ipsius carnis noxiam transmissionem usumque, alii ipsos homines, cum infectis prius conversantes vaccis & dehinc ad sanas accedentes.

PHENOMENA CONSTITUENTIA ET CONCOMITANTIA.

§. X.

Prosequemur hæc eo, quo se manifestarunt, ordine *per ipsa morbi tempora, principium, nempe, augmentum, statum & declinationem*. Distincta vero hæc morbi tempora nunc longiora erant, duorum triumve dierum, nunc breviora, sicut acuti morbi, subinde etiam peracuti fervoris indolem, respectu gravitatis atque durationis. *Luis initium* se prodidit, ordinarie *appetitus imminutione*, seligebant quasi e projecto pabulo gratiorem partem, & hinc inde decerpebant buccellam (*sic bällchen nør.*) gramenque recens præferebant: *auricula* erant *pendule*: *lactis minorem* atque minorem reddebant *quantitatem*: (*sic brechen ab in der Milch*) *cornua, nares*, *uberumque papillæ* plurimis continuo, alius per intervalla

Disput. Medicæ Pract. Tom. VII.

O o o o o

siq.

frigebant, aliquibus etiam *lingua*. Per intervalla, eaque vel statim, pomeridiano tempore, vel quotidie, vel etiam alternis diebus, vel vago tempore *frigus* non tantum, sed & manifestus *horror* atque *pedum* posteriorum *tremor febrilis* ingruiebant, unde ut plurimum *color cum sudore* per totum corpus subsequiebantur, maxime si in stabulo bene clauso pannis linteisve obiectæ fuerant vaccæ. Nihil ad genium veri paroxysmi febrilis defuit præter sitim, vel actualement assumptionem *potus*, quem toto morbi decursu non modo minus avidè appetierunt, sed invicte potius cum renisù admittebant, frigidum tamen libentius, quam tepidum hauriebant.

Deglutitio videbatur ipsis esse molesta & dolorifica, unde violentè infusus medicamentis & solidis & fluidis, imò simplicibus pro potu aquæ operosius relictæ sunt plures vaccæ. *Ruminatio* quoque a principio ad finem usque morbi *abolita* fuit omnibus, quotquot novimus, quod vulgus exprimebat: *Sie dürfen nicht*, rectius *sie widerkäuen nicht*.

Lingua aliis in principio statim, aliis in *aux* huius *mucosa* fuit *crassiorque*, aliis *secca*, *aspera*, ad radicem leviter *rubens*. Ex ore naribusque altero tertiove post invasionem die frequentes & continuæ quasi *striae mucosæ* propendebant exstillabantque, nisi quas ipsæ lambendo abliguriverant ægræ.

Murmuribus atque *borborygmis* totum *abdomen*, quasi graviore tonitru, resonabat frequenter, maxime cum immineret alvi excretio. Circa hanc vero & respirationem hæc fuit varietas, quod alix statim *diarrhoeam*, alix post aliquot demum dies expertæ, paucissimæ sine diarrhoea fuerint, pleræque etiam, non tamen omnes, mox sub invasione huius *crebrius ac anhelose respiraverint*.

§. XI.

Sub incremento & statu morbi non modo perdurabant, sed ingravescebant quoque priora symptomata. *Appetitus* pabuli plane *collabebatur* in plerisque, in aliis modicus supererat. *Lactis proventus* quotidie *magis* & notabiliter *imminuebatur*, ita ut cum aliqua præbuisset quotidie lactis triginta duas libras medicas, s. mensuras octo Wirtenbergicas, jam vix sextam vel octavam suppeditet partem: *Ubera* vero & *papillæ* præter frequens, aut continuum frigus, nihil exhibebant præter naturam. Molem uberum, & lactis imminuta magis magisque generatione *gracilescunt*, indies *decrefcere* magis & *flacescere*, mirum non est. *Lac*, quod semel aut bis quotidie poterat emulgeri, *naturalem* frequentissime *servavit colorem* atque fluiditatem, in nonnullis vero *flavedine tinctum* erat, in grumos tamen non coaluit, sed post solennem temporis moram, aliqui

quali fuit *obductum cremore*. *Diarrhœa*, seu *dysenteria* potius, quæ sub huius ingruerat principio, quantitate & continua & discreta *angebatur*, *feces alvi* liquidæ, copiosæ, fulcæ ac graveolentes, nonnullis etiam striis notatæ sanguineis, aut mucoso cruentæ fuerant, magnaque ut plurimum vi, quasi per siphonem, elisæ in distans.

Prægressa sunt ut plurimum has alvi dejectiones non modo ventris murmura (§. 10.) sed & *nifus egestorii*, atque *contorfiones* abdominis quasi *terminose*: quin, & *striaturæ* ani cum moliminibus excernendi *tenesmoideæ* insequiebantur feces jamjam redditas. *Paucissima a diarrhœa*, vel *dysenteria* plene immunes & *liberæ* fuerunt: Et e tot ægris non nisi unica fuit, cui ob alvi constipationem, sed a theriacalibus procul dubio inductam, loco suppositorii manum cubitumque suum ano intrusit veterinarius. Tussi increbescente ac ingravescente *expectoratio* tamen nulla successit alia, quam quæ per mucum naribus ac ore partim jugiter exsililantem, partim uno impetu & integris frustis rejectum, obigit.

Caput plurimis *demissum nutansque*, non paucis oculi *lippi*, *rubescences*, in profundum *retracti*, aliquibus cum *ophthalmia* sanguineo-pituitosa *nubecule corneæ* obducentes spectabantur. Cæterum *aliæ pedibus insidebant*, *aliæ jacebant* magis, ægriusque surgebant. *Bubonum*, vel *anthracum* nihil quidquam in toto morbi decursu apparuit.

§. XII.

Denique in *summo morbi fastigio respiratio* fuit continuo anhelosa, suspiciosa: *feces alvinæ*, ano jam depluentes magis quam elisæ, *fatorem spirabant cadaverosum*, & consilientiam quasi *purulentam*, vel *mucoso-ichoroso-purulentam* habuere: *Frigus corporis universale & perpetuum* fiebat: *Nullum plave alimentum* vel appetebant, vel assumebant.

PHÆNOMENA CONSEQUENTIA.

§. XIII.

Atque sic *communiter septimo, vel nono die moriebantur*, *aliæ placide ac tranquille*, *aliæ sub membrorum jectigatione motibusque convulsivis & incondito mugitu*. Aliquæ *citius*, intra duo scil. nycthemera, periire: sed & *aliæ tardim* die decimo tertio, aut septimo, per adhibita medicamenta, ut videtur, protracta longius vita. *Juvenæ citim* ordinarie, sed & *fineste*, absolverunt morbi stadium. *Vitulos* etiam aliquot præmaturo & subito ablectatos, propter luem matrum, languore novimus perisse exhaustos. *Diarrhœa*, quæ in *statu morbi demum supervenit* pejor atque

exitiosior fuit illa, quæ statim in principio invasit. Fecer alvi cum impetu reddita minus periculi portendebant, quam *deficientes* saltem & spumosa. Quæ semel stabulum subingressa lues est, *successive* vel *omnes*, vel certe *plerasque occupavit sodales*, etiam si ab ægrotante statim semotas; Sed irrepsit illis etiam stabulis, quibus nulla vicina adiacebant insecta, & quæ insuper debite purgata variis imbuebantur fumis medicatis, neque ex his statim a luis in urbem ingressu pedem unquam extulerunt vaccæ. Qualiter se habuerint luis initium, incrementum, declinatio, & finis, e sequenti constabit tabella, quæ e relationibus a Magistratu Oppidano communicatis, concinnavimus:

An. 1745. a 22. Aprilis ad d. 23. Maji. ad d. 11. Jun. ad 1. 7br.

Sponte mortuæ, & ex- coriati traditæ, ac in- tegræ sepultæ.	Nr. 18.	7.	A summa super- stitum sanarum
Lue affectæ, sed per la- nionem maculatæ, & se- pultæ, detractis coriis.	45.	65.	defecerunt ite- rum, & quidem
Sanæ maculatæ per lanio- nem in usus dome- sticos.	36.	184.	maximam par- tem sanæ macula- tæ, paucæ mor- tuæ, in summa
Actu lue ægrotantes.	23.	16.	168.
Sanæ superstites.	611.	362.	171.
In universum, toto luis decurfu.	Sponte mor- tuæ. 48.	Ægræ occisæ. 121.	Sanæ maculatæ. 393.

Tres, quos civitas nostra aluit vaccarum greges in summa confecerunt; ante luis ingressum, 733. vaccas, & juvenas sive ut loquuntur, *Rindvieh*. In scala præcedenti sub titulo d. 11. Junii superstitum sanarum, non prodiret nisi 339. vaccarum summa, si vero addantur in anteriore scala d. d. 23. Maji numeratæ tum 23. ægræ, tunc summa d. 11. Jun. adhuc superstitum sanarum 362. exurgit, ut computatio Mag-
gistratus

gistratus habet. Unde ergo demonstratur a) intra terminum a 23. Miji ad 11. Jun. non mortuas fuisse illas 23. vaccas quæ prius ægrotabant, & curæ methodicæ tum subiciebantur, imo potius convaluisse, quoniam morbus rarissime ad decimum septimum diem, vel ultra perduravit: b) E Summa gregum universa nunc deficere 562. vaccas: c) Revera paucas e lue mortuas, sed d) festinanter nimis, plures, np. 121. lue affectas fuisse occisas, quarum procul dubio magna pars salvari potuisset: e) Multo autem plures incertum e lue satum præoccupale, sanas adhuc mactatas.

§. XIV.

Ex illis, quæ a morbo convaluerunt, nulla fuit, quantum per veterinarios, famularum relationes & proprias rescire potuimus observationes, quæ *sive medicamentis fuerit restituta.* Salutis vero *spem*, atque sic declinationis morbi, rarissime fallacem, fecere, appetitus rediens, auctior, lactis generatio indies copiosior, calor æqualis atque naturalis per totum corpus, transpiratio auctior, & scabiei, in plurimis crustosæ, critica excretio in ubere, dorso, fronte colloque, quæ dehinc sanis aliquamdiu perstitit & denique pedetentim exaruit iterum & evanuit, *cutem* tamen hic ibi *depilem*, & *candam* inprimis *denudatam pilis*, scedo adspectu, diu reliquit. Beneficio talis amplioris in fronte *crustosæ pustula*, subinde manantis & recidivantis per plures septimanas vaccam suam a lue penitus intactam & servatam fuisse, non infulse judicavit civis quidam Tubingensis in platea Nicarnia, quæ vocatur, habitans, cum vicinorum stabula fere omnia exhaustisset dira lues. *Tussis* in convalescentibus magis magisque pariter ac reliqua symptomata, *remisit*, atque *tandem perfecta* affulsit sanitas.

Tamen post declinationem morbi, in *statu reconvalescentiæ*, nonnullæ *vaccæ* diu persisterunt *sceletiformes*, collapsæ *debiles*, ut sub incessu incertæ vacillarent. Imo e reconvalescentibus *quatuor recidivam passas* novimus, sed mitiorem prima invasione ac breviorē, nec, nisi unam ex his recidivam passis, occubuisse; & ne spontanea quidem morte, sed in cura male tractatam & securi percussam occisamque. *Causam recidivæ* in liberaliorem passum, cum de nulla alia in his exemplis consisteret causa, retulerunt veterinarii rectissime.

Quod *recidivam universalem integræ* ac epidemicæ hujus *luis* attinet, quæ alibi, jam per septimanas, menses annumque extincta, revixit atque recrudit, de hac nondum hinc Tubingæ habemus, per Dei gratiam, quod referamus. Confidimus potius fore, ut adspirante supremi sospita-

O o o o o 3

toris

toris gratia, & urbis antistitum vigilantia, non modo omne, quod hic ibi adhuc delitescere posset, luis seminum solícite expurgeretur, sed novo etiam, al unde invehendo, præcludatur accessus. Alienis vero in ipsa Patria exemplis didicimus, luem hanc incautis iterum iterumque obrepssile,

§. XV.

Substitit, hætenus minimum, *lues* hæc vaccarum intra *manu* hanc brutorum *speciem*, salvo manente caprino, equino, suillo, vervecino volucrumque domesticarum genere. Paucissima sane præstiterunt apud nos exempla, imo hic Tubingæ nonnisi unicum, communicatæ per *contagium* luis a vacca in consilubantem capram, quæ post mortem violentam secta exhibuerit cyssidem scellam turgentem amplamque. Reutlingæ nuper idem accidisse meminit Respondens. Quod de Gallinis in una domo brevi hic mortuis, & quibus in sectione fuerint inventæ cyssides scellæ turgidiores multatæ aut aliqui, vagus rumor, fide non satis dignus habetur. Weilæ in sylva Fagina, cum præteri a hieme lues vaccarum ibi leviret, vir quidam occisæ suæ vaccæ, lue correptæ, *intestina* projecit *subtus* conedenda, quæ vero hinc pariter lue fuerint affectæ & mortuæ. Sub medio luis cursu percepimus ab hominibus fide dignis, *mortuus* fuisse inventas *feras* in vicinis lue vaccariæ sylvis, apros aliquot, imo de cervino genere nonnullos. *Inter homines* toto fere hujus pecorariæ luis tempore *sternerit morbi*, nec epidemice. nec endemie grassati quicunque sunt, hic ibi sporadice saltem variis affectibus unus alterve decubuit. Variis *hominibus*, qui in alendis & curandis *agrotantibus vaccis*, lue demortuis, transvehendis, secandis, excoriandis, sepeliendis *occupati* fuerant & spissas pessime olentium effluviarum nebulas inspiraverant, *omnes* ac singuli *sani manserunt* salviqve. Unus e veterinariis cum vaccæ consilipatæ alvum intrusa manu aperuisset, *effluviis teterrimis* aggratus, bis ea vespera in *hospitium* incidit, hausto autem alexiterio perfecte statim convaluit.

Carnibus infectarum, tempestive quidem macellatarum boum *vesci* plures solidiverunt, non pauci tamen ab earum esu se abittereri non sunt passi, sed sale maximam partem fumoque conditarum, incolæ sæpius allegati pagi, Weilæ, avidius adhuc infectæ, vel infectarum certe vaccarum, carni inhiaverunt. *Hactenus* utrinque, quantum constat, *sine damno*.

§. XVI.

Juventus, si querulam morosamque audias plebem, pauca, quin nulla fuerunt: utpote cum variis & sæpe contrariis summeque noxiis uteren-

uterentur remediis, vel optimis negligenter inhærent, nulla, vel optimâ, methodus medendi votis ex æsse potuit satisfacere. Sed neque negamus aliquot vaccae, quæ cura a Facultate Medica præscriptæ subiciebantur, nihilominus periisse. Verum in nonnullis harum, per sectionem a morte constitit, labem quandam viscerum grandinosam & phthisicam satum e lue accelerasse: in aliis oscitanter a veterinariis adhibita fuisse medicamenta, imo alienis & noxiis interpolata: plurimis etiam valde nocuisse potum aquæ frigidum, a quo tamen vel vaccae, febri æstuentes, sibi facilius temperare, quam ab ejus exhibitione retineri poterant & veterinarii & vulgus. Ecquis vero vel tandem petendo tam impudens, vel sperando tam credulus fuerit, qui in gravi lue brutorum hominumve epidemica, omnium atque singulorum salutem, data quantacunque opera, præstendat reportandum promissue?

Juvisse vero methodum medendi a Facultate Medica heic inculcatam, & tabella. §. 13. docet, & ex ephemeridibus, per quatuordecim dies studiose conscribens hinc evincet Præses, quod e 24 ægris tum vaccis, medicæ curæ subjectis, 16. fuerint in integrum restitutæ, quatuor, quæ morti videbantur propinquæ, per laniationem mactatæ, ac nonnisi quatuor e morbo sponte perierint. Post examen & tractationem hujus luis per tres septimanas, advocatus in aulam Præses hujus disputationis, nec pluribus infundere observationibus, nec continuandæ laudabili methodo invigilare porro valuit.

§. XVII.

Juvantium, an nocentium potius titulum mereantur, quæ vulgus in usum duxit varia, absurda, invicem pugnantia, ac contraria remedia, facile est judicium? Purgantium profecto, oleosorum assatum infusorum, nitrosorum largissime exhibitorum, elixirium pulverumque sic dictorum antipeffilentialium, theriacalium, actu & potentia frigidorum, spirituum acidorum, aceti alexipharmaci, & nescio quorum hinc inde jactatorum specificorum virtutes dicam, an noxas? finistrum certe eventum a posteriori Tubingenses nostri sunt experti. Quamvis enim & hic fuerint bona mixta malis, & illa tamen tempore data non apto nocuere potius, quam profuere. Inter præsidia chirurgica conduxit pluribus instituta in principio morbi, aliquando etiam in *ausp. venesectione*, libræ unius vel sesquialibræ pondere: aliis *setaceum* in collo, præsertim e trajecta radice hellebori nigri recensens fibra.

§. XVIII.

Prophylacticorum remedium idem fere cum curativis erat satum. *Venesectione* præservatiua, statim sub accessu luis in urbem nostram plurimis

mis administrata vaccis, eisque mox a reliquarum commercio separatis non plus ad precavendum, vel tutius subeundam lucum profuit, quam irrita ut plurimum omnis reliqua prophylaxis. Cives aliquot tam hic, quam alibi nullum plane preservationum adhibuerunt, nullamque aliam cautionem, nisi quod vaccas in stabulo, bene semper mundato, jugiter detinuerint, easque servarunt incolunes. Perplacuit Præsidi pietas fidesque alicujus civis *Consladensis*, qui sub dira similis ibi luis grassatione, se unice precibus ad Deum quotidianis, certoque confisum spe sua hæcenus non excidisse hilaris deprecabatur. Id vero non minus præcepto & exemplo publico, recitatis nempe e *suggestu* precibus ad deprecandum Deo grave hoc flagellum, pie confirmatum est.

Quæ alias in peste laudatur *Panacea*, cito fugiendi & tardissime redeundi, felici se heic etiam commendavit applicatione bliis exemplis: alter ex incolis nostris mox ad primum luis ruinorem vaccas suas in arcem nostram, editiore loco sitam ablegavit, alter in hortum suum, in valle *Ammerona*, vix trecentos ab urbe passus distantiam amandavit, & uterque, in hunc diem ibi servatas, a lue omniique morbo salvas præstitit.

§. XIX.

Supereſt e phænomenis, ut succinctam faciamus mentionem, quæ in *seſſu* post mortem tam lue defunctis, quam in hujus morbi principio & statu mactatis inventa sunt præter naturam. Duabus ejusmodi sectionibus tota *Facultas Medica*, docentes & discentes, interfuerunt, tertiæ solus Præses, reliquis sex *Dn. Med. Lic. Brecht*: atque sic non modo rerum harum minus satagens excoriator instructus est jussusque omnia manibus atque cultro debite proſequi & in apricum producere, sed cuncta etiam, quæ p. n. occurrebant, phænomena folicite sunt annotata. Tres insuper aliæ sectiones partim præsentibus Medico atque Chirurgo, partim publicis, quos vocant carniæ & macelli Inspectoribus sunt administratæ. Omnes illæ vaccæ, paucis a morte horis sectioni & examini subjectæ, easque nihil ſingulare, præter aut rubentis procidentiam in aliis, & mucus e naribus penulimum in plurimis exhibuerunt, nullam vero ut plurimum, quod mirabamur, notabilem abdominis inflationem aut turgescentiam.

Incisa cutis carnesque subjectæ musculosæ colorem & consistentiâ naturalem ut plurimum servarunt. In aliquibus autem, primo etiam biduo vel triduo morbi mactatis carnes observatæ p. n. rubentes ac livescentes, & in quadam, decimo ab invasione die mortua, *ſalsa* colorum flavi, lividi ac nigrescentis mixtura inquinata.

Rubedo

Rubedo pupurea livorque, plus minus diffusæ ac profundæ, in eis maxime quæ sponte sunt mortuæ, tertio ac reliquis ab invasione diebus, aliquando circa finem primi statim bidui, conspiciebantur in *intestinis*, mox tenuibus & communiter magis, mox in crassis, mox utrisque simul, extus quidem magis, quam intus, s. in cavo canalis intestinalium: in foliolis, s. stratis *omasi*, quibus interjectum pabulum exsuccum, aridum illisque foliolis adglutinatum pallim tenacissime, aliquando friabile fuit, quo, mediante cultro, abrado, *stigmata rubro-livescientia* & *stasis* in reii quodam vasculoso sanguinis dilucide comparebant. *Omnibus hæc omasi inflammatio ac exsiccatio communis* fuit, gradu dumtaxat in aliis differens. In reliquis ventriculi raro occurrebant inflammationis vestigia, uti & omento, mesenterio ac peritoneo.

Hepatû pars convexa frequenti, sed superficiali magis, inflammatione *rubebat*. Aliquando *renes* etiam & *omentum* stigmatibus notabantur inflammatoriis: *Lien*, *vesica urinaria* & *partes internæ*, generationi inservientes, rarius.

Pulmones semper (paucissimis exceptis) *plus minus inflammati*, in aliis, quæ luem plures sustinuerant dies, *lividi, fusci* imo *nigricantes*, atque sic gangrenosi ac sphacelati fuerant. Aliquando etiam *œsophagus*, *pericardium* & *diaphragma* in superficiebus, nec non *fauces* & *lingue radix* *rubebant p. n.* & e stasi sanguinis inflammatoria. In quodam, decimo morbi die mortua quemadmodum passim in corpore inflammationis gangrenosæ plurima comparebant vestigia, sic etiam *cor miris coloribus*, rubro, viridi ac cœrulescente *defecatum*, & *trachea* grumo sanguineo, picei coloris, *infarcta* decem fere pollicum longitudine fuerunt.

Atque hæc fuerunt inflammationis internæ documenta!

§. XX.

Vesicula fellea in aliis naturalem servavit diametrum atque plenitudinem, in aliis *flaccida* fuit & magna parte inanis. Vidimus etiam aliquando satis repletam turgidamque, aut ultra dimidium capacitatis suæ repletam aëre, manu cultroque nondum affectam, illasamque. In aliis fuit mirum quantum distenta, *turgida*, amplissima b leque resertissima, unde morbo huic nomen imposuerunt: *Die Ubergalle*. *Bili*, quam continebat, varia pariter fuit conditio: scil. in aliis, & frequentius quidem, *nimis fluida*, aquosa, dilutioris flavedinis: In aliis *viscida*, tenax & ductilis: *numquam fœtens*, nec aquæ, fontanæ instillata, coagulum, grumescientiam, aut aliam, quales alii prætendunt alibi in tali lue observasse, mutationem passa.

Disput. Medico-Pract. Tom. VII.

P p p p p

Exami-

Examinavit Præses bilem cysticam, quam e duabus lue, ante duodecim horas defunctis vaccis domum suam apportari curavit, eamque capillaribus tubulis exceptam optimo quodam microscopio exploravit, nihil vero animati, nihil quod motu organicave structura vel umbram animalculi referret, observare potuit. Utriusque vaccæ biis hæc cystica cum spir. vitriol. instillato efferebuit, & in fusco-nigrum coaluit magma, altera plus, altera minus, ab ol. tart.: per deliq. altera nullam patia est mutationem, altera clariorem induit flavedinem. Ipsæ cystides felice duarum vaccarum exinaniæ ac examinata nulla præbuere signa vel inflammationis, vel putredinis.

§. XXI.

Magnus ille, f. primus ventriculus ut plurimum pabulo semidigesto diluore repletus erat & distensus. Omasum, f. tertius ventriculus, aliquando durum & vehementer infarctum tangebatur extus. Intestina paucis ut plurimum fecibus, fluidioribus, naturalibus, aliquando flavescente fusco liquamine, flatibus modice referta. Tenuia intestina in aliquibus plane vacua & collapsa, in aliis etiam crassa inania sunt inventa. Vesica urinaria ut plurimum vacua, subinde continuit urinam flavo-turbidam, qualis jumentorum est. Lixiviosam, aut rutilam nos quidem non deprehendimus, sed talem bis observarunt alii, in ipso vesicæ cavo inspectam.

Hepar aliquot vaccis, e duodenario sectioni subjectarum numero, pallidum ac aliena & chronica labe fuit infectum, tumoribus nempe scirrhis atque grandinosis, vomicisque diversæ magnitudinis, alias etiam hydatidibus. Vomicæ incisæ eructarunt liquamen purulentum viscidum. In cujusdam vaccæ sanguineis vasibus majoribus intra hepar incisæ propululabant copiosa infecta plana, crucigeri latitudine, pallidi coloris, quæ motu vermiculari se contrahentes locoque moventes vitam testabantur animale. An de hirudinum sic dictarum, der Aegnen, ut vocabant adstantes laniones, & in hepate vaccarum subinde nidulantium genere fuerint, an alio non audet determinare Præses? quoniam ipse non vidit nec examinare potuit hæc animalcula.

§. XXII.

Cor, pericardio separato, in consistencia sua & duritie musculoſa rore mixtum erat, & in thalamis suis modo vacuum, modo sanguine, coque vel fluido, vel grumoso, utroque paucis, repletum: remissimè flaccidum penitus & molle fuit, (quod veterinariis vocatur die Herzweiche) ac sanguinem spumofum exigua quantitate continuit. In mactatione vivarum adhuc, sed graviter lue jam laborantium observatus est sanguis jugulo

jugulo emissus fervidus, brevique consistens & concreescens: In sponte mortuis e lue vero sanguis intra vasa majora, respectu consistentiæ ac coloris nullam ostendit notabilem mutationem: in minoribus rariis, passim turgidioribus manifestam congestionem, stagnationem atque stasim.

Sebum circa renes in plurimis paucum præsto fuit, alibi etiam tunica adiposa aëre flatuque magis quam pinguedine turgelat, passimque rubedine notabatur ac livore. In medullam quoque ossium cavorum aliquando inquisitum illaque bonæ notæ deprehensa est. In gravida fetus, pilis nondum instructus, sine labe aut corruptione externa comparuit in sede sua naturali jacens.

§. XXIII.

Multa e vaccis, vel mox in principio, vel in statu morbi, violenter occisas servari potuisse non testatur modo analogia tantundem periclitantium, imo gravius afflictarum, subsecuta e medicamentis plenaria restitutio & factum apud nos semel, vel bis, tentamen emptæ ab alio cive aurei, quem ducatum vocant, pretio, quæ, pro desperata habita, feliciter medicamentorum ope est eluctata; sed confirmat etiam sectio instituta in variis, quæ, cum uno alterove die ægrotassent, occisæ sunt, atque viscera primaria, cor, pulmones, quatuor ventriculos & hepar illibata & nonnisi levem intestinorum tenuium ac superficiei exhibuerunt inflammationem. E tauris admissariis unus, cum appetitu deficere ac torpere cœpisset, mactatus plane nullum præbuit indicium vitii in interioribus. Præses ipse interfuit mactationi alicujus vaccæ, quæ nonnisi languidiore appetitu, & lactis aliquantilla imminutione aliquam morbi suspicionem hero movebat, in qua pariter nullum luis atque actualis morbil vestigium in sectione comparuit, excepta hepatis quadam labe, quod pallidum, duriusculum & vomice aliquot oblongis, callosis, ac partim lymphæ glutinosa, partim sero purulento refertis obfessum erat; Sed diu sane prægressam, lente generatam atque satis frequenter in tot aliis, cetera sanissimis, observari solitam nemo hic pro imminente mortis causa vendiderit.

§. XXIV.

Denique ad phaenomena consequentia luis vaccarum adhuc referimus constitutionem morbosam & epidemicam inter homines, quæ remittente ad principium mensis Augusti, modo elapsi, ac jam ultra 3. septimanas penitus cessante pecoraria lue, in nostra urbe cœpit gliscere: Scil. experti sumus ab aliquot septimanis sporadice grassantes affectus rheumaticos, febres

bres intermittentes, imo & aliquot continuas *acutae purpuræque albæ* in fatalem, omnes tamen in paucâ quantitate. Intermiscuit vero quoque se *dysenteria rubra, epidemica, benigna*, tamen magis &, nec valde numerosis, nec facile funestis speciminibus.

In vicinis autem pagis, *Nehren & Walddorff, Etc.* luem boum dysentericam brevi insecuta est & comitata ipsa hominum *dysenteria rubra*, a potiori *maligna*, infantibus atque pueris maxime funesta. In vicina urbe *Reuttlunga*, quæ diu ibi sævivit lues vaccarum, jam vero vel tandem cessavit, jam a sesquimestri post se traxit *epidemica febre acutam, purpuram albam & gravissimam dysenteriam*.

Avertat DEUS ulteriora mala clementissime!

Atque hæc sufficiant de Historia luis vaccarum Tubingenfis! Proxime, Deo volente, supplebimus quod reliquum est de illius Pathologia atque Therapia.

C O R O L L A R I A.

1.

Bruta patefecerunt Medicis notitiam plurimorum non modo medicamentorum ac venenorum, sed & operationum chirurgicarum.

2.

Plurimi morbi in- & externi sunt homini communes cum brutis:

3.

Imo jucunda est contemplatio analogiæ, quæ Pathologiæ ac Therapiæ regni vegetabilis intercedit cum regno animali;

4.

Dolendum vero, quod veterinarii atque hortulani suas observationes in usus medicos convertere nesciant, & Medici plerique hoc objectum vel negligant, vel dedignentur.

5.

Morbus brutorum epidemicus & contagiosus plurimum in suis animalis specie manet, nec ad aliam facile transit:

6.

Subinde tamen ab una brutorum specie in aliam, vel alias se propagat, & ipsos vel invadit homines, vel alio gravi & epidemico proferunt morbo.

7. Unde

7.

Unde patet, an absolute vera sint? quæ contendit Helmentius: Pestis humana non attingit bruta, ut neque vice versa. Pestis boum non cit canum, aut falconum: & nulla harum est hominum.

8.

Miratur e speciosis rationibus Virgilinus, Georg. L. 3. bobus adeo frequentem & exitiosam, quam vocat, pestem. Sed ipse, qui putatur simplex, boum victus, gramen, scœnum, scœnum chordam & aqua s. fontana, s. fluvialis, s. paludosa: nec adeo simplex est, nec a varia exemptus iniquatione. Quam variz herbæ pabulo miscentur, & manifeste quædam noxiæ? Quam hoc aliquando immaturum, alias acidum, subjade putidum, limosum, male rore, pruina, &c. contaminatum? Aqua luto, varia amurca, putredine, infectis, imo & gelido frigore infecta?

9.

Hinc est, quod boves non raro & epidemice & sporadice agrosent: ipsam ingluviem, a pabulo etiam optimo, sed nimio, gravibus distensionis incommotis, immo, a ranunculo acri, aliæ caustica aut venenata planta comestis, crepaturæ periculo luant: Alias quoque colicam; diarrhoeam, dysenteriam, tenesimum, hepatis scirrhum, vomicas, exulcerationem, magnos lienes, omasi exsiccationem & inflammationem, pulmonis inflammationem, vomicas, tubercula cruda, hydatides, tussim siccam & humidam, hydropem pericardii, cordis flaccidam mollietiem & polypos, anginam, vertiginem, hydrocephalum internum, coryzam malignam &c. &c. incurrant satis frequenter; Gravidæ vero abortum, difficilem partum, secundinarum retentionem, uberum abscessus patiantur. &c.

10.

Bruta febriles paroxysmos, febremque reuera, eum iisdem phenomenonis, quibus homo invaditur patiuntur. Id quod beat. celeberr. *Stablinus* ex hypothesi sua magis, quam rei veritate negavit atque pernegavit in Theor. med. p. 936.

11.

Auctores qui de simili boum lue, data opera, scripserunt, ex iis quos novimus, hi maxime videntur evolvendi: *Rimazzini* de contagiosa epidemia, quæ Patavino in agro & tota fere Veneta ditione irrepit in
Ppppp 3 boves:

boves: Giornal. d'Ital. Tom X. *Luigi*, Lucernensis, *Beschreibung des Viehzeugs, so von An. 2711. bis 1714. in Italien und Teutschland gewüret*: *Joh. Kneid* von der *Pehtanz des Hornviehs von An. 1736. bis 1716.* *Frid. Hoffmanns Hylfame Vorsehtze in der grafenten Hornvieh-Seuchs*: *Rud. Jac. Camerarius de Lue Vaccar. Disputatio*, Tubingæ An. 1713. *Joh. N. G. Textor, Versuch wie die Viehseuchen wol erkandt, preservirt und curirt werden sollen*, An. 1739. Hoc anno, *idiomate Belgico impressa tractatio de ultima lue boum in Hollandia.*

12.

Optandum est, ut exploratis solícite hujus aliusve luis cunctis phenomenonis, una certa quædam methodus medendi in plurimis subjectis tentetur, diu, & frequenter: Hac autem votis non respondente, alia curandi ratio, sub eadem conditione, ineatur, ut tandem per inductionem logicam, & quam plurima, si non plane omnia constet exempla, quænam optima sit methodus?



AD TOMUM VI.

D E

MORBIS CORPORIS UNIVERSITATEM OBSIDENTIBUS.

CCLXXIII

FRANCISCI THIERI,

THESIS IN HÆC VERBA

AN IN CELLULOSO TEXTU

Frequentius morbi & morborum mutationes?

Parif. 1757. Dec.

§. I.

TUnica, vel tela cellularis, melius textum cellulofum maximam corporis partem efficiens, fic vocatum quod cellulis innumeris ad fe mutuo patentibus fit conflatum, multo majoris quam huc ufque vifum eft momenti; ut in fanitate multiplicem ufum præftat, fic in morbis maximas partes agit. Cellularum texti illius fabrica laminulis conflata fe invicem fejunctis, nervis, vafculis omnis generis interjeñtis, inter quæ funt infinito numero quæ humorem eructant lymphaticum varium, pinguem nempe, mucofum gummi vegetantium fimilem, ferofum variæ confiftentix, areolas incertæ figuræ & amplitudinis diftendentem, quæ tamen absconditæ interdum & quafi inanes, flatu vel maceratione magis conspicuæ funt: ipfæ vero laminulæ majores, minoresve cujuscumque latitudinis, quaquaverfum obverfæ quafi temere difponuntur. Solidas autem non cavas effe fuadent injectiones quibus impervix funt, dum cellulæ omnes injecto liquore turgent ac diltenduntur, five per majores arterias, five per venas injectiones fiant; unde etiam vafa ex-

halan-

halantur simul & absorbentia in cellulas aperiri edocemur. Laminulae porro illae ad fibrosam naturam referendae, fibrae sunt tenuissimae, brevissimae item, sed utrumque planae ac in latitudinem majorem minoremve expansae. Inde ab altero fibrarum genere distinguuntur, hae nempe multo longiores, nullius fere latitudinis sunt, ad quas musculares, tendinae, nervae referuntur. Quam late autem se diffundat cellulare textum facile intelliges ex quo videbis ex illo fere efformari quodcumque non fibra longa est, nullamque longiorem fibram quamcumque in partem protendi quin textu cellulari stipetur; nec illud parium superficie tenus sisti, sed in illarum omnium penitissimos recessus insinuari, ita ut ne minimae quidem fibrillae longae sua desit vaginula cellulosa. Unde cogitare suberitorum corpus animale meram esse spongiam quae per meatus suos fibris longioribus quacumque ratione efformatis aditum transiitumque praebet. Hujus assertionis veritatem comprobabit singularum partium sedula observatio.

Detracta cute tibi statim occurrit textum cellulare laxum, amplum, humore pinguiori scatens, quod veteribus panniculus adiposus, carnosus quem homini falso tribuebant, panniculo suppositus; membrana dein musculorum communis a nonnullis vocatur; nunc vulgo, sub cute & ubicumque pinguius est, ut in omento, circa renes, &c. membrana adiposa, aptiori appellatione dicitur. Hoc cellulare textum non solum universum corpus perinde ac cutis vestit, sed musculis, tendinibus, ligamentis, &c. ubi indumentum exterius praebet, singulis quibus hae partes contextuntur fibris longis se adjungit, tenerius, & minus pingui, prout intimius est, liquore madens; tuncque membrana, vel tunica cellularis pro varietate figurae & functionis vocatur. Ad vasa deinde cujuscumque generis oculos adjicias, paucis fibris longis exceptis, membranas quibus formantur mere cellulares reperies, exterius laxiores & saepe pingues, strictiores vero quo intimiores sunt. Sic viscerum & glandularum fabrica maxima parte cellulosa est, cum nihil aliud sint quam vasculotum cujuscumque generis in glomulos implicatorum congeries. Quin etiam glandulae & viscera cellulari textu involvuntur mutato a membranis quae cava, ventres corporis vulgo appellata, succingunt. Peritonaeum nempe quacumque in partem producat, expandatur, tela cellularis ambit: ac proinde omnes abdominis viscerum membranas quae totidem sunt peritonaei propagines: amplior quidem, laxior ac pinguior in omento, mesenterio, mesocolo, alibi macrior, ut ita dicam, atque strictior. Intestinatorum tunicae, si muscularem exceperis, quae tamen tenuissimam suam habet cellulosam, mere cellulares sunt, cum nervae sic dicta tunica, hic sicut & alibi, cellularis sit strictior, & deinde villosa praeter vasa impleatur spongiosa quadam substantia quae vascula necit & ordinat. Fabricam similem agnoscunt tunicae ventriculi, vesicae felleae & urinae, ductum biliariorum,

rum, ureterum, &c. De pleura, idem dicas in pectore, ac de peritonæo in abdomine. Pulmonem ipsum mere cellulofum esse demonſtrant vaſorum quæ habet infinitus prope numerus, viſceris habitus, tum experimentum facile; quamcumque enim pulmonis particulam inſeſ, ſtatu omnem perambulat pulmonem; certo argumento conſtare illum texto, cujus partes omnes mutuo inter ſe patent, proindeque cellulari. Arachnoides, tum pia mater quæ per cerebrum, medullam ſpinalem, indeque per totum nervoſum genus, propagatur, mere cellulares ſunt, ſed denſiores. Dura mater, cutis ipſa & denſiſſimæ aliæ membranæ, maceratione, ſtatu, non adeo multis fibris longis remanentibus in cellulofum floccofumque textum interius latens abeunt. Illud præterea reperies in membrana pituitaria, cornea, in capſulæ cryſtallinæ anteriori parte, ſinubus lateralibus oſſis ſphenoidis, in lingua, labiis, pilorum radice, corpore vitreo oculi, ubi tenuiſſimum eſt, inter duram matrem & vertebrarum canalem, in corporibus cavernoſis penis, clitoridis, quæ cruorem in ſtatu naturali eſuſum recipiunt, &c. ubique, ne oſſibus quidem exceptis. Horum ſcilicet, haud ſecus ac partium mollium ſubſtantia, duplex fibrarum genus admittit, unum ex fibris longis, alterum ex laminis conſtatum. Cavitates præterea majores, minoreſve, quibus conſtant, duplici cellulari fabrica inſtruuntur; oſſeam quippe in extremis & ipſis penetralibus membranaceam ſubtiliſſimam habent, in qua liquor oleoſus continetur, medulla dictus. Copioſius eſt cellulare textum & amplioribus laminis cellulisque eſſormatum in magnis muſculorum & partium interſitiis, ubi oſſa eminent, ad partes quæ per vices dilatari & conſtringi debent, ubi motus & attritus maximi. Uteri, mammarum, aliarumque partium dilatabilis natura ſpongioſo texto debetur. Laxum, adipoſum, ſenſum amittit, an retinet ubi ſtrictius eſt?

Syſtematis cellularis autem cavitates ſibi invicem pervias eſſe demonſtrant cum experientia ex ſuſſato aëre vel liquore injecto, quo utroque cellulæ vel remotiſſimæ illico diſtenduntur, tum ipſa autopia. Vaſa enim & ſingulæ partes dum per varia corporis loca progrediuntur, ſinguli cujuſque membri tunica cellulari exterius induta univerſi ſyſtematis illius favent commercio. Sic vaſa iliaca, ſpermatice in viris, in ſceminis ligamenta rotunda, urethra, inteſtinum rectum, &c. dum abdomine exeunt cellulofam telam peritonæi ſecum adducunt eamque cum pudendorum & partium inferiorum cellulari perviam reddunt. Secundinarum vero, & abdominis exterioris, cellularem fabricam in communionem trahit funiculus umbilicalis. Sic etiam aorta, cava vena, par vagum, ductus thoracicus, vena azygos, dum in thorace adhuc ſunt cellularem pleuræ, in abdomine vero eam peritonæi circumjectam habent, quas ergo continuas fieri neceſſe eſt, ubi per ſeptum tranſeunt. Alia loco quibus cellularium peritonæi & pleuræ, harumque

Diſput. Medico-Pract. Tom. VII.

Q q q q q vero

vero cum cellulosis thoracis & abdominis exterioribus mutui sint aditus sectiones tibi ostendunt. Ex supradictis etiam cellulose caeitis & extramuratum superiorum cum illis medii & infimi ventris commercium demonstrabitur. Trachea præferim arteria cellulares capitis, colli & pectoris mutuo pervias facit; œsophagus huicce commercio ventriculum addit, adeoque abdomen universum. Demum, ubi celsi in ore, naribus, oculis, &c. non tam perforatur quam intro receditur, cellulares externas cum internis fieri continuas manifestum est.

Jam quis sit usus texti illius cellularis tam exquisito apparatu ubique in corpore profusi facile concipitur. Primo siquidem partes multæ ex eo solo formantur, aliæ ab aliis distinguuntur, partes corporis à se invicem remotissimæ, contrinuantur & una conspirant, vacua opulentur interstitia, singularum partium determinantur figuræ, fibræ longiores firmantur, ac veluti molli tomento ita fulciuntur, ut à se invicem divelli sine ruptura queant ac rursus appropinquari: inde partes extendi, relaxari, contrungi possunt pro rei necessitate, & omni machinæ firmitas, mollities, mobilitas simul & elegantia conciliantur. Vix sine textu celluloso contractio muscularis speranda esset. Vix sine illo ulla fieri posset secretio; vasa siquidem distinguit, necit, ordinat, in glomerem & infinitas figuras ducit, quæ alioquin rectam sequerentur lineam: hoc si resces, glanularum, organorum secermentum, & excernentium apparatus destrui videbis, simulque collabi varia quæ bili, spermati, urinæ, &c. dicantur receptacula. Deinde molliis adeps per suos ductus in cellulas exsudans partes lubricat, friciones minuit, ab ariditate præservat & frigore; ex omento porro, mesocolo & mesenterio redux præcipuam facit secerndæ bilis materiam. Præterea in sanguinem resorptus acre temperat & maximæ utilitatis est in exercitiis diu continuatis & inedia. Cæterum in sætu cellulose loco gelatinam esse, pinguedinem paucissimam; hanc copiosorem esse foemini quam viris compertum est: homini fluidam esse, nec ut in brutis solet, concrefcere, nisi post mortem. Medulla vero, tenuissimo quo intime penetrantur ossa oleo, solidissimis hisce partibus cum levitate firmitatem conciliat, ut ex analysi chemica constat, fragilitatem arcet & liquido mixta mucaginoso axungiam facit, qua articuli lubricantur. Liquoris autem subpinguis ope & subtilissimi in cellulas perspirabilis vapore, fibræ & membranz à concretionem præservantur. Tandem humor mucosus in cellulis tanquam in promptuario asservatus hinc quaquaversum meabilis toti corpori in alimentum cedit, & variæ concretus partium solidarum molem auget. Nutritionem enim & incrementum in partium interstitiis, adeoque in celluloso textu magis quam intra vasa fieri multa sunt quæ fudeant. Mutui porro quo pinguedo aliique humores in cellulis eris tardissime circumferuntur, fibræ carnez, tendinæ, membranæque validæ hic sparsim interstitæ famulantur, ut & ambientium actio, præfer-

præsertim musculorum & arteriarum. In hoc autem texto à summis (*) Viris haud ita pridem accurate descripto, morbos, & morborum mutationes sæpius fieri arguunt tum ipsius fibrosæ conspiciæ quantitas, tum cellularum mutuo inter se patentium numerus, quibus materia morifica quæcumque contineri, foveri, & unde et loco in locum moveri possit.

§. II.

Morbi liquidem vel cum materia fiunt, vel sine materia. Primi pendunt à mutatis quantitate, loco, proprietatibus humoris cujuslibet, vel à materia noxia extrinsecus adveniente. Alii in solidorum vitis potissimum consistunt, ad quæ tensio, crassities, &c. auctæ minuatæ referuntur. Morbi autem qui cum materia fiunt præ aliis varias mutationes subeunt. Vel priore cessante morbo novus exoritur, vel remanenti nova & gravissima superadduntur symptomata: vel ex diuturno acutus fit, ex acuto longus, ex levi gravissimus & è contrario. Quæ quidem mutationes à varia materiæ morificæ indole & alteratione pendunt, sed potissimum à mutato ipsiusmet loco; inde crisis, lysis, diadoche, metastasis. Porro cum morbi omnes mechanice eveniant, necessum est pariter morborum mutationes mechanice fieri. Principium enim internum, ferme incorporeum excogitatum, quod naturæ vulgari & tam decantato nomine, morbos amoveat, solvat, perimet, admittere non sinunt motus erronei, inutiles, noxii adeo sæpe in morbis observati. Sed omnia eo redeunt, ut leges & structura quibus initio corpus humanum creditum fuit, vigeant etiam in statu morbofo, effectusque suos edant, constantes quidem, sed promiscuo pro re naia inutiles, salutares, noxiosæ. Sic febres quæ à primariis causis æterni motus cordis ut effectus secundarii fiunt, utiles quidem sunt si humores viscosi & ad acidum vergant, noxiæ vero si jam nimis soluti sint & acres. Sic & hæmorrhoides non ex consulto sed mechanica necessitate veniunt, cum in earum formationem multa concurrant, quæ alio primus spectabant: inde per se semper noxiæ, fortuito utiles sunt. Nec etiam febres, hæmorrhoides, vomitus & alia

Q q q q 2 hujusce-

(*) Imprimis Marcell. Mûlpiighi de Omento & Adipe. Lewenhock in experim. & contemplat. epistol. physiol. pass. Fieder. Ruych. Epist. I. ad versar. Decad. II. & Thesaur. Anatomic. pass. Herman. Pouchav. Instit. Med. de omento, cuse & piasar. Apudissac. Joann. Bapt. Morgagni in advers. Anatom. II. Animadv. V. & VI. Advers. III. Animadv. II. Jacob. Douglas. de Periton. Winslow Exposit. Anatom. Traité de B. ventie, des Tégumens, &c. Abrah. Raw. Péripir. Hæmocr. Cap. XXXIII. & cæss. Wyer. Guilielm. Mûys musculorum artificiosæ fabrica pass. Bernard. Siegf. Abiu. in Histor. muscul. homin. p. 3. & seqq. Acidem. Annotationibus lib. III. cap. I. & X. &c. Albert. v. Haller in Notis Instit. Boerh. & Prim. lin. physiol. cap. I. II.

hujuscemodi eo tempore quo maxime utiles essent perpetuo eveniunt ; sed sæpius quo abesse magis optandum esset. Quæ igitur in statu morboſo accidunt ea tanquam systematis aliunde sapientissime conditi incommoda videri debent. Inde verissimum illud Asclepiadis (a) assertum, naturam non solum prodesse sed etiam nocere. Inde per textum cellulofum variz sunt in morbis mutationes quæ non magis ad prosperas, quam adversas res ægrotantis, sed promiscue ad alterutras vergunt.

§. III.

Porro ut incipiamus à texti cellulosi morbis qui cum materia fiunt; pinguedo si nimium augetur, partes comprimit, fibras relaxat, vasa angustiora reddit; cordi obices ponit, motum & sensum animum tardat & minuit, varias lædit functiones (b). Et adeo aliquando in toto corpore crevisse visa est, ut inde corpus immobile fere redderetur, & artuum musculi, cor ipsum & alii musculi cavi, ad simplicis membranæ tenuitatem redacti, deficere prorsus viderentur; ossa interea exilia quasi fetuum essent, dum partium mollium in imensum moles cresceret: adeo cellulosa membrana dilatari apta est, partium vel solissimarum detrimento. Fit etiam ut pinguedo ubique luxuriens, liquidis mixta circulantibus, variis in cavis deponatur; si in corde in frustra majora post mortem reperta concreſcat, obſtaculo insuperabili sit cordi, vasisque magnis, ideoque subito (c) interimat. Contra vero medulla quæ in cellulari ossium raro abundat, aliquando omnino deest ex inedia, morbis longioribus, senio, exercitiis vehementioribus, unde facilius ea franguntur; dum vero corrumpitur, pædartrocace, dirique ossium morbi oriuntur. Articulorum porro axungia si augetur, ossa e sede sua facile dimoventur; si minuitur, aut concreſcit, strepitus fit, rigiditas, demum anchylosis. Quibus vero cellulosa membranæ in toto macilentæ sunt, iis vasa sanguifera replentur; pulsus magnus, fortis, sensus exquisiti, motus promptissimi, acuti morbi frequentiores. Si texti spongiosi cellulæ fere omnino deplentur & exinaniantur, atrophia est: vasis sanguiferis interea sæpius satis plenis: cujus vitii genus cerebrum participasse haud, quod sciam, unquam visum; cum ejus cellularis substantia halitum subtilissimum, pinguedinem vero in statu sano, non admittat. Sinz & Ægyptii

(a) Ap. Cæl. Aurelian. p. 45.

(b) Boerhaav. II. Morb. Histor. Bonet. Sepulchr. Anatomic. Lib. II. Sect. I. obs. 45. 103. Sect. II. obs. 16. 35. 45. Lib. III. Sect. I. obs. 7. Sect. XXI. addit. obs. 80. 88.

(c) Hippocr. Aphor. 44. §. 11. Bontii medicin. Iad. obs. 8.

tii dum obesitatem ambiciosius exquirunt, nostrates præsertim mulieres, gracilitatem nimiam affectant. Tutior est mediocritas, qua, corpus nec crassum nec tenue nimis, functionibus constanter obeundis sit aptissimum. Cæterum adipem ex morbo, ubicumque tela cellularis est, in scroto, pene, ovariis, cerebro, &c. deponi, sectionibus constat. Præterea pinguedo cito & multum à propria indole abscedit, ut ex brutorum & hominum sectione edocetur. Præcipuum tinæ subiectum est (*d*) in qua instar seri liquidissimi diffuit. Purida sit etiam, rancida: summus in cancro corruptionis gradus est; aere morbosum, virulentum, heterogeneum, quod semel suscepit, tenaciter retinet: nec ullum in corpore vitium novimus quo non infestetur. Inde lepra Arabum, elephantiasis Græcorum, lues venerea, plica Polonica, varii pilorum morbi & cutanei maxima parte pendunt.

Si texti spongiosi cellulæ aërem elasticum admittunt, sit emphysema cujus frequentia in carnariis tibi exempla occurrunt, laniis in recens mactata animalia folle aërem adigere solitis, ut commodius & elegantius inde membra dissectent, & innocenti quidem artificio; quod etiam in fraudem adhibent mangones dum viva sic inflata pro saginatis & bene valentibus, aërensque pro carnibus vendunt. Emphysema itaque tumor est indolens, non difficile quidem cedens digitis, sed brevi rediens, sonitum reddens, & totius partis imminuens specificam gravitatem. Externæ causæ sunt animalium quorundam morsus, vulnus in quacumque corporis parte inflictum cutim penetrans ad cellulas usque, si aëri semel admissio egressus prohibetur. Calore enim expanditur, per ambientes cellulas vias sibi facit; qua arte mendici variis in corporis partibus tumores excitant. Sæpius tamen emphysematosin produciunt asperæ arteriæ, thoracis vulnera, dummodo angusta sint, tortuosa; levem quidem thoracis simplicia; horrendam visu si pulmone ipsi vulnus leve, angustum inflictum sit: tunc humana perit figura, ac novo aëre perpetuo in omnes cellulas adacto homo quasi sepelitur. Visus est aer totum replevisse hominem, ad undecim pollicum altitudinem, exceptis planta pedum, vola manuum, parte superiore capitis (*e*) ipsa etiam vitrei cellulosa, bullas aeris in sectione emittente. Nec tamen ut emphysema fiat vulnus externum semper requiritur, cum ex fractis costis (*f*) illæsa cute, ex ulcere & adhesionem pulmonum cum musculis intercostalibus, ex discisso œsophago illud nasci (*g*) compertum sit. Intus porro humores in cava effusi, putrescentes, aërem extricando elasticum reddunt, sic docente chemia & insuper sub-

Q q q q 3

merfo-

- (*d*) Bayl. probl. Med. Phys. 87.
- (*e*) Litt. A. R. Scient. ann. 1711.
- (*f*) Ibidem.
- (*g*) Boerh. Ia. Morb. Hist.

merforum exemplo quorum cadavera, ubi putruerint, supernatant. Aerem porro in corpore augent, vel sensibus obvium reddunt flatulenti cibi, potus fermentans, vires imminutæ præsertim concoctrices, suppressa perspiratio, venena plurima, febres nonnullæ, suctio, atmosphæra specificè levior. Hinc nullæ in corpore cellulares sunt quæ non peculiari emphysematosi aliquando laborent, ut aliunde symptomatis constet & sectionibus. Inter viscera lien qui maxime cellulosus est, magis a flatibus frequenter distenditur, & aliquando rumpitur. In cadaveribus, dum corrumpi incipiunt, penem aliquando arrigi, quod imperitis sæpe prodigio fuit, ex supradictis etiam facile intelligitur, tum & vivo homini cavernosa corpora flatulento halitu distendi posse: hypochondriacos præsertim, adeo incertæ, vel noxiæ veneris vana specie, sic aliquando misere deceptis.

Deinde aquæ intercutis vera sedes textum cellulosum est: siquidem anasarca & leucophlegmatias loca (b) *mania* occupant & quæcumque in alijs *vacua* sunt in hujusmodi ægotis opplentur. Aquæ intercutis, pleræque ab illis (i), & a lumbis incipiunt, cum nullibi cellulosæ copiosior adsit: mox exterius scrotum & palpebræ tument; quod in his cellulares pinguedine vacuæ sint: pedes, brachia deinde, collum, facies tumescunt, genæ levissimo motu indecore tremunt, torumque corpus puerita impetitur, ne quidem exceptis corporibus cavernosis penis. Inde ægris simul inest pallor, spirationis difficultas, tussis; inde etiam segnes, pigri sunt & effeminati, difficillime sudant & a cibi mole exigua multum instantur. Vola manuum, & planta pedum quæ aeris aditum recusant, aquam haud difficile admittunt: stagnatio ferè sic ita sponte efficit, quod in administrationibus anatomicis longa maceratio, scilicet, ut densissimæ membranæ in ultima fere elementa resolvantur. Leucophlegmatias hydrops (k) supervenit: mortuorum autem frequens sectio ostendit cellulares omnes laxatas, aqua madefcentes, musculorum inde faciem mutatam, partes solidas translucidas, tremulas veluti gummolas, adipi gelatinam substitutam. Morbum produciunt animalculorum morsus, copiosus frigidæ potus continuus, pravus cibus, quæcumque accessum liquidi in cellulas promonent, recessum vero prohibent. Cæterum nonnumquam & exigua in parte homo aquam intercutem patitur ut in capite, pulmone solo (l) aut jecinore, aut liene: sed omnium frequentissime in ovariis, testibus, omento, mesenterio, inter musculos abdominis & peritonæum & in omnibus peritonæi duplicaturis. Quam varii inde oriuntur effectus! Hinc ligamenta hepatis laxata infra costas deciduum palpanti offerunt viscus alio.

quint

(b) Aretæus de diuturn. morb. Lib. II, Cap. I.

(i) Hippocr. prænot. Sect. 2.

(k) Hippocr. Aph. 74. Sect. VII.

(l) Aret. Ibid.

quin sanum. Hinc ventriculus, lien, uterus, &c. sede sua naturali relicta, varia hypogastrii loca occupant. Hinc membranæ intestinorum, vesicæ urinæ, fellis, multo crassiores fiunt & cavitates angustantur. Duodenum præsertim cum copiosiori consistat cellulosa, fibrillis vel aqua turgidum varias facit ægritudines, quæ ventriculi, hepatis, pancreatis, morbis male adscribuntur. Herniarum multa genera huc quoque pertinent. Sic etiam dum cornea oculi, tympani membrana lero madescunt, visus, auditus minuuntur, &c. cacochymia est anasarca incipiens; œdema hydrops cellularum cujusque partis.

Situs vasorum in tunica cellulari, mollietates eorum quæ præsertim per pinguedinosam serpunt, amplitudo ductuum adiposorum & facilis per eos sanguinis admissio, cellularis vitia quibus necessario vasa infestantur, efficiunt ut externis internisque causis, in cellulosam, sæpe cruor effundatur. Inde Ecchymosis, aneurysma vulgo dictum spurium, varii nominis exanthemata oriuntur, quæ sede & natura similia, nonnisi gradu differunt, & inflammationi proxima sunt. Inde duplex inflammationis genus forsan admittendum venit, pro duplici, quo sanguis ducitur, errore loci: primum, in quo vasa lymphatica, a cruore distenduntur; alterum in quo, extra vasa, adeoque in circumpositæ telæ interstitiis, sanguis deponitur. Prius cum altero sæpe conjungi suadet ratio: posterius autem in omni inflammatione perpetuum esse demonstrat autopsia. Porro cum errore loci, majorem arteriarum nervorumque vim intendi necesse est, ut fiat inflammatio; cum si in parte quavis placide & absque ignis sensu sanguis divagaretur, hanc suggillatam aut alio nomine, haud vero inflammatam diceres. Plegmone porro potissimum cellulares adiposæ, strictiores aliæ erysipelate afficiuntur. Inflammatio & suppuratio nusquam tenacius (*m*) hærent quam in adipæ. Puri autem in cellulosa fiendo conducit maxime hujus membranæ indoles, quæ facile distendi, intumescere, ac dirumpi potest: cum argumento sunt pinguedinis grumi ac cellularis frusta, quæ ex parte suppurante manifeste prorumpunt. Idem sua lent puris proprietates; album enim, leve, tenax, subpingue, his dotibus maxime cum pinguedine convenit. Ex macerata in aqua pinguedine, ad putredinem usque, secedit ad fundum valis (*n*) materies albicans, tenax, aquæ fundum petens, puri simillima. Theoriam hanc illustrat suppuratio in visceribus & glandulis tarda, diffilis, cum his paucæ, macilentæque cellulosæ insint, nunquam laudabilior & citior quam in musculosis & magis cellulosis partibus; jugis & vix cohibenda in omento, mesenterio, in lumbis. Advertas etiam peris depravationem in ichorem, saniem, ubi sanguis vel serum pinguedinis materiam aut æquat, aut superat:

(*m*) Boerh. Et Doctif. Comment. Aphor. 374.

(*n*) Grassinis, Dissert. de Purc. F. 25.

superat : multis aliis eadem hæc firmantur ; scilicet lymphæ serumque motu inflammatorio coagulantur nec proinde pus fieri possunt : tum humor subpinguis perpetuo in cellulosas depluit , unde puris copiosa productio etiam ubi sanguifera jam satis libera sunt , nec partis laborantis adeo magnæ iacturæ fiunt : deinde subpingues materiæ a stagnatione , puri quid analogum exhibent , testantibus senum & infantum oculis. Pinguedo per febres contrita , soluta , sanguini mixta vel ex eodem non secreta , materiam morbi implicitam sæpe trahens , jam cessante erethismo cum criticæ secretionis adveniunt , per sedes , urinas &c. deponitur , quam primo intuitu sincerum pus existimares. Hinc adeo apud veteres exoptata concoctionis signa quæ puriformem materiam referunt. Ergo puris præcipua materies pinguedo est , & pars conservans , colligens , fovens pus & coquens cellulosa est. Hanc etiam gangrænæ sedem esse arguunt tum locus suppurationi & gangrænæ necessario communis , tum magna panniculi adiposi frusta (n) quæ in gangræna secedunt. Sphacelus , quo interiora corporis præsertim consumuntur , tum skirrus eundem locum occupant , & si quæ alia sint quæ inflammationem sequantur.

Cum vero cellulares nonnullæ una cum pinguedine vel muco vitiatæ indurantur , calefcunt , varii tumores fiunt : grandines , tubercula , clavi , gangliæ , strumæ , vomices , atheromata , melicerides , steatomata , & tumores illi enormes cystici , hydropem mentientes vel etiam facientes , cellulosas manifeste occupant ; ut frequens observatio docuit , in peritonæi duplicaturis , omento , mesenterio , ovaris. Nec a supradictis minoribus tumoribus vix differre videntur hydatides , nisi quia in cellulosis strictioribus , nec induratis locum habent ; proindeque non materiam sebaceam , sed serum continent. Porro si in musculorum cellularibus humor salino terreus deponitur , ut scorbuticis familiare est , musculi vario modo degeneres indurantur , sternomastoidei exemplo , unde caput oblitppum redditur : si in nervorum cellulari , fit paralyticis : si demum in glandularum membranas tale vitium inducitur , loco naturalis fabricæ , informem massam cartilagineam , tophaceam , materiæ pingui , ossæ , arenosæ , &c. varia admodum repletam , sectiones exhibent. Deinde si humoribus circumeuntibus aliqua insint vitia , his cellulosum textum sensim infici necesse est. In illo quidem perspirationis Sanctorianæ imminutæ suppressivæ materiæ potissimum stabulatur ; cum inter vasa cutis exhalantia , cellulosæ telæ perspirantia , humoremque intus & extra perspirabilem maxima sit analogia. Cutis vitia , scabies , impetigines , &c. reperiuntur , ac reumaticum , arthriticum , scorbuticum , varii excrementitii humores , ex organorum secretorum morbis in sanguine retenti , bilis & urina potissimum huc etiam confluunt ; cum si hæc crassa sint , cellulosæ poros

ductivæ

(n) WANSWARTEN *ibid.*

ductivse adiposae facile penetrant, quippe satis amplas, si tenuiora acrios tenuiores. Inde serosae colluviei (o) deferat. sedes præcipua textum cellulosum est. Hoc morborum capacissimum, quasi nidum esse omnia ergo suadent; quandoquidem cavitatum summam in systemate celluloso longe superare summam cavitatum vasculosi, edo- cent in majoribus partibus prima inspectio, in minimis ars Ruyschiana. Vitia quæ nequeas in humoribus circumeuntibus sæpius perspicere, in cellulari manifesta sunt. Ab acri in fibrarum interstitia impacto humore irritatio & dolor potius quam ab eodem in vasis contento. Acrem, heterogeneam, morbificam quamlibet materiam, qua facile sese vasa extricant, cellulares accipiunt, retinent. Motus continuus, validus in vasculoso systemate omnia miscet, putredinem impedit: hanc ju- vant in celluloso calor lenis, stagnatio, locus dilatationi aptissimus. Mirum quam varia & multa vel ex natura vel ex morbo huc undique confluant! aqua, sanguis, lympa, pus, ichor, sanies, mucus, pin- guedo, humor subpinguis, perspirabilis, excrementitius, aer elasticus, uno verbo cuiuscumque generis heterogenea. Paucis more suo celluloso- rum opus indigitavit Hippocrates (p) his verbis: „ Quidquid non coaruit, „ sive pellicula, sive carne contegatur, cavum est. Impletur autem „ dum sanum est spiritu; dum ægrotat ichore “.

Alia cellulose fabricæ vitia sunt quæ ad ipsius solidum magis spe- ctant. Quippe vel stricta, vel relaxata nimis est, tenuior etiam vel crassior: quæ similia vitia in fibras longas, vasa, viscera, in cellulari quasi natantia & immessa necessario inducunt. Vix ullum in visceribus vitium sectiones usquam monstrare, quin simul cellulosa, ampla, duriori, crassi, miro modo degenerare vestita & inclusa reperta sint. Præterea partium inter se præter naturam connexiones cellulars visio- plerumque contingunt, quæ nempe vel abest ex suppuratione; vel defectu liquidi dura callola redditur indeque non perspirabilis; vel etiam ex mucro in fila ductili, morbose efformata varias partes implcat & necit. Hæc inflammationis plerumque soboles sunt, qua incrassati membranas, novasque generari cellulosas frequenti autopsia, compertum est. Hinc pulmones & pleura, peritonæum & varia abdominis viscera, cutis & muscoli, hi inter se, &c. efflorescentibus fibris, vel concre- to mucro quasi glutinis coherent, haud cum levi incommodo; exin- de enim dolor, motus functionumque læsio sequuntur. Cellulare au- tem textum ampliari, luxuriari aliquando, varietque produci indicant ulcerum fungi, hyperfarcoles, carunculae, narium & uteri polypi. Hoc polypi nomine admonitus, haud abs re memorabo animalcula illa pec- sectiones multiplicari, jam ab antiquis visa, sed a recentioribus (q).

Disput. Medico-Præf. Tom. VII.

R r r r r

diligent

(o) Car. Pison. De serosa Colluv. p. 17.

(p) Hippocrat. de arte § 17. Vanderlinden.

(q) Mémoires pour servir à l'Histoire des Polypes, par M. Trembley, Paris, 1744.

diligentius observata; quod prodigium nonnisi in cellularem substantiam qua mere compingi videntur referendum esse, peritiores existimant. Postremo tandem viæ decursu sensim durior in senibus, cellulosa callescit, cornea & penitus ossea fit, præsertim ubi motus magni & perpetui sunt, ut in arteriis cordi vicinis. Aliquando tamen cerebri, omenti & tenerrimæ quascumque cellulares offescere vel principii terreæ abundantia, vel motus vitalis defectu, etiam in junioribus frequentens (*) casus edocuit. Has porro concrectiones in cellulari fieri demonstrant earum situs, lamellæ quas exhibent, ut & osium in foribus per medium quid cellulosum formatio.

IV.

Jam ex materia morbifica quacumque in cellulari texto contenta, nulla est, quæ per illud ambulare, progredi, mutareque locum non possit, siquidem continuam unam (Sect. I.) efficit cavitatem. Vifos efficit anasarca hydrops per omnes cellulas ire, redireque, modo manus, faciem, oculos, modo extremitates inferiores, testiculos & abdomen vicissim replere, inflareque: sic oedemata alicubi desinentia alibi mox apparent. Serosa profecto colluvies huc illuc moveri, impellique (†) proclivis est, adeoque irruere per vices in cellulosas omnes. Sic etiam aer simul ac a causis internis extricatur, per cellulas vagans dolores, tensionem producit, inflammationem ludit, revera tantum flatus; quos equidem ab inflammatione distinguunt artis prudentes, quia febris, vel nulla, vel admodum parva est, & subinde mutant locum. Flatus ex arteriis venisque in cellulosas, ex his vicissim in vasa ire redireque, symptomata & sectiones indicant. Vidi Parisiis anno 1750. Juvenem coriarium Turonensem adeo flatibus turgidum, ut non modo, singulis loquendo phrasibus, sed etiam ex motu, vel frictione minima in quavis corporis parte facta, in ructus continuo erumperet; systemate celluloso spiritum qui perpetuo renascere-tur, sic indefinenter eructante: qui morbus annum integrum & ultra perstans, purgantibus, roborantibus, variisque exercitiis feliciter sanatus est. Puri autem si natura, vel ars non inveniat exitum, viam sibi facit per cellulas vicinas, sensim progreditur & serpit; inde nisi omne in sanguinem resorbeatur, ulcera, sinus, fistulæ, quibus illæsi musculi quasi arte dissecantur; inde partes, longo tractu purulentæ fiunt, adeo ut in abditissimo quod remotum est extremo mali principium aliquando sit, exitus in altero quod manifestum est. At si purulentæ metastases fiant, recte conjicias huc potissimum latum iri materiam, ubi

(*) Vide Celeberr. & de re medica indefessis laboribus optime meriti Albert de Haller opusc. Patholog. obs. 47.

(†) Car. Pison, ibid. pag. 6.

ubi amplior & pinguior cellularis est. Hinc circa lumbos, ad inguina, & exinde in fasciæ latæ membranam, in axillas, circa parotides adeo frequentes metastases. Hinc inter viscera, ceteris aliunde paribus, pus alibi confectum, facilius accipiunt omentum, mesenterium, hepar, quippe textu celluloso, ubi materia pinguior puri affinis abundat, præ aliis luxuriant, ac præterea in his lentior est humorum motus. Scrofulas & acres materias potissimum accipiunt cellulose quæ non pinguedinem, sed tenuissimum perspirabile tantum habent : inde pulmo præ aliis visceribus iis maxime infestatur. Haud alia via quam per cellulofum textum gangræna, sphacelus, teterrimusque cancer diffunduntur, serpunt, vires acquirunt eundo, & tandem organa vitalia destruunt. Tanta damna vix compensat cellulosa tunica cum laminas solidumque suppeditat, unde membrana fiat dura, callosa, quæ nec sentire, nec perspirare videtur, cicatrix vulgo dicta. Glandulæ lymphaticæ simplices, sanæ, morbosæ, aliquandiu in cellulosa identidem in vicinia vagantur. Varios arrium lymphaticos tumores, dum sanantur, ad vicinas cellulosas longe lateque disfluere, notum est, materia morbi mobiliore jam facta : sic etiam in viro principe durissimum tumorem in regione umbilici, ex atroci Madritensium colico dolore (qui colicæ pîctionum adfinis est) male curaro, ortum vidi ; qui legitima adhibita methodo undequaque per cellulares abdominis diffundebarur, brevi diffundus. Multo magis perambulant pediculi, vermiculi, qui ut cavitates amant, aliquando in sela subcutanea observantur, in Septentrione frequentius, apud pueros (x) quos vigiliis, miris anxietatibus, tæde demum affligunt. Vena Medinensis, seu dracunculus, lumbicis similis, eandem sedem occupat, & immensæ aliquando longitudinis, per cellulas in gyros convolvitur & manifesto (x) movetur : non adeo magnum inferens tamen periculum & dolorem : quod animalculi genus populis regionum meridionalium frequentius, raro apud nos, nisi in brutis observatur. Quid si corpora durissima, metalla ipsa per cellulosas moventur ? Glandes plumbeæ, sclopeto in carnes adactæ, primò hærent, deinde per cellulares ambulant, usque dum cavum sibi invenerint aut fecerint. Acus, aciculæ, vel deglutitæ, vel casu cuti infixæ, si diu in corpore manent, varia peragant loca, vix dolorem creantes ; si quidem per cellulosas ampliores ite faciunt : tandemque inexpectatæ vario modo e corpore, æturgine infectæ, vel crusta lapideæ obductæ prodeunt. Nullus ergo dubitationi locus superest, quin materiæ morbificæ quæcumque per textu cellulosi ambitum eant, progrediantur, & aliquando rapide satis moveantur : nec tamen in-

R r r r r 2

diffri-

(x) Veschi'us de Vermib. capillat. infant.

(x) P. Ægin. Lib. IV. c. 52. Aetius Tetr. Serin. II. c. 84.

discriminatum per cellulofas omnes huc illuc ire redireque illas existimandum est; fed congeneres telas affectare magis videntur: sic ex adipofa in adipofam potius progrediuntur, ex mufculari in mufcularem, rheumatismi frequentiore exemplo, ex ftrictiori in ftrictiorem, ex cellulari nervi in aliam nerveam. Hinc typi morborum aliquandiu fervantur. Morborum cum materia qui nervos afficiunt miras facies, dum perperam fpiricibus adfcribuntur, a nervorum tunica cellulari potiffimum pendere multa funt quæ fufpiceant. Ros tenuis quo hæc perpetuò madet fuos certiffime morbos habet, ut abunde conftat fectionibus. Totum convelli genus nervofum ab irritatis gangliis, certa docuerunt experimenta; at ganglia textu cellulofa ftrictiori maxime componuntur. Hæc porro in hyftericis & hypochondriacis fæpius (*y*) mole aucta & hydatidibus obfeffis reperiuntur. Deinde opticus nervus in quo *cellulofitas* longe quam in aliis nervis manifeflius eft, facilius inde præ aliis affici videtur, ut docent vertigo, refolutio frequens, variæ obftrudiones & lapidææ (*x*) concreciones hic obfervatæ. Verofimilius ergo in nervorum morbis frequenter peccat textum cellulofum. Jam fi materia morifica tenuis quam fovet, huc illuc per varios cerebri anfractus movetur, fi e cerebro in medullam spinalem propellitur, & hinc inde per ganglia e nervo in nervum, e plexu in plexum divagatur; quam mira, quam varia prodeunt fymptomata! totus homo immutatur. Materie virulentæ, inprimis fi lente corpus afficiunt, præcipuam in cellulofa fedem etiam habent, & huc illuc ferpunt; & ad remotiffima quæque perveniunt. Admittunt illas pori in quacumque corporis parte in cellulofam hiantes; tum earundem actioni favent motus in cellulis tardiffimus, atque liquidorum in his varia indoles, quibus, five pingui, five aquofa, five mucofa pro majori affinitate, adhærere poffit tabum virulentum. Sic à contractu intimiori veneræ lues per cellulofum textum ubique (*a*) per corpus diffeminat, & pinguib. humoribus confociari (*b*) amat. Venenatorum miasmatum quæ per ictum vel morfum corpori communicantur, in cellulofa fystemate maxima pars vires fuas exerit, ut vulneratæ partis fubita inflatio oftendit. Equus biduo extinctus (a mure araneo in dextro poftico pede demorfum dicebant) oîm coram nobis anno 1748 fecaretur, exhibebat cellulofas omnes dextri lateris, à pede ad cervicem ufque per feriem decrefcentem fero flavo turgidas, fparfim fugillatas, flaccidos inde mufculos, pulmonem dextrum maculis nigris obfitum, auriculam cordis dextram flavam, feroque repletam, faniffimis interea mufculis, pulmone & auricula finiftris. Quædam in morbis mutationes accidunt, quæ ad vafculofum

(*y*) Lancif. differt. de gangl. nervor.

(*z*) Elegny Zodiæc. ann. 1679. April.

(*a*) Boerh. de Luc. Aphrodit.

(*b*) D. Astruc. de Luc. Vener. Lib. IV. c. 2.

culosum & cellulosum systema simul pertinent. Longi morbi in celluloso potissimum sedem habent; si quidem omnia hic lente moventur; acuti præsertim in vasculoso ob motus velocitatem. Porro systema utrumque mutuum sibi aditum præbet per vasa in cellulosam hiantia, & proinde vasa & cellulæ invicem dant & accipiunt: reciproca hac actione morbi accedunt, redeunt. Itaque si in acutis, tempore dato, cellulosum systema plus materiæ morbificæ accipit quam reddit, morbus quasi silet, chronicus fit; si, alio tempore dato, vasculosum plus absorbet quam exhalat, morbus recrudescit, acutumque typum refumit. Certe si perpetuo in cellulosis folis vitia residerent, vix acuti morbi forent & febres; si in folis vas, vix diurni aut intermittentes. Materiæ morbificæ receptacula necessario (c) adesse docent morborum historiarum. Hæc autem spongiosi texti cellulas sæpius esse quam vulgo creditur facile ex antedictis, concludes. Cum itaque constet materiam morbificam quæcumque varie in corpore per textum cellulosum moveri, jam hac ratione in morbis fieri mutationes (Sect. II.) probavimus. Unde patet ab una eademque morbifica causa varios pro parte affecta symptomatis se prodentes fieri; qui revera unus idemque primus sit morbus. „ Morborum omnium (d) unus & idem modus „ est, locus vero ipse eorum differentiam facit “.

§. V.

Videmus igitur quot & quantas in morbis partes agat textum cellulosum, sæpius tamen, ut ita dicam, *passive*; nec cum levi cognoscendis & curandis morbis adjumento. Inde morborum plurimorum sedes & natura definiuntur, symptomata explicantur, non pauca veterum loca illustrantur, curationum quas tradunt rationes magis elucescunt. Sic dum interiora corporis nimis exsiccantur: inunctiones ex oleo exterius conveniunt; cum prohibita cutis perspiratione, illa quæ per cellulosas interius fit, evadat copiosior. Dum corpus vero intus nimis humidum est, frictiones siccæ, tum ea adhibenda sunt quæ perspirationem externam adaugent, siquidem interna inde necessario imminuitur. Rursus si cellulosum systema implendum venit, cibi & potus qui pinguem & mucosam substantiam copiosiore habent, ex vegetantibus præsertim deprompti, jugiter & quantum ferre valet stomachus adhibendi sunt; adjectis simul corporis & animi placidissima quiete & somnis longioribus; tum etiam balneis vel venæ sectione vasa debilitanda sunt aut laxanda: sin contra deplendum, hæc roboranda sunt vel dilatanda. Impletur enim cellulosum

R r r r r 3 his

(c) Galen. de different. febr. Lib. II. c. 18.

(d) Hippocr. de Flatib. Sect. IV.

his fere quæ vires vasorum minuunt, & vicissim depletur iis quibus vasa replentur & corroborantur. Cellulosum etiam deplet diuretica & purgantia, cum serum ideo minori copia in cellulas advchatur, majori revehatur in sanguinem. Idem & sæpe efficacius præstant exercitia, sudorifera & adstringentia medicamenta cum victu & aëre socioribus, quibus quali pressione de spongioso textu liquores exprimuntur; præter quam enim quod serum diffilent, olea fluidiora reddunt, vasculosum systema roborant vel dilatant; unde cellulosum premitur, angustatur, liquida contra absorbentium oscula fortius applicantur. Hinc acidorum mineralium, aceti præsertim, usu prudenti, obesiora corpora ad justam mediocritatem reducere observatum est. Si porro ex symptomatis & causis pravas alicubi cellulose adhesionēs fieri conjecturam facias; præter diluentia interna, potissimum las asininum, pars externa affectæ respondens vapore tepido primo mollienda est, dein oleo sæpe inungenda, ut ex perspiratione interna abundantiori laminæ cellulares à concretionē prohibeantur; demum emplastro quod etiam resolvat aliquandiu fovenda & leni motu frequenter exercenda est. Simili methodo ariditas senilis & lapidæ vel cornæ concretionēs præcaventur; præsertim si quando perspiratio externa arte minuitur, intus assumuntur quæ perspirationem adjuvant. Porro materiæ morbificæ in celluloso textu contentæ, vel ex se mobiles sunt, vel non. Si materia crassa, viscida, in artuum cellularem aliquam impacta adeo hæreat, ut non mobilis sit, ab aquæ calidæ, thermalis præsertim ex alto in membrum lapsu, dilutam materiam mobilem fore sperandum est, ac pressione super incumbente, vicinas ingressuram cellulas, ex quibus deducta ac sanguini mixta foras propellenda erit. Quod si materia morbifica ex se mobilis est, nihil commodius & utilius excogitaveris, quam si ex aperta, in aliqua corporis parte, cellulari, materiæ exitum paraveris. Sic aqua intercus, frustra aliis adhibitis, sapius curatur, si in locis corporis infimis sponte fissuræ, vel arte (e) scarificationes fiant; potissimum ubi tempus ve adhibentur, ægri viribus adhuc constantibus (f) intactis musculis & roborantibus simul in usum vocatis. Aer majori copia ex vulnere, cellulosas implens tum suctione, tum eadem methodo e corpore educentur, nec sine (g) singulari exemplo. Exitum in utroque casu juvabunt compressio, frictio lenis, quæ ad ea cellulosæ loca, quæ aperta sunt, compellant materiam. Quod si aer intus extricatus in minori quantitate, per cellulas vagatur, ab internis ad externas mire, subito evocatur & quasi fugitur admotis cucurbitulis siccis. Flatus ex cute dum

(e) *Ætlii*, Tetr. III. Serm II. c. 30.

(f) *M. El. Col. de Villars*, Thes. an Leucophlegmatiz leves scarificationes? 1738.

(g) *Paré Liv. X. c. 30. p. 38.*

te dum magna vi exsiliunt, aliquantum crepitasse, rarissimum est. Sæpius resolventibus & antisepticis assidue haultis, frictione, sudore aut perspiratione aucta, sine strepitu discutiuntur. Alia sunt quibus cellulose expurgari & depleri possunt, phœnigmi, sinapismi, vesicantia, cucurbitulæ scarificatæ, cauteria, fonticuli, setacea. Quæ omnia miras utilitates præstant. Scilicet materiæ morbificæ exitum præbent lentum, & æquabilem: præterea evacuationes illæ continuari, cohiberi, augeri, minuere facile possunt: Aliæ aliis substitui pro materiæ indole & ægri temperie: modo in uno corporis loco, modo in pluribus, imo in oppositis fieri partibus, pro revulsionis, ut opus erit, aut derivationis ratione. His artibus morbi atroces & rebelles, vigilie pertinaces, immanes dolores leniuntur & sanantur. Sic quod in morbis pessima mala producit cellularum inter se commercium (Sect. IV.) idem in curationibus, compensatione quadam maximæ est utilis. Ubi vero virulenta materies, cellulose infunditur; impediendum statim est, ne per vicinas quoquoeversum serpat. Si itaque per contactum contagium advenit, ablutione, balneo, caldario, frictu, fomentis per poros cutis materia omnis educenda est. Si per vulnus; ipsiusmet dilatatione, scarificationibus amplis, igne, suctione. Veneni progressum tardant ligaturæ. Verum si morbus acutus gravior absque sensibili evacuatione cessaverit, suspecta debet haberi sanatio, nec, iis qui ex acuto graviore, cum materia morbo, convalescunt, valetudo satis tuta est, si minime macruerint: metuendum scilicet ne materia morbi in cellulosi textu longis anfractibus deposita fuerit, facile repullulitura; unde vel recrudescet morbus, vel ex acuto diuturnus fiet, vel imperfecta ab ægitudine recreatio. Ex cellulis itaque abducenda materies est, liquoribus miscenda circumeuntibus, & dein per loca convenientia expellenda. In longis autem & iuveteratis morbis, humores circulates, ut ut satis sanos reddideris, frustra tamen perfectam sanationem expectaveris, cum cellulose potissimum in his morbis peccent: quapropter liquida in celluloso systemate stagnantia, instauranda sunt: veteres & vitiatum succi sensim evacuandi abstinentia, exercitiis, purgantibus, mercurialibus præsertim, lignorumque sulfureorum decantis; novus & laudabilis succus cellulis sensim sufficiens est: sic sanum & novum corpus ægro succedit. Hæc est illa *Recorporatio* à methodicis tantum decantata, ut sine hac chronicos morbos, vix perfecte curari crediderint. Omnes ex textu celluloso indicationes in singulis morbis percurrere, longioris esset quam hic licet, dissertationis. Nihilominus quæ de singulari ac mirabili prope dixerim textu illius fabrica (Sect. I.) proposuimus, tum allatæ observationes (Sect. III, IV.) sat nobis erunt ut jure concludamus.

Ergo in celluloso textu frequentius morbi & morborum mutationes.

TABU.

TABULA DISPUTATIONUM
QUÆ AD MORBORUM HISTORIAM ET
CURATIONEM PERTINENT.

TOMUS VII.

PARS SEXTA.

Auxilia.

CCXXVIII.

A *Brabant VATER & Christ. Gotthfr. SCHOENWALD de erratione per expectationem Witteberg. 1746.* Historiam suam, hæc morbi per spontaneum ulcus sublati præmittit, deinde ad tosses diuturnas emetica laudat, etiam exemplis productis. Inde *STANLIANA*: animæ laudes refutat, ostenditque, ex ea hypothesi anatomæ & pathologiæ neglectum nasci

pag. 2

CCXXIX. *Daniel Wilhelm TRILLER & Ernesti Samuel WENZ de veritate paradoxorum dissi Hippocratici, nullam medicinam interdum esse optimam, Witteberg 1744.* Multa exempla, ex propria experientia desumpta producit, male diligentis medicationis. A fomento humido ad erysipelas cru. is adhibito caries: a repressa scabie convulsiones animi, deliquia, mors ipsa: phthisis etiam & aphonia supervenerunt. A reperculso sudore pedum periculose pectus laboravit. Podagrici dolores funesto eventu suppressi fuerunt, & perinde lethalis lethargus male occlusa pedis ulcera excepit, tum alias inmedicabilis variæ cancer.

22

CCXXX. *Georg. Ernst. STANZ & Gottfr. Sam. RASCH de alterantibus Et speciosis Hall 1703.* Deridet nimias spes, quas aliqui recentiorum de suis medicamentis conceperunt. Negat alterantia morborum ullum curare, absque subsidio evacuantium, ne in acutis quidem malis, neque in vitiis, ut credit, primarum viarum, aut hypochondriaco morbo, & suppressis mensibus, manifesto certe hic nimius. In sola evacuatione spem ponit felicitis & efficacis curationis. Inde peculiariter negat in cornu cervi philosophice calcinato, in unicorru fossili quidquam verarum virium esse, qui idem cinnabarum credat efficacem: tum absorbentia pura. Inde descendit speciosa, primumque millefolium in doloribus ab cæcis hæmorrhoidibus ortis: Nicotianæ extracti in tussi humida: festucæ nescio cuius ad dentium dolorem: arcani proprii in epilepsia, alteriusque modice alvum ducentis remedii in ascitis tumoribus. Sed idem vim specificam scorpiorum non recte admittit. Adgnoscit tamen diversis cognominis morbi speciebus. non parem esse efficaciam specificorum remedium, neque absque methodo proficere.

51

CCXXXI. *Antonii RIEDIGER de veritate virtutis medicamentorum Lips. 1750.*

Tom. VII.

S 555

Speci-

Specifica nulla dari offendit, quod humores nulla unius generis medicina mutare queat, Taraxaci salutarem vim ad morbos per lotium repurgandos confirmat exemplo. Cantharides lento usu & paulatino melius proficere adfirmat. Definitionem dat, quid per specificum intelligat. In peruviano cortice vires cum forti in paroxysmo cordis motu laudat, non perinde, quando respiratio difficilis, rigor artuum capitique dolor extra paroxysmum urgent, ut ego quidem Cl. virum intelligo. Eundem corticem pro nervino remedio habet eximio. Antagonismum aliquem inter aliquos nervos voluntatis minuit, & fibras arteriarum admittit. Camphoram iis convalescere observat, quibus nervi debiles sunt, magis autem ventriculo & utero, quam lieni rebusque prodesse. Rhei vim ad renes imprimis, non ad hepar valere. Monet, ut etiam ad vehicula respiciatur, ne eorum indoles a scopo medicamenti primario aliena sit. Ita diuretica minus commode in theiformi infuso exhiberi, rectius cum frigida. Ita croci vires, quoties de *resolvendo* igitur, melius a sale medio aliquo, quam a vini utilitatis spiritu extrahi. Alias etiam adfectiones, in viribus medicamentorum extrahendis vulgaris spiritus frumenti, alias repetito destillati vini spiritus esse.

pag. 79

CXXXII. *Danielis Wilhelmi Triller*, & qui in titulo auctoris nomen pie se fecit, J. Jacobi Klunze de *specificorum dubia fide* Witteberg 1751. Magnam partem calamitatum artis medicæ a præconcepta opinione pendere, dari, penè ad omnes morbos, specifica medicamina, quibus administrandis quisque idiota perinde aptus sit. Negat veri nominis specifica medicamenta reperiri, ne corticem quidem Cinchonæ. Eundem corticem a gallo, cui nomen du CLOS, cum amaris nultum, imbecille expertus est auxilium. Castoreum in calidis uteri morbis noret. Antihæcticum POTTESI imbellis phthisicos antidotus est. Vaga vocabula medicamentorum antifcorbuticorum &c. reprehendit. Bezoardica & calida in febribus nocent, morbillorum, quos auctor excitat, exemplo. Cephalica antepileptica voces sunt fallaces, nimisque aquarum mineralium laudes sunt.

111

CXXXIII. *Pauli Gyongyossi de empiricis remediis* Hardervic 1753. Argenti vivi laudes habet: quod luem veneream etiam absque salivæ fluxu tollat, exemplo adducto: quod in æthiope minerali latens jam eruptas variolas absque morbo abstergit: quod hydropem sustulerit, scorbuticæque ulceræ faucium (nisi ea alterius naturæ fuerunt): quod ejus usu canis jam hydrophobus sanatus fuerit, quem miror potuisse subigi, ut medicinam pateretur; quod eadem ophthalmia rebellis, non absque pia medici fraude, sit sublata. Librarum duarum hydrargyri, per infortunium absque ullo symptomate subsequente epotatum, exemplum habet. Casu male locatum opusculum melius post n. 236. legetur.

127

CXXXIV. J. Ehrenfried Gessler de *usu vomitorum* Lipsiæ 1746. Eruditi juvenis scopus est, ex physiologicis legibus emeticarum medicinarum variam efficaciam exponere. Quare, cum sanguinis circuitum utique suspendat, & concutiant vehementer, non suadet adhiberi, quoties aut vasa humoribus valde turgent, aut viscera in scirrhum induruerunt. Ob motum autem novum inductum laudat, ad resorbendum sanguinem ex vulnere inter duram membranam & cranium effusum: ad cecitatem simili ex causa ortam. Porro vires medicinæ emeticæ in affectibus soporosis, in morbo in acutorum principis, in peripneumonia vera, & in spuria, in variolis, & ante eruptionem, & si quando retrorsum labi videntur, denique in chronicis morbis laudat: dosimque minorum tutam efficaciam.

141

CCXXXV.

- CXXXV.** *Danielis NEBEL & Bernardini WEPFER auctoris disp. de medicamentis chalybeatis* Heidelbergæ 1711. Exempla curationum ex ill. avunculi sui B. U. N. N. praxi clinica proponit, cachexiam ex nimis mensibus natam, curantque chalybis usu, ostendit cur eam chlorosin chalybs perinde faciat, ac alteram quidem speciem a suppressis mensibus natam, pariterque & promoveat tardum sanguinem & male festinum retardet. Veram mechanica causam sagax indagat, multumque elastico elemento tribuit, quod ab eo metallo adsorbet, quando solvitur. Formulam aperit, linaturam nempe puriorem, cum siliqua dulci contemperatam 165
- CXXXVI.** *Michaelis AUBERTI & Job. HAVIGNORST auctoris de singulari mercurii dulcis usu in desperatis quibusdam morbis* Hall. 1744. Præter vulgatiorem aliquid, tradit imprimis experimenta minoribus mercurii dulcis dosibus capta, ut quotidie vix super tria grana æger deglutiat, totis vero triginta diebus unum medicamentum continuet. Ita fere absque salivatione ulcera cacoethica, perles manantes tuto siccant, cataractarum initia discussa, alique graves morbi superati sunt. Fatetur tamen, in scorbuticis & cancriosis adfectibus hydrargyri melius abstinere. Morbos denique recusat, in quibus ipse movet, minus tuto argentum vivum adhiberi. 181.
- CXXXVII.** *Alexandri CAMERARII nostri olim Præceptoris, & Wilhelmi AGRICOLÆ usus corticis a febre ad icterum extensus* Tubing. 1730. In minime inutili disp. adnotat auctor, crocæam urinae tincturam vehementer adicem esse rubræ illi febrili, quæ post finem paroxysmorum redditur. Videri & febres intermittentes, & icterum ab eadem bile nasci, quæ tamen in febre liberius ad ventriculorum & intestina fluat, in ictero vero retineatur, & reddatur sanguini. Quare & utramque urinam, & morbum utrumque a cortice superari. Curati vero, etiam graviore naturæ icteri septem exempla enumerat. Denique objectiones varias contra tutum corticis usum propositas refutat 185
- CXXXVIII.** *Georgii ENAN. ROSNER disp. qua nomenclatura circa vires lactis notantur* Leid. 1756. Omittimus ingeniosum nutritionis theoriam ad Gouanæ КНИОТН principia per adtractionem & repulsionem explicatæ, deque simili causa naturæ sentientis & irritabilis tentamen: Experimenta producit de vi rubræ tincturæ, qua ossa rachitica confirmat. Inde lac, variis plantis medicatum, vires harum ipsarum plantarum succis majores demonstrasse ostendit, atque sanguinis jacturam lacte vacæ urtica pastæ; contractam alvum lacte ejusmodi animalis lactuca, portulacæ & hujusmodi oleosis nutritæ sanatas fuisse ex Cl. POISSONNIER testimonio recenset. Lactis usum simplicem ad restituendas potius post ruptam vomitum vires, quam ad ipsum pulmoem purulentum repurgandum utilem credit. 226
- CXXXIX.** *J. BORCHER & Jac. VOLMAR. An nitrum sanguinem resolvat an coagulet* Argentor. 1741. Utique per experimenta ostendit, potius resolvere. 249
- CXL.** *Georg. Christoph. DETHARDING & Nicolai Henrici KEMMA de aquæ calis circa usum interno salutari* Rostock 1746. Calcem vivam credit repetita aquæ adfusione debilitari, neque perinde fortiter aquam imprægnare. Venenatam non esse ostendit. Propria experimenta de aquæ calis viribus proferit, in vomica pulmonum, suore albo sætido, obstructione glandularum mesenterii salutaribus. Nutrici datam in malignam insuam impetigine vidit profuisse. Mercurialia medicamenta infantibus fere nocere 258
- CXLI.** *Santæstæ Theodori QUERMALZ progr. quo insusum picis aquosum expendis* Lips. 1744. Analysin Chemicam hujus celeberrimi insusum habet, & de viribus medicis cogitationes aliquas. Iis addit vim antihelminthicam 280

- CXXLII.** *Abrahami VATER & J. Gabrielis MAYER phosphori loco medicamenti adjuncti virtutis medica aliquot casibus singularibus confirmata* Witteberg 1751. Efficax omnino, etsi parum notum medicamentum laudat ad febrem petechialem, aliasque deterioris generis, in quibus vires sustentat, & transpirationem restituit. 188
- CXXLIII.** *Job. JUNKER* cel. clinici, & auctoris *Mart. Frid. BOEHMER casus mæstrona largissimo opii usu per plures annos trallata* Hall. 1744. Hysterica femina opii quotidie per 19 annos integros drachmam unam devoravit 302
- CXXLIV.** *Samuelis Theodori QUELMAZ* progr. de frictionalibus abdomini Lipf. 1749. Antiquum remedium, ab Ill. viro *Ger. v. SWIETEN* multum laudatum, auctor in constipatione alvi diuturna cum intestinorum contractione feliciter adhibuit 317
- CXLV.** *J. Andrea SEGNER*, viri Ill. & *J. Georgii OEDER*, Professoris nunc Hafnensis de derivatione & revulsione per venæ sectionem Gotting. 1749. Ostendit revellere equidem sanguinis missionem, sed eo minus, quo longius a venæ incisæ sede locus adfectus distat. 313
- CXLVI.** *Georgii Ernesti STANZ* & *J. Jeremia COLER* de sanguisugæ usus utilitate disp. Hall. 1699. Laudat hirudines ad emovendas hæmorrhoides, cui alioquin sanguinis jacturæ plurimum tribuebat vir Ill. & exempla profert, in quibus ad viscerum abdominis obstructions varias tellendas, feliciter adhibita sunt adque arthritidem.

P A R S VII.

PRIORUM VOLUMINUM SUPPLEMENTUM.

- CXXLVII.** *Casus Gustavi GAHLRIE* viri ex lapsu lente deficientis casus Leid. 1462. Ex vehementi capitis adlione, & lapsu, gravissima symptomata, crurum paralysis, cum nullo in capite cerebro & spinali medulla comparente vitio nata sunt 195
- CXXLVIII.** *Job. Henrici SCHULZE* docti viri, & *Frid. Wilhelmi BRUNN* casus aliquot mente alienatorum aut perversorum Hall 1737. In primo, consua viscerum abdominis coalitio, & tubercula pulmonis gypso plena: quatuor alij ægri sanati 325
- CXXLIX.** *J. BORN & David VIPACHER*. Casus ægri noctambulæ morbo laborantis resolutus, Lipf. 1717. Studiosi hystoria, qui per somnum ad libros evolvendos solitaque studia se conferebāt. 438
- CC.** *Thomas SCHWENKER* viri casus explicatio anatomico-medica Hag. 1733. Ab adliso occipite sensim suborta hemiplegia, sublata tamen, tum virium lapsus, somnolentia, urina cruenta, febris longa: in cadavere thorax quidem solidus, offensus, absque respirationis memorabili vitio, hydatides in pia membrana cerebri, aqua inter cerebri gyros effusa, cerebrum durum, tendinis simile, exsuccum. Sanguis ex vasis universi corporis nullus 459
- CLI.** *Car. Frid. KALTSCHMIDT* progr. de hydrocephalo interno varæ magnitudinis Jen. 1752. Novem aquæ libræ sub membrana cerebri effusæ, cerebrum compressum, compactum, durius, ut tamen de medulla parum superesset.

- perisset. Tres lobis cerebri distincti, glandula pinealis vesicæ aqua plene similis, insundibulum duplo amplius aquæ comæatui patulum; nervi sere aboliti, ossa cranii solito more clausa, ut in sano homine T. XXXI. a. b. 484.
- CCLII. Caroli Frid. HOFSTETTER de spina bifida Altdorf 1703. Historia ejusmodi morbi ut solet esse funestis. Tab. XXXII. 485.
- CCLIII. J. Ignatii GIZO de spina bifida Vienn. 1754. Aliud exemplum cum anatome aliquantum accuratiori vertebrarum, ligamentorum, medullæ spinalis, nervorum Tab. XXXIII. 500.
- CCLIV. Wilhelmi Ulric WALDSCHMIDT & Christ. Henr. SCHEFFER de morbo epidemico convulsivo per Holfatiam grassante oppido raro Kel. 1717. Morbus idem, qui ex usu fecalium clavorum solet oriri, et alias causas auctor accusat 518.
- CCLV. G. Wolff. WEDEL & J. Christiani WOLF disp. de morbo spasmodico maligno in Saxonia, Lusatia vicinisque locis grassata &c. adhib. grassante, Jen. 1717. De eodem malo, cui & ipse WEDELIUS causas quaerit 522.
- CCLVI. Joannis STARR & F. J. Erbe de SCHOENLEBEN de remedia sub lingua speciali cum casu Erford 1734. A calculo salivari causa mali fuit, ut fere solet 564.
- CCLVII. J. Gotofredi SCHEID historia mulieris qua inopinato casu subito loquelam amisit &c. ex desperato repente recepit Argentor. 1725. Ab excreto cum sanguine pure loquela restituta. Admissa est lacerti de ventriculo rejecti historia 574.
- CCLVIII. Sigismundi SCHMIEDER de polypo œsophagi vermiciformi rarissimo a pulceris stercutorii hispanici abusu progenito Hall. 1717. Frustra ventriculum sollicitavit, peritque consumtus. In gula sanguine fere polypus fuit Tab. XXXIV. 594.
- CCLIX. J. Friderici ZIESNER varus œsophagi morbus Regiom. 1712. Difficultas in deglutendo sensim aucta, funesta: ulcus in œsophago, & ex ulcere rupta gula. 629.
- CCLX. Job. MILLER de morbo Tyntör Hungaria endemia Leid. 1717. Feculicula ex debiliore digestionis difficilis cibi descriptio, deinde aliqua de peculiari ingenio morborum Hungaricorum 639.
- CCLXI. Mariani SEIGER ep. de jussulo pulli lienteria specifico Valentiz edita, & nata ab observatione naturæ 677.
- CCLXII. MOUNSONMITH de colica apud incolas caribenses endemia Leid. 1717. Vera colica pictorum ex intemperantia potissimum nata. 682.
- CCLXIII. Andrea Elia BUCHNER & J. Car. Eberhard HABENSTADT de scirrbo mesenterii exulcerato Hall. 1756. 697.
- CCLXIV. Abrahami VATER & J. Frider. SCHIMMER de calculi in vesica fellea generatione Witteberg 1722. Aliquot exempla diversis generis calculorum profert vir Cl. Icterus inde constanter nasci, negat expertus 714.
- CCLXV. Antoni de HAAK, Ill. viri, historia anatomica medica morbi miri incursabilis Hagæ 1744. Impedimenti nempe in retinendo cibo, vomitus abdominis tumoris, ab omenti putridi aucta mole cum duro hepate, intestinis inter se cumque vicinis membris connatis. 722.
- CCLXVI. Henr. Frider. DELII & auctoris Guil. Friderici BOENNEKEN hydrops ascites imprimis paracentesi feliciter curatus Erlang 1715. Solam historiam morbi de longiori disputatione conservavi, ut chartæ parcerem. Oportuisset autem etiam sex ultimas lineas omisisse, quæ p. 736. a vocibus *crura vero* incipiunt, & me absente, neque correctioni præfecto, irreperierunt 734.

- CCLXVII. *Frid. Godofr. BARBER & Erhardi BRUNNER de corde oculo indeque hydropse ascite consequente* Duisburg 1701. Pulmones inter se mutuo & cum pericardio commati, pericardium cum corde coalescens cor oculuerunt. Adjecta est Cl. BRUNNER omnino memorabilis de villis intestinum diff. quos vasis lacteis continui, multaque vascula, per ductum thoracicum replenda, continere vidit 737
- CCLXIII. J. de BUCHWALD & Nicolai RYBERG *de diabetis curatione cum primis per Rhubarbarum* Hafn. 1733. Curatioque exempla, in quibus exiguu, fere scropuli unius, dosis rhei lento usu morbum formidabilem subegit* 762
- CCLXIX. *Gorgii Christiani DETHARDING & Franc. Philippi KNAUD de hemorrhoidibus vesicae mucosae* Rostoch 1764. Idem morbus est, nuper a Cl. LEUTAUD descriptus, in quo plurimus absque calculoso vitio mucus per urinam redditur. Eum Cl. DETHARDING vices hemorrhoidum non fluentium tenere persuadetur, & restituta ea salutari hemorrhagia sanari 775
- CCLXX. *Jac. Henrici Christiani ADAMI de materia calcarea post diuturnam arthritidem per vias urinarias educta observatio singulari* Luben 1740. Arthritice materiae introrsum conversae tribuit calculosorum fragmentorum diuturnam ejectionem, fracturorumque quasi lapillosum: deinde materiae tenacis, & argillaceae adeo quidem copiosam ad lotium miscelam, ut gutta quaeque maculam relinqueret. Calculus nempe vesicae, ut nimis frequenter fit, podagris supervenerat. Materies ex calcarea cum acidis liquoribus effebuit, cum nullus quidem sal lixivius a medico propinatus fuisset: in igne odorem volatilem urinosum sparsit: destillata dedit elementa urinosa volatilia 795
- CCLXXI. *Philippi GORRI historia & curationis epidemicae quae anno 1762. & 1763. Tergester incolas vastavit* Vienn. 1764. Ex remittentium genere erat, sed maculis purpureis, aut petechiis, multaque maligniorum symptomatum cohorte comitata, cum nausea, aliisque in eo febrium genere familiaribus signis. Emeticis dato, aqua acidis succis temperata, nonnunquam etiam analepticiis medicamentis superabatur 819
- CCLXXII. *Berchardi MAUCHART de lue vaccarum Tubingensi* disp. prior Tubing. 1745. Debuisset in tomo IV apparuisse, cum vero serius ad me pervenerit, melius tamen etiam nunc collectioni nostra accedit. Continet historiam accuratam morbi notissimi per diarrhoeam funestis. In cada-veribus signa fuerunt inflammatae ventriculi, qui Onafus dicitur, tum pulmonis. Malum per contagium in capras & sues denique transit, non tamen in homines, qui caribus, fumo equidem maceratis impune passi sunt. Duae tertiae partes tamen insectarum morbo vaccarum sumtis medicamentis convalescerunt. 837
- CCLXXIII. *Francisci THIERRY thesis in haec verba Ergo in celluloso textu frequentius morbi & morborum mutationes* Paris 1757. Altera & aucta editio libelli, quem praesidi tribueram olim, cum pleraque utique innugralia specimina praesidium fuit opus. Describit vir Cl. cellulosum textum, & utilitatem ejus physiologicam exponit, morbos subjicit, & morborum per eum textum migrationes 856

F I N I S.



